
L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Cardiophorus sacratus v. nov. tokatensis. — Modice pubescens, niger, thorace postice rufo notato. Asie M^{re} : Tokat (coll. Pic). — Distinct par la partie antérieure du prothorax entièrement noire, angles compris et la pubescence peu fournie.

Cardiophorus sacratus v. nov. Augustalisi. — Niger, sat dense pubescens, elytris subœneis, geniculis rufescentibus. Mésopotamie (Frère Augustalis in coll. Pic). — Variété distincte par la coloration foncée de son prothorax.

Cardiophorus nigricornis v. nov. brevinotaticollis. — Thorace rubro, in medio nigro notato. Syrie (coll. Pic). Diffère de la forme type par la présence, sur le prothorax, d'une seule macule noire isolée et placée sur le milieu de cet organe.

Nanophyes (Corimalia) obscuriceps n. sp. — Satis elongatus, antice attenuatus, subnitidus, sat dense et longe griseo pubescens, testaceus, capite postice obscuro, oculis, pedibus abdomineque pro parte nigris, elytris ad suturam et lateraliter in medio nigro notatis, aliquot brunneo notatis.

Assez allongé, rétréci antérieurement, un peu brillant, assez densément pubescent de gris, cette pubescence longue, plus condensée sur la suture derrière l'écusson et d'ordinaire aussi sur les côtés du prothorax ou le milieu, testacé avec la tête obscurcie en dessus derrière les yeux ceux-ci et la poitrine noirs, élytres marqués, sur la suture et au milieu des côtés, d'une bordure noire, celle-ci passant au brun chez les exemplaires moins colorés. Rostre long ; front convexe ; antennes grêles, à funicule de 5 articles et massue à articles presque soudés ; prothorax assez court, nettement rétréci en avant, concolore, parfois avec de vagues macules discales obscurcies ; élytres à peine plus larges que le prothorax, courtement rétrécis postérieurement, séparément subarrondis au sommet ; pattes longues, à cuisses multidentées, testacées avec les tarsi en partie obscurcis et une tache foncée, ou rembrunie, sur le dessus des cuisses antérieures. Dessous du corps foncé avec l'abdomen testacé à l'extrémité, le prothorax et la tête étant aussi de cette dernière coloration. Long. 3 mill. environ. Recueilli en Mésopotamie et obligeamment procuré par le Frère Augustalis.

Cette nouveauté, voisine de *M. languidus* Boh. en diffère nettement au moins par la présence, sur les élytres, d'une bordure suturale et externe foncées ou rembrunies. Il se pourrait que cette espèce se rapporte au *N. languidus* Bris. (exemplaires de Syrie et Sarepta) certainement différent (ex description) du *N. languidus* Boh., originaire de Sicile, et décrit comme étant entièrement roux-testacé avec seulement les yeux et la poitrine foncés.

Dolichopyga balcanica n. sp. — Angustatus, nitidus, griseo pubescens, niger, supra subcœruleo-plumbeus, antennis ad basin, palpis, tibiis tarsisque pro parte testaceis,

Étroit et allongé, brillant, revêtu d'une pubescence grise, assez rapprochée, pas sensiblement plus dense sur le pourtour des élytres, noir avec le dessus offrant une coloration d'un bleu-plombé, base des antennes, palpes, tibias et tarses en partie testacés. Tête déprimée entre les yeux, longue, pas plus large que le devant du prothorax ; antennes grêles ; prothorax à ponctuation pas très forte ni rapprochée, long, modérément élargi en avant, à longue impression postérieure médiane se prolongeant en forme de sillon antérieurement, une impression médiane arquée et transversalement placée ; écusson triangulaire ; élytres longs, rétrécis à l'extrémité, densément et ruguleusement ponctués, sans côtes distinctes ; tibias postérieurs faiblement arqués. Long. 18 mill. Balkans (coll. Pic).

Voisin de *D. incana* Schmt., ponctuation du prothorax moins forte, ou moins rapprochée, cet organe de forme plus étroite et peu élargi en avant, etc.

Chitona innotaticollis n. sp. — Angustatus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, elytris albido cinctis, nigro-æneus, antennis palpisque ad basin, tibiis, tarsisque pro parte testaceis.

Étroit et allongé, brillant, revêtu d'une pubescence grise assez espacée avec les élytres étroitement bordés d'une pubescence plus serrée blanchâtre, noir à reflets bronzés, base des antennes, palpes en partie, tibias et dessous des tarses testacés. Tête bombée entre les yeux, pas très longue, avec les yeux à peine plus large que le devant du prothorax ; antennes grêles ; prothorax à ponctuation pas très forte, rapprochée par places, long, à peine élargi en avant, marqué sur le disque de plusieurs impressions longitudinales avec une faible dépression médiane transversale ; écusson large, densément pubescent de blanc ; élytres assez longs, très rétrécis à l'extrémité, densément et ruguleusement ponctués, sans traces de côtes nettes ; pattes foncées avec tibias et partie des tarses testacés. Long. 7 mill. Tunisie (coll. Pic).

Voisin de *C. gracilicollis* Frm., s'en distingue par le prothorax à pubescence uniforme, sans macules pubescentes postérieures nettes, la coloration plus foncée des pattes, etc.

Probosca nigrofemorata v. nov. **purpureomicans**. — Supra purpureo-micans. Tunisie (coll. Pic).

Très distinct de la forme typique, dont la coloration du dessus du corps est verte, parfois à reflets dorés, par la coloration du dessus pourprée, à reflets métalliques.

Cryptocephalus Augustalisi n. sp. — Testaceus, capite, thorace elytrisque ad humeros et postmedium nigro maculatis, infra corpore pedibusque pro parte testaceis, pro parte nigris. Variat : elytris aliquot testaceis, ad humeros nigro maculatis thoraceque nigro, testaceo limbato, in disco maculis testaceis notato (var. *euphraticus*).

Robuste, convexe, brillant, presque glabre en dessus, assez densément pubescent de gris argenté en dessous, testacé avec la tête, le prothorax et les élytres diversement maculés de noir, écusson noir, parfois taché de jaune, dessous du corps et pattes en partie testacés, en partie noirs. Tête testacée, à ligne frontale et macules entre les yeux foncées, celles-ci parfois réunies, ponctuation forte, rapprochée ; antennes foncées à base testacée ; prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation forte et écartée, testacé, bordé de noir antérieurement et postérieurement avec une large fascie discale noire ondulée, recourbée en arrière et n'atteignant pas les côtés ; élytres à peine striés avec des rangées de points forts, courts, rétrécis en arrière, séparément arrondis au

sommet, tantôt testacés avec sur chacun une macule humérale et plusieurs macules postmédianes transversalement placées, noires (forme type), tantôt avec une seule macule humérale noire petite (v. *euphraticus*) ; pygidium testacé, parfois foncé en arrière ; dessous du corps testacé, taché de noir ; pattes testacées, milieu des cuisses et tibias maculés de noir. Long. 4,4-5 mill. Bords de l'Euphrate (Frère Augustalis, in coll. Pic).

Rentre dans les Ondulés de Marseul en étant voisin de *C. arabs* Suf. dont il se distingue, à première vue, par le dessin des élytres.

Cryptocephalus albidiceps n. sp. — Minutus, infra niger, supra cærulescens, capite, antennis ad basin, thoracis limbo antice pedibusque pro parte pallidis.

Cette petite espèce a le prothorax marqué d'une ponctuation allongée, pas très forte et écartée, les élytres à stries faibles ponctuées de points profonds, moins marqués postérieurement, les quatre pattes antérieures sont flaves avec le dessus des cuisses linéolé de foncé et les postérieures sont presque entièrement foncées ; elle se rapproche de *C. punctiger* Payk., mais le prothorax a des reflets bleuâtres et la forme du corps est moins allongée. Long. 2,5 mill. environ. Sibérie (coll. Pic). Reçu de v. Bode-meyer.

Cryptocephalus vittatus v. nov. *reductevittatus*. — Vitta lutea elytrorum antice oblitterata. Asturies (coll. Pic).

Cette variété se distingue, à première vue, de la forme type par la bande jaune du disque des élytres non prolongée jusqu'à la base.

Cryptocephalus lusitanicus v. nov. *unioblitteratus*. — Tarsis anticis flavis, elytris ad humeros et post medium unimaculatis. Espagne : Valence (coll. Pic). Reçu de Paganetti. — Diffère de la var. *lividimanus* Ksw. par les élytres n'ayant chacun que deux, au lieu de trois, macules noires.

Cryptocephalus octacosmus v. nov. *lateniger*. — Signaturis luteis elytrorum valde reductis, pro parte indistinctis. F^{ce} M^{te} (Gabillet in coll. Pic).

Les macules jaunes discales et latérales sont réduites à de simples traits et, vus de loin, les élytres paraissent presque entièrement noirs. Cette variété nouvelle est voisine de la variété *oneratus* Weise.

(A suivre.)

M. Pic.

DIAGNOSES DE DASCILLIDES ET CYPHONIDES NOUVEAUX

Ces présentes diagnoses sont publiées ici pour permettre à un certain nombre de nouveautés de figurer dans le *Coleopterorum Catalogus des Dascillidæ et Cyphonidæ* = *Helodidæ* que je prépare actuellement ; plus tard je reparlerai de certaines de ces espèces et publierai, à l'occasion, leurs descriptions. Ces diverses nouveautés figurent toutes dans ma collection et ont été acquises en partie avec la collection Van de Poll.

Dascillus birmanicus. Subparallelus, postice mediocre dilatatus, nitidus, griseo-luteo aut fusco pubescens, niger, elytris abdomineque postice testaceis. Long. 9 mill. Birmanie. — Voisin de *D. Holzi* Pic, mais un peu élargi en dessous du milieu des élytres et pubescence différente.