

# SYNONYMIA INSECTORUM.

---

GENERA ET SPECIES

CURCULIONIDUM.

---

TOMUS OCTAVUS. — PARS SECUNDA.

GENERA ET SPECIES  
**CURCULIONIDUM,**

CUM

SYNONYMIA HUIUS FAMILIÆ;

A

C. J. SCHOENHERR.



SPECIES NOVÆ AUT HACTENUS MINUS COGNITÆ,

DESCRIPTIONIBUS

A DOM. L. GYLLENHAL, C. H. BOHEMAN, O. J. FAHRÆUS  
ET ENTOMOLOGIS ALIIS

ILLUSTRATÆ.

TOMUS OCTAVUS. — PARS SECUNDA.

SUPPLEMENTUM

CONTINENS.

PARISIIS,

APUD RORET, VIA HAUTEFEUILLE, N° 10 bis.

LIPSIAE,

APUD FRED. FLEISCHER.

1845.

**VIRO**

**PRÆCLARISSIMO ET CELEBERRIMO**

**DOMINO**

**CAROLO JACOBO SUNDEVALL,**

**MED. DOCTORI, PRÆFACTO MUSEI ZOOLOGICI ACADEMIÆ SCIENTIARUM  
SUECANÆ,**

**HAS PLAGULAS,**

**SIGNUM VENERATIONIS, AMICITIÆ ANIMIQUE GRATI,**

**OFFERT**

**AUCTOR.**

# LIBRI

## IN SYNONYMIA INSECTORUM CITATI,

ET

### ABBREVIATIONUM EXPLICATIO.

( CONTINUATIO. )

---

BURMEISTER, z. *Naturg. d. Gatt. Calandra*. Zur Naturgeschichte der Gattung *Calandra*, nebst Beschreibung einer neuen Art. *Calandra Sommeri*, von D. HERMANN BURMEISTER. — Berlin 1837. 4°.

LABR. et IMHOFF. *Gen. Curcul.* — Singulorum Generum Curculionidum unam alteramve speciem additis iconibus a David LABRAM ad Naturam delineatis illustravit L. IMHOFF. Pars I. — Basel 1842. 8°.

MANNERH. *Beitr. z. Käfer. Fn.* — Beitrag zur Käfer. — Fauna der Aleutischen Inseln, der Insel Sitkha und Neu-Californiens, von Graf C. G. MANNERHEIM. (*Aus. d. Bullet. der Naturforsch. Gesellsch. in Moscou, Band. 16. 1843.*) 8°.

*Proceed. of the Ent. Soc. of Lond.* — Journal of proceedings of the Entomological Society of London. — London 1841. 8°.

STURM. *Catal. 1843.* — Catalog der Käfer. — Sammlung von Jacob STURM. Mit 6 ausgemalten Kupfertafeln. — Nurnberg 1843. 8°.

---

Scientiæ entomologicæ cultoribus hoc opus dedico, in quo per triginta annos elaboravi, et familiam Curculionidum systematice, ut potui, in 644 genera divisi et descripsi, nec non 7000 mihi cognitæ ejusdem familiæ species definivi, quarum tantummodo 700 aut 800 ante inceptum hoc opus descriptæ erant.

Manca multa et imperfecta, quæ scientiæ entomologicæ periti sine dubio in hoc opere deprehendent, neque negare neque defendere animus est; ea vero excusatione uti liceat, multa ejusmodi neque opera quam maxime impensa, neque commercio litterarum, ad has res illustrandas, frequenter et per multos jam annos cum permultis Dom. Entomologis in et extra Europam instituto, me tollere potuisse. Pro virile tamen conatus sum amatæ prodesse scientiæ, nec possum, ut volo et debeo, grati animi sensa testificari ob benignitatem et liberalitatem, qua multi me persecuti sunt amici, qui hoc opus meum ultro juvarunt et permultis tum descriptionibus specierum plerumque novarum, tum diagnosisibus antea cognitarum, sed nondum accurate descriptarum, locupletarunt.

In hac gratiarum actione primo loco nominandi sunt : antehac Centurio, nunc vero Musei Entomologici Regiæ Academiæ Scientiarum Stockholmiensis Intendens, Professor Dom. C. H. BOHEMAN, qui opera prorsus indefessa et accuratissima 20 nova genera, me ægrotante, definivit, ac 3050 novas species descripsit, necnon 310 aliarum novas easque emendatiores diagnoses exposuit; — amicus numquam obliviscendus, quem morte abreptum scientiæ entomologicæ studiosi lugemus, Excubiarum Præfectus, Eques Dom. GYLLENHAL, cui pari modo descriptiones 1573 specierum aliarumque 259 diagnoses debemus; — Consiliarius Regis Sueciæ augustissimi, Commendator Reg. Ord. de Stella Polari, Dom. O. F. FAHRÆUS, qui descriptionibus 601 species et 67 alias dia-

gnosibus illustravit; — Medic. doctor Dom. EB. MUNCK AF ROSENCHOELD, qui 122 descriptiones et 31 diagnoses nobis subministravit. — Proximum locum sibi vindicant ii, qui pauciarum specierum descriptiones nobis obtulerunt : Præses Imper. Dicasterii principalis Wiburgensis, Commendator, Dom. Comes MANNERHEIM; — Consiliarius status Imp. Ross. Eques Dom. GEBLER, in Barnaule Sibiriae; — Professor, Eques, Dom. Doct. SAHLBERG; b. m. Professor, Doct. DALMAN, et Professor Dom. GERMAR, Halæ, cui amico multa etiam in synonymia constituenda debeo accurate exposita et correctâ.

Amicis denique cæteris, quibus placuit nova genera novasque species Curculionidum describenda mecum communicare, gratias me agere oportet maximas ob bonam hanc erga me voluntatem illamque scientiæ amplificationem, quam hoc modo spectarunt et effecerunt.

Utinam hæc communia nostra studia ad id conduxerint, ut majorem lucem affuderint scientiæ amatæ, admiratione sui scrutatores naturæ semper impleturæ et amplitudine sua prorsus infinita immensæ CREATORIS potentiæ incredibilisque rerum creaturarum ubertatis imaginem, licet imperfectam, semper exhibituræ!

Sparresæter prope Skaram, d. XII Aprilis MDCCCXLIV.

---

FAMILIA  
CURCULIONIDES.

ORDO SECUNDUS.

GONATOCERI.

REGIO II. — MECORHYNCHI. (*Rhynchænides*. Fabr.)

SECTIO I. — *Antennæ articulis 11, 12; clava 4-articulata.*  
(Gen. 344-584.)

DIVISIO II. — APOSTASIMERIDES.

*Pedes antici basi in plerisque distantes, inter quos pectus aut planum, aut plus minusve distincte canaliculatum.* (Gen. 450-584.)

SUBDIVISIO III. — CRYPTORHYNCHIDES.

*Pectus inter pedes anticos in plerisque distincte canaliculatum.*  
(Gen. 506-584.)

(CONTINUATIO)

COHORS II. — *Thorax infra, pro receptione rostri, aut minus distincte, aut vix canaliculatus; canalicula in pectore in plerisque haud continuata, sed nunquam distincte terminata.* (Gen. 549-584.)

TRIBUS I. — *Scutellum in plerisque distinctum (in paucis omnino caret (1)).* (Gen. 549-573.)

CENUS 549. — HETEROPUS. Chevrolat.

*Character generis.* — *Antennæ mediocres, validæ; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, re-*

---

(1) Ex. gr. species nonnullæ inter genera *Ithyporus* et *Strongylopterus*.

liquis brevioribus, basi rotundatis, apice truncatis; clava oblonga, apice obtusa, sub-spongiosa.

Rostrum longiusculum, sub-tenuè, arcuatum.

Oculi demissi, rotundati, sub-depressi.

Thorax sub-globosus, basi in medio sub-productus, apice utrinque emarginatus, pone oculos lobatus.

Elytra sub-ovata, basi conjunctim introrsum perparum emarginata; humeri obtuse angulati.

Pedes robusti, compressi; femora clavata; tibiæ anticæ intus et extus angulato-dentatæ, posticæ apicem versus latissimæ, valde compressæ.

DESCRIPTIO. — *Corpus* oblongo-sub-ovatum, modice convexum, sculpturatum, alatum; majoris magnitudinis. — *Antennæ* ad thoracis medium vix pertingentes, in medio rostri insertæ, validæ, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculum non attingente, recto, clavato; 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> longiusculis, obconicis; 3-8 brevioribus, basi rotundatis, apice truncatis, sub-coarctatis; clava parva, oblonga, fere cylindrica, apice rotundata, sub-acietata, 4-articulata, sub-spongiosa, articulis arctissime connexis. — *Caput* parvum, valde convexum. — *Rostrum* capite triplo longius, sub-tenuè, teres, subtus apicem versus paulatim attenuatum, modice arcuatum, inflexum, lateribus utrinque canalicula, ab oculo ad apicem ducta, exaratum. — *Oculi* laterales, demissi, rotundati, sub-depressi. — *Thorax* latitudine baseos nonnihil brevior, basi in medio parum productus, lateribus æqualiter valde rotundato-amplius, apice utrinque emarginatus, pone oculos perparum lobatus, supra modice convexus; rima thoracis distincta, lateribus argute marginata, ante pedes anticos desinente. — *Scutellum* mediocre, apice rotundatum. — *Elytra* basi thoracis parte postica dimidio latiora et latitudine fere duplo longiora, sub-ovata, basi conjunctim introrsum leviter emarginatâ, humeris obtuse angulatis; posterius attenuata, apice conjunctim obtuse rotundata, pygidium sub-obtegentia; supra modice convexa. — *Pedes* mediocres, longitudine sub-æquales, robusti; femoribus clavatis, crassiusculis, sub-compressis; tibiis compressis, anticis intus, extus et apice angulato-dentatis, posticis apicem versus latissimis, dilatatis, intus curvatis, valde compressis; tarsis subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, falcato, bi-unguiculato.

Ab ἕτερος, diversus, πούς, pes.

Typus. — *Heteropus Africanus*; e Senegallia.



1. *H. AFRICANUS*. (Chevrolat.) — *Oblongo-ovatus, niger, sub-opacus; capite parvo, sat crebre rugoso-punctato; rostro tenui, arcuato, basi ruguloso; thorace amplo, sub-globoso, confertim punctato; elytris sat profunde crenato-punctatis, interstitiis planis, vage punctatis.*

*Patria* : Senegallia. Mus. Dom. CHEVROLAT.

*Magnitudo Cratosomi pterygomalis.* Caput parvum, rotundatum, convexum, sat crebre mediocriter punctatum, nigrum, opacum, nudum; oculi rotundati, sub-depressi, brunnei; rostrum capite triplo longius, sub-tenuè, teres, modice arcuatum, inflexum, basi ruguloso-punctatum, extrorsum sub-læve, nigrum, parum nitidum, glabrum. Antennæ mediocres, validæ, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava parva, sub-cylindrica, apice rotundata, dense cinereo-pubescente. Thorax amplus, latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque sat profunde emarginatus, pone oculos parum lobatus, supra rotundato-productus, lateribus valde æqualiter rotundato-amplius, basi in medio parum productus, tenue marginatus, supra modice convexus, confertim mediocriter punctatus, niger, sub-opacus, glaber. Scutellum mediocre, apice rotundatum, confertim coriaceum, concolor. Elytra basi conjunctim introrsum leviter emarginata, thoracis basi dimidio fere latiora, humeris obtuse angulatis; posterius sensim attenuata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, sat profunde crenato-striata, interstitiis planis, vage mediocriter punctatis; nigra, sub-opaca, glabra. Corpus subtile sat crebre punctatum, nigrum, nitidum, glabrum. Pedes mediocres, validi, nigri, sub-nitidi; femoribus crassiusculis, sub-compressis, anticis breviter dentatis, remote punctatis; tibiis compressis, anticis intus, extus et apice angulato-dentatis, posticis apicem versus latissimis, dilatatis, omnibus crebre punctatis, fulvo-setulosis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 550. — DESMIDOPHORUS. Chevrolat.

*Hujus operis* IV. p. 360. genus 337.

\* 1. *D. HEBES*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 361. 1. — *P. Bengalia.*

\* 2. *D. CUMINGII*. (Schh.) — *Breviter ovatus, convexus, ater, parce setulosus; capite rostroque profunde punctatis; thorace angustiore,*

*pulvinato, profunde crebre punctato, basi inæqualiter maculaque apicali albo-squamosis; elytris profunde punctato-sub-sulcatis, albo-squamosis, singulo maculis quatuor, magnis, atris, denudatis, decorato; tuberculis nonnullis atro-fasciculatis instructis.*

*Mas* : rostro nonnihil breviori, undique profunde punctato, abdomine basi impresso.

*Femina* : rostro nonnihil longiori, remotius apicem versus subtilius punctato; abdomine basi convexo.

VAR.  $\beta$ . Thorace macula utrinque basali, elytris linea suturali, antice macula regulari disci punctisque nonnullis apicis albo-squamosis.

VAR.  $\gamma$ . Thorace macula utriusque basali, elytris maculis plurimis sparsis, albo-squamosis.

*Desmidophorus pustulosus*. SCHH. in litteris, olim.

*Patria* : Insulæ Philippines. D. D. CUMING et WALTON. MUS. SCHH. A. DOM. SOMMER ad conferendum missus.

*Desmidophoro hebeti* magnitudine et statura æqualis; thorace minus lato, elytris profundius punctato-sulcatis, albo-squamosis vel maculatis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, sat crebre profunde punctatum, atrum, sub-nitidum, glabrum; oculi ovati, parum prominuli, brunnei; rostrum thorace nonnihil brevius, validum, parum arcuatum, supra convexum, in mare undique, profunde in femina apicem versus subtilius remotius punctatum, in utroque atrum, sub-nitidum, parce setulosum. Antennæ mediocres, nigrae, pallido-setulosæ; clava valde elongata, acuminata, dense griseo-pubescente. Thorax latitudine postica brevior, antice duplo angustior quam basi, apice utrinque sat profunde emarginatus, lobo medio lato, antrorsum producto, obtuse rotundato; lateribus anterie obliquis, posterius rotundato-ampliatis; basi bi-sinuatus, elevato-marginatus, supra modice convexus, pulvinatus, confertissime profunde punctatus, ater, parum nitidus, setulis depressis, concoloribus adpersus, basi inæqualiter maculisque duabus apicalibus albo-squamosis. Scutellum rotundatum, punctatum, medio longitudinaliter impressum, atrum. Elytra antice sub-sinuata, thoracis basi fere dimidio latiora, angulo humerali lateraliter extenso-rotundato; lateribus non ampliata, posterius angustiora, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, postice declivia,

profunde sulcata, sulcis rude punctatis, interstitiis planis, rugulosis; atra, albido-squamosa, parce setulosa, maculis magnis, atris, denudatis, nempe una basali, altera in medio ad latera minore, tertia intra apicem et quarta in dorso communi, insignita, interstitio secundo et quarto tuberculis tribus obtusis, dense atro-setulosis obsitis. Corpus subtus sat crebre rugoso-punctatum, atrum, opacum, squamulis albidis setisque nigris adpersum. Pedes validi, atris, profunde punctati et rugulosi, squamis pallidis parce adpersi; femoribus parum clavatis, subtus dente obsoleto armatis, tibiis compressis, anterioribus arcuatis, nigro-setulosis; tarsis dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

3. D. AUREOLUS. Chev. — *H. op.* IV. p. 361. 2. — *P.* Java.

4. D. CONFUCH. Schh. — *H. op.* IV. p. 362. 3. — *P.* China.

\* 5. D. IMHOFFII. (Schh.) — *Breviter ovatus, niger, squamis parvis, setiformibus, silaceis obsitus; fronte obsolete carinata, rostro sat profunde crebre punctato; thorace pulvinate, confertim rude rugoso-punctato, margine apicali bi-, dorso medio transversim quadrituberculato; elytris sub-sulcatis, sulcis rude remote punctatis, interstitiis alternis tuberculis silaceo-fasciculatis, seriatim crebrius obsitis; humeris lateraliter extensis, acutis; femoribus dentatis.*

*Patria:* Java. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Magnitudo et statura *Desmidophori aureoli*; colore indumenti, thorace profundius rugoso, sex-tuberculato, elytrorum interstitiis crebrius seriatim tuberculatis, humeris lateraliter extensis, acutis, femoribus dentatis, etc., ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, supra parum convexum, sub-remote rugoso-punctatum, nigrum, squamis setiformibus, silaceis dense adpersum; fronte linea brevi, vix elevata, lævi, apice foveola parva adjecta, instructa; oculi ovati, parum prominuli, brunnei; rostrum thorace paulo brevius, validum, teres, sub-arcuatum, supra convexum, sub-remote basi profundius extrorsum subtiliter punctatum, nigrum, squamis concoloribus adpersum. Antennæ mediocres, nigropiceæ, pallido-setulosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, atra. Thorax latitudine postica brevior, antice duplo angustior quam basi, apice utrinque profunde emarginatus, lobo medio supra antrorsum producto; lateribus anterie obliquis, posterius rotundato-ampliatis; basi bi-sinuatus, supra modice convexus, pulvinatus, profunde crebre rugoso-punctatus, margine apicali tuberculis

duobus majoribus, approximatis, silaceo-fasciculatis, et in medio dorsi quatuor transversim locatis, minoribus; niger, squamis angustis, setiformibus, silaceis sat dense adpersus. Scutellum rotundatum, elevatum, medio impressum, parce silaceo-squamosum. Elytra antice sub-sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris lateraliter valde extensis, acutis; posterius angustiora, apice singulatim obtuse acuminata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, postice declivia, sub-sulcata, sulcis rude remote punctatis; interstitiis planis, subtiliter coriaceis, alternis tuberculis plurimis, silaceo-fasciculosus, in medio brunneis, seriatim obsitis; nigra, squamulis setiformibus, silaceis sat dense obsita. Corpus subtus sat crebre punctatum, nigrum, squamositate densa, silacea tectum. Pedes validi, nigri, sat crebre punctati, silaceo-squamosi; femoribus parum incrassatis, subtus dente brevi, sub-obtusò armatis; tibiis sub-teretibus, anterioribus arcuatis; tarsis dilatatis, subtus fulvo-spongiosis. — BEN.

6. *D. SENEX*. (Chevrolat.)—*Sub-ovatus, ater, albo-setosus, pilositate albida et atra hinc inde fasciculatim obsitus; antennis tenuioribus, rostro remote punctato, glabro, nitido; thorace pulvinato, profunde crebre punctato, intra apicem leviter constricto; elytris sub-sulcatis, sulcis rude sat crebre punctatis, fasciculis nonnullis atris instructis; femoribus subtus dentatis.*

*Trichosomus id.* DOM. CHEVROLAT in litteris.

*Patria:* Madagascar. A DOM. CHEVROLAT ad describendum missus.

*Desmidophoro hebeti* nonnihil longior et angustior. Caput rotundatum, supra sub-planum, crebre sat profunde punctatum, nigrum, sub-nitidum, setis depressis, albidis parce adpersum; oculi ovati, haud prominuli, brunnei; rostrum longitudine thoracis, minus validum, teres, modice arcuatum, remote basi profundius extrorsum subtiliter punctulatum, atrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, antice duplo angustior quam basi, apice utrinque profunde emarginatus, lobo medio lato, antrorsum producto, obtuse rotundato; intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis; basi bi-sinuatus, supra modice convexus, pulvinatus, confertim profunde punctatus; ater, pilis longis, albidis, antè atris mixtis, sat dense obsitus. Scutellum rotundatum, elevatum, atrum, albo-setulosum. Elytra sub-ovata, antice leviter tri-sinuata, thora-

cis basi dimidio latiora, angulo humerali lateraliter extenso, rotundato; posterius angustiora, apice singulatim sub-rotundata, thorace triplo longiora, supra valde convexa, postice declivis, subsulcata, sulcis rube sat crebre punctatis, interstitiis planis, obsolete rugulosis; atra, setulis depressis, albidis sat dense adspersa, dorso fasciculis nonnullis e pilis longis, erectis, atris et albidis obsita. Corpus subtus sat crebre parum profunde punctatum et rugulosum, atrum, sub-nitidum. Pedes validi, atri, confertim punctati, setis atris, albidis immixtis, obsiti; femoribus parum clavatis, subtus dente brevi, obsoleto armatis; tibiis compressis, basi nonnihil tenuioribus; tarsis dilatatis, subtus griseo-spongiosis.

BHN.

7. D. PENICILLATUS (1). (Olivier.) — Niger; elytris scabris, fasciculato-pilosis; pedibus nigro-cinereoque variis. — OLIV.

Hujus operis IV. p. 363. 4. — P. Cayenna? Brasilia?

GENUS 551. — RHYSSOMATUS. Chevrolat.

Hujus operis IV. p. 364. genus 338.

STIRPS I. — Oculi contigui vel parum distantes; rostrum validum, minus elongatum, teres, paulo arcuatum. (Spec. 1.-12.)

1. R. VEHEMENS. (Schh.) — Sub-ovatus, rufo-ferrugineus, sub-nitidus, breviter pallido-pubescentis; rostro parum arcuato, basi striolato-rugoso, extrorsum punctulato; thorace trigono, oblique confertim aciculato, medio tenuiter carinato; elytris late sulcato-punctatis, sutura interstitiisque carinatis, primo a sutura plano.

Patria: America meridionalis. E mus. Imp. Russ. ad describendum communicatus.

*Tylomo gonoptero* magnitudine æqualis. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre rugoso-punctatum, rufo-ferrugineum, sub-nitidum, pube brevi, depressa, pallida adspersum; oculi magni, oblongi, in fronte sub-approximati, infra connexi, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, teres, parum arcuatum, a basi ad medium subtiliter crebre striolato-rugosum, extrorsum subtiliter confertim punctulatum, piceum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, ferruginæ, parce

*pilosæ*; *clava* oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. *Thorax* breviter triangularis, latitudine postica multo brevior, apice utrinque et supra in medio emarginatus, lobis ocularibus parum productis, obtusis; lateribus obliquis; basi leviter bi-sinuatus, tenuer reflexo-marginatus, supra modice convexus, subtiliter crebre oblique aciculatus, medio tenuiter carinatus, rufo-ferrugineus, nitidus, pube brevi, depressa, pallida dense adpersus. *Scutellum* rotundatum, confertim punctulatum, rufo-ferrugineum. *Elytra* antice leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtuse rotundatis; lateribus pone basin sensim perparum angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra convexa, postice declivia, late et profunde sulcata, sulcis in fundo mediocriter punctatis, sutura interstitiisque carinatis, primo tamen parum convexo; tota rufo-ferruginea, sub-nitida, pube brevi, depressa, pallida parce obsita. *Corpus* piceum, sub-nitidum, pectore evidenter, ventre obsolete punctatis. *Pedes* mediocres, confertim punctulati, ferruginei, pube pallida adpersi; femoribus modice clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis subcompressis, basi nonnihil tenuioribus, arcuatis, posticis extrorsum angulato-dentatis; tarsis modice dilatatis, subtus fulvo-spongiosis.

BHN.

2. *R. STRIGICOLLIS*. (Germar.) — *Ovalis*, piceus, sub-nitidus, glaber; capite confertim ruguloso, rostro valido, recto, confertim punctulato; thorace sub-conico, oblique strigoso, antice tenuiter carinato; elytris sub-triangularibus, convexis, clathratis, interstitiis sub-carinatis, alutaceis; femoribus obtuse dentatis.

*Hujus operis* IV. p. 372. 8.

*Orobis* id. GERM. *Ins. Spec.* p. 245. 374.

*Patria*: Brasilia. *Mus. Dom. GERMAR.*

*Rhyssomato novali* nonnihil major; rostro crassiori, recto, elytris profundius clathratis, interstitiis omnibus sub-carinatis, femoribus breviter dentatis, ab illo facile distinctus. *Caput* rotundatum, convexum, crebre subtiliter rugoso-punctatum, nigro-piceum, sub-opacum, glabrum; oculi in fronte contigui, ovati, parum prominuli, nigri; rostrum thorace nonnihil longius, crassum, rectum, apice nonnihil ampliatum, subtiliter crebre punctulatum, nigro-piceum, opacum. *Antennæ* minus tenues, piceæ, parce pilosæ; *clava* oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. *Thorax* breviter sub-conicus, apice utrinque leviter emarginatus, lobis ocularibus vix prominulis, lateribus antrorsum sub-compressis,

posterius ampliatis; postice obsolete bi-sinuatus, reflexo-marginatus, supra modice convexus, strigis crebris, obliquis, punctatis exaratus; dorso antico tenuiter carinatus, piceus, sub-nitidus, glaber. Scutellum rotundatum, concolor, rugulosum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris antrorsum nonnihil prominulis, obtuse rotundatis; lateribus pone humeros apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra valde convexa, postice declivia, punctis magnis, oblongo-quadratis, profundis striata, interstitiis elevato-lineatis, punctulatis; picea, sub-nitida, glabra. Corpus subtus piceum, sub-nitidum, pectore profunde, ventre subtiliter punctatis. Pedes mediocres, punctati, picei; femoribus modice clavatis, subtus obtuse dentatis; tibiis sub-compressis, posterioribus extus apice dentatis; tarsis modice dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

\* 3. R. NOVALIS. Germ. — *H. op.* IV. p. 365. 1. — *P. Brasilia.*

\* 4. R. PALMACOLLIS. Say. — *H. op.* IV. p. 366. 2. (Exclusis synonymis *Tylomus lineaticollis*, GERM. et SAY.)

*Patria*: Missouri, Americæ borealis.

5. R. LINEATOCOLLIS. (Say.) — *Ovatus, niger, parum nitidus, glaber; oculis sub-contiguis, rostro striolato-rugoso, extrorsum punctulato; thorace transverso, evidenter carinato, longitudinaliter crebre inæqualiter strigoso; elytris bifariam mediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis costatis.*

*Tylomus lineatocollis*. DOM. GERM. in litt.

SAY, *Descript. of Curc. of N. Amer.* p. 16.

*Cryptorhynchus id.* SAY. loc. cit. p. 27. 1.

*Rhynchænus id.* SAY. *Journ. Acad. Phil.* III. p. 313.

*Patria*: America borealis. A DOM. GERMAR ad describendum missus.

Statura et summa similitudo *Rhysomati palmacollis*, nonnihil major; thorace ut videtur latiori, longitudinaliter, non oblique strigoso, elytris minus profunde punctato-striatis, totis nigris, ab illo unice distinctus. Caput rotundatum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, nigrum, pallido-pubescens; oculi oblongi, in fronte sub-contigui, parum prominuli, nigri; rostrum thorace vix longius, crassiusculum, teres, parum arcuatum, nigro-pi-

ceum, basi medio tenuiter carinatum, utrinque subtiliter striolato-rugosum, extrorsum obsolete punctulatum. Antennæ subtenuēs, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ et pubescentes. Thorax latitudine postica duplo brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus parum productis, obtusis; intra apicem constrictus, lateribus obliquis, versus basin subito ampliat; postice sub-truncatus, tenæ marginatus, supra parum convexus, in medio dorsi carinula modice elevata notatus, longitudinaliter inæqualiter strigosus; niger, parum nitidus, subglaber. Scutellum parvum, rotundatum, punctulatum, concolor. Elytra ovata, antice leviter sinuata, thoracis basi parum latiora, humeris obtuse rotundatis; a medio apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, postice declivia, punctis mediocribus, per paria approximatis, striata, sutura interstitiisque alternis argute costatis; tota nigra, parum nitida, squamulis minutissimis, pallidis adpersa. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, pectore evidenter, ventre subtiliter punctatis. Pedes longiusculi, validi, picei, punctati, pube pallida parce adpersi; femoribus parum clavatis, dente parvo, acuto armatis; tibiis basi nonnihil arcuatis, apicem versus dilatatis; tarsis elongatis, subtus fusco-spongiosis.

BHN.

6. R. BICOLORATUS. (Schh.) — *Ovatus, convexus, ater, nitidus, glaber; rostro crasso, modice arcuato, striolato-rugoso, oculis contiguis; thorace breviter trigono, oblique strigoso, medio tenuiter carinato; elytris triangularibus, profunde sulcato-punctatis, interstitiis carinatis, fascia transversa ante medium, vittis duabus pone illam apice connexis, sanguineis; pectore abdomineque basi sanguineis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. GERMAR.

*Rhyssomato palmacolli* dimidio minor, angustior. Caput rotundatum, convexum, evidenter sat crebre punctatum, atrum, nitidum, glabrum; oculi magni, ovati, in fronte connexi, parum convexi, nigri; rostrum longitudine thoracis, validum, modice arcuatum, striolato-rugosum et punctatum, atrum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenuēs, ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax breviter sub-trigonus, latitudine postica duplo brevior, apice utrinque leviter emarginatus, lobis ocularibus parum productis, obtusis; intra



apicem constrictus, lateribus obliquis, versus basin cito ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra modice convexus, crebre oblique strigosus, medio tenuiter carinatus, ater, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, punctulatum, concolor. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi parum latiora, humeris antrorsum prominulis, sub-acutis; lateribus pone humeros apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra valde convexa, postice declivia, profunde sulcato-punctata, interstitiis elevatis, carinatis; atra, nitida, glabra, mox ante medium fascia lata, transversa, et pone illam vittis duabus, una prope suturam et altera laterali, postice connexis, sanguineis. Pectore et basi abdominis sanguineis, evidenter crebre punctatis, segmentis reliquis nigris, obsolete punctatis. Pedes longiusculi, validi, confertim punctati, nigri; femoribus clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis; tibiis compressis, basi nonnihil arcuatis, extrorsum ampliatis, posticis extus versus apicem calcaratis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus fulvo-spongiosis. — BHN.

\* 7. R. CRISPICOLLIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 367. 3. — *P.* Cuba.

8. R. SUBCOSTATUS. Chevrol. — *H. op.* IV. p. 368. 4. — *P.* Mexico.

9. R. RUFUS. Chevrol. — *H. op.* IV. p. 369. 5. — *P.* Mexico.

In diagnosi et descriptione l. c. datis, pro « oculis distantibus », lege: « oculis parum distantibus. »

\* 10. R. SEMICOSTATUS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, ferrugineus, nitidus, glaber; oculis sub-distantibus, rostro parum arcuato, basi striolato-rugoso, extrorsum punctulato; thorace breviter trigono, sub-remote punctato; elytris parum profunde remote seriato-punctatis, subtiliter transversim rugulosis, interstitiis alternis dorsalibus postice elevatis, carinatis, lateralibus omnibus integris.*

*Rhyssomatus subcostatus.* KLUG in litteris.

*Patria:* Columbia. DOM. SCHUPPEL. MUS. SCHH.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Rhyssomati rufi*, aliter coloratus; thorace remotius, minus profunde punctato, elytris parum profunde, minus crebre seriato-punctatis, transversis, rugulosis, ab illo præcipue distinctus. Caput rotundatum, convexum, crebre punctulatum, ferrugineum, nitidum, glabrum; fronte puncto profundiori insculpta; oculi magni, sub-ovati, perparum

prominuli, in fronte distantes, nigri; rostrum vix longitudine capitis cum thorace, minus crassum, teres, modice arcuatum, a basi ultra medium striolato-rugosum, extrorsum punctulatum, ferrugineum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax breviter sub-trigonus, latitudine baseos multo brevior, apice utrinque emarginatus, supra in medio nonnihil rotundato-productus, lobis ocularibus parum prominulis, obtusis; intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis, versus basin subito ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra paulo convexus, sub-remote minus profunde quam in *Rhyssomato rufo* punctatus; ferrugineus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, concolor, læve. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris antrorsum nonnihil prominulis, acutis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra convexa, postice declivia, punctis remotis, parum profundis, sub-quadratis seriatim insculpta, transversim subtiliter rugulosa, interstitiis lateralibus omnibus alternis dorsalibus elevatis, carinatis; ferruginea, nitida, glabra. Corpus subtus ferrugineum, sub-nitidum, pectore evidenter, abdomine subtiliter punctatis. Pedes mediocres, validi, confertim punctati, ferruginei, squamulis parvis, pallidis adpersi; femoribus clavatis, dente sat valido, acuto armatis; tibiis sub-compressis, strigosis, basi nonnihil arcuatis, posticis extus obsolete calcaratis; tarsis modice dilatatis, subtus fulvo-spongiosis.

BHN.

11. R. VIRIDIPES. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 370. 6. — *P. Mexico.*

♂♀ 12. R. POLYCOCCUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 371. 7. — In diagnosi l. c. pro "*inæqualibus*", lege: "*inæqualis*". — *P. Brasilia.*

STURM, *Catal.* 1843. p. 222.

STIRPS 2. — *Oculi plus minusve distantes, fronte foveola impressa; rostrum sub-tenue, cylindricum, magis elongatum et arcuatum.* (Spec. 13-17.)

\* 13. R. MORIO. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 372. 9. — *P. Mexico.*

\* 14. R. MARGINATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 373. 10. — *P. Brasilia.*

♀ 15. *R. STRANGULATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 374. 11. — *P. Antillæ.*

\* 16. *R. ACICULATICOLLIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 375. 12. — *P. St.-Domingo.*

17. *R. NIGERRIMUS*. Chevrolat. — *H. op.* IV. p. 376. 13. — *P. Mexico.*

GENUS 552. — CHALCODERMUS. Chevrolat.

*Hujus operis* IV. p. 377. genus 339.

STIRPS 1. — *Thorax aciculatus*. (Spec. 1.-8.)

\* 1. *C. CALIDUS*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 378. 1. — *P. Cayenna.*

\* 2. *C. ARMIPES*. Schh. — *H. op.* IV. p. 380. 2. — *P. Brasilia.*

3. *C. PRUINOSUS*. (Chevrolat.) — *Ovatus, convexus, ferrugineus, æneo-micans; antennis rufo-testaceis, capite subtiliter punctulato, rostro tenui, modice arcuato, capite cum thorace longiori; thorace confertim rugoso, tenuiter carinato, intra apicem constricto; elytris sub-triangularibus, punctis sat magnis, oblongis, connexis, seriatim impressis; interstitiis carinatis, lævibus; femoribus acute dentatis; tibiis anterioribus intus in medio nonnihil angulato-ampliatis.*

*Patria*: California. Mus. Dom. CHEVROLAT.

*Chalcodermo armipedi proximus, dimidio minor; thorace angustiori, subtilius ruguloso, evidenter carinato, interstitiis elytrorum carinatis, ut et armatura pedum, ab illo facile distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, æneum, nitidum, glabrum; oculi in fronte sub-approximati, ovati, parum prominuli, nigri; rostrum capite cum thorace nonnihil longius, tenue, teres, modice arcuatum, vix punctulatum, obscure ferrugineum, æneo-micans, glabrum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-testacæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque leviter emarginatus, antè angustior, intra apicem constrictus, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim rugulosus, dorso tenuiter carinatus, æneus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, coriaceum, concolor. Elytra basi sub-tri-sinuata, thorace duplo latiora, humeris*

sub-elevatis, obtuse rotundatis; lateribus a basi ultra medium sensim, dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra convexa, postice declivia, punctis sat magnis, oblongis, connexis, seriatim impressis insculpta, interstitiis omnibus elevatis, carinatis, sub-lævibus; ænea, nitida, glabra. Corpus subtus sat crebre punctatum, æneum, nitidum, glabrum. Pedes elongati, punctati, ænei, nitidi; femoribus modice clavatis, subtus dente acuto armatis; tibiis sub-compressis, striatis, nonnihil arcuatis, anterioribus intus in medio paulo angulato-ampliatis; tarsis elongatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

4. C. LONGIROSTRIS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 381. — P. Mexico.

\* 5. C. TOMBACINUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 382. 4. — P. Brasilia.

\* 6. C. PLICATICOLLIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 383. 5. — P. Brasilia.

*Obs.* — DOM. GERMAR individuum nobis communicavit, thorace antice canaliculato, cæterum jam descripto simillimum. Species nullo modo distincta.

7. C. RORICATUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 384. 6. — P. Brasilia.

\* 8. C. SERRIPES. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 385. — P. Brasilia.

STIRPS 2. — *Thorax punctatus.* (Spec. 9.-14.)

\* 9. C. SPINIFER. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 386. 8. — P. Amer. mer.

10. C. RUBRONOTATUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 387. 9. — P. Brasilia.

\* 11. C. ÆNEUS. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 388. 10. — P. Amer. bor.

\* 12. C. ANGULICOLLIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 389. 11. — P. Columbia.

*Chalcoderm. nigro-æneus.* Dom. KLUG in litt.

\* 13. C. METALLINUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 390. 12. — P. America meridionalis.

\* 14. C. EBENINUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 391. 13. — P. Cuba.

GENUS 553. — CONOTRACHELUS. *Latreille.*

*Hujus operis* IV. p. 392. genus 340.

STIRPS I. — *Coxæ antice approximatae, rima in pectore haud continuata.* (Spec. 1.-90.)

MANIPULUS I. — *Antennæ in medio rostri insertæ. Femora semper dentata.* (Spec. 1.-9.)

1. C. MAMILLATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 393. 1. — *P. America meridionalis.*

\* 2. C. FILIROSTRIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 394. 2. — *P. Brasilia.*

3. C. TENUIROSTRIS. (*Schh.*) — *Ovatus, sub-depressus, ferrugineus, squamulis angustis, silaceis parce adpersus; rostro tenui, dimidio corpore nonnihil brevior, lævi; thorace antice valde producto, profunde crebre rugoso, apice tenuiter carinato, subtus utrinque breviter spinoso; elytris sub-ovatis, profunde remotius punctato-striatis, interstitiis alternis dorsalibus et lateralibus carinatis, secundo bi-tuberculato, tuberculo antico angulariter valde elevato; humeris dense silaceo-squamosis; femoribus acute dentatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. WESTERMANN.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Conotracheli filirostris*; rostro nonnihil brevior, elytris remotius punctato-striatis, tuberculo antico interstitio secundo magis angulariter elevato, ab illo differt. Caput rotundatum, convexum, crebre ruguloso-punctatum, ferrugineum, squamulis piliformibus, depressis, silaceis dense tectum, inter oculos vix foveolatum; oculi oblongi, remoti, sub-depressi, nigri, brunnei; rostrum dimidio corpore nonnihil brevius, tenue, teres, modice arcuatum, basi utrinque obsolete striatum, dein extrorsum sub-læve, dilute rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum, apice ipso infuscatum. Antennæ in medio rostri insertæ, tenues, dilute rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica fere brevior, apice supra in medio valde rotundato-productus, antice multo angustior quam basi, ibique valde coarctatus, lateribus pone apicem subito rotundato-ampliatus, basi sat profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, undique rude crebre rugoso-punctatus, dorso antico tenuiter carinatus, obscure

ferrugineus, sub-opacus, parce silaceo-squamulosus, utrinque vitta obliqua, apice fere coeunte, dense similiter squamosa insignitus. Scutellum rotundatum, elevatum, obscure ferrugineum, medio leviter canaliculatum. Elytra antice singulatim nonnihil rotundata, reflexo-marginata, thoracis basi duplo fere latiora, humeris acute angulatis; lateribus a basi ultra medium perparum deinceps angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, sat profunde sub-remote punctato-striata, interstitiis carinatis, alternis dorsalibus planis, secundo a sutura tuberculis duobus instructo, quorum anteriore, in medio disco locato, valde angulariter elevato; ferruginea, opaca, squamulis silaceis parce adpersa, in macula supra-humerali et apiceque condensatis. Corpus subtus ferrugineum, parce silaceo-squamosum; pectore profundius, ventre obsoletius punctatis. Pedes elongati, validi, obsolete punctati, dilutius rufo-ferruginei, setulis silaceis adpersi; femoribus clavatis, subtus pone medium dente valido, acuto armatis; tibiis sub-compressis, basi tenuioribus, anticis extrorsum nonnihil ampliatis. — BHN.

\* 4. *C. PAVIDUS*. Schh. — *H. op. IV. p. 395. 3* — *P. Brasilia*.

\* 5. *C. DIACONITUS*. Schh. — *H. op. IV. p. 397. 4*. — *P. Cuba*.

\* 6. *C. FASCIATUS*. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, ferrugineus, squamulis pallidis adpersus; rostro tenui, valde arcuato, vix punctato; thorace confertim punctato, anterieus angustato, lateribus recto, utrinque vitta basi albo-apice silaceo-squamosa decorato; elytris remote seriatim punctatis, interstitiis alternis posterius carinatis, dorso postico fascia transversa, communi, albo-squamosa decoratis.*

*Patria*: Brasilia interior, in Minas Geraes. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

Magnitudo et habitus *Conotracheli Diaconiti*. Caput rotundatum, convexum, confertim rugoso-punctatum, ferrugineum, silaceo-squamosum; oculi ovati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine elytrorum, tenue, cylindricum, valde arcuatum, vix punctatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, dense pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque emarginatus, supra rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, sub-obtusis; anterieus subito angustior, leviter con-

*strictus*, lateribus pone *stricturam* rectis; postice *profunde* *bi-sinuatus*, supra parum *convexus*, *confertim* *punctatus*, dorso antico *obsolete* *carinatus*, *ferrugineus*, *vitta* utrinque, basi *albo-apicem* *versus* *silaceo-squamosa*, *decoratus*. Scutellum *rotundatum*, *concolor*, *albo-squamulosum*. Elytra antice *tri-sinuata*, thoracis basi *duplo* *latiora*, *humeris* *rotundatis*; lateribus *non* *ampliata*, pone *medium* *apicem* *versus* *sensim* *angustata*, *apice* *conjunctim* *rotundata*, thorace *triplo* *longiora*, supra in dorso paulo *convexa*, postice *declivia*, *seriatim* *remote* *punctata*, *interstitiis* *alternis* *posterius* *carinatis*; *ferruginea*, *squamulis* *piliformibus*, *pallidis* *parce* *adpersa*, in dorso postico *fascia* *transversa*, *communi*, *albo-squamosa* *decorata*. Corpus *subtus* *punctatum*, *ferrugineum*, *parce* *albo-squamulosum*. Pedes *longiusculi*, *punctulati*, *rufo-ferruginei*, *densius* *silaceo-squamosi*; *femoribus* *clavatis*, *subtus* *dente* *valido*, *acuto* *armatis*; *tibiis* *teretibus*, *basi* *nonnihil* *arcuatis*; *tarsis* *angustis*, *subtus* *griseo-spongiosis*. — BHN.

\* 7. *C. SCOPULOSUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 398. 5. — *P. Brasilia*.

\* 8. *C. MOESTUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 399. 6. — *P. Brasilia*.

9. *C. MURCIUS*. (Schh.) — *Sub-ovatus*, *convexus*, *niger*, supra *parce* *inaequaliter* *subtus* *dense* *laete* *cervino-squamosus*; *rostro* *tenui*, *arcuato*, *capite* *cum* *thorace* *longiori*, *punctulato*, *obscure* *ferrugineo*, *basi* *squamuloso*; *thorace* *sub-conico*, *confertim* *punctulato*, *vitta* *dorsali* *lateribusque* *laete* *cervino-squamosis*, *scutello* *transverso*; *elytris* *parum* *profunde* *striatis*, *striis* *in* *fundo* *obsolete* *punctatis*, *interstitiis* *sub-planis*, *confertissime* *punctulatis*; *femoribus* *obtuse* *dentatis*.

*Patria* : Minas Geraes *Brasiliae*. Mus. Imp. Acad. Alexandr.

*Ciono Fraxini* parum major. Caput parvum, rotundatum, convexum, confertim subtiliter punctulatum, nigrum, squamulis silaceis, circa oculos densioribus, adpersum; oculi ovati, parum prominuli, nigri; rostrum capite cum thorace nonnihil longius, tenue, teres, arcuatum, obscure ferrugineum, subtiliter punctulatum, basi squamulosum, extrorsum denudatum, glabrum. Antennae in medio rostri insertae, minus tenues, piceae, parce pilosae; clava oblonga, acuminata, obscuriori. Thorax sub-conicus, latitudine postica brevior, apice utrinque leviter emarginatus, intra apicem parum profunde constrictus; lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice sat profunde bi-sinuatus, lobo medio lato, parum

producto, truncato; supra modice convexus, confertim punctulatus, niger, vitta dorsali lateribusque læte cervino-squamosis. Scutellum latum, transversum, apice acuminatum, punctulatum, nigrum. Elytra antice conjunctim tri-sinuata, thoracis basi latiora, humeris sub-elevatis, obtuse angulatis; lateribus pone humeros ultra medium sensim, dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, parum profunde striata, striis in fundo obsolete punctatis, interstitiis sub-planis, confertissime punctulatis; nigra, sub-opaca, squamulis læte cervinis, præsertim in dorso postico, inæqualiter variegata. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense læte cervino-squamosum. Pedes breves, sat validi, punctulati, nigri, griseo-squamosi; femoribus modice clavatis, subtus dente brevi, obtuso armatis; tibiis sub-teretibus, basi nonnihil arcuatis. — BHN.

MANIPULUS II. — *Antennæ pone medium rostri insertæ.* (Spec. 10.-103.)

CENTURIA I. — *Femora dentata.* (Spec. 10.-88.)

A). *Elytrorum interstitia alterna costata.* (Spec. 10.-83.)

†). *Costæ elytrorum omnes integræ, vel basi aut apice tantum abbreviatæ.* (Spec. 10.-25.)

\* 10. C. SPECTABILIS. Schh. — *H. op. IV. p. 400. 7.* — *P. Brasilia.*

\* 11. C. PORCULETI. Germ. — *H. op. IV. p. 401. 8.* — *P. Brasilia.*

\* 12. C. NIGRITA. (Dejean.) — *Oblongo-ovatus, niger, sub-nitidus; rostro thorace nonnihil longiori, validiori, modice arcuato, subtiliter sat crebre punctulato; thorace supra parum convexo, sat crebre punctato, antice tenuiter carinato, lateribus sub-recto, antice angustato; elytris inæqualiter parce albo-squamulosis, subtiliter sub-remote bifariam punctato-striatis, interstitiis carinatis, alternis in dorso sub-planis.*

*Eirrhinus Nigrita.* DEJ. *Cat. ed. 2. p. 277. ed. 3. p. 301.*

*Patria:* Columbia. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

*Eirrhino bimaculato* vix longior, sed in elytris dimidio latior. Caput rotundatum, convexum, sat crebre mediocriter punctatum, atrum, nitidum, glabrum, inter oculos foveolatum; oculi sub-ro-



tundati, parum prominuli, nigri; rostrum thorace parum longius, sat validum, compressum, apicem versus deplanatum, modice arcuatum, subtiliter sat crebre punctulatum, atrum, nitidum, glabrum. Antennæ apicem rostri propius insertæ, sub-tenuis, piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, dilutiori, pubescente. Thorax latitudine postica parum brevior, apice utrinque emarginatus, supra modice rotundato-productus, lobis ocularibus modice prominulis, obtusis; anterie angustior, leviter constrictus, lateribus pone stricturam sub-rectis vel parum ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, sat crebre mediocriter punctatus, dorso antice tenuiter carinatus, niger, nitidus, glaber. Scutellum parvum, apice rotundatum, punctulatum, concolor. Elytra oblongo-ovata, antice leviter sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris obtuse rotundatis; lateribus in medio nonnihil ampliata, apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace plus triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, subtiliter sub-remote punctato-striata, granulis parvis in striis obsita, interstitiis elevatis, carinatis, secundo et quarto a sutura fere planis; nigra, sub-nitida, squamulis piliformibus, depressis, in maculis parvis condensatis, parce adspersa. Corpus subtus nigrum, nitidissimum, pectore evidenter crebrius, abdomine obsolete remote punctatis. Pedes longiusculi, punctati, nigri, nitidi; femoribus clavatis, subtus dente brevi, obtuso armatis; tibiis teretibus, basi nonnihil angustatis, arcuatis, intus in medio paulo ampliatis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 13. C. TRICOSTATUS. (Chevrolat.) — *Oblongo-ovatus, niger, parum nitidus, squamulis parvis, cinereo-albidis adspersus; antennis pedibusque ferrugineis, rostro capite cum thorace nonnihil longiori, validiori, arcuato, subtiliter basi evidenter punctulato; thorace angustiori, supra parum convexo, confertissime rugoso-punctato, antice carinato, lateribus recto, antice angustato; elytris subtiliter sub-remote bifariam punctato-striatis, interstitiis alternis acute carinatis, alternis sub-planis.*

*Eirrhinus picipes.* DOM. BUQUET in litteris.

*Patria* : Columbia. DOM. CHEVROLAT. Mus. SCHH.

Affinis certe *Conotracheli Nigritæ*, nonnihil minor, præsertim brevior; rostro tenuiori, magis arcuato, thorace angustiori, confertissime evidenter rugoso-punctato, interstitiis alternis acutus

carinatis, alternis etiam in lateribus sub-planis, ab illo tamen bene distinctus. Caput rotundatum, convexum, mediocriter minus crebre punctatum, nigrum, nitidum, fere glabrum, inter oculos foveola parva insculptum; oculi sub-rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine thoracis cum capite, minus validum, teres, arcuatum, subtiliter sat crebre versus basin evidenter punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax angustus, latitudine postica longior, apice utrinque emarginatus, supra rotundato-productus, lobis ocellaribus modice prominulis, obtusis; anterieus angustior, constrictus, lateribus pone stricturam rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, confertissime evidenter rugoso-punctatus, dorso antico tenuiter carinatus, niger, sub-opacus, parce cinereo-squamulosus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra sub-ovata, antice leviter tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris obtuse rotundatis; lateribus in medio nonnihil ampliata, pone medium apicem versus citius angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace vix triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, subtiliter sub-remote bifariam punctato-striata, interstitiis alternis elevatis, acute carinatis, alternis sub-planis; nigra, sub-opaca, squamulis parvis, angustis, cinereo-albidis sat dense adspersa. Corpus subtus punctatum, nigrum, nitidum. Pedes longiusculi, obscure ferruginei, punctati; femoribus modice clavatis, subtus dente parvo, obtuso armatis; tibiis teretibus, basi nonnihil angustatis et arcuatis; tarsi dilutius ferrugineis. — BHN.

14. *C. FUNESTUS*. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, sub-opacus, setulosus, squamulis læte cervinis parce inæqualiter obsitus; antennis tarsisque ferrugineis, rostro longitudine thoracis, parum arcuato, a basi ultra medium bi-sulcato; thorace supra parum convexo, rude crebre punctato, lateribus in medio rotundato, antice angustato; elytris parum profunde crebrius punctato-striatis, interstitiis alternis modice carinatis.*

*Patria*: Minas Geraes Brasiliæ. Mus. Imp. Acad. Alexandr.

*Conotrachelo tricostrato* affinis, nonnihil angustior; rostro bi-sulcato, thorace latiore, rude punctato, interstitiis alternis elytrorum minus elevatis, etc., ab illo facile dignoscitur. Caput rotundatum, convexum, crebre punctatum, nigrum, parum nitidum, inter oculos læte cervino-squamosum; oculi rotundati, parum prominuli,

nigri; rostrum longitudine thoracis, teres, parum arcuatum, a basi ultra medium bi-sulcatum, apice punctulatum, piceum, parce albo-setulosum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, sub-tenuæ, ferruginæ, parce pilosæ; clava-oblongo-ovata, acuminata, pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque profunde emarginatus, supra rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, acutis; antice subito angustatus, constrictus, lateribus pone stricturam cito rotundato-amplius, versus basin nonnihil angustatus, postice bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra parum convexus, rude profunde crebre rugoso-punctatus, dorso antico sub-carinatus, niger, opacus, parce fusco-squamulosus et albido-setulosus. Scutellum parvum, elevatum, rotundatum, concolor. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris obtuse angulatis, vix elevatis; lateribus apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, bifariam sat crebre mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis elevatis, modice carinatis, alternis planis; nigra, parum nitida, squamulis læte cervinis inæqualiter variegata, setulis pallidis parce adspersa. Corpus subtus punctatum, nigrum, opacum, vix squamosum. Pedes longiusculi, punctati, nigri, pallido-setulosi; femoribus parum clavatis, subtus dente brevi, obtuso armatis; tibiis teretibus, sub-rectis; tarsis ferrugineis. — BIN.

\* 15. C. ACUTECOSTATUS. (Schh.) — *Breviter ovatus, ferrugineus, squamulis piliformibus, læte cervinis testis; rostro longitudine thoracis cum capite, modice arcuato, punctulato, basi carinato; thorace parvo, transverso, subtiliter confertim granulato, vitta media sub-denudata decorato; elytris bifariam remote subtiliter punctato-striatis, sutura interstitiisque alternis acute costatis, sutura interstitioque quarto nigris.*

*Patria* : Brasilia. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

*Magnitudo Cioni Scrophulariæ.* Caput rotundatum, convexum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, obscure ferrugineum, læte cervino-squamosum; oculi laterales, ovati, sub-depressi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, modice arcuatum, confertim punctulatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum, parce squamulosum, extrorsum denudatum, totum ferrugineum. Antennæ sub-tenuæ, ferruginæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax parvus, latitudine postica brevior, apice utrinque emarginatus. su-

pra parum rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, obtusis; antice angustatus, leviter constrictus, lateribus pone stricturam sub-obliquis; postice bi-sinuatus, supra paulo convexus, subtiliter crebre granulatus, obscure ferrugineus, squamulis læte cervinis dense obsitus, vitta media angusta, sub-denudata decoratus. Scutellum mediocre, rotundatum, obscure ferrugineum, denudatum. Elytra breviter ovata, antice trisinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus triplo longiora, bifariam subtiliter remote punctato-striata, sutura interstitiisque alternis alte carinatis; ferruginea, dense læte cervino-squamosa, sutura interstitioque quarto nigris. Corpus subtus remote punctulatum, obscure ferrugineum, squamulis pallidis adpersum. Pedes longiusculi, ferruginei, confertim punctulati, læte cervino-squamosi; femoribus modice clavatis, subtus dente brevi, sub-obtuso armatis; tibiis teretibus, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

16. C. PERDIX. (Creutz.)— *Sub-ovatus, ferrugineus, squamulis pallidis parce adpersus; oculis magnis, rostro brevi, sub-recto, confertim punctulato; thorace crebre subtiliter punctulato, dorso tenuiter carinato, antice angustato, vitta laterali antice dilatata, albo-squamosa decorato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis.*

*Patria*: Guyana. Mus. DOM. GERMAR.

*Conotrachelo acutecostato* proximus, sed duplo minor; rostro breviori, recto, thorace latiori, aliter colorato, ab illo abunde distinctus. *Ciono Fraxini* nonnihil minor. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, ferrugineum, sub-opacum, inter oculos foveola parva insculptum; oculi sat magni, rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite dimidio longius, teres, fere rectum, extrorsum deplanatum, subtiliter confertim punctulatum, ferrugineum, parum nitidum. Antennæ sub-tenuis, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque leviter emarginatus, anterius angustior, intra apicem constrictus, lateribus nonnihil rotundato-amplius, basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, dorso tenuiter carinatus, ferrugineus, sub-opacus, utrinque vitta anterius valde dilatata,

dense albo-squamosa decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, obscure ferrugineum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris obtuse angulatis, non elevatis; lateribus a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, subtiliter crebre bifariam punctato-striata, interstitiis alternis elevatis, carinatis, alternis sub-planis; ferruginea, sub-opaca, squamulis parvis pallidis, parce in callo humerali, dense obsita. Corpus subtus punctulatum, ferrugineum, parce pallido-squamulosum. Pedes breves, validi, punctati, ferruginei, parce pallido-squamulosi; femoribus clavatis, subtus dente brevi armatis; tibus sub-teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 17. *C. DISTINCTUS*. Dej. — *H. op. IV. p. 410. 17.* — *P. Brasilia meridionalis.*

\* 18. *C. COSTIROSTRIS*. Schh. — *H. op. IV. p. 403. 10.* — *P. Brasilia.*

19. *C. SUBTILIS*. Chev. — *H. op. IV. p. 404. 11.* — *P. Mexico.*

\* 20. *C. CURVIROSTRIS*. Schh. — *H. op. IV. p. 411. 18.* — *P. Brasilia.*

\* 21. *C. MACERITIÆ*. Chev. — *H. op. IV. p. 412. 19.* — *P. Guadeloupe.*

\* 22. *C. POSTICATUS*. Say. — *H. op. IV. p. 406. 13.* — *P. Florida.*

\* 23. *C. TOMENTOSUS*. (Schh.) — *Oblongo-ovalis, piceus, squamulis piliformibus, depressis, pallidis inæqualiter adpersus; antennis, rostro tarsisque ferrugineis; thorace sub-remote profunde punctato, dorso antico carinato, antice angustato, lateribus recto; elytris margine antico utrinque flavo-punctato profunde punctato-striatis, interstitiis costatis, alternis dorsalibus sub-planis; femoribus breviter dentatis.*

*Patria* : Brasilia. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

Magnitudo et statura *Conotrachei Maceritiæ*, sed nonnihil angustior. Caput rotundatum, convexum, sat crebre punctatum, piceum, nitidum, squamulis setiformibus, pallidis parce adpersum, inter oculos puncto profundiori insculptum; oculi laterales, ovati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine thoracis cum

capite, minus tenue, sub-compressum, apice deplanatum, modice arcuatum, basi evidenter extrorsum subtiliter punctulatum, ferrugineum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax angustus, latitudine postica vix brevior, apice utrinque emarginatus, supra in medio rotundato-productus, lobis ocularibus modice prominulis, obtusis; anterius angustior, leviter constrictus, lateribus pone stricturam rectis; postice bi-sinuatus, supra modice convexus, remote sat profunde punctatus, dorso antico tenuiter carinatus, piceus, squamulis piliformibus, depressis, pallidis adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor, læve. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris obtuse rotundatis; lateribus pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace triplo longiora, supra convexa, postice declivia, profunde sat crebre punctato-striata, interstitiis costatis, 2° et 4° tamen sub-planis; picea, nitida, squamulis piliformibus, depressis, pallidis inæqualiter adpersa, punctisque duobus concoloribus in margine baseos utrinque notata. Corpus subtus subtiliter sub-remote punctulatum, piceum, nitidum, squamulis nonnullis pallidis adpersum. Pedes longiusculi, validi, punctulati, picei, parce pallido-pubescentes; femoribus clavatis, subtus breviter dentatis; tibiis sub-teretibus, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, rufo-ferrugineis, subtus fulvo-spongiosis. — BHN.

\* 24. C. PUNTIOLLIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 405. 12. — *P. Brasilia.*

\* 25. C. SUBFASCIATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 413. 20. — *P. Brasilia.*

††). *Costæ elytrorum duæ interiores, vel una tantum, interruptæ.*  
(Spec. 27.-56.)

\* 26. C. ARGULA. Fabr. — *H. op.* IV. p. 425. 31. — *P. N. Carol. Amer. bor.*

STURM, *Catal.* 1843. p. 222.

Obs. — Magnitudine *Balanini villosi.*

27. C. HOPEI. Schh. — *H. op.* IV. p. 431. 37. — *P. Brasilia.*

\* 28. C. INTERMEDIUS. Dejean. — *H. op.* IV. p. 431. 37. — *P. Brasilia meridionalis.*

In diagnosi *huj. op. l. c. lin. 1*, pro « *brevio-* », lege: « *longio-* ».

29. *C. QUADRINOTATUS*. *Chevr.* — *H. op. IV. p. 432. 38.* — *P. Brasilia.*

30. *C. LAUTUS*. (*Schh.*) — *Ovalis, niger, squamulis pallidis parce adpersus; antennis tarsisque ferrugineis, capite minus confertim punctulato, rostro capite cum thorace nonnihil longiori, arcuato, basi utrinque striolato; thorace angusto, confertim rude rugoso-punctato; elytris striato-punctatis, singulo costis tribus elevatis, internis antice sub-interruptis, basi irregulariter maculaque rotunda, libera versus apicem, dense silaceo-squamosis, decorato; femoribus albo-annulatis, acute dentatis.*

\* *VAR. β. Rufo-testaceus, signaturis elytrorum albidioribus.*

*Conotrachelus lautus. Huj. op. IV. p. 408. 15.*

*Patria: Brasilia. Mus. DD. GERMAR et SCHH.*

*Obs.*—Individuum *hujus operis loc. cit.* descriptum nuper exclusum, quare diagnosin emendandam et jam descriptum ut *var. β* afferre licet. Statura et summa similitudo *Conotracheli 4-notati*, sed rostro breviori, crassiori, costis dorsalibus pone basin tantum interruptis, ab illo certe distinctus. — *BHN.*

\* 31. *C. HUMERALIS*. *Schh.* — *H. op. IV. p. 424. 30.* — *P. Brasilia meridionalis.*

\* 32. *C. LASSULUS*. *Schh.* — *H. op. IV. p. 409. 16.* — *P. Cuba.*

33. *C. SEMICOSTATUS*. (*Germar.*) — *Sub-ovatus, niger, opacus, squamulis piliformibus, albidis parce adpersus; rostro longitudine thoracis cum capite, sat valido, modice arcuato, profunde striato, apice punctulato; thorace crebre rugoso-punctato, dorso antico carinato, lateribus sub-recto; elytris mediocriter sub-remote punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis, internis bis interruptis; femoribus acute dentatis.*

*Hujus operis IV. p. 458. 65.*

*Cryptorhynchus id. GERM. Ins. Spec. p. 284. 423.*

*Patria: Brasilia. Mus. GERMAR.*

*Obs.* — *Conotrachelo quadrinotato vix latior, nonnihil brevior, aliter coloratus; rostro breviori, validiori, profundius striato, thorace crebrius rude rugoso-punctato, antice carinato, etc., ab illo mox dignoscitur.* — *BHN.*

34. *C. ARATUS*. (Germar.) — *Oblongo-ovatus, nigro-piceus; rostro longitudine capitis cum thorace, modice arcuato, punctulato, medio carinato; thorace confertim punctato, apice angustato, constricto, ferrugineo, lateribus modice rotundato-ampliato; elytris ferrugineo-variegatis, parce inæqualiter pallido-pubescentibus, mediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis elevatis, carinatis, costa interna bis interrupta; femoribus obsolete bi-dentatis.*

*Hujus operis* IV. p. 457. 63.

*Cryptorhynchus* id. GERM. *Ins. Spec.* p. 283. 421.

*Patria*: America septentrionalis (Kentuchi) et Brasilia. Mus.

GERMAR.

*Obs.* — *Conotrachelo inconcinno* proximus, illo vix latior, sed nonnihil longior, aliter coloratus; thorace confertim minus profunde punctato, antice non carinato, elytris tenuiter punctato-striatis, costis alternis minus elevatis, ut et femoribus obsolete bi-dentatis, ab illo facile distinctus. *Conotrachelo semicostato* etiam affinis, nonnihil minor, præsertim angustior; rostro breviori, basi non striolato, thorace subtiliter punctato, ut et armatura pedum, ab illo dignoscitur. — BHN.

\* 35. *C. INCONCINNUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 423. 29. — *P. Brasilia.*

In descriptione loco citato, lin. 3, lege: « Caput... remote profunde punctatum; fronte foveola parva insculpta; oculi, etc.

\* 36. *C. COELEBS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 427. 33. — *P. Rio Janeiro.*

37. *C. ELEVATUS*. (Silbermann.) — *Oblongo-ovatus, nigro-piceus, opacus, squamulis pallidis parce adpersus; fronte vix foveolata, rostro longitudine capitis cum thorace, validiori, compresso, arcuato, striolato-rugoso; thorace inæquali, crebre rugoso-punctato, antice non carinato; elytris striato-punctatis, costis internis elevatis, interruptis et abbreviatis, singulo plaga magna triangulari, laterali, fere in medio dense pallido-squamosa, decorato; femoribus bi-dentatis.*

*Patria*: Cayenna. Mus. DOM. CHEVROLAT.

Magnitudo et summa similitudo *Conotracheli Coelebis*, nonnihil tamen brevior et latior, rostro validiori, magis compresso, tho-



race confertim rugoso-punctato, antice non carinato, elytris aliter coloratis, costis magis elevatis, ab illo tamen differt. Caput rotundatum, convexum, mediocriter sat crebre punctatum, nigro-piceum, sub-nitidum, inter oculos parce pallido-squamulosum, fronte haud foveolata; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, validum, subcompressum, arcuatam, striolatum, medio carinatum, nigropiceum, squamulis pallidis adpersum. Antennæ sub-tenues, obscure ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, obscuriore, densius pubescente. Thorax latitudine postica parum brevior, apice utrinque emarginatus, lobis ocularibus valde productis, obtusis; anterieus angustior, intra apicem constrictus, lateribus sub-rectis; basi profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, inæqualis, confertim rugoso-punctatus, niger, squamulis pallidis adpersus. Scutellum rotundatum, pallido-squamosum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, mediocriter striato-punctata, interstitiis alternis elevatis, carinatis, duobus internis costatis, costis abruptis et abbreviatis; nigra, squamulis pallidis parce adpersa, mox pone medium plaga magna, sub-triangulari, laterali, dense albo-squamosa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigro-piceum, nitidum, pectore albo-squamoso. Pedes elongati, obscure ferruginei, punctulati, albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus bi-dentatis; tibiis sub-teretibus, basi arcuatis; tarsis elongatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 38. *C. SIMILIS*. Dejean. — *H. op. IV. p. 416. 22.* — *P. Amer. bor.*

39. *C. LEUCOPHEATUS*. Chev. — *H. op. IV. p. 417. 23.* — *P. Mexico.*

\* 40. *C. ELEGANS*. Say. — *H. op. IV. p. 428. 34.* — *P. Amer. bor.*

\* 41. *C. AFFINIS*. Dejean. — *H. op. IV. p. 429. 35.* — *P. Amer. bor.*

*Obs.* — *Conotrachelo serpentino* minus affinis quam *Conotrachelo eleganti*, a quo tamen differt magnitudine dimidio fere minore, rostro multo breviori, minus arcuato, thorace subtiliter

punctato, costis internis elytrorum minus elevatis, tamen ut in illo bis interruptis; femoribus breviter bi-dentatis.

\* 42. *C. CONFINIS*. Dejean. — *H. op.* IV. p. 430. 36. — *P. Pennsylvania.*

*Obs.* — *Conotrachelo eleganti* et *C. affini* in multis proximus: ab illo, magnitudine minore, rostro brevior, minus arcuato, colore pedum et elytrorum, etc.; ab hoc, thorace angustiore, elytris aliter coloratis, costis internis magis elevatis, differt.

\* 43. *C. ANAGLYPTICUS*. Say. — *H. op.* IV. p. 418. 24. — *P. Amer. borealis.*

44. *C. SCAPULARIS*. Chev. — *H. op.* IV. p. 419. 25. — *P. Mexico.*

45. *C. TRIGONUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 420. 26. — *P. America meridionalis.*

\* 46. *C. GRAMMICOLLIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 421. 27. — *P. Brasilia.*

47. *C. HUMEROSUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 422. 28. — *P. Mexico.*

\* 48. *C. RUBIGINOSUS*. (Klug.) — *Breviter ovatus, nigro-piceus, squamulis cinereis et brunneis variegatus; rostro longitudine thoracis, modice arcuato, punctulato, medio argute carinato; thorace angusto, confertim rugoso-punctato, lateribus recto, antice angustato, dorso antico impresso, utrinque cristato; elytris dorso parum convexis, subtiliter bifariam punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis, carinis interioribus hinc illinc abruptis, apice ferrugineis.*

*Patria*: Columbia. Dom. SCHÜPPEL. Mus. SCHH.

*Ciono Scrophulariæ* dimidio minor. Caput rotundatum, modice convexum, rugoso-punctatum, nigro-piceum, brunneo-squamosum; fronte obsolete carinata; oculi sub-depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis, minus tenue, teres, modice arcuatum, apice nonnihil deplanatum, punctulatum, medio sat argute carinatum, nigro-piceum, brunneo-squamosum, apice denudatum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-ferruginæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax angustus, latitudine postica vix longior, apice utrinque emarginatus, supra in medio valde rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, sub-acutis; antè angustatus, longe intra apicem leviter constrictus,

lateribus pone stricturam ræctis; postice bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim rugoso-punctulatus, dorso antice late et sat profunde impressus, utrinque crista arcuata instructus, nigro-piceus, læte brunneo-squamosus. Scutellum parvum, apice rotundatum, læte brunneo-squamosum. Elytra breviter ovata, antice leviter tri-sinuata, thoracis basi fere triplo latiora, humeris obtuse angulatis; pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, subtiliter sub-remote bifariam punctato-striata, interstitiis alternis elevatis, carinatis, carinis interioribus hinc illinc interruptis; nigro-picea, dorso fusco-cinereoque variegata, basi brunneo-squamosa, apice ferruginea. Corpus subtus remote profunde punctatum, piceum, opacum, parce læte brunneo-squamosum. Pedes mediocres, validi, punctulati, picei, silaceo-squamulosi et pubescentes; femoribus clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis teretibus, basi nonnihil tenuioribus et arcuatis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

49. *C. MULTITUBERCULATUS*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 426. 32. —  
*P. Amer. meridionalis.*

In diagnosi *huj. op.* l. c. lin. 4, pro « valde bi-tuberculato, in medio linea longitudinali », lege : « valide bi-tuberculato, in medio linea longitudinali elevata. — lin. 6, adde : « tibiis curvatis ».

50. *C. GINCTIPES*. (*Schh.*) — *Sub-ovalis, niger, pube griseo-flavescenti adpersus; antennis, rostro tibiisque apice et tarsis rufes-taceis, rostro carinato; thorace antice transversim impresso, dorso obsolete bi-tuberculato, in medio linea longitudinali elevata; elytris sub-remote striato-punctatis, interstitiis alternis costatis, costis interioribus interruptis; femoribus uni-dentatis, medio albo-cingulatis; tibiis sub-rectis.*

*Patria*: Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Conotracheli multituberculati*, aliter coloratus; thorace breviter bi-tuberculato, elytris magis triangularibus, usque ad apicem æqualiter striato-punctatis, femoribus uni-dentatis, tibiis sub-rectis, ab illo tamen distinctus videtur. Vix alter sexus. Caput rotundatum, convexum, confertim evidenter punctatum, nigro-piceum, nitidum; fronte flavo-tomentosa, in medio foveola parva impressa; oculi sub-

ovati, haud prominuli, nigri; rostrum thorace cum capite vix longius, validiusculum, arcuatum, sub-compressum, dorso ultra medium argute carinatum, lateribus sub-strigosum, rufo-testaceum, flavo-pubescent, apice punctulatum, glabrum. Antennae tenues, rufo-testaceae; clava oblonga, acuminata, albedo-sericea. Thorax angustus, latitudine baseos longior, apice in medio nonnihil rotundato-productus, lateribus a basi longe ultra medium sub-parallelis, tum angulatim angustatis; postice bi-sinuatus, supra modice convexus, antice sat profunde transversim impressus, coarctatus, in medio dorsi tuberculis duobus parvis, parum elevatis, et linea media tenui, longitudinali instructus; niger, tomento flavescente undique tectus. Scutellum parvum, sub-triangulari, piceum, glabrum. Elytra triangularia, antice sub-tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, hameris sub-acute angulatis; lateribus inflexa, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, undique mediocriter seriato-punctata, interstitiis alternis planis, alternis costatis, costis interioribus magis elevatis, his interruptis; nigra, basi apiceque pube flavescente obducta. Corpus subtus nigrum, nitidum, pectore profunde remote punctato, parce squamoso, abdomine sub-lævi. Pedes mediocres, punctati, parce squamulosi; femoribus nigris, modice clavatis, subtus unidentatis, medio cingulo niveo ornatis; tibiis teretibus, sub-rectis, apice cum tarsis rufo-testaceis.

51. C. LASSATUS. (Schh.) — *Ovalis, piceus, læte cervino-squamosus, parce pallido-setulosus; rostro brevi, crasso, modice arcuato, basi striolato; thorace angusto, lateribus sub-recto, antice angustato, dorso tenuiter carinato, antice tuberculis quatuor dense setosis ob- sito; elytris subtiliter seriato-punctatis, dorso remote tuberculatis, tuberculo pone medium prope suturam valido, singulo plaga magna basali, ovata, albo-squamosa decorato; pedibus ferrugineis; femoribus bi-denticulatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

*Conotrachelo Argulae* magnitudine et statura sub-similis. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, piceum, fronte dense læte cervino-squamosa; oculi sub-rotundati, haud prominuli, nigri; rostrum longitudine thoracis, validum, sub-compressum, apice deplanatum, modice arcuatum, a basi ultra medium striolatum, dein punctulatum, obscure ferrugineum, parce pallido-setulosum. Antennae non procul ab apice rostri insertae,

sub-tenues, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax angustus, latitudine postica fere longior, apice utrinque leviter emarginatus, supra modice rotundato-productus, anterieus angustatus, dein lateribus versus basin sub-parallelis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim subtiliter punctulatus, dorso tenuiter carinatus, antice tuberculis quatuor modice elevatis, dense setosis obsitus; piceus, squamulis læte cervinis, ad latera pallidioribus, dense tectus, setisque pallidis parce adpersus. Scutellum parvum, oblongo-ovatum, læte cervino-squamosum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris lateraliter nonnihil extensis, obtuse angulatis; lateribus inflexa, apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, subtiliter sub-remote seriatim punctata, dorso tuberculis remotis instructa, nempe duobus non procul a basi transversim locatis, tertio in medio, parvis, quarto non procul a sutura, magno, valido, et nonnullis intra apicem minoribus, interstitiis alternis lateralibus elevatis, sub-cæstatis; picea, squamulis densis, læte cervinis, setulisque pallidis obsita; singulo a basi fere ad medium plaga magna, ovata, albo-squamosa decorato. Corpus subtus rufo-piceum, opacum, punctulatum, segmento ultimo abdominis ferrugineo. Pedes mediocres, obscure ferruginei, punctulati, læte cervino-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus bi-denticulatis; tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

52. C. DEMENS. (Schh.) — *Ovalis, niger, squamulis albidis variegatus; antennis, tibiis, apice tarsisque rufo-testaceis, rostro longitudine thoracis, modice arcuato, carinato, utrinque striolato; thorace angusto, rude rugoso, dorso impresso, medio carinato, antice utrinque crista parum elevata instructo; elytris albo-squamosis, basi inæqualiter apice toto brunneo-squamosis, mediocriter seriatopunctatis, interstitiis alternis modice elevatis, carinatis; femoribus bi-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria*: Vera-Cruz, Mexico. Dom. HÖGGERG. Mus. Reg. Acad. Holm.

Habitus et magnitudo *Conotracheli Argulæ*. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre rugoso-punctatum, nigrum, opacum, squamulis læte cervinis parce adpersum; oculi sub-rotundati, haud prominuli, brunnei; rostrum longitudine thoracis, sat va-

lidum, teres, modice arcuatum, a basi longe ultra medium carinatum, lateribus striolatum, dein apicem versus sub-deplanatum, confertim punctulatum, nigro-piceum, opacum, haud squamosum. Antennæ sub-tenues, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica parum brevior, apice utrinque emarginatus, supra in medio nonnihil rotundato-productus, lateribus a basi ad medium sub-parallelis; dein apicem versus oblique angustatus, postice bi-sinuatus, supra paulo convexus, confertim rude rugoso-punctatus, dorso sub-impessus, medio carinula antice posticeque abbreviata; anterieus crista utrinque parum elevata instructus, niger, opacus, squamulis albidis inæqualiter adpersus. Scutellum oblongo-ovatum, albido-squamosum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus inflexa, apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, parum profunde seriato-punctata, interstitiis alternis planis, alternis elevatis, sub-carinatis; nigra, squamulis albidis tecta, basi inæqualiter apiceque toto cervino-squamosa. Corpus subtus piceum, opacum, confertim punctatum. Pedes mediocres, punctati, nigri, albo-squamulosi et brunneo-variegati; femoribus modice clavatis, subtus bi-denticulatis, tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis, extrorsum cum tarsis rufo-testaceis. — BHN.

53. C. STIGMATICOLLIS. Chev. — *H. op. IV. p. 433. 3g.* — *P. Brasilia.*

*Obs.* — Dom. GERMAR individuum ad conferendum nobis communicavit jam descripto simillimum, thorace evidenter carinato tamen differt. Vix species diversa.

\* 54. C. DEUSTUS. Schh. — *H. op. IV. p. 434. 4o.* — *P. Brasilia.*

\* 55. C. SERPENTINUS. Germ. — *H. op. IV. p. 402. 9.* — *P. Cuba.*

56. C. INTRACTATUS. Schh. — *H. op. IV. p. 407. 14.* — *P. Amer. meridionalis.*

In diagnosi *huj. op. l. c. lin. 3*, pone "alternis", adde: "2 et 4 a sutura pone medium tantum, etc.

†††). *Costæ elytrorum tres dorsales interruptæ.* (Spec. 57-83.)

\* 57. C. PRÆUSTUS. Schh. — *H. op. IV. p. 436. 41.* — *P. Brasilia.*

\* 58. *C. AMABILIS*. (Buquet.) — *Oblongo-ovatus, piceus, sub-nitidus; rostro capite cum thorace longiori, sub-compresso, valde arcuato, basi striolato-rugoso, extrorsum punctulato; thorace crebre rugoso-punctato, utrinque vitta albo-squamosa decorato, lateribus recto, antice angustato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis, tribus internis interruptis, plaga magna, oblongo-quadrata, humerali apiceque albo-squamosis.*

*Patria* : Cayenna. Mus. GERMAR.

*Cryptorhyncho Lapathi* longitudine æqualis, nonnihil latior, minus convexus. Caput rotundatum, convexum, sat crebre et profunde punctatum, piceum, nitidum, sub-glabrum; oculi laterales, ovati, sub-depressi, nigri; rostrum capite cum thorace nonnihil longius, sat validum, compressum, extrorsum deplanatum, valde arcuatum, basi striolato-rugosum, piceum, squamulis piliformibus, pallidis parce adpersum, apicem versus punctulatum, ferrugineum, glabrum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-piceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica haud longior, apice utrinque emarginatus, supra in medio valde rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, obtusis; anterie subito angustior, vix coarctatus, lateribus rectis; postice bi-sinuatus, supra modice convexus, crebre sat profunde rugoso-punctatus, dorso antico obsolete carinatus, piceus, sub-nitidus, utrinque vitta anterie angustata, albo-squamosa decoratus. Scutellum rotundatum, piceum, sub-nitidum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus triplo longiora, supra in dorso paulo convexa, postice declivia, parum profunde punctato-striata, interstitiis alternis carinatis, tribus internis interruptis; picea, sub-nitida, macula magna, oblongo-quadrata, basali apiceque albo-squamosis. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, setulis albidis parce adpersum; pectore profunde, sub-remote abdomine vix punctatis. Pedes longiusculi, validi, picei, parce punctulati, setulis albidis adpersi; femoribus clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus griseo-spongiosis. — BAN.

\* 59. *C. RETENSUS*. Say. — *H. op.* IV. p. 442. 47. — *P. Mississipi, Americæ borealis.*

- \* 60. *C. DENTIFERUS*. *Chevrolat*. — *H. op.* IV. p. 443. 48. — *P.* Mexico.
61. *C. OBLIQUUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 444. 49. — *P.* Amer. mer.
- \* 62. *C. CORALLIFER*. (*Chevrolat*). — *Oblongo-ovalis, rufo-ferrugineus, sub-nitidus, setulis albidis adpersus; rostro sat valido, arcuato, basi tenuiter striolato, capite cum thorace longiori; thorace angusto, rude rugoso, dorso carinato, antice cito angustato, lateribus sub-recto; elytris dorso parum convexis, sat profunde seriato-punctatis, antice tuberculis, postice costis abbreviatis, rufo-testaceis instructis; humeris lateraliter extensis, obtuse rotundatis; femoribus bi-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria* : Columbia. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Magnitudo *Cryptorhynchi Mangiferæ*. Caput parvum, modice convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, vix setosum, inter oculos foveola parva insculptum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum capite cum thorace nonnihil longius, sat validum, teres, arcuatum, a basi longe ultra medium tenuiter striolatum, dein extrorsum subtilissime punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, setulis pallidis adpersum. Thorax angustus, latitudine postica vix brevior, apice utrinque profunde emarginatus, supra in medio rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, sub-obtusis; anterius subito angustatus, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam fere rectis vel basin versus perparum angustatis; postice sat profunde bi-sinuatus, reflexo-marginatus, angulis baseos acutis, retrorsum nonnihil productis; supra parum convexus, rude et profunde rugosus, dorso distincte carinatus, rufo-ferrugineus, nitidus, setulis depressis, albidis adpersus. Scutellum breve, elevatum, apice rotundatum, concolor, læve. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris lateraliter extensis, obtuse rotundatis; lateribus apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice modice declivia, sat profunde seriato-punctata, dorso antico tuberculis quatuor obtusis, postice costis abbreviatis, rufo-testaceis instructa, interstitiis alternis lateralibus carinatis; rufo-ferruginea, nitida, setulis depressis, albidis adpersa. Corpus subtus rufo-ferrugineum, nitidum, remote inæqualiter punctatum, setulis albidis parce adpersum. Pedes elongati, validi, vix punctati, rufo-



ferruginei, nitidi, setulis raris, albidis obsiti; femoribus clavatis, subtus bi-dentatis, dente exteriori breviori; tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis.

BHN.

\* 63. *C. REPENS.* (Schh.) — *Oblongo-ovatus, nigro-piceus, opacus, squamulis silaceis parce adpersus; rostro longitudine capitis cum thorace, sub-compresso, arcuato, basi striolato-rugoso; thorace confertim ruguloso punctato, tenuiter carinato, utrinque vitta silacea decorato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis, tribus interioribus interruptis, macula basali punctoque intra apicem dense silaceo-squamosis, decoratis; femoribus silaceo-annulatis, sub-bi-dentatis.*

VAR.  $\beta$ . *Vittis thoracis, signaturis elytrorum annulisque femorum niveo-squamosis.*

*Patria* : Brasilia. MUS. GERMAR et SCHH.

*Conotrachelo præusto similis, sed aliter coloratus. Caput rotundatum, convexum, obsolete rugoso-punctatum, piceum; vertice carinula brevi instructo; orbitis oculorum silaceo-squamosis; oculi laterales, ovati, sub-depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis cum capite, sat validum, compressum, extrorsum deplanatum, arcuatum, a basi ultra medium striolato-rugosum, parce silaceo-squamosum, extrorsum punctulatum, denudatum, totum nigro-piceum. Antennæ sub-tenuis, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava elongata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica haud longior, apice utrinque emarginatus, supra in medio valde rotundato-productus, lobis ocularibus parum prominulis, obtusis; anterie angustatus, leviter coarctatus, lateribus pone stricturam sub-rectis; postice bi-sinuatus, supra modice convexus, parum profunde crebre rugoso-punctatus, dorso tenuiter carinatus, piceus, parum nitidus, utrinque vitta obsoleta e squamulis silaceis decoratus. Scutellum rotundatum, piceum, nitidum. Elytra antice conjunctim leviter tri-sinuata, thoracis basi plus duplo latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, subtiliter punctato-striata, interstitiis alternis argute elevatis, costatis, costis tribus interioribus interruptis; nigra, opaca, squamulis silaccis parce adpersa, in ipsa basi macula difformi et ante apicem puncto disci dense silaceo-squamosis decorata. Corpus subtus piceum,*

sub-nitidum, parce pallido-setulosum, pectore profundius, ventre obsoletius punctatis. Pedes longiusculi, validi, piceï, punctulati; femoribus clavatis, albo-annulatis, subtus sub-bi-dentatis, dente exteriori obsoleto; tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus fulvo-spongiosis. — BEN.

64. C. DIFFICILIS. (Schh.) — *Oblongo-ovalis, niger, parum nitidus, parce cinereo-squamulosus; antennis tarsisque rufo-ferrugineis, rostro longitudine capitis cum thorace, valido, arcuato, carinato, basi utrinque striolato; thorace confertim mediocriter rugoso-punctato, dorso carinato, antèrius angustato, lateribus recto; elytris sub-remote sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis costatis, costis interioribus interruptis; femoribus sub-bi-dentatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

Magnitudo *Cryptorhynchi divergentis*. Caput rotundatum, modice convexum, crebre rugosum, nigrum, sub-nitidum, vix squamosum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, validum, sub-compressum, arcuatum, supra a basi ultra medium tenuiter carinatum, lateribus striolatum, apicem versus subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, parce pallido-setulosum. Antennæ sub-tenues, rufo-testaceæ, parce pilosæ. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque emarginatus, supra in medio modice lobis ocularibus magis prominulis; antèrius subito angustatus, intra apicem sat profunde constrictus, lateribus pone stricturam ampliatis et dein versus basin sub-parallelis; postice bi-sinuatus, supra parum convexus, crebre mediocriter rugoso-punctatus, carinula postice abbreviata instructus, niger, parum nitidus, squamulis pallidis parce adpersus. Scutellum parvum, sub-triangularè, concolor, læve. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris haud elevatis, obtuse rotundatis; lateribus inflexa, apicem versus angustata, apice ipso acute rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice declivia, sat profunde sub-remote punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis elevatis, carinatis, costis interioribus bis interruptis, et apicem versus abbreviatis; nigra, parum nitida, squamulis parvis, cinereis parce adpersa. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, sub-glabrum, pectore evidenter, ventre remotius punctatis. Pedes elongati, confertim punctati, nigro-piceï, sub-nitidi; femoribus modice clavatis, subtus sub-bi-dentatis, dente exteriori obsoletissi-

mo; tibiis sub-compressis, nonnihil arcuatis, intus in medio parum ampliatis; tarsis angustis, dilate ferrugineis. — BHN.

\* 65. C. CARINICOLLIS. (Schh.) — *Ovatus, rufo-piceus, squamulis parvis, silaceis adpersus; rostro longitudine thoracis, valde arcuato, basi striolato-rugoso, extrorsum punctulato; thorace inæquali, rugoso-granulato, medio sulcato et breviter carinato, scutello basi albo-squamoso; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis alternis costatis, internis interruptis; singulo elytro pone medium plaga obliqua, silaceo-squamosa decorato; femoribus bi-dentatis.*

*Patria* : Brasilia. DOM. COM. MANNERHEIM. MUS. SCHH.

Affinis certe *Conotracheli cristati*, sed duplo major, præsertim latior, aliter coloratus; thorace inæquali, medio sub-sulcato, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, convexum, crebre medio-criter punctatum, piceum, squamulis parvis, silaceis parce adpersum; fronte puncto profundiori insculpta; oculi laterales, ovati, sub-depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis, sat validum, sub-compressum, apice deplanatum, valde arcuatum, a basi ultra medium striolato-rugosum, parce squamulosum, extrorsum punctulatum, ferrugineum, glabrum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-piceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque emarginatus, supra in medio modice rotundato-productus; lobis ocularibus prominulis, obtusis; anterieus angustior, intra apicem leviter coarctatus, lateribus rectis; postice sat profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, inæqualis, rugoso-granulatus, dorso obsolete sulcatus, sulco carina brevi instructus, utrinque leviter impressus; totus nigro-piceus, squamulis parvis, silaceis parce adpersus. Scutellum oblongum, apice rotundato-ampliatum, piceum, basi albo-squamosum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus inflexa, posterius sensim attenuata, apice conjunctim acute rotundata, thorace triplo longiora, supra parum convexa, postice modice declivia, subtiliter punctato-striata, interstitiis alternis sub-costatis, costis duabus suturæ proximis, bis, tertia unice interruptis, extrema fere ad apicem continuata; nigro-picea, pube silacea parcissime adpersa, pone medium plaga obliqua, dense silaceo-squamosa decorata. Corpus subtus piceum, nitidum, pectore ferrugineo, remote punctato, parce pallido-setuloso, abdomine sub-lævi, glabro. Pedes mediocres, validi, punctulati et granulati, ferruginei, læte cervino-

squamosi; femoribus clavatis, subtus ~~pone~~ medium dentibus duobus, posteriore obsoleto, munitis; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

66. C. LORIPES. (Schh.) — *Ovalis, niger, sub-nitidus, squamulis ochraceis parce variegatus; rostro longitudine capitis cum thorace, sat valido, arcuato, a basi ultra medium striolato; thorace confertim mediocriter punctato, dorso antico carinato; elytris sat profunde sub-remote striato-punctatis, interstitiis alternis carinatis, dorsalibus interruptis; femoribus bi-dentatis, dente anteriore valde acuto; tibiis basi arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

Statura et affinitas *Conotracheli carinicollis*, nonnihil major; thorace confertim punctato, non rugoso, evidenter carinato, femoribus acutius dentatis, differt. Caput rotundatum, convexum, profunde sat crebre punctatum, nigro-piceum, sub-nitidum, parce squamulosum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, sat validum, sub-compressum, modice arcuatum, a basi ultra medium striolatum, parce squamulosum, dein apicem versus subtilissime punctulatum, nitidum, glabrum, totum piceum. Antennæ sub-tenues, obscure ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque profunde emarginatus; supra in medio et lobis ocularibus valde prominulis; antè angustior, intra apicem late sed parum profunde constrictus, lateribus pone stricturem subito rotundato-ampliatis, dein versus basin sub-parallelis; postice bi-sinuatus, tenue marginatus, supra modice convexus, crebre mediocriter punctatus, dorso antico carinatus, niger, parum nitidus, squamulis ochraceis parce adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor, læve. Elytra antice obsolete trisinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus inflexa, a medio apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice declivia, sat profunde punctato-striata, interstitiis dorsalibus alternis planis, reliquis carinatis, interioribus his interruptis; nigra, sub-nitida, squamulis ochraceis antè parce postè dense variegata. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, glabrum, pectore evidenter sat crebre, abdomine vix punctatis. Pedes mediocres, punctati, nigri, ochraceo-squamosi; femoribus modice clavatis, subtus

bi-dentatis, dente interiore longo, acuto; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BEN.

67. C. BIFASCICULATUS. (Schh.) — Ovalis, nigro-piceus, parum nitidus, squamulis griseis parce adpersus; antennis pedibusque ferrugineis, rostro sat valido, modice arcuato, medio tenuiter carinato, utrinque uni-striato; thorace transverso, obsolete rugoso-punctato, dorso medio transversim arcuatim impresso, antice tricarinato, cœnitis lateralibus brevibus, sub-obliquis; elytris basi brunneo-squamosis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis acute carinatis, interioribus bis interruptis; femoribus sub-tridentatis, basi arcuatis.

*Patria*: Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

*Conotrachelo repenti* magnitudine et statura simillimus; thorace aliter constructo, femoribus sub-tridentatis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, sat crebre punctatum, piceum, nitidum, vix squamosum, inter oculos foveola impressum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, sat validum, modice compressum, a basi ultra medium tenuiter carinatum, lateribus utrinque uni-striatum, confertim punctulatum, piceum, nitidum, parce setulosum, apicem versus nonnihil deplanatum. Antennæ sub-tenues, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque emarginatus, supra in medio et lobis ocularibus modice productus, anterie subito angustatus, lateribus rotundato-amplius, basi bi-sinuatus, supra paulo convexus, minus crebre sat profunde rugoso-punctatus, in medio transversim arcuatim impressus, antice carinatus et utrinque crista brevi instructus, nigro-piceus, squamulis griseis parce adpersus. Scutellum rotundatum, elevatum, piceum, læve. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus inflexa, apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis elevatis, carinatis, interioribus bis interruptis et apicem versus abbreviatis; picea, sub-nitida, squamulis griseis parce adpersa, in ipsa basi macula parva, cervino-squamosa. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, pectore profunde, crebre, ventre vix punctatis, segmento basali abdominis, serie arcuata e punctis

majoribus. Pedes elongati, punctulati, rufo-picei, parce squamulosi; femoribus clavatis, subtus sub-tri-dentatis, dente interiore valido, altero minutissimo adjecto, tertio libero; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis.

BHN.

68. C. PETROSUS. (Schh.) — *Ovalis, niger, opacus, setulis parvis, depressis, pallidis parce adpersus; rostro longitudine capitis cum thorace, terete, modice arcuato, crebre basi evidenter punctulato; thorace convexo, confertim mediocriter rugoso-punctato, medio carinula brevi instructo; elytris sub-remote mediocriter striato-punctatis, interstitiis alternis remote tuberculatis; femoribus obtuse uni-dentatis; tibiis arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

*Conotrachelo carinicollis* parum longior, sed latior; thorace magis convexo. Caput rotundatum, parum convexum, confertim subtiliter rugulosum, nigrum, opacum, squamis setiformibus, pallidis parce adpersum, inter oculos foveola parum profunda insculptum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, sat validum, sub-teres, modice arcuatum, crebre basi evidenter extrorsum subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Antennæ sub-tenues, obscure ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, vix pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque emarginatus, lobo medio et ocularibus modice prominulis; anterius subito angustatus, obsolete constrictus, lateribus modice rotundato-ampliatis; basi leviter bi-sinuatus vel sub-truncatus, supra convexus, confertim mediocriter rugoso-punctatus, dorso carinula brevi, antice posticeque valde abbreviata instructus; niger, opacus, setulis depressis, pallidis parce adpersus. Scutellum rotundatum, concolor, læve. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi duplo fere latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus inflexa, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice declivia, mediocriter remote seriato-punctata, interstitiis alternis planis, alternis remote tuberculatis; in medio dorsi, non procul a sutura, carina elevata instructa, nigra, opaca, setulis depressis, pallidis parce adpersa. Corpus subtus remote parum profunde punctatum, nigrum, parum nitidum, setulis pallidis adpersum. Pedes elongati, punctulati, nigro-picei, pallido-setulosi; femoribus mo-

dice clavatis, subtus dente obtuso armatis; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 69. C. ABRUPTECOSTATUS. Schh. — H. op. IV. p. 440. 45. —  
P. Brasilia.

\* 70. C. RUGICOLLIS. Schh. — H. op. IV. p. 441. 46. —  
P. Columbia.

71. C. BIDENTATUS. (Schh.) — *Sub-ovalis, niger, squamulis fuscis parce adpersus; rostro longitudine capitis cum thorace, crassiori, compresso, arcuato, a basi ultra medium striolato; thorace angusto, confertim profunde punctato, antice tenuiter carinato, dorso obsolete quadri-tuberculato; elytris mediocriter striato-punctatis, costis tribus dorsalibus elevatis, abruptis; femoribus bi-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria:* Columbia. Mus. DOM. CHEVOLAT.

*Conotrachelo rugicollis* proximus, sed dimidio minor; thorace confertim profunde punctato, non rugoso, dorso obsolete quadri-tuberculato, femoribus bi-dentatis, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, convexum, nigro-piceum, nitidum, glabrum, sat crebre punctulatum, inter oculos obsolete foveolatum; oculi demissi, oblongi, haud prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, validum, sub-compressum, arcuatum, a basi longe ultra medium multi-striatum, dein extrorsum punctulatum, nigrum, parum nitidum, squamulis griseis parce adpersum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, sub-tenuæ, piceæ, parce pilosæ, clava ovata, acuminata, fusco-pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque emarginatus, supra rotundato-productus, antice subito angustatus, coarctatus, mox pone apicem oblique ampliatus, dein lateribus rectis; basi bi-sinuatus, supra modice convexus, sat profunde crebre punctatus, antice leviter carinatus, dorso tuberculis quatuor obsolete instructus; niger, parum niger, squamulis griseis parce obsitus. Scutellum rotundatum, sub-elevatum, concolor. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; a basi fere ad medium parum, dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, supra in dorso parum convexa, postice declivia, mediocriter striato-punctata, interstitiis alternis planis, alternis argute costatis, costis tribus dorsalibus interruptis, omnibus apice abbreviatis; nigra, sub-

opaca, squamulis fusco-griseis parce adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, remote obsolete punctatum. Pedes elongati, punctati, nigri, parce squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus bi-dentatis, dente exteriori minore; tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis.

BHN.

\* 72. C. ABDOMINALIS. Fabr. — H. op. IV. p. 437. 42. —  
P. America meridionalis.

\* 73. C. CRISTATUS. Chev. — H. op. IV. p. 438. 43. — P. America borealis, Guadeloupe.

\* 74. C. RUFIROSTRIS. Schh. — H. op. IV. p. 439. 44. — P. Brasilia.

75. C. DEGLUPTUS. (Germar.) — Sub-ovatus, nigro-piceus, inæqualiter brunneo-tomentosus; rostro longitudine thoracis, valido, punctulato, basi carinato; thorace remote rugoso, breviter carinato, antice profunde constricto, obtuse bi-tuberculato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis alternis costatis, costis tribus dorsalibus interruptis, parte intermedia altius elevata, plaga magna dorsali denudata, atra; femoribus bi-dentatis.

Hujus operis IV. p. 457. 64.

Cryptorhynch. id. GERM. Ins. Spec. p. 284. 422.

Patria: Brasilia. MUS. GERMAR.

Obs. — Magnitudo, statura et similitudo *Conotracheli ufirostris*; rostro validiori, aliter colorato, thorace remote rugoso, dorso carinula brevi instructo, anterieus subito angustato, magis constricto, apice obtuse bi-tuberculato, ab illo facile distinctus.

BHN.

\* 76. C. VESCULUS. (Schh.) — Sub-ovatus, ater, opacus, squamulis setiformibus, albidis parce adspersus; antennis tarsisque ferrugineis, rostro arcuato, basi carinato, striolato-rugoso; thorace confertim minus profunde rugoso-punctato, dorso antico tenuiter carinato, antice subito angustato, lateribus recto; elytris remote parum profunde striato-punctatis, costis alternis tuberculatis, parte intermedia costæ primæ altius elevata, carinata; femoribus bi-dentatis.

Patria: Brasilia. Dom. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Magnitudo et similitudo *Conotracheli deglupti*. Caput sub-globosum, confertim evidenter rugoso-punctatum, atrum, opacum,



squamulis cinereo-albidis, præsertim inter oculos, adpersum; oculi sub-rotundati, haud prominuli, brunnei; rostrum longitudine fere thoracis cum capite, validiusculum, arcuatum, teres, nigrum, dorso ultra medium carinatum et striolato-rugosum, parce cinereo-squamulosum, extrorsum subtiliter punctulatum, glabrum, nitidum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, tenues, ferruginæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra in medio nonnihil rotundato-productus, lateribus a basi longe ultra medium sub-parallelis, tum subito angustatis; postice bi-sinuatus, supra paulo convexus, antice transversim sat profunde coarctatus, confertim minus profunde rugoso-punctatus, dorso antico tenuiter carinatus, ater, opacus, squamulis raris, albidis, ad latera densioribus adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, atrum, nitidum, læve. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris elevatis, obtuse rotundatis, lateraliter nonnihil extensis; lateribus pone humeros ultra medium sensim dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra in dorso paulo convexa, postice declivia, parum profunde sub-remote seriatim punctata, interstitiis alternis planis, alternis tuberculis remotis obsitis, parte intermedia costæ primæ altius elevata, carinata; tota atra, opaca, squamulis setiformibus, albidis, pone medium in fascia angusta, transversa condensatis, parce adpersa. Corpus subtus remote parum profunde punctatum, nigrum, ventre sub-nitido; punctis setulis pallidis obsitis. Pedes mediocres, validi, confertim punctati, nigri, squamulis albidis adpersi; femoribus clavatis, subtus versus apicem dentibus duobus, exteriori obsolete, armatis; tibiis sub-teretibus, basi arcuatis; tarsi angustis, ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis.

BHN.

\* 77. *C. SCIRRHOSUS*. Schh. — *P. Brasilia borealis*.

*Cryptorhynchus id.* — Huj. op. IV. p. 461. 3.

78. *C. MUCIDUS*. (Schh.) — *Ovatus, niger, niveo-squamosus; antennis, rostro pedibusque rufo-testaceis, rostro thorace breviori, valido, compresso, basi sub-elevato; thorace angusto, intra apicem late transversim constricto, dorso medio tuberculo parum elevato instructo; elytris medio transversim late denudatis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis costatis, costis duabus interio-*

*ribus bis interruptis, rufo-testaceis; femoribus sub-bi-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

Longitudo *Conotracheli Argulæ*, sed latior. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, ferrugineum, niveo-squamulosum, vertice denudato; fronte puncto profundiori insculpta; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum thorace nonnihil brevius, validum, compressum, arcuatum, basi elevatum, extrorsum deplanatum, confertim punctulatum, rufo-testaceum, niveo-squamosum, apice denudatum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax angustus, latitudine postica fere longior, apice utrinque emarginatus, supra in medio rotundato-productus, anterieus angustior, intra apicem late constrictus, lateribus sub-parallelis; basi sat profunde bi-sinuatus, supra paulo convexus, in medio dorsi, mox pone stricturam, tuberculo obsoleto instructus, niger, dense niveo-squamosus. Scutellum rotundatum, sub-elevatum, concolor, niveo-squamosum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi plus duplo latiora, humeris haud elevatis, obtuse angulatis, lateribus a medio parum, dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra convexa, postice declivia, sub-remote sat profunde punctato-striata, intersitiis alternis planis, alternis argute elevato-costatis, costis dorsalibus bis interruptis, rufo-testaceis; nigra, dense niveo-squamosa, mox pone medium transversim late denudata. Corpus subtus piceum, nitidum, pectore subtiliter punctulato, parce albo-squamuloso. Pedes elongati, rufo-testacei, albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus bi-dentatis, dente exteriori obsoleto; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BEN.

79. *C. SAXOSUS*. (Schh.) — *Ovalis, niger, sub-nitidus, parce inæqualiter fusco-squamosus; antennis tarsisque rufo-testaceis, rostro brevi, crasso, compresso, modice arcuato, basi elevato, carinato, utrinque striolato; thorace inæquali, medio canaliculato, utrinque longitudinaliter obsolete tri-tuberculato; clytris sat profunde crebre striato-punctatis, costis dorsalibus argute carinatis, bis interruptis; femoribus subtus bi-dentatis; tibiis basi parum arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

Parvus. *Sibynes Viscariæ* magnitudine æqualis. Caput rotundatum, convexum, sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, parce

Fusco-squamulosum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum vix longitudine thoracis, validum, compressum, modice arcuatum, basi elevatum, medio carinatum, utrinque striolatum, extrorsum deplanatum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, parce squamulosum. Antennæ sub-tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax angustus, latitudine postica haud brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra modice rotundato-productus, antè angustior, transversim constrictus, lateribus pone stricturem oblique ampliatis, dein sub-parallelis; basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, inæqualis, medio longitudinaliter canaliculatus, et utrinque tuberculis prope canaliculam tribus parum elevatis instructus; niger, squamulis fuscis sat dense obsitus. Scutellum parvum, rotundatum, sub-elevatum, concolor. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi duplo fere latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus a basi fere ad medium nonnihil dein citius angustata, apice ipso acute rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, sat profunde crebre punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis elevato-costatis, costis dorsalibus bis interruptis, ante apicem abbreviatis; nigra, sub-nitida, basi fusco-squamosa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigro-piceum, sub-nitidum, glabrum. Pedes mediocres, punctulati, nigro-picei, parce squamulosi; femoribus modice clavatis, sub-bi-dentatis, dente exteriori obsolete; tibiis sub-teretibus, basi parum arcuatis; tarsis angustis, rufo-testaceis. — BHN.

80. C. HORREUS. (Schh.) — *Ovalis, ater, nitidus, glaber; rostro longitudine thoracis, valido, arcuato, basi compresso, sub-elevato, obsolete striolato, extrorsum deplanato, punctulato; thorace angusto, inæquali, rugoso-punctato; dorso antico, quadri-tuberculato; elytris rude inordinate punctatis, costis dorsalibus interruptis et abbreviatis; femoribus sub-bi-dentatis; tibiis arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. MUS. GERMAR.

Magnitudo *Conotracheli Argulæ*. Caput rotundatum, supra parum convexum, fronte sub-plana, evidentè punctulata; totum nigrum, sub-nitidum, glabrum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum longitudine thoracis, validum, arcuatum, basi compressum, sub-elevatum, obsolete striolatum, extrorsum deplanatum, subtiliter crebre punctulatum, atrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, obscure ferrugineæ, parce pilosæ;

clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore, densius pubescente. Thorax angustus, latitudine postica vix brevior, apice utrinque emarginatus, supra modice lobis ocularibus magis rotundato-productus, anterie angustior, intra apicem sat profunde constrictus, lateribus pone stricturam sub-parallelis; basi leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra modice convexus, inæqualis, rude rugoso-punctatus, dorso antico tuberculis quatuor parum elevatis, quadratim locatis instructus, ater, sub-nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, concolor, læve. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi duplo fere latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus inflexa, apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice declivia, inordinate profunde punctata, interstitiis alternis argute costatis, costis dorsalibus bis interruptis et postice abbreviatis; atra, nitida, glabra. Corpus subtus nigro-piceum, glabrum, remote sat profunde punctatum. Pedes mediocres, punctati, nigri; femoribus clavatis, subtus bi-dentatis, dente exteriori minutissimo, obsoleto munitis; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsi angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

81. C. TOROSUS. (Schh.) — *Ovalis, niger, squamulis parvis, læte cervinis sat dense adpersus; rostro longitudine capitis cum thorace, valido, sub-compresso, arcuato, supra a basi ultra medium tenuiter carinato, utrinque striolato; thorace confertim parum profunde ruguloso-punctato, dorso antico tenuiter carinato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis alternis costatis, costis interioribus interruptis; femoribus obtuse uni-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

*Otiorhyncho Mauro* magnitudine æqualis. Caput rotundatum, convexum, crebre mediocriter punctatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis parvis, angustis, læte cervinis adpersum, inter oculos puncto profundo insculptum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, validum, arcuatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum, utrinque striolatum, extrorsum deplanatum, punctulatum, nigrum, parum nitidum, parce squamulosum. Antennæ sub-tenuis, piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque profunde emarginatus, supra in medio et lobis ocularibus valde rotundato-productus.

tus, antè subito angustatus, intra apicem late sed minus profunde constrictus, lateribus pone stricturam oblique ampliatis, dein sub-parallelis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, crebre minus profunde ruguloso-punctatus, dorso antè tenuiter carinatus, niger, squamulis parvis, angustis, cervinis sat dense adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor, læve, nitidum. Elytra antè sub-truncata, thoracis basi duplo latiora, humeris non-elevatis, obtuse angulatis; lateribus ultra medium recta, tum apicem versus angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, profunde punctato-striata, interstitiis alternis sub-convexis, alternis costatis, costis interioribus interruptis et apicem versus abbreviatis; nigra, sub-opaca, squamulis cervinis sat dense adpersa. Corpus subtus nigro-piceum, parum nitidum, pectore profunde sat crebre, ventre obsolete remote punctatis. Pedes elongati, nigri, confertim punctati; femoribus clavatis, subtus dente brevi, obtuso armatis; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

82. C. BREVIS. (Schh.) — *Ovatus, niger, sub-opacus, squamulis fuscis parce adpersus; rostro, antennis pedibusque ferrugineis, rostro longitudine capitis cum thorace, sat valido, arcuato, crebre basi evidenter punctulato; thorace subtiliter crebre ruguloso-punctato, antè tenuiter carinato, dorso obsolete quadri-tuberculato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis costatis, costis dorsalibus bis interruptis; femoribus obtuse uni-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

*Otiiorhyncho Mercurialis* parum major. Caput rotundatum, convexum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, nigrum, parum nitidum, fere glabrum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sat validum, teres, arcuatum, crebre a basi ultra medium evidenter dein subtilissime punctulatum, ferrugineum, sub-nitidum, apice infuscatum. Antennæ sub-tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica parum brevior, apice utrinque emarginatus, supra in medio modice rotundato-productus, lobis ocularibus magis prominulis, obtusis; antè angustior, intra apicem late sed parum profunde constrictus, lateribus pone stricturam oblique ampliatis, tum parallelis;

basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter crebre ruguloso-punctatus, antice tenuiter carinatus, in medio dorsi tuberculis quatuor parvis, quadratim locatis instructus; niger, sub-opacus, squamulis fuscis parce adpersus, vitta utrinque obliqua, obsoleta e squamulis pallidioribus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, concolor, nitidum, læve. Elytra breviter ovata, antice leviter tri-sinuata, thoracis basi plus duplo latiora, humeris haud elevatis, obtuse angulatis; lateribus a basi ultra medium recta, dein apicem versus citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice valde declivia, mediocriter sub-remote seriato-punctata, interstitiis alternis sub-planis, alternis costatis, costis dorsalibus bis interruptis, apice abbreviatis, tertia minus elevata, tuberculata; nigra, sub-opaca, squamulis fuscis parce adpersa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, pectore remote, ventre vix punctatis. Pedes elongati, subtiliter crebre punctulati, ferruginei; femoribus clavatis, subtus dente obtuso instructis; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — ВНН.

83. C. LEMNISCATUS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, fusco-squamosus; rostro thorace brevior, valido, compresso, arcuato, medio tenuiter carinato, utrinque striolato; thorace parum profunde crebre rugoso-punctato, dorso obtuse sex-tuberculato, lateribus pone stricturam angulariter ampliato; elytris basi lineola brevi, pone humeros altera obliqua in medio disci ducta, silaceo-squamosis, parum profunde punctato-striatis, interstitiis alternis tuberculatis; femoribus obtuse uni-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

*Phytonomo Polygoni* vix longior, sed nonnihil angustior. Caput rotundatum, convexum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, nigrum, opacum, inter oculos fusco-squamosum; fronte carinula brevi tuberculisque duobus parvis instructa; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum thorace nonnihil brevius, validum, compressum, arcuatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum, utrinque striolatum, dense fusco-squamosum, extrorsum deplanatum, subtiliter punctulatum, nudum, totum nigrum. Antennæ sub-tenuis, obscure ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica haud brevior, apice supra nonnihil rotundato-productus, lateribus a basi longe ultra medium nonnihil ampliatis, tum an-

gularitatem angustatis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, intra apicem transversim impressus, coarctatus, impressione versus latera callo sub-elevato postice terminata; crebre, parum profunde ruguloso-punctatus, dorso utrinque longitudinaliter tri-tuberculatus, tuberculo medio validiori; niger, opacus, squamis densis, fuscis obsitus. Scutellum rotundatum, concolor, sub-denudatum. Elytra oblonga, antice tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris lateraliter nonnihil extensis, obtuse rotundatis; lateribus ultra medium recta, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, parum profunde sub-remote punctato-striata, interstitiis alternis sub-convexis, alternis seriatim tuberculatis, tuberculis dorsalibus evidentioribus; nigra, sub-opaca, dense fusco-squamosa, lineola brevi in ipsa basi, in interstitio secundo, vittaque obliqua pone humeros, in medio disci ducta, silaceo-squamosis. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, parce squamulosum, pectore profunde, ventre vix punctatis. Pedes mediocres, confertim punctulati, nigro-picei, fusco-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente obtuso armatis; tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, obscure ferrugineis. — BHN.

B). *Elytrorum interstitia omnia aut planiuscula aut convexa, haud costata.* (Spec. 84-88.)

84. C. INFECTOR. (Schh.) — *Ovalis, niger, sub-opacus; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis, rostro longitudine fere thoracis cum capite, sat valido, arcuato, a basi ultra medium tenuiter carinato, utrinque striolato; thorace breviori, rude profunde rugoso-punctato, dorso carinato; elytris obscure ferrugineis, silaceo-squamosis, remote sat profunde punctato-striatis, interstitiis planis; femoribus obtuse uni-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria*: Philadelphia, Americæ borealis. MUS. DOM. GERMAR.

*Magnitudo Cryptorhynchi divergentis.* Caput rotundatum, convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, opacum, tenuiter silaceo-squamulosum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sat validum, sub-teres, arcuatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum, lateribus striolatum, apice deplanatum, subtiliter confertim punctulatum, obscure ferrugineum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, den-

sus pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque profunde emarginatus, supra in medio et lobis ocularibus productus, anterie nonnihil angustior, lateribus pone apicem modice rotundato-ampliatis; basi bi-sinuatus, supra parum convexus, rude, profunde et crebre rugoso-punctatus, dorso carinatus, niger, sub-opacus, denudatus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum, læve. Flytra antice tri-sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus ultra medium sensim dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, sat profunde crebre punctato-striata, interstitiis planis; obscure ferruginea, squamulis silaceis dense tecta, dorso antico nonnihil denudata, forte detrita. Corpus subtus nigropiceum, sub-nitidum, crebre punctatum. Pedes elongati, punctulati; femoribus modice clavatis, subtus obtuse dentatis, nigropiceis, apicem versus silaceo-squamosis; tibiis sub-teretibus, basi nonnihil arcuatis, cum tarsis rufo-testaceis. — BHN.

\* 85. *C. CRIBRICOLLIS*. Say. — *H. op.* IV. p. 446. 50. — *P. Missisipi*, Americæ borealis.

\* 86. *C. RUBICUNDULUS*. Chev. — *H. op.* IV. p. 447. 51. — *P. Brasilia*, Columbia.

\* 87. *C. PILOSELLUS*. (Klug.) — *Ovalis*, *convexus*, *nigro-piceus*, *dense griseo-squamosus*, *setulis fuscis adpersus*; *antennis pedibusque ferrugineis*, *rostro longitudine capitis cum thorace, striolato-rugoso*, *modice arcuato*; *thorace anterie subito angustato*, *sub-remote punctato*; *elytris striatis*, *striis in fundo tenuiter punctatis*, *interstitiis convexis*; *femoribus anterioribus muticis*, *posticis obsolete dentatis*.

*Patria* : Columbia. Dom. SCHUPPEL. Mus. SCHH. Rio - Janeiro. Mus. GERMAR.

Statura et similitudo *Conotracheti rubicunduli*, nonnihil major, undique dense griseo-squamosus; striis elytrorum subtiliter punctatis, femoribus tantum posticis obsolete dentatis, ab illo differt. Caput rotundatum, convexum, crebre sed parum profunde punctulatum, nigro-piceum, griseo-squamosum et parce setulosum; oculi laterales, rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, modice arcuatum, teres, a basi ultra medium striolato-rugosum, extrorsum punctu-



latum, piceum, sub-nitidum, pube erecta, fusca parce adpersum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica paulo brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra in medio modice rotundato-productus, lobis ocularibus paulo prominulis, obtusis; anterius subito angustior, intra apicem leviter constrictus, pone stricturam modice rotundato-ampliatum, basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, sub-remote punctatus, nigro-piceus, dense griseo-squamosus, setulis erectis, fuscis adpersus. Scutellum rotundatum, piceum, denudatum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus inflexa, pone medium apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, distincte striata, striis in fundo obsolete punctatis, interstitiis convexis; nigro-picea, squamulis griseis dense tecta, pube longa, sub-erecta, fusca seriatim adpersa. Corpus subtus punctatum, piceum, fere nudum, segmentis ultimis abdominis rufo-ferrugineis. Pedes mediocres, punctulati, ferruginei; femoribus modice clavatis, albo-squamulosis et pubescentibus; anterioribus subtus muticis, posticis obsolete dentatis; tibiis teretibus, rectis, basi nonnihil arcuatis, tenuioribus; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

88. C. SYLVIVS. (Moritz.) — *Ovalis, rufo-testaceus, squamulis albidis setisque fuscis dense obsitus; rostro longitudine capitis cum thorace, tenui, terete, modice arcuato, confertim punctulato; thorace crebre punctulato, intra apicem constricto, lateribus sub-recto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-planis; femoribus muticis; tibiis sub-rectis.*

*Patria* : Guyana. MUS. DOM. GERMAR.

Parvus. *Acalypto Carpini* magnitudine æqualis. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, rufo-testaceum, dense albo-squamosum, parce fusco-setulosum, inter oculos leviter foveolatum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenuæ, teres, modice arcuatum, crebre subtiliter punctulatum, rufo-testaceum, sub-denudatum, parce setulosum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica vix brevior, apice utrinque leviter emar-

ginatus, supra modice rotundato-productus, antèrius angustior, intra apicem transversim impressus et constrictus, lateribus pone stricturam sub-parallelis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, rufo-testaceus, albo-squamulosus et fusco-setosus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra antice sub-tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus a basi ultra medium vix dein apicem versus citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, tenuiter sat crebre punctato-striata, interstitiis sub-planis; rufo-testacea, squamulis albidis tecta, setulis erectis, fuscis seriatim adpersa. Corpus subtus punctulatum, rufo-testaceum, parcius albo-squamulosum. Pedes medio-cres, punctulati, rufo-testacei, parce albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, sub-rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

CENTURIA II. — *Femora mutica*. (Spec. 89.-90.)

\* 89. C. COSTALIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 448. 52. — *P.* Brasilia.

90. C. TAGAX. Schh. — *H. op.* IV. p. 449. 53. — *P.* Caffraria.

STIRPS 2. — *Coxæ antice distantes, rima pectoralis magis distincta, antennæ pone medium rostri insertæ*. (Spec. 91.-103.)

91. C. ALATUS. Chevr. — *H. op.* IV. p. 450. 54. — *P.* Brasilia.

In diagnosi l. c. lin. 1, pro « antèrius », lege : « antennis ».

\* 92. C. RHINOCEROS. Chevr. — *P.* Brasilia.

*Cyphorhynchus id.* Huj. *op.* IV. p. 459. 1.

\* 93. C. LEUCOSTICTUS. (Klug.) — *Oblongo-ovatus, niger, squamositate silacea inæqualiter adpersus; rostro parum arcuato, thorace crebre punctato, dorso antico sex-tuberculato; elytris remote seriatim parum profunde punctatis, interstitiis dorsalibus remote tuberculatis, plaga humerali guttulisque supra illam et pone medium lacteo-squamosis, ornatis; femoribus valide acute dentatis.*

VAR.  $\beta$ . Guttulis lacteis in dorso postico deficientibus.

*Patria* : Columbia. Dom. SCHUPPEL. Brasilia. Mus. DD. GERMAR et SCHH.

Statura et summa similitudo *Conotracheli Rhinocerotis*, nonnihil

minor; rostro minus arcuato, basi non tuberculato, femoribus dente validiore instructis, ab illo fere unice distinctus. Caput rotundatum, convexum, confertim rugulosum, nigrum, opacum, parce circa oculos densius cinereo-squamulosum, fronte foveola parva insculpta; oculi demissi, ovati, parum convexi, nigri; rostrum thorace nonnihil brevius, validum, sub-teres, parum arcuatum, confertim rugoso-punctatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum, nigrum, parum nitidum, parce cinereo-squamulosum et setosum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, sub-tenuis, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica vix longior, apice utrinque profunde emarginatus, lobo medio lato, antrorsum rotundato-producto, leviter emarginato, anterius angustiori; intra apicem late sed parum profunde constrictus, lateribus dein sub-rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim minus profunde punctatus, niger, inæqualiter silaceo-squamosus, dorso antico tuberculis sex obsitus, quorum quatuor in margine apicali et duobus ante medium. Scutellum rotundatum, sub-elevatum, nigrum, opacum, squamulis silaceis adpersum. Elytra antice sub-tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris lateraliter extensis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra convexa, postice declivia, punctis sub-remotis, parum profundis, seriatim digestis impressa, interstitiis dorsalibus alternis tuberculis nonnullis inæqualibus obsitis; nigra, inæqualiter silaceo-squamosa, plaga sub-rotunda, humerali, supra guttulis 2 vel 3 oblique adjecta, et pone medium in dorso guttulis quatuor lacteo-squamosis, ornata. Corpus subtus vix punctatum, nigrum, opacum, parce lateribus abdominis densius albido-squamulosum. Pedes mediocres, validi, nigri, parce albo-squamulosi et setulosi; femoribus clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis compressis, basi arcuatis; tarsi angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 94. *C. SQUALIDUS*. Schh. — *P. Brasilia interior.*

*Cyphorhynchus. id.* Huj. op. IV. p. 460. 2.

95. *C. SETOSUS*. Chevr. — *P. Mexico.*

*Obs.* — Affinitas et summa similitudo *Conotracheli squalidi*, dimidio fere minor; rostro brevior, crassior, thorace evidenter canaliculato, elytris profundius punctato-striatis, ab illo distinctus.

\* 96. *C. VERTICALIS*. Klug. — *H. op.* IV. p. 451. 55. — *P. Cuba.*

97. *C. COSTIFERUS*. Chev. — *H. op.* IV. p. 452. 56. — *P. Mexico.*

\* 98. *C. SOBRINUS*. Dejean. — *H. op.* IV. p. 453. 57. — *P. Brasilia merid.*

\* 99. *C. BICRISTATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 454. 58. — *P. Brasilia, Columbia.*

\* VAR.  $\beta$ . *Dimidio minor, cinereo-squamosus; capite, thorace, elytrorum basi umbrinis.* — BHN.

\* 100. *C. GEMELLATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 455. 59. — *P. Brasilia, Columbia.*

\* 101. *C. APICALIS*. (Schh.) — *Ovalis, convexus, niger, opacus; pedibus cinereo-squamulosis, rostro tenui, parum arcuato, a basi longe ultra medium striolato-rugoso; thorace rugoso-punctato, dorso antico tenuiter carinato; elytris punctis remotis, oblongis seriatim impressis; interstitiis alternis carinatis, basi parce vitta suturali in apice silaceo-squamosis.*

*Patria* : Brasilia. DOM. MÉNÉTRIÉS. MUS. SCHH.

Magnitudo *Cryptorhynchi divergentis*. Statura et summa similitudo *Conotracheli porcatirostris*, sed dimidio major; thorace profundius rugoso-punctato, antice carinato, elytrorum interstitiis alternis minus elevatis, ab illo facile distinctus. Caput rotundatum, convexum, parum profunde sub-remote punctatum, nigrum, nitidum, glabrum; oculi in fronte connexi, ovati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenue, teres, parum arcuatum, a basi longe ultra medium striolato-rugosum, apice punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, sub-tenues, piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque leviter emarginatus, anterieus subito angustior, lateribus sub-rectis, parum ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim sat profunde rugoso-punctatus, dorso antico tenuiter carinatus, niger, opacus, setulis nonnullis, brevibus, albidis adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, nigrum, nitidum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris vix prominulis, obtuse rotundatis; lateribus a basi fere ad medium sensim dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata,

thorace vix triplo longiora, supra convexa, postice declivia, punctis oblongis, remotis, seriatim digestis impressa, interstitiis lævibus, alternis vix elevatis, alternis carinatis; tota nigra, opaca, in ipsa basi parce vitta suturali in apice dense silaceo-squamosis. Corpus subtus parum profunde punctulatum, nigrum, squamulis pallidis parce adpersum. Pedes mediocres, validi, nigri, punctati, cinereo-squamulosi; femoribus parum clavatis, subtus dente acuto armatis; tibiis sub-compressis, fere rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — **BURN.**

\* 102. *C. PORCATIROSTRIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 456. 60. — *P. Brasilia interior.*

103. *C. SUBABRUPTUS*. (Schh.) — *Oblongus, rufo-ferrugineus, pube silacea parce adpersus; rostro longitudine capitis cum thorace, tenui, terete, modice arcuato, subtiliter crebre punctulato; thorace confertim subtiliter punctulato, intra apicem leviter constricto; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis elevatis, secundo pone medium interrupto; femoribus obtuse uni-dentatis; tibiis basi arcuatis.*

*Patria* : Campos Geraes Brasilæ. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Habitus et magnitudo *Erihini pectoralis*. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, fronte dense silaceo-squamosa; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, modice arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, rufo-testaceum, nitidum, glabrum, apice ipso infuscatum. Antennæ sub-tenuis, rufo-testacæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica vix brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra parum rotundato-productus, anteriorius angustior, intra apicem transversim impressus et constrictus, lateribus pone stricturam sub-parallelis; postice bi-sinuatus, supra paulo convexus, subtiliter crebre punctulatus, rufo-ferrugineus, pube depressa, silacea tenuiter adpersus. Scutellum parvum, sub-triangulare, rufo-ferrugineum, læve. Elytra oblongo-ovata, antice leviter tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, sat profunde et crebre punctato-striata, interstitiis alternis convexis, secundo pone medium interrupto; rufo-testacea, sub-nitida, pube depressa, si-

lacea tenuiter adspersa. Corpus subtus piceum, nitidum, pectore subtiliter sat crebre, ventre vix punctatis. Pedes mediocres, punctulati, rufo-testacei; femoribus modice clavatis, subtus dente obtuso armatis; tibiis sub-teretibus, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

*Ad hoc genus verisimile referendū sunt. (Species mihi invisæ.)*

104. C. CONCENTRICUS. Oliv. — *H. op.* IV. p. 457. 61. —  
P. St.-Domingo.

105. C. COLUBER. Fabr. — *H. op.* IV. p. 457. 62. — P. Amer.  
mer.

(GENUS. — CYPHORHYNCHUS. Nobis.)

*Hujus operis* IV. p. 458. gen. 341. — Hoc genus e serie nominum delendum et cum *Conotrachelo* conjungendum.

GENUS 554. — MITROPHORUS. Nobis.

*Hujus operis* IV. p. 463. genus 342.

\* 1. M. WATERHOUSEI. Schh. — *H. op.* IV. p. 464. 1. — P. Brasilia.

GENUS 555. — PERIDINETUS. Nobis.

*Hujus operis* IV. p. 467. genus 344.

\* 1. P. IRRORATUS. Fabr. — *H. op.* IV. p. 468. 1. — P. Brasilia interior, Cayenna.

\* 2. P. ZINCKENI. Schh. — *H. op.* IV. p. 470. 2. — P. Brasilia borealis.

3. P. SELLATUS. (Chevrolat.) — *Sub-ovalis, niger, sub-nitidus, squamulis atris, brunneis et albidis variegatus; fronte impressa, rostro valido, arcuato, subtilissime punctulato; thorace obsolete crebre punctulato, sub-carinato, antice valde constricto; elytris planiusculis, tenuè punctato-striatis, interstitiis apice carinatis, dorso plaga magna dorsali, communi, cordiformi, cervino-squamosa decoratis, pectore cervino-squamoso, utrinque puncto albido insignito.*

*Patria* : Brasilia. Mus. CHEVROLAT.

Minoribus *Peridineti Zinckeni* magnitudine æqualis et statura simillimus, aliter coloratus. Caput rotundatum, convexum, confer-

tim punctulatum, nigrum, squamulis cervinis dense tectum; fronte leviter impressa, canaliculata; oculi ovati, parum convexi, nigri; rostrum longitudine thoracis, validum, teres, arcuatum, subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, basi cervino-squamosum, extrorsum glabrum. Antennæ in medio rostri insertæ, sub-tenuæ, nigropiceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovali, acuminata. Thorax latitudine baseos brevior, apice sub-truncatus, lobis ocularibus nullis; antè angustatus, late sat profunde constrictus, lateribus pone stricturam rotundatis, dein fere rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, subtilissime crebre punctatus, dorso obsolete carinatus, niger, squamulis atris tectus, antè cervinis variegatus. Scutellum breve, latum, apice truncatum, parce squamulosum. Elytra antè leviter tri-sinuata, thoracis basi paulò latiora, humeris elevatis, lateraliter nonnihil extensis, obtuse rotundatis; pone humeros apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso sub-plana, postice declivia, tenuiter striata, striis in fundo subtiliter punctatis, interstitiis planis, apicem versus carinatis; nigra, squamulis atris, albidis et cervinis variegata, dorso antico plaga magna, communi, cordiformi, dense cervino-squamosa, et pone illam, in interstitio 3°, macula parva, distinctiori, albida decorata. Corpus subtus subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, pectore parce cervino-squamoso, in medio lateris macula parva, albida decorato. Pedes breviusculi, confertim punctati, nigri, nitidi; femoribus modice clavatis, subtus dente acuto armatis, apicem versus annulo e squamulis albidis insignitis; tibiis sub-compressis, basi arcuatis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BEN.

♂♀ 4. *P. MACULATUS*. Sturm. — *H. op.* IV. p. 471. 3. — *P. Cuba*.

STURM, *Ins. Catal.* 1843. p. 222.

*Heilipus Roeseli*. Huj. *op.* III. p. 206. 57. et VII. II. p. 89. 110.

♂ 5. *P. SIGNATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 472. 4. — *P. Cuba*,  
Porto-Rico.

#### GENUS 556. — ACENTRUS. *Chevrolat.*

*Character generis.* — Antennæ mediocres, sub-tenuæ; funiculo 7-articulato: articulis 1 et 2 brevissime obconicis, illo longiore, reliquis brevibus, sub-turbinatis, paulo coarctatis; clava sub-ovata, acuminata.

Rostrum longum, sub-tenuæ, teres, arcuatum.

Oculi laterales, ovati, sub-depressi.

Thorax, lateribus basi rub-rectis, intra apicem valde coarctatus.

Elytra oblonga, sub-ovata, humeris obtuse angulatis; apice conjunctim rotundata.

Pedes longiusculi, mutici; femora parum incrassata.

DESCRIPTIO. — Corpus oblongum, sub-ovatum, modice convexum, dense squamosum, alatum; minusculæ magnitudinis. — *Antennæ* ad thoracis medium pertingentes, pone medium rostri insertæ, sub-tenues, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculum sub-attingente, recto, clavato; 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> brevissime obconicis, illo paulo longiore et crassiore; 4-8 brevibus, sub-turbinatis, nonnihil coarctatis, ultimo parum latiore, clavæ adpresso; clava ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine capitis cum thorace, sub-tenue, teres, modice arcuatum, inflexum. — *Oculi* laterales, demissi, ovati, sub-depressi. — *Thorax* latitudine baseos nonnihil longior, postice leviter bi-sinuatus, lateribus ultra medium rectis; anterieus cito angustior, coarctatus, apice ipso utrinque leviter emarginatus, supra modice convexus; rima thoracis minus distincta, ante pedes anticos desinente. — *Scutellum* rotundatum, sub-elevatum. — *Elytra* basi thoracis parte postica fere dimidio latiora et latitudine fere quadruplo longiora, basi conjunctim leviter tri-sinuata, humeris obtuse angulatis; lateribus linearia, pone medium apicem versus sensim paulo attenuata, apice ipso conjunctim rotundata, anum obtegentia, supra modice convexa. — *Pedes* mediocres, postici perparum longiores, omnes mutici; femoribus vix incrassatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulo ultimo bi-unguiculato.

Ab *ἄκεντρος*, aculeo carens.

TYPUS. — *Acentrus Histrio*; ex Europa intermedia.

Obs. — Generi *Cryptorhyncho* haud dissimile est, sed præter alias differentias, quod thoracis inferus pectus non transit et ibi haud argute determinatus, pedesque antici minus distantes, atque aliter antennæ sunt constructæ.

\* 1. A. HISTRIO. (Schh.) — *Oblongus, niger, niveo-squamosus; antennis ferrugineis, rostro modice arcuato, ruguloso; thorace confertim punctato, basi brunneo-bi-maculato; elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis planis, obscure brunneo-squamosis, singula fascia media maculaque parva dorsali, versus apicem niveis, ornato.*



DEJEAN, *Catal.* ed. 2. p. 298. ed. 3. p. 322.

STURM, *Catal.* 1843. p. 222.

*Cryptorhynchus id.* FALDERMANN. *Faun. Ent. Transcaucas.* II. p. 248. 465. et III. p. 205.

Habitat in Caucas. DOM. STEVEN. Sardinia et Sicilia. DOM. CHEVROLAT. Nicia. DOM. SCHUPPEL. Gallia merid. DOM. COM. DEJEAN.

Magnitudo *Eirrhini affinis*. Caput globosum, nigrum, dense niveo-squamosum; oculi laterales, mediocres, ovati, depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis cum capite, teres, sub-tenue, modice arcuatum, obscure ferrugineum, subtiliter rugulosum, squamulis brunneis tectum. Antennæ longe pone medium rostri insertæ, ad medium thoracis pertingentes, sub-tenues, rufo-ferrugineæ, parce pubescentes; clava ovata, acuminata, fusca. Thorax latitudine baseos nonnihil longior, apice late, sed parum profunde emarginatus, lateribus a basi ultra medium rectis, tunc angulatis et subito angustatis; antice coarctatus, postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, niger, confertim punctulatus, sordide cretaceo-squamosus, utrinque ante scutellum, in ipsa basi, macula parva, sub-cuneata, obscure brunneo-squamosa decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, sub-elevatum, albo-squamosum. Elytra oblonga, antice thoracis basi fere dimidio lätiora, humeris sub-prominulis, obtuse angulatis; thorace fere quadruplo longiora, a basi usque pone medium linearia, dein apicem versus nonnihil angustata, apice declivia, conjunctim rotundata, supra modice convexa, subtiliter striata, striis in fundo obsolete remote punctulatis; tota nigra, squamulis brunneis dense adspersa; singulo in medio fascia sat lata, niveo-squamosa, et longe pone medium, prope suturam, macula parva ejusdem coloris notato. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis niveis tectum. Pedes mediocres, nigri, squamulis setulisque niveis dense obtecti; femoribus parum clavatis, muticis; tarsis elongatis, ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 557. — PANTOTELES. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ mediocres, tenues, funiculo 7-articulato: articulis quatuor basalibus longiusculis, sub-clavatis, exterioribus sensim brevioribus, reliquis rotundatis; clava oblongo-ovalis, acuminata.

Rostrum longiusculum, tenue, teres, sub-rectum.

Oculi rotundati, parum convexi, majusculi.

Thorax lateribus basi rotundatus, antrorsum angustior, intra apicem coarctatus.

Elytra oblongo-ovata; humeri obtuse angulati.

Pedes longiusculi, antici paulo longiores; femora modice clavata, subtus uni-dentata.

DESCRIPTIO. — *Corpus* oblongum, modice convexum, dense squamosum, alatum; minoris magnitudinis. — *Antennæ* thoracis medium attingentes, mox ante medium rostri insertæ, tenues, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculum attingente, clavato; 2-5 longiusculis, sub-clavatis, exterioribus gradatim brevioribus; 6-8 brevibus, sub-rotundatis, omnibus distantibus; clava oblongo-ovalis, acuminata, 4-articulata. — *Caput* exsertum, valde convexum. — *Rostrum* capite duplo longius, tenue, teres, sub-rectum, inflexum. — *Oculi* majusculi, laterales, rotundati, perparum convexi. — *Thorax* latitudine baseos vix brevior, postice leviter bi-sinuatus, lateribus plus minusve rotundato-ampliatus, anterieus angustior, intra apicem modice coarctatus, apice ipso in medio nonnihil rotundato-productus, lateribus pone oculos haud lobatus, supra modice convexus; rima pectoralis paulo profunda, ante pedes anticos desinente. — *Scutellum* distinctum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora illoque triplo longiora, oblonga, basi singulatim rotundato-producta, humeris obtuse angulatis; apicem versus nonnihil attenuata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, pygidium obtegentia, supra modice convexa, posterius haud callosa. — *Pedes* longiusculi, minus validi, antici nonnihil longiores, basi paulo distantes; femoribus clavatis, subtus uni-dentatis; tibiis sub-teretibus, fere sub-rectis, apice unco valido instructis; tarsis mediocribus, subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, bi-unguiculato.

A παντοτελής, integer, perfectus.

Typus. — *Pantoteles tenuirostris*; ex America meridionali.

Obs. — Statura *Cryptorhyncho* generi fere appropinquat; thorax autem infra pone pedes anticos haud distincte canaliculatus, etc.

1. P. ERYTHORHYNCHUS. (*Chevolat.*) — *Oblongus, niger; rostro tenui, sub-recto, rufo-testaceo, punctulato, capite dense silaceo-squamoso, fronte foveolata; thorace amplo, lateribus valde rotundato-ampliato, confertim punctulato, dense silaceo-squamoso; elytris atro-squamosis, cæcio-tessellatis, lateribus antice silaceo-*

*bi-maculatis*, subtiliter punctato-striatis, interstitiis sub-planis; corpore subtus cum pedibus albo-squamosis.

*Patria* : Demerari. Mus. DOM. CHEVROLAT.

*Eri rhino Ethiopi* longitudine æqualis, sed nonnihil angustior. Caput rotundatum, valde convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, dense silaceo-squamosum, inter oculos foveola profunda insculptum; oculi rotundati, parum convexi, nigri; rostrum capite plus duplo longius, tenue, teres, fere rectum, subtiliter crebre punctulatum, rufo-testaceum, nitidum, glabrum, apice ipso infuscatum. Antennæ sub-tenuæ, piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra paulo rotundato-productus, lobis ocularibus haud prominulis; anterius subito angustatus, intra apicem constrictus, lateribus valde rotundato-ampliatum, basi sat profunde bi-sinuatus, supra convexus, subtiliter crebre punctulatus, niger, dense dorso medio parcius silaceo-squamosus. Scutellum breve, latum, apice rotundatum, nigrum. Elytra oblonga, antice singulatim rotundato-producta, thoracis medio paulo latiora, humeris obtuse angulatis, vix elevatis; lateribus a basi versus apicem parum angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, ante apicem gibbere obtuso instructa, subtiliter punctato-striata, interstitiis sub-planis; atro-squamosa, sat crebre læsio-tessellata, lateribus antice silaceo-bi-maculata. Corpus subtus confertim subtiliter punctulatum, nigrum, dense albo-squamosum. Pedes elongati, punctulati, nigri, antei silaceo-, posteriores albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente sub-acuto instructis, tibiis sub-compressis, fere rectis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis.

BUN.

\* 2. P. TENUIROSTRIS. (Chevrolat.) — Oblongus, niger, squamulis silaceis tectus; rostro, antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis, rostro capite duplo longiore, tenui, sub-recto, subtiliter crebre punctulato; thorace confertim punctato, lateribus modice rotundato-ampliato; elytris umbrino-variegatis, tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-planis.

*Patria* : Brasilia. Mus. FREYREISS. Mus. SCHH. A DOM. CHEVROLAT ad conferendum etiam missus.

Magnitudo *Pantot. erythrorhynchi*, sed variat etiam nonnihil

major. Caput rotundatum, valde convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, dense silacco-squamosum, inter oculos foveola oblonga, profunda insculptum; oculi sub-rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite duplo longius, tenue, teres, sub-rectum, subtiliter crebre punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica parum brevior, utrinque oblique sub-truncatus, anteriorus angustior, intra apicem obsolete constrictus, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim punctulatus, niger, dorso parcius lateribus dense silaceo-squamosus, linea tamen media dorsi evidentiore silacea. Scutellum mediocre, apice rotundatum, silaceo-squamosum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris parum elevatis, obtuse angulatis; lateribus linearia, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, supra in dorso modice convexa, postice nonnihil declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis sub-planis; nigra, squamulis silaceis et brunneis tecta et variegata. Corpus subtus nigrum, punctulatum, dense silaceo-squamosum. Pedes elongati, punctulati, squamulis silaceis tecti; femoribus modice clavatis, subtus dente acuto armatis; tibiis sub-compressis, basi parum arcuatis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis.

BHN.

GENUS 558. — EUDERES. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 227. gen. 129. — *Huj. op.* III. p. 554. gen. 262.

\* 1. E. LINEICOLLIS. *Wiedem.* — *H. op.* III. p. 555. 1. — *P. Caput Bonæ Spei.*

DEJEAN, *Catal.* ed. 2. p. 284. ed. 3. p. 308.

GENUS 559. — STRONGYLOPTERUS. *Chevrolat.*

*Hujus operis* IV. p. 473. genus 345. — In diagnosi l. c. lin. 10, pone "scutellum", adde: "aut mediocre, apice rotundatum, aut, etc."

\* 1. S. OVATUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 474. 1. — *P. Chili.*

\* 2. S. DENTIPES. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, nigro-piceus, squamulis silaceis supra parce inæqualiter subtus densius adpersus; rostro*

*brevissimo, crasso, punctulato, inter antennas canaliculato; thorace confertim punctulato, longitudinaliter obsolete carinato, intra apicem constricto, scutello mediocri, apice rotundato; elytris profundius punctato-striatis, interstitiis convexis, confertim alutaceis; femoribus compressis, muticis; tibiis mediis extus acute dentatis.*

*Patria* : Chili. DOM. KLUG. Mus. SCHH.

Statura *Strongylopteri ovati*, dimidio major, non pubescens; rostro brevissimo, crasso, elytrorum interstitiis evidenter alutaceis, femoribus muticis, tibiis mediis extus acute dentatis, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigro-piceum, sub-nitidum, circa oculos et subtus squamulis silaceis obsitum; oculi sub-rotundati, haud prominuli, nigri; rostrum capite brevius, valde crassum, rectum, lineare, basi evidenter extrorsum subtiliter punctulatum, apice impressum, nigro-piceum, nitidum, extrorsum glabrum. Antennæ minus tenues, rufo-piceæ, parce pilosæ; clava ovata, parum acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, lobis ocularibus modice prominulis, obtusis; anterior subito angustior, intra apicem late sat profunde constrictus, lateribus nonnihil rotundato-ampliatus, postice bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, dorso longitudinaliter obsolete carinatus, nigro-piceus, parum nitidus, maculis tribus basalibus apiceque utrinque silaceo-squamosis. Scutellum mediocre, apice rotundatum, silaceo-squamosum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris non prominulis, sub-rectangulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace vix triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, evidenter punctato-striata, interstitiis convexis, crebre distincte alutaceis; nigro-picea, sub-opaca, squamulis silaceis parce, hinc inde maculatim condensatis, adpersa. Corpus subtus subtiliter sat crebre punctulatum, nigro-piceum, squamulis silaceis densius adpersum. Pedes mediocres, validiusculi, subtiliter punctulati, nigro-picei, squamulis silaceis parce adpersi; femoribus compressis, subtus muticis; tibiis compressis, rectis, mediis extus mox pone basin acute dentatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

*Obs.* — DOM. CHEVROLAT individuum ad conferendum nobis benevole communicavit, antennis validioribus, cæterum jam descripto simillimum. Forte alter sexus?

GENUS 560. — TRAPHECORYNUS. *Nobis.*

*Cælosternus*. SCHH. olim.

*Character generis.* — Antennæ longiusculæ, sub-tenues; funiculo 7-articulato: articulis 1-3 longiusculis, 2° longiore, sub-obconicis, reliquis brevibus, sub-turbinatis; clava longissima, cylindrica, sub-solida.

Rostrum longum, sub-tenue, teres, modice arcuatum.

Thorax basi obsolete bi-sinuatus, lateribus rotundatus, antè angustior, antice rotundato-productus, utrinque pone oculos profunde emarginatus.

Elytra oblonga, sub-ovata, humeris obtuse angulatis.

Pygidium in mare apertum, inflexum, ventre contiguum, extra elytra non prominens.

Pedes longiusculi; femora valde clavata, subtus valide dentata.

DESCRIPTIO. — *Corpus* oblongum, sub-ovatum, sculpturatum, parce squamosum, alatum; mediæ magnitudinis. — *Antennæ* ultra thoracis medium fere pertingentes, versus medium rostri insertæ, sub-tenues, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1° oculus sub-attingente, recto, clavato; 2°, 3°, interdum etiam 4°, longiusculis, 3° semper longiore, obconicis, reliquis aut oblongis, sub-ovatis, aut brevibus, sub-turbinatis, ultimo clavæ haud adpresso; clava longissima, cylindrica, apice obtuse rotundata, sub-solida, articulis haud discernendis. — *Rostrum* longitudine capitis cum thorace, ante medium paulo crassius, ex inde versus apicem sub-tenue, modice arcuatum, inflexum; scrobe lineari in basi rostri subtus cum opposita connivente. — *Oculi* laterales, valde demissi, ovati, sub-depressi. — *Thorax* latitudine postica vix longior, basi leviter bi-sinuatus, lateribus paulo rotundato-ampliatus, antè cito angustior, haud coarctatus, apice supra rotundato-productus, ibique utrinque profunde emarginatus, lobis ocularibus valde prominulis; rima pectorali ante pedes anticos abbreviata, lata, profunda impressus. — *Scutellum* rotundatum, sub-elevatum. — *Elytra* antice obsolete conjunctim emarginata, thoracis basi fere dimidio latiora, humeris obtuse angulatis; oblongo-ovata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, pygidium obtegentia. — *Pygidium* in mare inflexum, semi-rotundatum, sextum quasi articulum formans, non tamen ultra elytrorum

apicem prominens. — *Pedes* longiusculi, postici parum longiores; femoribus valde clavatis, basi tenuioribus, subtus valide dentatis; tibiis intus leviter bi-sinuatis, apice unco valido, acuto intus instructis; tarsis longis, subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, unguibus binis, validis armato.

A τράχη, lignum erectum, scopus; κορύνη, clava.

Typus. — *Traphecorynus anxius*. — Patria: Madagascar.

Obs. — Generi *Ithyporo* proximum, sed clava antennarum longissima, cylindrica.

\* 1. T. ANXIUS. Schh. — P. Madagascar.

*Cælosternus id.* Huj. op. IV. p. 214. 17. — In diagnosi l. c. lin. 6, pro « femoribus antice », lege: « femoribus acute. »

\* 2. T. INÆQUALIS. Schh. — P. Madagascar.

*Cælosternus id.* Huj. op. IV. p. 203. 5.

#### GENUS 561. — ITHYPORUS. Nobis.

*Hujus operis* III. p. 550. genus 261. — In diagnosi l. c. lin. 3, pro « lenticularibus », lege: « sæpissime rotundatis, in nonnullis sub-ovatis. — lin. 11, pro « pygidium apertum », lege: « pygidium in mare apertum. — lin. 14, « arcuata », lege: « armatæ ».

*Colobodes.* H. op. IV. p. 465. gen. 343.

#### STIRPS 1. — Scutellati. (Spec. 1-8.)

♂♀ 1. I. CAPENSIS. Dejean. — H. op. III. p. 552. 1. — P. Caput Bonæ Spei (~~dele~~ Senegalia).

DEJEAN, Cat. ed. 2. p. 284. ed. 3. p. 308.

\* 2. I. SENEGALENSIS. (Schh.) — Oblongo-ovatus, niger, squamis albidis, subtus æqualiter, supra variegatim obsitus; rostro rugoso-punctato, thorace sub-concinne varioloso-punctato; elytris punctato-striatis, interstitiis dorsalibus alternis parum elevatioribus, macula communi postica albida, distinctiore.

Patria: Senegalia. A DOM. DUPONT missus. Mus. SCHH.

*Ithyporo Capensi* primo intuitu simillimus, at vere distinctus magnitudine dimidio minore, femoribus simpliciter dentatis, tibiis aliter constructis, macula suturali elytrorum transversim sub-quadrangulari, etc. Ab *Ithyporo inquinato* iterum mox distin-

guitur statura multo latiore, sub-ovata, etc. Caput rotundatum, nigrum, confertim ruguloso-punctatum, punctis squamulis albidis aut fusco-griseis repletis; oculi depressi, cupreo-brunnei; rostrum capite duplo longius, sub-teres, modice arcuatum, confertim longitudinaliter strigosum et punctatum, nigrum, basi albedo-squamosum, extrorsum glabrum, nitidum. Antennæ breviusculæ, nigræ; clava cinereo-holosericea. Thorax latitudine media non brevior, antè basi parum angustior, postice leviter bi-sinuatus, apice utrinque profunde sinuato-lobatus, lateribus æqualiter rotundato-ampliatis; supra parum convexus, niger, confertissime sub-reticulatim excavato-punctatus, punctis squamis repletis, squamositate inferne albida, dorso fusca, lituris nonnullis albidis; carinulæ dorsalis vestigium tantum obsoletissimum observatur. Scutellum rotundatum, albedo-squamosum. Elytra antice conjunctim emarginata, pone humeros obtuse rotundatos, ultra medium sub-lineararia, thoraceque ibi dimidio latiora, posterius attenuata, apice conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, tenuiter striata, in striis remote punctata, punctis squamiferis, interstitiis rugulosis, dorsalibus alternis nonnihil convexioribus; nigra, squamis rotundis, albidis fuscisque variegatim obsita, illis versus basin apicemque densius congregatis, pone medium dorsi macula suturali sub-transversa, albo-squamosa, distinctiore. Corpus subtus nigrum, dense æqualiter albedo-squamosum. Pedes validi, confertim punctati, nigri, albedo-squamosi, fusco-fasciati; femoribus modice incrassatis, subtus ante apicem simpliciter, anterioribus obsoletius uni-dentatis; tibiis anterioribus sub-rectis, posticis sub-compressis, leviter incurvis, juxta apicem extus sinuato-dentatis, inferne fulvo-ciliatis; tarsis subtus griseo-spongiosis. — FHS.

♂ 3. I. MADAGASCARIENSIS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, atro-fuscus, supra variegatim ochraceo-albidoque squamosus; thorace rugoso-punctato, dorso antice evidenter carinato; elytris punctato-striatis, interstitiis dorsalibus alternis costatis, sutura longitudinaliter impressa; pedibus silaceo-squamosis, atro-plagiatis; femoribus apice breviter clavatis.*

*Patria*: Madagascar. E Mus. Reg. Gall. et a Dom. GERMAR communicatus. Mus. SCHH.

*Ithyporo Capensi* paulo minor. Caput exiguum, rotundatum, rugoso-punctatum, nigrum, squamis silaceis fuscisque variega-



tum; oculi magni, sub-depressi, brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenuè, lineare, arcuatum, nigrum, basi longitudinaliter rugulosum et punctatum, parce griseo-squamulosum, dorso tenuissime carinulatum, apice simpliciter punctulatum, glabrum, nitidum, linea media dorsi lævi. Antennæ validiusculæ, nigræ; clava fusco-holosericea. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, antè dimidio angustior, basi levissime bi-sinuatus, apice utrinque profunde sinuatus, pone oculos insigniter lobatus, lateribus sub-æqualiter rotundato-ampliatis; supra parum convexus, temere rugoso-punctatus, ater, squamis rotundis, cinnamomeis albidisque, in medio disci lateribusque parcus, alibi densius variegatus, in dorso antico carinula tenui, ante basin abbreviata, lævi, nitida, elevata. Scutellum rotundatum, dense albido-squamosum. Elytra thorace fere dimidio latiora at vix triplo longiora, basi conjunctim emarginata, pone humeros calloso-elevatos, ultra medium linearia, margine inflexa, apice sub-descendentia, conjunctim acute sub-rotundata, supra modice convexa, profunde striata, in striis remote punctata, punctis squamiferis, interstitiis convexis, dorsalibus alternis sub-costatis, ipsa sutura, a basi ultra medium sub-impressa, nigra, squamitate atra, ochracea albidaque variegata, his coloribus basi apiceque late, illo in medio, prævalentibus, interstitiis granulis, glabris, nitidis remote seriatis. Corpus subtus nigrum, ochraceo-squamosum, fusco-maculatum. Pedes longiusculi, nigri; femoribus tibiisque silaceo-squamosis, fusco-bi-fasciatis, illis basi ultra medium gracilibus, tum subito inflatis, anticis maris longioribus, omnibus in utroque sexu prope apicem inferne dente validissimo armatis; tibiis sub-incurvis, ante medium infra obtuse sub-dentatis; tarsis subtus griseo-spongiosis. — FHS.

\* 4. I. ALBESCENS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, piceus, squamositate albida inæqualiter vestitus; antennis unguisque fusco-ferrugineis, rostro elongato, attenuato; thorace antice transversim impresso, basi fusco bi-plagiato; elytris dorso sinuatim fusco-ochraceis, macula suturali pone medium alba.*

*Patria* : Madagascar. Mus. Reg. Gall. et SCHH.

*Ithyporo Capensi* dimidio minor. Caput semi-globosum, piceum, squamositate albida, in vertice bi-sinuatim ochraceo-tincta, vestitum; oculi magni, depressi, brunnei; rostrum capite cum thorace fere longius, æqualiter arcuatum, fere subulatum, vel a basi

ultra medium saltem attenuatum, fusco-castaneum, basi silaceo-albido-squamosum, parce griseo-setulosum, extrorsum glabrum, læve, nitidissimum. Antennæ medium thoracis parum excedentes, sub-tenues, fusco-ferruginæ; clava ob-ovata, cinereo-holosericea. Thorax latitudine media nonnihil brevior, basi levissime sub-bi-sinuatus, a basi ultra medium modice ampliatus, tum subito angustatus, apice pone oculos distincte lobatus, margine dorsi late rotundato-producto; supra modice convexus, antice transversim late impressus, ibique medio obsolete sub-carinulatus, piceus, squamositate subtus lateribusque silaceo-albida et fusco-umbrina variegata vestitus, superne densius albida, plagis duabus approximatis bascos brunneis, dorso antico præterea fasciculis aliquot exiguis lateribusque setulis breviusculis passim adpersis. Scutellum elevatum, rotundatum, dense silaceo-squamosum. Elytra thorace fere dimidio latiora et triplo longiora, basi conjunctim leviter emarginata, callo humerali rotundatim elevato; pone humeros ultra medium sub-linearia, margine sub-inflexa, apice conjunctim acute sub-rotundata, supra sub-fornicata, evidenter striata, striis punctis squamiferis remote impressis, sutura anterieus impressa, interstitiis convexis, tuberculis obsolete setiferis, absque ordine passim obsitis; picea, squamositate in dorso indeterminate fusco-umbrina vestita, lateribus sinuatim maculaque communi transversa, pone medium dorsi, albidis. Corpus subtus piceum, albido-squamosum et setulosum, ventre longitudinaliter late sub-infuscatum. Pedes longiusculi, picei, dense albido-squamosi et disperse griseo-setosi; femoribus bis, tibiis unice fusco-plagiatis, illis versus apicem clavatis, subtus minus valide uni-dentatis. — FHS.

\* 5. I. LABRAMI. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, squamulis silaceis tectus; rostro crassiori, parum arcuato, basi silaceo-squamoso, extrorsum denudato; thorace parum profunde rugoso-punctato, tenuiter canaliculato, vitta lata utrinque obscuriori notato, fasciculis sex e setis crassis, brunneis instructo; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, tuberculis nonnullis fasciculatis instructis, dorso plaga obscuriori decoratis.*

*Patria*: Java. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Habitus *Ithypori Capensis*, sed dimidio fere minor. Caput rotundatum, modice convexus, confertim rugoso-punctatum, nigrum, silaceo-squamosum; fronte puncto profundiori insculpta; oculi

lâterales, ovati, sub-depressi, brunnei; rostrum thorace nonnihil brevius, crassiusculum, sub-compressum, parum arcuatum, supra a basi ultra medium striolato-rugosum, silaceo-squamosum, extrorsum punctatum, denudatum, totum nigrum, opacum. Antennæ mox pone medium rostri insertæ, minus tenues, rufo-piceæ, parce pubescentes; clava ovata, acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica vix brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra nonnihil rotundato-productus, lateribus a basi ultra medium sub-parallelis, dein apicem versus angustatis; postice bi-sinuatus, supra modice convexus, parum profunde sat crebre rugoso-punctatus, medio tenuiter canaliculatus, in margine apicali fasciculis duabus et in medio quatuor transversim locatis, e setulis brunneis, instructus; niger, silaceo-squamosus, utrinque vitta laterali, lata, obscuriori decoratus. Scutellum parvum, elevatum, rotundatum, nigrum, nitidum. Elytra antice sub-tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis parum convexis, dorsalibus fasciculis nonnullis e setis crassis obsitis; tota nigra, silaceo-squamosa, dorso plaga communi, obscuriori decorata. Corpus subtus remote punctulatum, nigrum, silaceo-squamosum. Pedes mediocres, validi, nigri, punctati, silaceo-squamosi; femoribus parum clavatis, subtus dente parvo, obsoleto instructis; tibiis compressis, fere rectis, extus basi angulato-dentatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 6. I. FASCIATUS. (Schh.) — *Oblongo-sub-ovatus, niger, squamositate subtus cinerea, æquali, supra ochracea, atro-albidoque variegata vestitus; rostro basi thoraceque apice carinulatis; elytris punctato-striatis, interstitiis dorsi alternis sub-costatis, fascia pone medium, macula humerali liturisque sparsis albis.*

*Patria*: Madagascar. E Mus. Reg. Gall. et a Dom. SCHUPPEL communicatus. Mus. SCHH.

*Pissodi notato* magnitudine sub-æqualis. Caput rotundatum, crebre rugoso-punctatum, nigrum, squamis cinereo-ochraceis adpersum; oculi magni, sub-depressi, brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-filiforme, arcuatum, piceum, basi rugoso-punctatum, parce cinereo-squamulosum, extrorsum

punctulatum, glabrum, nitidum, carinula dorsali baseos tenui, pone medium in lineam lævem evanescente. Antennæ rufo-piceæ; clava ob-ovata, atro-holosericea. Thorax latitudine baseos paulo brevior, antè dimidio angustior, sub-æqualiter rotundato-amplius, basi sub-truncatus, apice utrinque sinuato-lobatus, pone gulam insigniter emarginatus, sulco vero pro receptione rostri obsolete; supra modice convexus, confertim rugoso-punctatus, squamis cinereo-ochraceis, fuscis albidisque variegatus, carinula dorsali, ante basin abbreviata, plus minusve distincta. Scutellum sub-rotundatum, albo-squamosum. Elytra thorace paulo latiora ac triplo longiora, basi conjunctim leviter emarginata, humeris calloso-elevatis; pone humeros ultra medium linearia, margine inflexa, apice conjunctim acute sub-rotundata, supra convexa, evidenter striata, striis punctis squamulis albis, umbilicatis remote obsitis, interstitiis sub-convexis, dorsalibus alternis elevatioribus, sutura depressa; tota piceo-nigra, squamositate ochracea et atro-fusca variegata, macula humerali, fascia irregulari pone medium dorsi liturisque sparsis, albo-squamosis ornata, interstitiis granulis minutissimis, nudis, nitidis, costatis crebrius, seriatis. Corpus subtus piceum, punctatum, æqualiter cinereo-squamosum. Pedes longiusculi, picei, cinereo-albido-squamosi; femoribus basi gracilibus, ante apicem abrupte clavatis; clava fusco-plagiata, subtus valide uni-dentata; tibiis posticis basi curvatis, omnibus juxta basin late et distincte fusco-annulatis; tarsis subtus griseo-tomentosis. — FHS.

\* 7. I. BILLBERGI. Schh. — P. Insula Java.

*Colobodes id.* Huj. op. IV. p. 466. 1.

\* 8. I. INQUINATUS. Schh. — H. op. III. p. 553. 2. — P. Sierra Leona.

STIRPS 2. — *Exscutellati.* (Spec. 9.-11.)

9. I. CERAPTERUS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, piceo-niger, supra squamositate atro-fusca, ochracea albidaque variegatus; thorace rugoso-punctato, alte carinato, antice utrinque foveato; elytris distincte costatis, basi cornibus duobus porrectis, thoracem amplectentibus.*

Habitat ad Promontorium Bonæ Spei. E mus. Dom. DREGE descriptus.

Animalculum singulare, *Ithyporo Capensi* dimidio minor. Caput rotundatum, nigrum, punctis squamis ochraceis repletis crebre obsitum; fronte densius silaceo-squamosa, foveola insculpta; oculi laterales, sub-depressi, metallici; rostrum capite duplo longius, robustum, sub-teres, modice arcuatum, apice leviter ampliatus, longitudinaliter rugosum, in interstitiis punctatum, basi silaceo-squamosum, extrorsum glabrum, nitidum. Antennæ medium thoracis vix attingentes, piceæ; clava cinereo-sericea. Thorax latitudine baseos paulo longior, anterius parum angustior, lateribus æqualiter modice ampliatis; basi sub-truncatus, apice utrinque sinuato-lobatus, intra apicem constrictus, supra admodum convexus, posterius sub-gibbosus, undique tamen rugosus, dorso carina valida, elevata, superne sub-deplanata, ab apice fere ad basin ducta, adjacente intra apicem utrinque fovea profunda; totus niger, in cavitatibus squamis sordide griseis fuscisque adpersus, carina dorsi glabra, lævi. Scutello caret. Elytra sub-ovalia, thorace vix triplo longiora illiusque medio antice parum latiora; lateribus inflexa, apice sub-descendentia, acute sub-rotundata, supra admodum convexa, remote seriato-punctata, punctis squamulis obtectis, sutura depressa, interstitiis vero omnibus, præsertim dorsalibus, argute costatis, secundis a sutura basi intumescens, in cornua validissima, apice attenuata, dorsum thoracis amplectentia eodemque parum breviora, protuberantibus; tota piceo-nigra, ochraceo-fuscoque squamosa, lituris albidis, sparsis, pone medium dorsi sub-fasciatim congestis, variegata; costis cornibusque granulis denudatis, nitidis, illis seriatim, his vage adpersis. Corpus subtus punctatum, piceum, dense silaceo-squamosum. Pedes breviusculi, validi, punctati, squamositate silacea obducti, obsolete fusco-maculati; femoribus parum incrassatis, subtus ante apicem dente mediocri minutis; tibiis incurvis; tarsis subtus griseo-spongiosis. — FHS.

♂ 10. I. ALBOSIGNUM. (Schh.) — *Oblongus, niger, opacus, squamulis griseis inæqualiter obsitus; antennis rostroque rufo-ferrugineis, rostro longitudine thoracis, deplanato, arcuato, basi striolato; thorace amplo, inæquali, lateribus utrinque rotundato, dorso postico obsolete carinato, dense silaceo-squamoso, basi utrinque macula umbrina decorato; elytris sub-remote parum profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, seriatim tuberculatis, macula dorsali communi, pone medium silaceo-squamosa.*

*Patria* : Caput Bonæ Spei. Dom. DRÈGE. Mus. SCHH.

*Eri rhino acridulo* magnitudine æqualis. Caput rotundatum, modice convexum, crebre punctulatum, nigrum, dense læte griseo-squamosum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine thoracis, minus validum, deplanatum, arcuatum, a basi ultra medium striolato-rugosum, parce squamulosum, extrorsum punctulatum, nitidum, glabrum, totum rufo-ferrugineum. Antennæ tenues, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, obscuriore, densius pubescente. Thorax amplus, latitudine postica fere longior, apice utrinque leviter emarginatus, supra in medio parum lobis ocularibus magis productus, anterius sensim angustatus, intra apicem constrictus, lateribus rotundato-amplius, basi sub-truncatus, supra modice convexus, inæqualis, dorso postico tenuiter carinatus, niger, dense læte griseo-squamosus setisque brevibus concoloribus parce adpersus, utrinque in ipsa basi macula ovata, umbrino-squamosa insignitus. Scutellum parvum, apice rotundatum, læte griseo-squamosum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi parum latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus vix ampliata, a medio apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, sub-remote punctato-striata, punctis squama silacea pupillatis, interstitiis convexis, seriatim tuberculatis; nigra, opaca, squamulis læte griseis parce versus latera densioribus adpersa, in dorso pone medium macula communi, similiter dense squamosa decorata. Corpus subtus punctulatum, læte griseo-squamosum. Pedes elongati, nigro-piceï, griseo-squamulosi et breviter parce albo-setulosi; femoribus apicem versus clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis sub-compressis, medio perparum ampliatis, anticis apice tenuioribus; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — ВНХ.

\* 11. I. ODIOSUS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, sub-opacus; squamulis griseis parce adpersus; rostro validiore, capite dimidio longiore, modice arcuato, basi striolato-rugoso; thorace amplo, confertim parum profunde ruguloso, dorso carinato, lateribus rotundato; elytris dorso postico fascia transversa, communi, densius griseo-squamosa decoratis, evidenter remote punctato-striatis, interstitiis convexis, seriatim granulatis; femoribus anterioribus sub-muticis.*

*Patria.* Caput Bonæ Spei. Dom. WAHLBERG. Mus. Reg. Acad. Holm

*Erihino Æthiopi* magnitudine æqualis. Caput rotundatum, modice convexum, subtiliter crebre ruguloso-punctatum, nigrum, opacum, squamulis griseis parce adpersum; oculi parvi, ovati, haud prominuli, brunnei; rostrum capite dimidio longius, sat validum, sub-deplanatum, modice arcuatum, a basi ultra medium striolato-rugosum, extrorsum punctulatum, nigrum, sub-opacum, glabrum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-piceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil longior, apice utrinque leviter emarginatus, antice posticeque angustatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus rotundato-ampliatus, basi sub-truncatus, supra convexus, confertim parum profunde rugulosus, dorso tenuiter distincte tamen carinatus, niger, sub-opacus, squamulis griseis parce adpersus. Scutellum parvum, apice rotundatum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi parum latiora, humeris sub-angulatis, non elevatis; lateribus nonnihil ampliata, pone medium apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, evidenter remote punctato-striata, interstitiis convexis, seriatim granulatis; nigra, opaca, squamulis griseis parce in fascia transversa, communi, pone medium magis condensatis. Corpus subtus confertim punctatum, nigrum, opacum, parce griseo-squamulosum. Pedes elongati, subtiliter crebre punctulati, nigri, squamulis raris, griseis adpersi; femoribus apicem versus clavatis, anterioribus vix posticis acute uni-dentatis; tibiis compressis, medio nonnihil ampliatis; tarsis angustis, piceis. — BHN.

GENUS 562. — ARTHROSTENUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 288. gen. 166. — *H. op.* III. p. 533. gen. 258.

♂♀ 1. *A. FULLO. Boeber.* — *H. op.* III. p. 534. 1. — *P. Caucasus, Turcomania.*

*Mas* : rostro dense squamoso, pone medium subtus lateribusque piloso.

*Femina* : rostro paulo longiore, glabro, haud squamoso, haud piloso.

FALDERM. *Faun. Ent. Transcauc.* III. p. 204.

DEJEAN, *Catal.* ed. 2. p. 284. ed. 3. p. 308.

\* 2. A. SPADICEUS. *Schh.* — *H. op.* III. p. 534. 2. — *P. Caucasus.*

\* 3. A. CINEREUS. *Schh.* — *H. op.* III. p. 535. 3. — *P. Caucasus.*

GENUS 563. — BAGOUS. *Germar.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 289. gen. 168. — *H. op.* III. p. 537. gen. 260. — In diagnosi generica *huj. op.* l. c. lin. 3, pro « valde », lege : « multo ». — lin. 4, pro « hic clavæ arcte adpressus », lege : « hoc clavæ arcte adpresso ».

STIRPS I. — *Tarsorum articulo penultimo angusto.*  
(Spec. 1.-26).

1. B. ELEGANS. (*Fabricius.*) — *Elongatus, angustus, niger, dense cinereo-squamosus; thorace depressiusculo; elytris fusco-vittatis, interstitiis alternis elevatioribus, ante apicem acute callosis, apice truncatis, extus pinosis.*

*Lixus elegans.* *FABR. Syst. Eleuth.* 2. 499. 3.

— *GERMAR. Faun. Ins. Eur. fasc. IV. Tab. 8.*

Habitat in Germaniæ septentrionalis Arundine phragmite.  
MUS. FABRIC. GERMAR.

*B. binodulo* duplo fere longior, sed vix latior. Caput rotundatum, antice deplanatum, supra fusco-lateribus cinereo-squamosum; oculi rotundati, nigri, parum prominuli; rostrum thorace fere longius, tenue, parum arcuatum, nigrum. Antennæ tenues, ferrugineæ; clava oblongo-ovata, parum incrassata, fusca. Thorax latitudine parum brevior, supra depressus, lateribus rectis, longe ante apicem valde coarctatis; basi truncatus. Scutellum vix visibile. Elytra antice conjunctim emarginata, thoracis basi latiora, humeris oblique rotundatis; lateribus non ampliata, posterius valde attenuata, apice truncata, extus utrinque mucrone sub-recto, divaricato armata, thorace ter et ultra fere longiora, supra parum convexa, posterius declivia, punctato-striata, interstitiis alternis elevatioribus griseis, reliquis fuscis, interstitio quarto postice longe ante apicem in tuberculum spiniformem exeunte. Corpus subtus griseo-squamosum, pectore abdomineque longitudinaliter impressis. Pedes elongati, cinereo-squamosi; femoribus modice clavatis; tibiis apice satis arcuatis, intus setosis; tarsis elongatis, angustis, piceis.

Pinguedine facile colores perdit et totus niger evadit. Mas femina minor; rostro paulo breviori distinguitur. In copula prope Magdeburgum captus est. — *GERMAR.*



- \* 2. *B. BINODULUS.* (*Herbst.*)—*Oblongus, niger, dense fusco-squamosus; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis, fronte foveolata, rostro brevi, valido, modice arcuato; thorace confertissime punctulato, dorso tenuiter canaliculato, longe intra apicem constricto, lateribus sub-recto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis alternis elevatioribus, singulo posterius acute bi-tuberculato.*

*Hujus operis* III. p. 538. 2.

*Bagous binodosus.* GUÉRIN, *Icon. du Règne anim.* V. Tab. 38. fig. 2. a. b. cor?

*Patria* : Suecia, Germania, Anglia. Mus. SCHH. America borealis. Teste DOM. GERMAR.

*Obs.* — Longitudo fere *Phytonomi Rumicis*, sed nonnihil angustior.

- \* 3. *B. MAMILLATUS.* *Say.* — *H. op.* III. p. 539. 4. — *P.* Missari, Amer. bor.

- \* 4. *B. NODULOSUS.* *Schh.* — *H. op.* III. p. 538. 3. — *P.* Germania, Sibiria, Italia.

- \* 5. *B. PYRHOCNEMIS.* *Schh.* — *H. op.* III. p. 540. 5. — *P.* Calcutta.

- \* 6. *B. ARGILLACEUS.* *Schh.* — *H. op.* III. p. 542. 8. — *P.* Tauria, Caucasus.

7. *B. ROTUNDICOLLIS.* (*Schh.*) — *Oblongus, niger, fusco-squamosus; rostro longitudine fere thoracis cum capite, tenuiore, modice arcuato, rufo-ferrugineo; thorace subtiliter confertim punctulato, intra apicem constricto, lateribus rotundato-ampliato, basi utrinque macula cuneata, umbrina decorato; elytris tenuiter punctato-striatis, dorso umbrino variegatis, singulo versus apicem callo evidentiore instructo; pedibus obscure ferrugineis.*

*Patria* : Germania. Mus. DOM. GERMAR.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Bagoi lutosi*; rostro longiore, tenuiore, thorace utrinque magis rotundato-ampliato, callo postico elytrorum evidentiore, tarsorumque structura, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, obsolete crebre punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamulosum, inter oculos foveola obsoleta insculptum; oculi ovati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, minus validum, teres, modice arcuatum, subtilissime punctulatum, rufo-ferrugineum,

nitidum, glabrum. Antennæ breves, ferrugineæ, parce pilosæ; clava parva, ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica vix brevior, antice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus productis, obtusis; anterie nonnihil angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus in medio rotundato-ampliatis; basi truncatus, supra parum convexus, subtiliter crebre punctulatus, niger, fusco-squamosus, in ipsa basi maculis duabus cuneatis, umbrinis decoratus. Scutellum parvum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus sub-recta, pone medium apicem versus attenuata, apice conjunctim sub-acuminata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso antico fere plana, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis; singulo elytro ante apicem callo evidentiore instructo; nigra, fusco-squamosa, dorso antico prope suturam umbrino-variegata. Corpus subtus nigrum, punctulatum, fusco-squamosum. Pedes mediocres, obscure ferruginei, cinereo-squamulosi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, sub-rectis; tarsis angustis, articulo penultimo non dilatato. — BEN.

\* 8. B. COENOSUS. Schh. — *H. op.* III. p. 541. 7. — *P.* Caffraria.

\* 9. B. HEMATOPUS. Schh. — *H. op.* III. p. 543. 10. — *P.* Caucasus.

\* 10. B. INCERATUS. Schh. — *H. op.* III. p. 544. 11. — *P.* Caucasus, Berolini.

11. B. ENCAUSTUS. (Chevrolat.) — *Oblongus, nigro-piceus, sub-nitidus, squamulis cinereis parce adpersus; antennis pedibusque obscure ferrugineis, rostro thorace brevior, arcuato; thorace latitudine postica parum brevior, sub-quadrato, confertim subtilissime punctulato, intra apicem leviter constricto; elytris evidenter punctato-striatis, ante apicem vix callosis.*

*Patria* : Pyrenæis oriental. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Magnitudo *Bagoi nodulosi*. Affinis certe *Bagoi incerati*, sed major, parce squamosus; thorace latiore ab illo distinctus videtur. Caput rotundatum, convexum, subtiliter creberrime punctulatum, nigro-piceum, sub-nitidum, vix squamosum, inter oculos foveola parva insculptum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum thorace brevius, sat validum, sub-teres, arcuatum, subtiliter crebre punctu-

latum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Antennæ breves, validiusculæ, obscure ferruginæ, parce pilosæ; clava ovata, obscuriore, densius pubescente. Thorax latitudine postica parum brevior, apice late, sed paulo profunde emarginatus, lobis ocularibus prominulis, obtusis; antè angustior, intra apicem sat profunde constrictus, lateribus pone stricturam sub-rectis; basi vix sinuatus, supra parum convexus, postice in medio obsolete canaliculatus, confertim subtilissime punctulatus, niger, sub-nitidus, squamulis parvis, cinereis parce adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, ibique thoracis basi vix dimidio latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, thorace plus triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, ante apicem vix callosa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis; nigro-picea, nitida, squamulis cinereis parce adpersa. Corpus subtus piceum, nitidum, subtiliter confertim punctulatum, vix squamosum. Pedes mediocres, obscure ferruginei; tibiis tarsisque dilutioribus; femoribus clavatis, muticis; tarsis angustis, articulo penultimo non dilatato. — BHN.

\* 12. B. LIMOSUS. (Gyllenhal.) — *Oblongus, niger, cinereo-squamosus; antennis inferne tibiisque ferrugineis; fronte non canaliculata; rostro brevior, crassior, arcuato; thorace brevi, variegato, antice leviter constricto, subtiliter punctulato; elytris profundius sulcato-punctatis, interstitiis sub-convexis, puncto discoïdali, albo, setulis brevibus, albidis, hinc inde seriatim præditis, ante apicem callosis; tarsorum articulo penultimo angusto.*

*Hujus operis* III. p. 547. 17.

*Rhynchænus id.* GYLLEN. *Ins. Suec.* IV. p. 560. 20-21.

*Patria* : Dalecarlia, Sueciæ; Caucasus; Paris. — BHN.

\* 13. B. SUBCARINATUS. Schh. — *H. op.* III. p. 543. 9. — *P. Gallia.*

*Obs.* — Similis *Bagoi limosi* et illo magnitudine æqualis, nonnihil tamen latior; thorace longiore, antice supra sub-carinato, ut et elytris tenuiter punctato-striatis, ab illo differt. — BHN.

\* 14. B. PETROSUS. *Herbst.* — *P. Germania, Gallia.*

*Curculio id.* HERBST. *Col.* VI. p. 366. 342. T. 89. f. 1.

*Bagous laticollis.* SCHH. *H. op.* III. p. 548. 19.

*Stettin. Ent. Zeit.* III. p. 108.

- \* 15. *B. BI-IMPRESSUS.* (Schh.) — *Oblongus, piceus, dense murino-squamosus; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis; thorace ante medium sub-angulato-ampliato, puncto juxta latera dorsi utrinque lineolaque ante scutellum impressis; elytris profunde punctato-striatis.*

*Patria: Pisa Etruriæ. A Dom. SCHUPPEL communicatus. Mus.*

SCHH.

*Bagoi petrosi affinis, at dimidio minor, rostro longiori, minus arcuato, thoracis sculptura diversa, etc.; præter antennas ac pedes, totus piceo-niger, squamositate, concreta, murina vel sub-argilacea obductus. Caput rotundatum, deflexum, granulato-punctatum; fronte sub-depressa, obsoletissime canaliculata; oculi laterales, sub-ovati, depressi, nigri; rostrum capite dimidio longius, sub-cylindricum, modice arcuatum, apice sub-denudatum, nitidum. Antennæ medium thoracis vix attingentes, tenues, ferruginæ; clava oblonga, nigro-fusca. Thorax latitudine baseos haud brevior anticeque parum angustior, ante medium sub-angulato-ampliatum, basi truncatus, apice utrinque sinuato-lobatus, intra apicem transversim profunde impressus et constrictus, dorso sub-depressus, undique confertim granulato-punctatus, ad latera dorsi, versus medium, puncto utrinque, lineola obsoleta ante scutellum foveaque gemina utrinque versus basin laterum inferne insculptus. Scutellum minutum, sub-rotundatum. Elytra basi conjunctim leviter emarginata, ibique thorace paulo latiora, pone humeros elevato-rotundatos non ampliata, postice attenuata, sub-acuminata, thorace triplo longiora, supra convexa, ante apicem impressa, undique profunde punctato-striata, interstitiis sub-convexis, alutaceis, secundo a sutura reliquis sub-latiore. Pectus et abdomen granulato-punctata, illud medio canaliculatum, hujus segmentis duobus intermediis brevissimis. Pedes elongati, sub-glabri vel tenuissime modo cinereo-pubescentes; femoribus parum incrassatis, nigris; tibiis apice incurvis, tarsisque gracillimis, rufo-ferrugineis.*

FHS.

- \* 16. *B. CHORINÆUS.* (Chevrolat.) — *Piceo-niger, inæqualiter fusco-cinereo-squamulosus; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis; rostro brevi, arcuato; thorace ante medium ampliato, intra apicem constricto; elytris striatis, striis sub-remote punctatis, interstitiis convexis.*

*Habitat Parisiis. A Dom. CHEVROLAT communicatus. Mus. SCHH.*

*Bago curto simillimus, distinctus tamen videtur thorace an-*

terius magis ampliato, elytris remotius striato-punctatis, interstitiis convexioribus, etc.: *Bagoo bi-impresso* etiam affinis, rostro brevior, crassior, thorace non impresso, ab illo differt. Corpus piceo-nigrum, squamositate sordide cretacea indutum; indumento tamen nonnunquam detricto, sub-glabrum evadit. Caput rotundatum, deflexum, punctulatum, fronte puncto impressa; oculi sub-rotundati, parum convexi, glauci; rostrum capite nonnihil longius, crassum, arcuatum, apice glabrum, nitidum. Antennæ ferrugineæ, clava paulo saturatiore. Thorax longitudine fere latior, basi apiceque superne truncatus, pone oculos lobatus, intra apicem constrictus, pone stricturam abrupte amplius, dein versus basin sensim sub-angustatus, supra parum convexus, obsolete punctatus. Scutellum vix conspicuum. Elytra thorace dimidio latiora et fere triplo longiora, basi interne conjunctim leviter emarginata, pone humeros obtuse sub-angulatos ultra medium linearia, tum subito angustata, ipso apice acute sub-rotundata, supra subfornicata, ante apicem impressa, tenuiter striata, striis sub-remote punctatis, interstitiis convexis, alutaceis. Corpus subtus parum convexum, granulato-punctatum, ventre transversim insculpto. Pedes longiusculi; femoribus piceo-nigris; tibiis tarsisque ferrugineis, illis apice leviter incurvis, his tenuissimis, filiformibus. — FHS.

- \* 17. B. FRIT. (*Herbst.*) — *Oblongo-ovatus, niger, squamulis cinereis variegatus; antennis inferne tibiisque ferrugineis; thorace brevi, confertim evidenter granulato, dorso canaliculato, utrinque obsolete albo-lineato, intra apicem late constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, subtiliter coriaceis, tarsorum articulo penultimo angusto.*

*Hujus operis* III. p. 549. 21.

SAHLB. *Ins. Faun.* II. p. 35. 19.

*Patria*: Suecia, Finlandia, Germania, Dauria.

BHN.

- \* 18. B. MUNDANUS. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, niger, squamulis cinereis variegatus; tibiis tarsisque ferrugineis, rostro basi ruguloso-punctato; thorace confertim granulato, intra apicem constricto, lateribus haud ampliato, dorso tenuiter canaliculato, fusco bi-vittato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, alutaceis, pone medium non procul a sutura macula parva, rotunda, albida decoratis; tarsorum articulo penultimo angusto.*

*Patria*: Helvetia. DOID. CHEVRIER. MUS. SCHH. et GERMAR.

*Bagoo Frit* proximus, dimidio tamen minor; antennis nigris, thorace angustiore, elytris tenuiter punctato-striatis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, cinereo-squamulosum; fronte depressa, non foveolata; oculi laterales, ovati, sub-depressi, nigri; rostrum capite nonnihil longius, crassum, teres, arcuatum, confertim ruguloso-punctatum, nigrum, basi squamulosum, extrorsum nudum. Antennæ breves, nigrae, parce pilosæ. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice late emarginatus, intra apicem transversim constrictus, lateribus haud ampliatus, basi truncatus, angulis baseos sub-rotundatis; supra modice convexus, confertim subtiliter granulatus, medio tenuiter canaliculatus, niger, cinereo-squamulosus, dorso vittis duabus fuscis decoratus. Scutellum parvum, nigrum. Elytra antice truncata, thoracis basi dimidio latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, posterius attenuata, apice conjunctim acute rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso anteriore fere plana, posterius declivia, ante apicem callosa, tenuiter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, subtiliter alutaceis; nigra, cinereo-squamulosa, mox pone medium, non procul a sutura, macula parva, rotunda, alba decorata. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, cinereo-squamulosi; femoribus sub-clavatis, nigris, muticis; tibiis apicem versus arcuatis, fusco-ferrugineis; tarsis gracillimis, totis ferrugineis, articulo penultimo angusto. — BHN.

19. B. CLAUDICANS. (Schuppel.) — *Oblongo-ovatus, niger, squamulis cinereis parce variegatus; antennis basi, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis, rostro brevi, valido, arcuato, confertim punctulato; thorace obsolete crebre granulato, intra apicem constricto, lateribus recto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter coriaceis, dorso cinereo-variegatis.*

*Patria*: Germania. Mus. DOM. GERMAR.

*Bagoo mundano* affinis, sed dimidio major, parcius squamosus; thorace latiore, brevior, antice evidenter constricto, ab illo distinctus. *Bagoo lutulenti* etiam simillimus, sed tarsorum articulo penultimo non ampliato certe differt. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, dense griseo-squamosum, inter oculos obsolete foveolatum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius, sat validum,

arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, parce squamosum. Antennæ breves, minus tenues, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, nigro-picea, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus minus prominulis, obtusis; anterior angustior, intra apicem sat profunde constrictus, lateribus sub-parallelis; basi fere truncatus, supra parum convexus, subtiliter confertim granulatus, niger, sub-opacus, squamulis cinereis parce adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus ultra medium sub-recta, dein apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, thorace triplo fere longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, ante apicem obsolete callosa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter coriaceis; nigra, cinereo-variegata. Corpus subtus punctulatum, nigrum, parce squamulosum. Pedes mediocres, punctulati; femoribus nigro-piceis, muticis; tibiis cum tarsis rufo-testaceis.

BHN.

\* 20. B. BREVIS. Schh. — *H. op.* III. p. 550. 22. — *P. Scania.*

\* 21. B. CURTUS. (Schh.) — *Brevis, niger, squamulis cinereis inæqualiter variegatus; tibiis obscure ferrugineis; thorace transverso, antice profunde constricto; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, in medio albido-guttatis; tarsorum articulo penultimo non dilatato.*

*Patria:* Suecia, prope Holmiam. A Dom. NYBLÆO detectus. Mus. SCHH.

*Bagoo Frit* simillimus, sed adhuc brevior, præsertim in thorace; antennæ totæ nigre et signaturæ elytrorum aliæ. Caput sub-globosum, punctatum, nigrum, sat dense cinereo-squamulosum, fronte leviter canaliculata; oculi rotundati, brunnei, parum convexi; rostrum capite parum longius, crassum, arcuatum, nigrum, supra cinereo-squamulosum, apice ipso glabrum. Antennæ breves, totæ nigre; clava majuscula, cinereo-pubescente. Thorax transversim quadrangulus, latitudine dimidio fere brevior, antice late et profunde emarginatus, intra apicem constrictus, margine apicis elevato, calloso, albido-squamuloso; lateribus vix ampliatum, basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, confertissime ruguloso-punctatus, niger, cinereo-squamulosus, relictis

vittis duabus dorsalibus maculaque laterali utrinque sub-nudis. Scutellum minutum, nigrum. Elytra antice singulatim obtuse rotundata, thoracis basi latiora, humeris rotundatis, elevato-callosis; lateribus non ampliata, posterius attenuata, apice conjunctim acute rotundata, thorace triplo longiora, supra in dorso fere plana, posterius declivia, punctato-striata, interstitiis fere planis, confertim alutaceis; nigra, inæqualiter cinereo-squamulosa; in medio disci singuli elytri puncta quatuor, albidius squamulosa, observantur, unum anterius et tria transversim posita. Corpus subtus confertissime punctulatum, nigrum, squamositate densa, cinerea tectum. Pedes longiusculi; femoribus clavatis, nigris, muticis; tibiis arcuatis, obscure testaceis; tarsis elongatis, nigris, articulo tertio non dilatato. — GHL.

\* 22. *B. DIGLYPTUS*. (Germar.) — *Brevis, niger, squamulis cinereis dense tectus; tibiis obscure ferrugineis, rostro brevi, crasso; thorace latiore, confertim granulato, antice profundissime constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, tarsorum articulo penultimo non dilatato.*

*Patria* : Saxonia. DOM. MÆRKEL. MUS. SCHH.

*Bago curto* certe affinis, sed nonnihil latior, dense cinereo-squamosus; thorace latiore, antice profundius constricto, elytris tenuiter punctato-striatis, ab illo tamen bene distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamosum, inter oculos foveola parum profunda, oblonga insculptum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius, validum, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, cinereo-squamosum, apice denudatum. Antennæ breves, piceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus paulo prominulis, obtusis; anterius nonnihil angustior, intra apicem profundissime constrictus, lateribus pone stricturam sub-rectis; postice sub-truncatus, supra modice convexus, subtiliter crebre granulatus, niger, dense cinereo-squamosus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, inter-



stitiis sub-convexis; nigra, dense cinereo-squamosa. Corpus sub-  
tus punctulatum, dense cinereo-squamosum. Pedes mediocres,  
picei, cinereo-squamulosi; femoribus clavatis, muticis; tibiis sub-  
teretibus, apicem versus nonnihil inflexis; tarsis elongatis, arti-  
culo penultimo non dilatato. — BHN.

\* 23. B. LUTULOSUS. (Gyllenhal.) — Oblongus, angustior, niger,  
fusco-squamosus, cinereo-albido-variegatus; tibiis sub-arcuatis,  
ferrugineis; thorace longiore, confertim granulato, intra apicem  
profunde constricto, antice elevato, linea dorsali lateribusque cine-  
reo-squamosis; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis  
convexis, alternis elevationibus, dorso in medio albido-guttatis;  
articulo penultimo tarsorum angusto.

Hujus operis III. p. 546. 15.

Rhynchæmus id. GYLLENH. Ins. Suec. IV. p. 568. 20-21.

Patria: Suecia merid., Gallia, Borussia. — BHN.

\* 24. B. TEMPESTIVUS. Herbst. — H. op. IV. p. 546. 16.

Patria: Berolini. (Non in Anglia et in Gallia.)

\* 25. B. CNEMERYTHRUS. (Marsham.) — Oblongus, nigro-piceus, ci-  
nereo-squamulosus; antennis inferne, tibiis tarsisque ferrugineis;  
thorace subtiliter crebre punctulato, dorso canaliculato, postice  
angustato, angulis baseos rotundatis; elytris tenuiter punctato-stria-  
tis, sutura interstitiisque alternis elevationibus; tarsorum articulo  
penultimo angustato.

Curculio id. MARSH. Ent. Brit. p. 268. 92.

Rhynchæmus tereticollis. BECK, Beytr. p. 23-34. Tab. 6. f. 34?

Patria: Anglia. A DD. WALTON et SPENCE communicatus. In  
Gallia. DOM. CHEVROLAT. Mus. SCHH.

*Bago tempestivo* proximus, illo vix longior sed dimidio latior;  
thorace canaliculato, angulis posticis rotundatis, vittis dorsalibus  
nullis, ab illo differt. Caput rotundatum, convexum, subtiliter  
crebre punctulatum, nigro-piceum, cinereo-squamulosum; fronte  
impressa, obsolete foveolata; oculi laterales, sub-ovati, depressi,  
nigri; rostrum capite nonnihil longius, sub-cylindricum, modice  
arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, opacum, sub-  
denudatum. Antennæ medium thoracis vix attingentes, tenues,  
ferrugineæ; clava oblonga, nigro-fusca. Thorax latitudine baseos  
haud brevior, basi apiceque truncatus, antierius parum angustior,

intra apicem leviter constrictus, lateribus paulo rotundato-ampliatum, angulis baseos rotundatis; supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, medio longitudinaliter distincte canaliculatus, niger, squamulis densis, cinereis undique vestitus. Scutellum minutum, sub-rotundatum, concolor. Elytra basi conjunctim leviter emarginata, ibique thorace paulo latiora, pone humeros elevato-rotundatos vix ampliata, postice attenuata, apice ipso sub-acuminata, thorace triplo longiora, supra convexa, postice declivia, ante apicem impressa, callosa, tenuiter punctato-striata, sutura interstitiisque alternis elevatioribus; nigro-picea, squamulis cinereis vestita, macula parva, rotunda, albida pone medium, non procul a sutura, insignita. Corpus subtus punctulatum, nigrum, cinereo-squamulosum. Pedes elongati, cinereo-squamulosi; femoribus parum incrassatis, nigris, muticis; tibiis apice incurvis tarsisque gracillimis rufo-ferrugineis. — BERN.

\* 26. B. CONVEXICOLLIS. (Schh.) — *Oblongus, angustior, niger, dense griseo-squamosus; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis, rostro brevi, crasso, arcuato; thorace subtiliter crebre punctulato, dorso obsolete canaliculato, postice sub-angustato, intra apicem constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, sutura interstitiisque alternis elevatioribus; humeris lateraliter nonnihil extensis; tarsorum articulo penultimo angustato.*

*Patria* : Saxonia montosa. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

Majoribus *Bagoi cnemerythri* statura et magnitudine simillimus; thorace antice evidenter constricto, elytris tenuiter punctato-striatis, humeris lateraliter magis extensis, ab illo differre videtur. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, griseo-squamosum; fronte non foveolata; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius, validum, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, griseo-squamosum, apicem versus denudatum. Antennæ medium thoracis vix attingentes, sub-tenuis, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, obscuriore. Thorax latitudine baseos fere brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus modice prominulis, obtusis; intra apicem transversim impressus et constrictus, lateribus versus basin nonnihil angustatis; postice truncatus, supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, medio obsolete canaliculatus, niger, squamulis densis, griseis tectus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata,

thoracis basi vix dimidio latiora, humeris lateraliter nonnihil extensis, obtuse angulatis; lateribus sub-parallelis, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, sutura interstitiisque alternis elevatioribus; nigra, squamulis griseis dense vestita. Corpus subtus punctulatum, nigrum, griseo-squamulosum. Pedes elongati, cinereo-squamulosi; femoribus modice incrassatis, nigris, muticis; tibiis apice incurvis, cum tarsis gracillimis ferrugineis. — BHN.

STRIPS 2. — *Tarsorum articulo penultimo paulo dilatato, bi-lobo.*  
(Spec. 27-34.)

\* 27. B. LONGULUS. Schh. — *H. op.* III. p. 537. 1. — *P. Caffraria.*

\* 28. B. LUTOSUS. (Gyllenhal.) — *Elongatus, angustior, niger, cinereo-squamosus; pedibus fusco-ferrugineis, rostro mediocri, crassiusculo, arcuato; thorace lateribus sub-recto, supra crebre subtiliter punctulato, in medio obsolete canaliculato; elytris apice attenuatis, callo unico obtuso instructis, tenuiter punctato-striatis, sutura interstitiisque alternis sub-elevatis; tibiis elongatis, arcuatis; articulo penultimo tarsorum paulo dilatato, bi-lobo.*

*Hujus operis* III. p. 541. 6.

*Rhynchaenus id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 34. 17.

*Patria* : Suecia, Finlandia, Anglia, Gallia. — BHN.

\* 29. B. LUTULENTUS. (Gyllenhal.) — *Oblongus, niger, squamulis cinereis variegatus; tibiis ferrugineis, rostro mediocri, modice arcuato, fronte canaliculata; thorace confertim punctulato, antice constricto, lateribus sub-recto; elytris obsolete punctato-striatis, sutura interstitiisque 1 et 2 elevatioribus, ante apicem callosis; singulo elytropone medium, nonprocul a sutura, macula parva, albida ornato; articulo penultimo tarsorum dilatato, bi-lobo.*

*Obs.* — *Bagoo limoso* affinis, sed latior; thorace evidenter punctulato, tarsorum articulo penultimo dilatato, bi-lobo, ab illo mox dignoscitur.

*Hujus operis* III. p. 545. 12. (dele : *Bagous tibialis*, STEPH., etc.)

SAHLB. *Insecta Fenn.* II. p. 34. 18.

*Bagous binotatus.* STEPH. *Huj. op.* IV. p. 545. 13.

*Patria* : Suecia, Finlandia, Anglia, Germania, Sibiria.

\* 30. *B. INQUINAMENTUS*. Schh. — *H. op.* III. p. 545. 14. —  
*P. Sibiria occidentalis.*

\* 31. *B. PUNCTICOLLIS*. (Schh.) — *Oblongus, niger, dense fusco-squamosus; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis, rostro mediocri, arcuato, confertim punctulato; thorace confertim evidenter punctulato, antice constricto, lateribus sub-recto, basi umbrino-bi-maculato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis omnibus planis; singulo elytro in dorso postico macula rotunda, alba decorato; tibiis arcuatis, articulo penultimo tarsorum modice dilatato, bi-lobo.*

*Patria* : Lipsiæ. DOM. KUNZE. Mus. SCHH.

*Bago lutulento* proximus, densius squamosus; thorace evidenter punctulato, elytrorum interstitiis omnibus planis, ab illo differt. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, dense fusco-squamosum, inter oculos leviter foveolatum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum capite vix dimidio longius, validum, arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, basi fusco-squamosum, extrorsum denudatum. Antennæ breves, minus tenues, ferruginæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica vix brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus modice prominulis, obtusis; anterie nonnihil angustior, intra apicem constrictus, dorso tenuiter canaliculatus, crebre evidenter punctulatus, niger, dense fusco-squamosus, in ipsa basi maculis duabus umbrinis decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, squamulosum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris parum elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice déclivia, ante apicem callo sat valido instructa, tenuiter punctato-striata, interstitiis omnibus planis; nigra, dense fusco-squamosa, singulo pone medium, non procul a sutura, macula parva, rotunda, albo-squamosa decorato. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense fusco-squamosum. Pedes mediocres, fusco-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis, nigro-piceis; tibiis sub-teretibus, apicem versus inflexis, anticis intus crenulatis, cum tarsis rufo-ferrugineis; articulo penultimo tarsorum modice ampliato, bi-lobo. — BEN.

- \* 32. *B. VALIDITARSUS.* (Schh.)—*Oblongus, niger, dense fusco-squamosus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis, rostro brevi, valido, arcuato, confertim punctulato; thorace subtiliter confertim punctulato, intra apicem leviter constricto, lateribus sub-recto, dorso obsolete canaliculato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis omnibus planis, dorso umbrino-variegatis; tarsis brevibus, articulo penultimo ampliato, bi-lobo.*

*Patria:* Paris. Dom. CHEVROLAT. Mus. SCHH.

*Bago incerato* proximus, sed tarsis latioribus, ut et colore indumentū, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, dense fusco-squamosum, inter oculos vix foveolatum; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum capite vix dimidio longius, validum, teres, arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, cinereo-squamulosum. Antennæ breves, minus tenues, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica haud brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus modice prominulis, obtusis; anterius nonnihil angustior, intra apicem minus profunde constrictus, lateribus sub-parallelis; basi sub-truncatus, supra paulo convexus, subtilissime confertim punctulatus, dorso obsolete canaliculatus; niger, squamulis fuscis dense tectus, vittis duabus obscurioribus decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, fusco-squamosum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus ultra medium linearia, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis omnibus planis; ante apicem callo obtuso, albo-squamoso instructa, nigra, fusco-squamosa, dorso antico umbrino-variegata. Corpus subtus subtiliter confertim punctulatum, dense fusco-squamosum. Pedes mediocres, rufo-ferruginei, cinereo-squamulosi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, apicem versus inflexis; tarsis brevibus, articulo penultimo ampliato, bi-lobo. — BHN.

- \* 33. *B. TOPHYOSUS.* Schh. — *H. op.* III. p. 547. 18. — *P. Sibiria occidentalis.*

- \* 34. *B. TIBIALIS.* (Schh.) — *Elongatus, angustus, niger, squamulis cinereis variegatus; antennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis, rostro*

*breviore, sat valido, arcuato, confertim punctulato; thorace subtiliter crebre punctulato, intra apicem haud constricto, lateribus recto, antèrius nonnihil angustato, dorso denudato; elytris evidenter crebre punctato-striatis, interstitiis angustis, sub-convexis; articulo penultimo tarsorum ampliato, bi-lobo.*

*Patria: Germania. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.*

Statura et summa similitudo *Bagoi cnemerythri*; thorace intra apicem non constricto, elytris evidenter punctato-striatis, tarsis brevioribus, magis dilatatis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, modice convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, cinereo-squamosum; fronte tenuiter canaliculata; oculi ovati, haud prominuli, nigri; rostrum capite dimidio longius, sat validum, teres, arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, cinereo-squamosum. Antennæ breves, minus validæ, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica nonnihil longior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus paulo prominulis, sub-obtusis; antèrius nonnihil angustior, intra apicem haud constrictus, lateribus sub-parallelis; basi truncatus, supra paulo convexus, confertim subtiliter punctulatus, niger, dorso sub-denudatus, lateribus cinereo-squamosus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra elongata, antice sub-truncata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus linearia, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra in dorso paulo convexa, postice declivia, crebre evidenter punctato-striata, interstitiis sub-convexis; ante apicem vix callosa, nigra, opaca, squamulis cinereis inæqualiter variegata. Corpus subtus crebre punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamosum. Pedes mediocres, cinereo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis, nigro-piceis; tibiis teretibus, apicem versus parum inflexis, cum tarsis brevibus, dilatatis, rufo-testaceis. — BHN.

GENUS 564. — ZYGOPS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 300. gen. 175. — *Huj. op.* IV. p. 601. gen. 353. — LACORDAIRE, *Extr. des Ann. des Sciences nat.* XX. p. 194.

STIRPS I. — *Femora quadri-, antica uni-, postica sub-bi-dentata.*  
(Spec. 1-19.)

\* 1. *Z. LIGATUS*. Chevrolat. — *H. op.* IV. p. 602. 1. — *P. Cayenna.*

\* 2. *Z. HOSTIA*. Germar. — *P. Brasilia.*

*Pœcilma id.* GERMAR. *Ins. Spec.* p. 256. 368.

*Zygops Germari.* SCHH. *Huj. op.* IV. p. 603. 2.

3. *Z. SANCTUS*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 604. 3. — *P. Amer. mer.*

\* 4. *Z. STRIX*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 606. 4. — *P. Cayenna.*

\* 5. *Z. OCHATINUS*. Germ. — *H. op.* IV. p. 607. 5. — *P. Brasilia.*

\* 6. *Z. BUFFO*, Dejean. — *H. op.* IV. p. 608. 6. — *P. Brasilia, Cayenna.*

\* 7. *Z. DISJUNCTUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 609. 7. — *P. Minas Geraes Brasiliæ.*

\* 8. *Z. SIGNATIVENTRIS*. (Chevrolat.) — *Oblongo-ovatus, niger, pube holosericeo-atra et cervina variegatus; antennis, rostro, tibiis tarsisque ferrugineis; thorace confertim punctulato, intra apicem constricto, lateribus maculis tribus obliquis, albidis decorato; ethytris tenuiter punctato-striatis, singulo guttulis tribus niveis decorato; corpore subtus atro-squamoso, pectore apice silaceo-alboque maculato, abdomine vittis tribus apice connexis punctoque laterali niveo-squamosis.*

*Patria* : Cayenna. DOM. CHEVROLAT. MUS. SCHH.

Statura et similitudo *Zygopis disjuncti*; femoribus anticis nigris, ut et colore, ab illo bene distinctus. Caput orbiculatum, silaceo-squamosum, vertice triangulariter denudato; oculi magni, ovati, inferne acuminati, valde approximati, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, basi nonnihil crassius, ibique quadri-canaliculatum, parce silaceo-squamosum, extrorsum subtiliter punctulatum, totum rufo-ferrugineum, apice nonnihil deplanatum. Antennæ sub-tenuis, ferrugineæ. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, antè angustior, apice oblique truncatus, intra apicem striga transversa, profunda insculptus, lateribus sub-obliquis; basi profunde bi-sinuatus, angulis lateralibus retrorsum productis; supra modice convexus, confertim subtiliter punctulatus, niger, atro-squamosus, dorso lateribusque cervino-variegatus, utrinque maculis tribus longitudina-

liter oblique positis, albidis insignitis. Scutellum breve, latum, apice rotundatum, punctulatum, ferrugineum, parce cervino-squamosum. Elytra basi leviter sinuata, antice thoracis basi nonnihil latiora, humeris rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice conjunctim sub-truncata, thorace duplo longiora, supra parum convexa, tenuiter striata, striis in fundo subtiliter punctata, interstitiis planis; nigra, atro-cinereoque variegata, guttulis tribus obliquis; niveis insignita, prima ante medium, non procul a latere, parva, secunda pone medium, fere in disco, tertia apicem et suturam propius; plaga laterali ante medium atra, sutura anterie paulo elevata, postice tuberculata. Pygidium exsertum, apice rotundatum, cervino-squamosum, basi macula parva, pallidiori. Corpus subtus obsolete punctulatum, atro-squamosum, pectore utrinque apice inferne macula nivea, superne macula silacea, decorato; abdomine vittis tribus apice connexis, basi niveo-extrorsum silaceo-squamosis et præterea puncto laterali, albido insignito. Pedes validi, punctati, parce inæqualiter albido-squamosi; femoribus parum clavatis, nigris, anterioribus acute uni-, posticis sub-bi-dentatis, dente exteriori breviori, obtuso; tibiis tarsisque rufo-ferrugineis. — BEN.

9. *Z. PIUS.* (Chevrolat.) — *Oblongo-ovatus, niger, squamulis silaceis variegatus; thorace confertim subtiliter punctulato, intra apicem constricto, lateribus obliquis, apice linea dorsali postice abbreviata aliaque laterali, obliqua, silacea decorato; elytris tenuiter punctato-striatis, guttulis parvis, numerosis, silaceis crebre adspersis; ventre silaceo-tri-vittato.*

*Patria* : Cayenna. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Statura *Zygopis disjuncti*, illo nonnihil major. Caput globosum, nigrum, dense silaceo-squamosum, macula verticali, triangulari, ferruginea, denudata insignitum; oculi magni, ovati, convexi, inferne acuminati, in fronte approximati, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, sub-tenuè, basi nonnihil crassius, quadri-sulcatum, silaceo-squamosum, extrorsum deplanatum, subtiliter punctulatum, glabrum, nitidum, totum piceum. Antennæ sub-tenuès, piceæ; clava elongata, acuminata, atro-holosericea. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique truncatus, lobis ocularibus vix prominulis; intra apicem striga transversa, arcuata, profunda insculptus, lateribus obliquis; postice profunde bi-sinuatus, angulis baseos retrorsum productis, acutis; supra modice convexus,



subtiliter confertim punctulatus, niger, atro-squamosus, apice ipso linea dorsali postice abbreviata, vittaque obliqua, arcuata, laterali, infra cum linea longitudinali connexa, silaceo-squamosis. Scutellum breve, apice rotundatum, nigrum, sub-denudatum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, sub-rotundatis; lateribus haud ampliata, apice conjunctim oblique truncata, thorace duplo longiora, supra paulo convexa, tenuiter striata, striis in fundo subtiliter punctatis, interstitiis alternis dorsalibus nonnihil elevatis, omnibus subtiliter alutaceis; nigra, atro-squamosa, guttulis numerosis, parvis, silaceo-squamosis dense obsita. Pygidium oblongo-triangulari, apice sub-acuminatum, atro-squamosum, linea media angusta, silacea insignitum. Corpus subtus subtilissime crebre punctulatum, nigrum, pectore silaceo-marginatum, abdomine atro-squamoso, vittis tribus latis, silaceo-squamosis decorato. Pedes elongati, validi, nigri, punctulati, parce silaceo-squamulosi; femoribus parum clavatis, anterioribus subtus acute uni-dentatis, posticis pone dente crenulatis; tibiis compressis, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 10. Z. WIEDII. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 611. 8. — *P.* Rio-Janciro Brasiliæ.

\* 11. Z. CINCTIPES. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 611. 9. — *P.* Brasilia.

\* 12. Z. MEXICANUS. *Chev.* — *H. op.* IV. p. 611. 10. — *P.* Mexico.

\* 13. Z. HISTRIO. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 612. 11. — *P.* Brasilia borealis, Cayenna.

\* 14. Z. SUBMACULATUS. *Chev.* — *H. op.* IV. p. 614. 12. — *P.* Cayenna.

\* 15. Z. PISTOR. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 615. 13. — *P.* Brasilia interior.

16. Z. STIGMA. (*Schh.*)—*Oblongo-ovatus, niger, supra atro-, cervino-cinereoque variegatus, subtus albido-squamosus; antennis ferrugineis, rostro basi utrinque impresso; thorace angustiori, sub-conico, intra apicem leviter constricto, basi parum profunde bi-sinuato, linea dorsali lateribusque inæqualiter læte cervino-squamosis; elytris tenuiter punctato-striatis, macula suturali majori, atra pone medium, insignitis; pectore utrinque silaceo-bi-maculato.*

*Patria* : Porto Allegro Brasiliæ. Mus. Dom. SOMMER.

Affinis certe *Zygopi Pistori*; thorace angustiori, sub-conico, ut et signaturis aliis, ab illo facile distinctus. Caput orbiculatum, nigrum, silaceo-squamosum, vertice macula triangulari, denudata insignitum; oculi ovati, convexi, approximati, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenuè, arcuatum, inflexum, basi nonnihil crassius, utrinque leviter impressum, squamulosum, extrorsum deplanatum, subtiliter punctulatum, glabrum, nitidum. Antennæ sub-tenuès, ferrugineæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriori. Thorax latitudine postica vix brevior, angustus, sub-conicus, apice oblique truncatus, intra apicem striga transversa insculptus, lateribus obliquis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, dorso atro-squamosus, cum linea media pallido-squamosa, lateribus inæqualiter albedo-silaceoque squamulosis. Scutellum latum, apice rotundatum, nigrum, parce squamulosum. Elytra conjunctim leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris paulo elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice ipso subtruncata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis; nigra, squamulis cinereis, cervinis atrisque variegata, pone medium macula communi, sub-quadrata, atra insignita. Pygidium apice rotundatum, punctatum, brunneo-squamosum, medio linea pallidiori divisum. Corpus subtus punctulatum, nigrum, squamulis albidis sat dense obsitum, pectore utrinque maculis duabus silaceis, una basi, altera apice, decorato. Pedes mediocres, elongati, punctati, nigri, albo-squamulosi; femoribus linearibus, anterioribus acute uni-, posticis bi-dentatis, dente exteriori parvo; tibiis subcompressis, rectis, angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 17. *Z. VINULLUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 616. 14. — *P. Brasilia septentr.*

\* 18. *Z. SOBRIVUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 622. 20. — *P. Brasilia septentr.*

*Obs.* — Femoribus anterioribus obtuse uni-, posticis bi-dentatis, dente exteriori parvo.

19. *Z. PARVULUS*. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, opacus, squamulis læte cervinis variegatus; antennis rostroque apice ferrugineis, rostro punctulato, basi tenuiter carinato; thorace sat crebre punctulato, intra apicem constricto, striga transversa insculpto,*

*lateribus recto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim coriaceis; apice singulatim obtuse rotundatis.*

*Patria* : Brasilia. **MUS. DOM. GERMAR.**

Statura *Zygopis sobriini*, dimidio minor, aliter coloratus. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, nigrum, opacum, squamulis læte cervinis obsitum, vertice triangulariter denudato; oculi magni, ovati, convexi, nigri, in fronte approximati; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, basi crassius, evidenter punctulatum, tenuiter carinatum, parce squamulosum, extrorsum ferrugineum, nitidum, glabrum, subtiliter punctulatum. Antennæ tenues, ferrugineæ, parce pilosæ. Thorax latitudine postica brevior, apice supra leviter emarginatus, intra apicem constrictus, ibique supra linea transversa, profunda insculptus, lateribus pone stricturam ad basin rectis; postice subtruncatus, supra modice convexus, obsolete sat crebre punctulatus; niger, opacus, squamulis læte cervinis, inæqualiter sat dense adpersus. Scutellum parvum, apice rotundatum, concolor. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexe, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime confertim coriaceis; nigra, opaca, squamulis læte cervinis inæqualiter obsita. Pygidium apice rotundatum, confertim punctulatum, læte cervino-squamosum. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, squamulis læte cervinis adpersum. Pedes mediocres, punctulati, nigri, opaci, squamulis silaceis adpersi; femoribus modice clavatis, omnibus subtus dente parvo, acuto armatis, tibiis sub-compressis, rectis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — **BHN.**

STIRPS 2. — *Femora omnia aut bi- aut tri-dentata.*

(Spec. 20-28.)

20. *Z. JASPIDEUS.* (Germar.) — *Oblongo-ovatus, niger, supra brunneo-subtus cum capite albido-squamosus; rostro longitudine capitis cum thorace, basi utrinque triangulariter impresso, squamoso; thorace subtiliter confertim punctulato, intra apicem constricto; lateribus sub-recto, linea obsoleta media annuloque laterali duplicato albidis; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, parce fusco-cinereoque variis, singulo pone medium guttulis duabus silaceis insignito; abdomine utrinque fusco-maculato.*

*Hujus operis* IV. p. 623. 22.

*Pœcilma jaspideum*. GERMAR. *Ins. Spec.* p. 260. 32.

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

*Obs.* — Latitudo *Zygopis submaculati*, nonnihil brevior; rostro basi aliter impresso, ut et colore alio, ab illo bene distinctus. — Femoribus anterioribus bi-, posterioribus tri-dentatis, dente anteriore majore, acuto. — BHN.

21. *Z. RUBRICOLLIS*. (*Chevrolat.*) — Oblongus, niger; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis, capite silaceo-squamoso, rostro basi quadrisulcato; thorace cinnabarino-squamoso, basi plaga magna semi-lunata, lateribus maculis duabus difformibus, atro-squamosis, niveo-marginatis, decorato; elytris tenuiter punctato-striatis, atro-cinereoque variegatis, linea arcuata, suturali, ad medium extensa, punctoque laterali in medio niveo-squamosis; corpore subtus albo-squamoso, atro-silaceoque maculato et vittato.

*Patria* : Cayenna. Mus. DOM. CHEVROLAT.

Species pulchra. Magnitudo *Zygopis disjuncti*. Caput globosum, nigrum, dense silaceo-squamosum, vertice macula parva, triangulari, denudata insignito; oculi magni, ovati, inferne acuminati, convexi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, arcuatum, basi nonnihil crassius, ibique quadrisulcatum, in sulcis silaceo-squamosum, extrorsum deplanatum, subtiliter punctulatum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, ferrugineæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, intra apicem striga sat profunda inculptus, lateribus sub-obliquis; basi profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, dorso obsolete carinatus, niger, cinnabarino-squamosus, basi plaga magna, semi-lunata maculisque duabus lateralibus, una basi obliqua, oblonga, altera sub-triangulari, apicali, atro-squamosis, niveo-marginatis. Scutellum breve, apice rotundatum, atro-squamosum. Elytra antice singulatim valde angulariter producta, thoracis basi vix latiora, humeris non prominulis, rotundatis; lateribus sub-linearibus, apice singulatim obtuse rotundata, thorace vix duplo longiora, supra in dorso sub-plana, tenuiter punctato-striata, interstitiis angustis, parum convexis; nigra, dorso fusco-cinereoque obsolete lineata, lateribus antice cervino-, pone medium atro-squamosa, præterea linea arcuata, suturali, a basi fere ad medium

extensa punctoque laterali ~~mox~~ pone medium, albo-squamosis, decorata. Pygidium apice rotundatum, punctulatum, brunneo-squamosum. Corpus subtus punctulatum, nigrum, albo-squamosum, pectore utrinque plaga magna, abdomine vittis quatuor atro-squamosis maculisque tribus lateralibus silaceis decoratum. Pedes mediocres, albo-squamulosi; femoribus parum clavatis, nigris, subtus bi-dentatis, dente anteriore acuto armatis; tibiis compressis, sub-rectis, cum tarsis ferrugineis. — **BAN.**

\* 22. Z. TEMPORARIUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 617. 15. — *P. Brasilia borealis.*

*Obs.* — Femoribus posticis apice extus lacinio truncato, subtus dente minuto instructo, acuto.

\* 23. Z. SCENICUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 618. 16. — *P. Brasilia borealis.*

*Obs.* — Femoribus posticis extus apice lacinio sub-truncato, inferne subtus dente parvo instructo, acuto.

24. Z. PLANULUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 619. 17. — *P. America meridionalis.*

*Obs.* — In diagnosi l. e. lin. 5, adde : « femoribus extus carinatis, anterioribus subtus bi-, posticis tri-dentatis, dentibus gradatim minoribus.

25. Z. STIGMATICUS. (*Lacordaire.*)—*Oblongus, niger, squamulis cervinis inæqualiter adpersus; rostro basi carinato, evidenter crebre punctulato; thorace subtiliter crebre coriaceo, lateribus sub-obliquo, supra intra apicem striga profunda insculpto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, remote granulatis, in medio dorsi plaga transversa communi, umbrino-squamosa decoratis; femoribus extus carinatis, anterioribus subtus bi-, posticis tri-dentatis, dentibus gradatim minoribus.*

*DEJEAN, Catal.* ed. 2. p. 300. ed. 3. p. 320.

*Patria* : Cayenna. *Mus. Dom. GERMAR.*

Longitudo *Zygopis temporarii*, sed dimidio latior. Caput orbiculatum, nigrum, linea angustissima frontali margineque oculari, lateribus et subtus parce cervino-squamosum; oculi magni, ovati, in fronte approximati, modice prominuli, nigri; rostrum thorace nonnihil longius, arcuatum, deplanatum, basi nonnihil crassius,

confertim evidenter punctulatum, sub-opacum, medio carinatum, extrorsum subtilissime punctulatum, nitidum, glabrum, totum nigro-piceum. Antennæ sub-tenuæ, ferrugineæ, parce pilosæ; clava parva, acuminata, obscuriore, apice densius pubescente. Thorax latitudine baseos brevior, antè nonnihil angustior, apice late emarginatus, lobis ocularibus productis, lateribus versus basin sensim obliquis; basi profunde bi-sinuatus, angulis lateralibus sub-rectis; supra parum convexus, subtiliter confertissime coriaceus, intra apicem striga transversa, sat profunda insculptus, niger, opacus, squamulis cervinis setisque brevibus, albidis parce inæqualiter adpersus. Scutellum parvum, elevatum, nigrum. Elytra antice vix rotundato-producta, thoracis basi parum latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus in medio vix ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata vel sub-truncata, thorace dimidio longiora, supra in dorso parum convexa, tenuiter striata et in striis obsolete punctata, interstitiis planis, obsolete remote granulatis; nigra, opaca, inæqualiter cervino-variegata, in medio dorsi plaga transversa, oblonga, umbrina decorata. Pygidium apertum, ovatum, apice sub-rotundatum, nigrum, opacum, parce cervino-squamulosum. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, lateribus parce cervino-, medio densius cinereo-squamulosum. Pedes validi, confertim punctulati, parce cervino-squamulosi; femoribus modice clavatis, extus carinatis, anterioribus subtus bi-, posticis tridentatis, dentibus gradatim minoribus, posticis extus apice lacinio corneo, sub-acuto instructis; tibiis compressis, extrorsum dilatatis; tarsis subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 26. *Z. HINNULUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 620. 18. — *P. Brasilia borealis*.

27. *Z. TRIDENTATUS*. Chevrolat. — *H. op.* IV. p. 621. 19. — *P. Cayenna*.

28. *Z. SEMIALBUS*. (Chevrolat.) — *Oblongo-ovatus, niger, atro-squamosus; capite thoraceque dense corpore subtus parcius albo-squamosis, rostro basi confertim evidenter punctulato, opaco, obsolete carinato; thorace intra apicem constricto, lateribus sub-obliquis, dorso atro, quadri-maculato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, apice singulatim oblique truncatis.*

*Patria*: Cayenna. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Magnitudo *Zygopis hinaulti*. Caput globosum, nigrum, sublæve, albido-squamosum, macula verticali, triangulari, denudata; oculi magni, ovati, convexi, in fronte connexi, nigri; rostrum longitudine thoracis, inflexum, arcuatum, basi nonnihil crassius, confertim punctulatum, opacum, obsolete carinatum, dein extrorsum subtiliter minus crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum, apice piceum. Antennæ tenues, obscure ferrugineæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriori, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus parum productis; intra apicem striga transversa insculptus, anterie nonnihil angustior, lateribus sub-obliquis; basi leviter bi-sinuatus, supra paulo convexus, subtiliter crebre punctulatus, niger, dense albido-squamosus, setulisque depressis, albidioribus adpersus, maculis quatuor dorsi transversim locatis et nonnullis basalibus nigris insignitus. Scutellum breve, apice rotundatum, nigrum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris rotundatis; lateribus linearia, apice singulatim oblique truncata, thorace duplo longiora, supra in dorso parum convexa, tenuiter striata, striis in fundo subtiliter punctatis; nigra, atro-squamosa. Pygidium apice rotundatum, crebre punctulatum, nigrum, atro-squamosum. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, squamulis lanceolatis, albidis adpersum. Pedes validi, nigri, punctulati, squamulis albidis parce adpersi; femoribus parum clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis; tibiis compressis, brevibus, sub-recctis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

*Ad hoc genus verisimile referendus.*

29. Z. BOISDUVALII. Dupont. — *H. op.* IV. p. 622. 21. — *P. Nova Guinea.*

GENUS 565. — COPTURUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 623. gen. 354. — *Curc. Disp. Méth.* p. 302. sub-genus.

STIMPS 1. — *Femora dentata.* (Spec. 1.-33.)

MANIPULUS I. — *Elytra apice acuminata.* (Spec. 1.-3.)

\* 1. C. SUBULIPENNIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 625. 1. — *P. America meridionalis.*

2. *C. DEPLANUS*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 626. 2. — *P. America meridionalis.*
- \* 3. *C. PAPAVERATUS*. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 827. 3. — *P. Brasilia borealis.*

MANIPULUS II. — *Elytra apice mutica.* (Spec. 4.-37.)

CENTURIA I. — *Interstitia elytrorum aut planiuscula, aut sub-elevata, leviter convexa.* (Spec. 4.-26.)

- \* 4. *C. SATYRUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 628. 4. — *P. Brasilia borealis.*
5. *C. FIGURATUS*. (*Schh.*) — *Qvatus, ferrugineus, supra squamulis silaceis, subtus albidis adpersus; rostro dimidio corpore longiori, tenui, arcuato, basi carinato; thorace confertim subtiliter punctulato, dorso carinato, antice utrinque plaga magna, cinnabarino-squamosa, linea media, margine basali plagæ maculaque in angulo postico silaceo-squamosis; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis alternis latioribus, convexis; humeris elevatis.*

*Patria* : America meridionalis. *E Mus. Imp. Russ. ad describendum missus.*

Magnitudo *Copturi Lamellæ*, sed paulo latior. Caput parvum, orbiculatum, rufo-piceum, subtiliter punctulatum, silaceo-squamosum, vertice longitudinaliter denudato; oculi majusculi, convexi, ovati, brunnei, in fronte approximati; rostrum dimidio corpore longius, tenue, inflexum, arcuatum, basi nonnihil crassius, carinatum, silaceo-squamosum, undique punctulatum, nigro-piceum, extrorsum glabrum, nitidum. Antennæ basin rostri propius insertæ, tenues, piceæ; clava parva, dilutiori, pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique truncatus, anterieus angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis; basi sat profunde hi-sinuatus, supra convexus, confertim subtiliter punctulatus, dorso carinatus, ater, antice utrinque plaga magna, cinnabarina, postice silaceo-marginata decoratus, linea dorsali, macula utrinque basali silaceo-squamosis. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, ferrugineum, silaceo-squamosum. Elytra antice sinuata, thoracis basi latiora, humeris elevatis, obtuse rotundatis; lateribus pone basin ampliata, dein apicem versus nonnihil angustata, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra sub-depressa,



tenuiter punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis latioribus, convexis, subtiliter confertim alutaceis; ferruginea, parce silaceo-interstitiis planis densius silaceo-squamosa. Pygidium apice rotundatum, rufo-ferrugineum, punctulatum. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, piceum, squamulis albidis, silaceis mixtis, sat dense obsitum, segmento secundo abdominis denudato, apice maculis tribus albidis decorato. Pedes elongati, tennes, punctulati, nigri, albo-squamulosi; femoribus linearibus, subtus dente parvo armatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis elongatis, angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

6. *C. CONDECORATUS*. (Schh.) — *Ovatus, niger, opacus, squamulis silaceis dense adpersus; antennis ferrugineis, rostro longitudine thoracis, punctulato, intra antennas obsolete canaliculato; thorace confertim rugoso-punctato, intra apicem constricto, apice supra carinato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, rugulosis, arcu basali prope scutellum, macula magna media laterali alteraque apicali niveo-squamosis; thorace subtus, abdomine basi maculisque duabus apicalibus niveo-squamosis.*

*Patria* : Brasilia, prope Novum Friburgum. Mus. Dom. SOMMER.

*Copturo pauperato* statura similis, sed dimidio minor. Caput orbiculatum, obsolete punctulatum, nigrum, silaceo-squamosum, vertice macula parva, triangulari, denudata; oculi magni, ovati, convexi, in fronte connexi, nigri; rostrum longitudine thoracis, minus tenue, modice arcuatum, basi crassius, distincte punctatum, squamulis silaceis adpersum, inter antennas obsolete canaliculatum, extrorsum subtiliter lateribus evidenter punctulatum, glabrum, nitidum. Antennæ tennes, ferrugineæ, parce albo-pilosæ; clava ovata, acuminata, obscuriori. Thorax latitudine postica multo brevior, apice oblique truncatus, intra apicem constrictus, lateribus obliquis; basi sat profunde bi-sinuatus, lobo medio triangulariter producto; supra modice convexus, confertim rugoso-punctatus, antice carinatus, niger, sub-opacus, squamulis silaceis inæqualiter sat dense adpersus. Scutellum parvum, vix conspicuum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, sub-truncata, thorace duplo longiora, supra in dorso sub-depressa, profunde sat crebre punctato-striata, interstitiis convexis, transversim ruguloso-granulatis; nigra, squamulis silaceis sat dense obsita, basi,

prope scutellum, arcu parvo, macula magna laterali in medio et altera apicali minore niveo-squamosis, decorata. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, silaceo-squamosum, thorace subtus, segmentis duobus basalibus abdominis maculisque binis apicalibus niveo-squamosis; segmento basali utrinque macula sub-denudata insignito. Pedes elongati, punctati, nigri, silaceo-squamosi; femoribus parum clavatis, subtus dente brevi instructis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 7. *C. ARMATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 631. 7. — *P. Brasilia*.

In diagnosi l. c. adde : « *femoribus omnibus apice spina acuta armatis.* »

8. *C. LATRENSIS*. (Schh.) — *Ovatus, sub-depressus, niger, opacus, squamulis silaceis adpersus; capite, rostro basi abdomineque apice croceo-squamosis, oculis minoribus, magis remotis; thorace confertim rugoso-punctato, dorso tenuiter carinato, croceo-squamoso, plaga dorsali sub-triangulari maculaque laterali parcius squamosis; elytris sat profunde punctato-striatis, rugulosis, apice sub-emarginatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

Primo intuitu *Copturo papaverato* simillimus, nonnihil minor; oculis minoribus magis distantibus, thorace carinato, elytris apice emarginatis, non tuberculatis, ut et colore abdominis, ab illo facile distinctus. Caput globosum, obsolete punctulatum, nigrum, dense croceo-squamosum, macula parva verticali, denudata; oculi sat magni, ovati, convexi, nigri, in fronte minus approximati; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, minus tenue, subtiliter punctulatum, basi croceo-squamosum, extrorsum glabrum, nitidum, rufo-piceum. Antennæ tenues, piceæ, parce pilosæ. Thorax latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam sub-obliquis; postice leviter bi-sinuatus, lobo medio parum producto, triangulari; supra modice convexus, confertim ruguloso-punctatus, dorso tenuiter carinatus, niger, sub-opacus, croceo-squamosus, plaga dorsali, triangulari, maculisque lateralibus parcius squamosis. Scutellum parvum, sub lobo postico thoracis occultatum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; la-

teribus a medio apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim leviter emarginata, thorace duplo longiora, supra in dorso sub-depressa, sat profunde punctato-striata, interstitiis parum convexis, confertim rugulosis; nigra, squamulis silaceis undique sat dense adpersa, pone medium disci linea parva, obliqua e squamulis densioribus insignita. Corpus subtus sub-remote punctulatum, nigro-piceum, squamulis silaceis adpersum, segmentis quatuor ultimis abdominis croceo-squamosis. Pedes elongati, punctati, nigri, silaceo-squamosi; femoribus parum clavatis, subtus dente brevi, obtuso armatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

9. *C. FURFURACEUS*. (Germar.) — *Ovatus, niger, squamulis cervinis inæqualiter adpersus; rostro longitudine capitis cum thorace, basi carinato; thorace sub-conico, confertim punctato, dorso obsolete carinato, dense cervino-squamoso, dorso vittis duabus denudatis decorato; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim coriaceis, dorso cervino-, lateribus albo-variegatis, pone medium macula parva, laterali, albo-squamosa insignitis; humeris elevatis.*

*Pœcilma furfuraceum*. GERM. *Ins. Spec.* p. 260. 392.

*Zygops id.* Huj. op. IV. p. 623. 23.

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

*Copturo armato* proximus et magnitudine fere æqualis, aliter coloratus; thorace angustiore, elytris profundius punctato-striatis, interstitiis evidenter coriaceis, pedibus brevioribus, validioribus, ab illo mox distinctus. Caput parvum, globosum, subtilissime punctulatum, nigrum, cervino-squamosum, vertice denudato; oculi magni, ovati, in fronte approximati, convexi, brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, punctulatum, a basi ultra medium carinatum, cervino-squamosum, basi utrinque macula parva, albo-squamosa decoratum, extrorsum denudatum, glabrum. Antennæ tenues, testacæ; clava parva, ovata, densius pubescente. Thorax latitudine postica fere longior, apice oblique truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis, versus basin sensim nonnihil ampliatis; postice profunde bi-sinuatus, lobo medio lato, rotundato; supra modice convexus, crebre punctatus, dorso carinula parum elevata instructus; niger, parum nitidus, cervino-squamosus, supra vittis duabus denudatis insignitus. Scutellum parvum, rotundatum,

nigrum. Elytra sub-quadrata, antice tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata vel singulatim oblique truncata, thorace duplo longiora, supra in dorso sub-depressa, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, confertim evidenter coriaceis; nigra, opaca, dorso inæqualiter cervino-lateribus albo-squamulosa, pone medium macula parva, laterali, nivea decorata. Corpus subtus sat crebre punctatum, nigrum, nitidum, inæqualiter niveo-squamosum. Pedes mediocres, crebre punctulati, anteriores dense cervino-squamosi, postici subdenudati; femoribus parum clavatis, extus carinatis, subtus dente parvo apiceque spina acuta armatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis.

BEHN.

\* 10. *C. CONCINNUS*. (Schh.) — *Ovatus, niger, subtus niveo-squamosus; antennis, tibiis tarsisque testaceis, rostro basi, capite thoraceque fulvo-squamosis, illo sub-triangulari, confertim punctato, basi albo-squamoso; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis planis, confertim coriaceis, basi, sutura fasciisque duabus obliquis, una ante, altera pone medium, albo-squamulosis.*

*Patria*: Brasilia. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Parvus. Magnitudo *Rhinonci* *inconsecti*. *Copturo* *furfuraceo* colore sub-similis, duplo tamen minor; capite thoraceque fulvo-squamosis, corpore subtus dense niveo-squamoso, ab illo mox dignoscitur. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, nigrum, fulvo-squamosum; oculi magni, ovati, convexi, in fronte valde approximati, brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, sub-tenue, basi nonnihil crassius, carinatum, fulvo-squamosum, extrorsum punctulatum, denudatum, sub-nitidum. Antennæ tenues, testaceæ, parce pilosæ. Thorax sub-triangularis, latitudine baseos nonnihil brevior, apice oblique truncatus, intra apicem haud constrictus, lateribus obliquis, basin versus citius ampliatis; postice sat profunde bi-sinuatus, lobo medio modice producto, rotundato; supra paulo convexus, subtiliter confertim punctulatus, niger, fulvo-squamosus, basi squamulis albidis obsitus. Scutellum rotundatum, nigrum, parce albo-squamulosum. Elytra antice conjunctim trisinuata, thoracis basi latiora, humeris elevatis, rotundatis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice

ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra parum convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter confertim coriaceis; nigra, parum nitida, basi anguste, sutura fasciisque duabus obliquis, una ante, altera pone medium, albo-squamosis. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense albo-squamosum. Pedes elongati, tenues, punctulati, albo-squamulosi; femoribus nigris, vix clavatis, subtus dente parvo apiceque spina brevi, acuta armatis; tibiis teretibus, rectis, cum tarsis testaceis. — BHN.

11. *C. LUDIOSUS*. Chev. — *H. op.* IV. p. 642. 18. — *P. Mexico.*

12. *C. MACULATUS*. (Schh.) — *Sub-ovatus, niger, cervino-squamosus, supra atro-alboque variegatus; thorace confertim rugoso-punctato, intra apicem constricto, dorso carinato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, coriaceis, apice singulatim obtuse acuminatis; abdomine albo-squamoso, plaga apicali subquadrata, brunnea insignito; femoribus posterioribus apicem versus atro-maculatis.*

*Patria*: America meridionalis. Mus. Imp. Russ.

*Copturo armato* dimidio minor, præsertim angustior. Caput orbiculatum, punctulatum, nigrum, cervino-squamosum, linea verticali maculaque utrinque rotunda atris, sub-denudatis; oculi magni, ovati, convexi, brunnei, in fronte approximati; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, inflexum, modice arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-opaeum, basi cervino-squamulosum. Antennæ tenues, piceæ, parce pilosæ. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam nonnihil rotundatis, dein sub-obliquis; postice sat profunde bi-sinuatus, lobo medio modice producto, sub-triangulari; supra modice convexus, confertim rugoso-punctatus, dorso longitudinaliter carinatus, niger, cervino-squamosus, maculis atris variegatus, squamulis nonnullis albidis adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra sub-triangularia, antice conjunctim subtri-sinuata, thoracis basi latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus apicem versus sensim angustata, apice ipso singulatim obtuse acuminata, thorace duplo longiora, supra in dorso sub-depressa, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter confertim coriaceis; nigra, cervino-squamosa, ma-

culis atris et albidis variegata. Corpus subtus punctulatum, nigrum, antice cervino-, postice albo-squamosum; abdomine apice plaga sub-quadrata, brunnea insignito. Pedes mediocres, punctulati, nigri, cervino-squamosi; femoribus parum clavatis, subtus dente brevi armatis, posterioribus versus apicem macula atra insignitis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

13. C. MEGERLEI. (Schh.) — *Sub-ovatus, ater, opacus, antennis ferrugineis; thorace confertim punctato, intra apicem constricto, supra cinnabarino-squamoso, plaga magna, sub-cordiformi, denudata insignito; elytris triangularibus, profunde punctato-striatis, interstitiis confertim alutaceis, linea suturali maculaque transversa, laterali in medio, albo-squamosis; corpore subtus atro-alboque variegato.*

*Patria* : Brasilia, prope Novum Friburgum. Mus. Dom. SOMMER.

*Copturo papaverato* nonnihil brevior, sed multo angustior. Caput globosum, atrum, parum nitidum, obsolete punctulatum, subtus albo-squamulosum; oculi magni, ovati, convexi, nigri, in fronte connexi; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, minus tenue, subtiliter punctulatum, basi albo-squamosum, dein extrorsum glabrum, nitidum. Antennæ tenues, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis; basi sat profunde bi-sinuatus, lobo medio triangulariter producto, angulis lateralibus rotundatis; supra modice convexus, confertim sat profunde punctatus, supra cinnabarino-squamosus, plaga magna dorsali, sub-cordiformi, laterali difformi, denudatis insignitis, subtus niveo-squamosus. Scutellum parvum, haud conspicuum. Elytra triangularia, antice tri-sinuata, reflexo-marginata, thoracis basi latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra in dorso sub-depressa, profunde punctato-striata, interstitiis planis, confertim alutaceis; atra, sub-opaca, linea suturali in interstitio primo, maculaque laterali in medio transversa, albo-squamosis. Corpus subtus sub-remote punctulatum, nigrum, nitidum, niveo-squamosum, pectore antice segmento primo, tertio et quarto abdominis denudatis. Pedes elongati, punctulati, nigri, parce cinereo-squa-

mulosi; femoribus parum elevatis, subtus dente brevi armatis, tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis.

BHN.

\* 14. *C. RUBRICOLLIS*. Chevrolat. — *H. op. IV. p. 641. 17.* —  
P. Cayenna.

\* 15. *C. ROSEOSIGNATUS*. Schh. — *H. op. IV. p. 639. 15.* —  
P. Brasilia interior.

\* 16. *C. BESCKII*. Mannerh. — *H. op. IV. p. 640. 16.* — P. Brasilia  
interior.

\* 17. *C. SANNIO*. Schh. — *H. op. IV. p. 638. 14.* — P. Brasilia  
borealis.

17 bis. *C. REGALIS*. (Chevrolat.) — *Oblongus, niger, subtus cretaceo-squamosus; antennis ferrugineis, rostro punctulato; thorace angusto, sub-cylindrico, intra apicem constricto, evidenter crebre punctato, squamulis viridi-nitidis obsito, dorso transversim atro, tri-maculato; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis angustis, convexis, macula magna scutellari, alia parva, suturali in medio, suturaque postice albo-squamosis, fascia ante medium, plaga obsoleta pone medium cervino-squamosis; femoribus anterioribus muticis, posticis acute dentatis.*

*Patria* : Cayenna. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Parvus. *Erirhino acridulo* parum major. Caput globosum, nigrum, infra oculos albo-squamosum; oculi majusculi, ovati, convexi, in fronte connexi, brunnei; rostrum thorace nonnihil longius, basi paulo crassius, arcuatum, ibique evidenter, extrorsum subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ tenues, ferrugineæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica vix brevior, sub-cylindricus, apice oblique truncatus, intra apicem striga transversa sat profunda insculptus, lateribus sub-rectis; basi sat profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim evidenter punctatus, niger, squamulis viridi-nitidis obsitus, dorso plaga cordiformi, et utrinque macula rotunda, atro-squamosis, decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, sub-elevatum, nigrum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim leviter emarginata, thorace dimidio longiora, supra

in dorso parum convexa, evidenter punctato-striata, interstitiis angustis, sub-convexis; nigra, in ipsa basi circa scutellum macula majori, pone medium altera suturali, et dein sutura apicem versus albo-squamosis; præterea, ante medium, fascia transversa et pone medium plaga obsoleta prope suturam cervino-squamosis. Pygidium occultatum. Corpus subtus crebre punctulatum, dense cretaceo-squamosum. Pedes mediocres, elongati, punctulati, nigri, albo-squamulosi; femoribus sub-linearibus, anterioribus muticis, posticis dente acuto armatis; tibiis sub-compressis, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 18. C. PERTURBATUS. Schh. — H. op. IV. p. 643. 19. — P. Jamaica.

\* 19. C. GUTTULAALBA. Schh. — H. op. IV. p. 644. 20. — P. Brasilia.

\* 20. C. RORULENTUS. Schh. — H. op. IV. p. 637. 13. — P. Brasilia.

\* 21. C. VESTITUS. Dejean. — H. op. IV. p. 645. 21. — P. Carthago Columbiae.

22. C. CONFINIS. (Schh.) — Ovatus, niger, opacus, squamulis angustis, supra læte brunneis, subtus albidis adpersus; thorace longiori, angustiori, sub-conico, confertim sat profunde punctato, intra apicem leviter constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, confertim alutaceis, macula parva, sub-rotunda, suturali, in medio albido-squamosa decoratis; femoribus parce inæqualiter albo-squamosis.

Patria : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

Statura fere et summa similitudo *Copturi vestiti*, dimidio major; thorace longiori, angustiori, sub-conico, minus profunde punctato, ab illo præcipue distinctus. Caput orbiculatum, obsolete punctulatum, nigrum, opacum, parce inæqualiter læte brunneo-squamosum; oculi magni, ovati, brunnei, in fronte approximati; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, sub-tenuè, arcuatum, basi paulo crassius, tenuiter carinatum, parce squamulosum, undique subtilissime punctulatum, extrorsum glabrum, nitidum. Antennæ tenues, picæ, parce pilosæ. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, apice oblique truncatus, antè angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis; postice hi-



sinuatus, supra parum convexus, crebre sat profunde punctatus, niger, opacus, squamulis læte brunneis parce inæqualiter adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, punctulatum. Elytra antice sub-trisinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris elevatis, obtuse rotundatis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace vix duplo longiora, supra in dorso sub-depressa, tenuiter striata et in striis parum profunde punctata, interstitiis planis, confertim alutaceis; nigra, opaca, squamulis parvis, angustis, læte brunneis adpersa, in medio macula parva, sub-rotunda, albido-squamosa decorata. Corpus subtus sat crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis albidis, parce ad latera abdominis silaceis, densius adpersum. Pedes mediocres, nigri, punctulati, parce inæqualiter albido-squamulosi; femoribus parum crassis, subtus dente acuto armatis; tibiis teretibus, sub-rectis; tarsis ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

23. *C. SUBUNDATUS.* (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, squamulis cervinis inæqualiter obsitus; antennis tarsisque ferrugineis; rostro basi tenuiter carinato; thorace transverso, anterieus angustato, lateribus recto, confertim punctulato, dorso carinato, atro-variegato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, alutaceis, at-undulatis; abdomine extus silaceo-brunneoque variegato.*

*Patria* : Brasilia. MUS. DOM. GERMAR.

*Copturo vestito* duplo major, oblongior. Caput orbiculatum, obsolete crebre punctulatum, nigrum, sub-opacum, squamulis læte cervinis inæqualiter adpersum; oculi magni, ovati, inferne acuminati, brunnei; in fronte approximati; rostrum longitudine capitis cum thorace, inflexum, arcuatum, minus tenue, basi nonnihil crassius, tenuiter carinatum, læte cervino-squamosum, undique punctulatum, extrorsum glabrum, sub-nitidum. Antennæ tenues, testaceæ; clava parva, obscuriori, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, anterieus angustior, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam sub-rectis; basi sat profunde bi-sinuatus, supra paulo convexus, confertim punctulatus, longitudinaliter carinatus, niger, læte cervino-squamosus, dorso atro-variegatus. Scutellum parvum, rotundatum, cervino-, apice albo-squamosum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi latiora, humeris elevatis, rotundatis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim ob-

tuse rotundata, thorace duplo longiora, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, confertim alutaceis; tota nigra, læte cervino-squamosa, transversim atro-undulata. Corpus subtus sat crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, pectore abdomineque basi parce dein extrorsum dense læte cervino-brunneoque variegatum. Pedes mediocres, punctulati, nigri, cinereo-brunneoque variegati; femoribus modice clavatis, subtus dente acuto armatis, posticis extus carinato-elevatis; tibiis sub-teretibus, rectis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — **Bux.**

\* 24. *C. LEBASHI*. Dejean. — *H. op. IV.* p. 646. 22. — *P. Carthago Columbiae.*

\* 25. *C. INFIMUS*. Dejean. — *H. op. IV.* p. 647. 23. — *P. Carthago Columbiae.*

VAR.  $\beta$ . Obscure ferrugineus; forte nuper exclusus?

*Copturus senilis*. Dom. MORITZ in litteris.

\* VAR.  $\gamma$ . Thorace utrinque plaga sub-quadrata, nivea decorato.

*Copturus auritus*. Dom. KLUG in litteris.

\* 26. *C. TROGLODYTES*. Schh.—*H. op. IV.* p. 648. 24.—*P. Brasilia.*

CENTURIA II. — *Interstitia elytrorum angusta, sub-elevata.*  
(Spec. 27.-28.)

\* 27. *C. LAMELLA*. Fabr. — *H. op. IV.* p. 629. 5. — *P. America meridionalis.*

28. *C. AVICULARIS*. Chev. — *H. op. IV.* p. 630. 6. — *P. Mexico.*

CENTURIA III. — *Interstitia elytrorum aut omnia aut alterna argute elevata, carinata.* (Spec 29.-33.)

29. *C. PIPA*. Fabr. — *H. op. IV.* p. 632. 8. — *P. Amer. mer.*

In diagnosi et descriptione l. c. datis, adde: « *femoribus posterioribus extus elevato-carinatis.* »

\* 30. *C. COSTATUS*. Schh.—*H. op. IV.* p. 633. 9. — *P. Brasilia.*

In diagnosi l. c. lin. 5, data, post « *sub-muticis* », adde: « *extus carinatis.* »

\* 31. *C. CARINATUS*. Schh. — *H. op. IV.* p. 636. 12. — *P. Minas Geraes Brasiliae.*

In diagnosi, lin. ultima, adde : « *femoribus posterioribus extus carinatis*; » — et in descriptione l. c. lin. 1, pro « *Baridii nitentis* », lege : « *Ceuthorhynchi cruciferi magnitudo*. »

\* 32. C. AFFABER. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 634. 10. — *P. Minas Geraes Brasiliæ.*

In diagnosi et descriptione l. c. datis, adde : « *femoribus posticis carinatis*. »

33. C. ULULA. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 635. 11. — *P. America meridionalis.*

STIRPS 2. — *Femora muica.* (Spec. 34.-37.)

34. C. SOLIERI. (*Schh.*) — *Ovatus, ater, opacus, parce inæqualiter silaceo-squamosus; antennis, pedibus plagaque pectorali ferrugineis, rostro vix longitudine thoracis, basi evidenter punctulato, tenuiter carinato; thorace sub-trigono, confertim parum profunde punctulato, dorso tenuiter carinato; elytris sanguineis, apice atro-squamosis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis convexis, subtiliter confertissime coriaceis; femoribus muicis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

Magnitudo *Cleogoni Rubetræ*. Caput orbiculatum, obsolete crebre punctulatum, atrum, opacum; oculi magni, ovati, convexi, in fronte approximati, nigri; rostrum vix longitudine thoracis, sub-tenuè, modice arcuatum, confertim basi evidenter punctulatum, ibique tenuiter carinatum, opacum, extrorsum nitidum. Antennæ tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata. Thorax sub-trigonus, latitudine postica brevior, apice sub-truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam obliquis; basi sat profunde bi-sinuatus, lobo medio sub-triangulari, modice producto; supra convexus, confertim parum profunde punctulatus, dorso carinula tenui, antice posticeque abbreviata instructus; niger, squamulis atris inæqualiter obsitus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, opacum, parce silaceo-squamosum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus pone humeros sensim apicem versus citius angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis convexis, subtiliter

confertissime coriaceis; sanguinea, a basi longe ultra medium parce silaceo-, dein apicem versus densius atro-squamosa, apice ipso macula silacea decorata. Corpus subtus subtiliter sat crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, plaga utrinque magna, pectorali, ferruginea insignitum, squamulis nonnullis silaceis in pectore adspersum, segmento secundo abdominis medio profunde impresso, utrinque elevato. Pedes elongati, confertim punctati, ferruginei; femoribus basi obscurioribus, parum clavatis, muticis; tibiis subcompressis, rectis; tarsis elongatis, subtus brunneo-spongiosis.

BHN.

\* 35. C. OPERCULATUS. *Say.* — *H. op.* IV. p. 649. 25. — *P. Amer.* septentrionalis.

\* 36. C. QUERCUS. *Say.* — *H. op.* IV. p. 650. 26. — *P. Amer.* septentrionalis.

37. C. OCVLATUS (1). *Say.* — *H. op.* IV. p. 650. 27. — *P. Amer.* septentrionalis.

GENUS 566. — PIAZURUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 651. gen. 355. — *Curc. disp. Méth.* p. 303. sub-gen.

STIRPS 1. — *Articuli funiculi antennarum 2 et 3 longi, æquales. Oculi coadunati. Corpus supra depressum.* (Spec. 1.-11.)

1. P. PHLESUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 652. 1. — *P. Amer.* mer.

\* 2. P. BISPINOSUS. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 654. 2. — *P. Antioquia* Columbiae.

\* 3. P. CILIATUS. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 679. 29. — *P. Brasilia borealis.*

*Pæcilma ciliatum.* GERM. *Ins. Spec.* p. 254. 385.

*Piazurus bidentatus.* SCHH. *H. op.* IV. p. 655. 3.

\* 4. P. OPEROSUS. *Dej.* — *H. op.* IV. p. 656. 4. — *P. Cayenna.*

---

(1) Congenericus forte, mihi invisus.

- \* 5. *P. PROPINQUUS*. *Dejean*. — *H. op.* IV. p. 657. 5. —  
*P. Cayenna.*
- \* 6. *P. COMPACTUS*. *Dejean*. — *H. op.* IV. p. 658. 6. — *P. Cayenna,*  
*Brasilia borealis.*
- \* 7. *P. INCOMMODUS*. *Dejean*. — *H. op.* IV. p. 659. 7. —  
*P. Cayenna.*
- \* 8. *P. MACULIPES*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 660. 8. — *P. Mexico.*
9. *P. SAGINATUS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 661. 9. — *P. Mexico.*
- \* 10. *P. VERSICOLOR*. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 679. 29. — *P. Bra-*  
*silia borealis.*

*Pœcilma id.* *GERM. Ins. Spec.* p. 255. 387.

*Piazurus bistratus*. *SCHH. H. op.* IV. p. 662. 10.

- \* 11. *P. CALCARATUS*. *Chevrol.* — *H. op.* IV. p. 663. 11. —  
*P. Cayenna.*

*Piazurus bajulus*. *DEJEAN, Cat.* ed. 2. p. 300. ed. 3. p. 325.

STIRPS 2. — *Articuli funiculi antennarum* 2<sup>us</sup> 3<sup>o</sup> dimidio longior.  
(Spec. 12.-28.)

MANIPULUS I. — *Oculi intus coadunati.* (Spec. 12.-16.)

CENTURIA I. — *Corpus supra sub-depressum.* (Spec. 12.-14.)

12. *P. TACITURNUS*. (*Chevrolat.*) — *Ellipticus, niger, supra squamo-*  
*sitate cinerea, subtus ad latera lutescenti obsitus; rostro longiori,*  
*basi striolato-rugoso, medio carinato; thorace latiori, trigono, ob-*  
*solete coriaceo, medio carinula tenui, abbreviata instructo, basi*  
*foveolato; elytris minus convexis, remote mediocriter punctato-*  
*striatis, dorso parce atro-variegatis; apice leviter emarginatis,*  
*singulatim vix acuminatis.*

*Patria*: Cayenna. *Mus. DOM. CHEVROLAT.*

*Piazuro succivo* affinis, dimidio major; thorace latiori, breviter  
obsoletius carinato, basi foveolato, elytris minus convexis, dorso  
non tuberculatis, apice singulatim vix acuminatis, ab illo bene  
distinctus. Caput globosum, confertim subtiliter ruguloso-punc-  
tatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis silaceis, circa oculos  
densioribus adpersum; oculi maximi, sub-rotundati, convexi,

nigri, in fronte valde approximati; rostrum capite cum thorace longius, validum, arcuatum, inflexum, basi striolato-rugosum, medio leviter carinatum, silaceo-squamosum, dein extrorsum subtiliter punctulatum, nitidum, glabrum, totum nigrum. Antennæ sub-tenuæ, ferrugineæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriori, densius pubescente. Thorax sub-triangularis, latitudine postica brevior, apice utrinque leviter emarginatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice sat profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim coriaceus, dorso carinula brevi, tenui, antice posticeque abbreviata instructus, ante scutellum foveola sat magna, rotunda insculptus; niger, sub-nitidus, squamulis parvis, cinereis inæqualiter adpersus. Scutellum sub-cordiforme, punctulatum, nigrum, sub-nitidum, parce cinereo-squamulosum. Elytra sub-triangularia, antice tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus a basi apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim leviter emarginata, vix acuminata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso parum convexa, sub-remote evidenter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, subtilissime confertim coriaceis; nigra, sub-nitida, squamulis cinereis obsita, dorso remote parce atrovareiegata. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, nitidum, lutescenti-squamosum, medio denudatum, abdomine basi profunde longitudinaliter impresso. Pedes validi, obsolete punctulati, nigri, squamulis silaceis obsiti; femoribus omnibus, præsertim posticis, clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis rectis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 13. P. PLEURONECTES. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 664. 12. — *P. Amer. meridionalis.*

14. P. MELANOSTICTUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 665. 13. — *P. Cayenna.*

CENTURIA II. — *Corpus supra convexum.* (Spec. 15.-16.)

\* 15. P. OBESUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 666. 14. — *P. Brasilia.*

\* 16. P. DEFECTOR. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 667. 15. — *P. Brasilia.*  
*STURM, Catal.* 1843. p. 224.

*Piazurus costatopunctatus.* *DEJEAN, Catal. ed. 2. p. 300. ed. 3. p. 325.*

MANIPULUS II. — *Oculi paulo distantes. Corpus supra plus minusve convexum.* (Spec. 17.-28.)

\* 17. P. OCHREOCEPHALUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 668. 16. —  
P. Brasilia.

\* 18. P. ROSENSCHÖLDI. Schh. — *H. op.* IV. p. 669. 17. — P. Brasilia interior.

19. P. SUCCIVUS. Chevrol. — *H. op.* IV. p. 670. 18. — P. Mexico.

\* 20. P. STIPITOSUS. Germ. — P. Brasilia interior.

*Pœcilma stipitosum.* GERMAR. *Ins. Spec.* p. 255. 386.

*Piazurus contumeliosus.* SCHH. *H. op.* IV. p. 671. 19.

\* 21. P. VARIUS. Dejean. — *H. op.* IV. p. 672. 20. — P. Rio Janeiro.

SYNONYMON GERMARI *hujus operis* l. c. deleatur.

\* 22. P. CERASTES. Fabr. — *H. op.* IV. p. 673. 21. —  
P. Amer. meridionalis.

23. P. FRAUDULENTUS. (Schh.) — *Ovatus, convexus, niger, cervinosquamosus; antennis ferrugineis, rostro breviori, validiori; thorace sub-trigono, antice haud constricto, vix punctato, dorso tuberculo oblongo, sub-carinato instructo; elytris atro-variegatis, punctato-striatis, interstitiis alternis tenuiter carinatis, dorsalibus tuberculis nonnullis instructis, apice conjunctim rotundatis; femoribus anterioribus breviter, posticis valide dentatis.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.

Similis certe *Piazuri Cerastidis* et illo magnitudine æqualis, magis convexus; rostro breviori, validiori, thorace sub-trigono, apice haud constricto, vix punctato, tuberculo oblongo instructo, elytris tenuiter punctato-striatis, etc., ab illo bene distinctus. Caput orbiculatum, obsolete punctulatum, nigrum, opacum, inæqualiter silaceo-squamosum; oculi sat magni, rotundati, convexi, nigri, in fronte minus approximati; rostrum longitudine thoracis, minus tenue, arcuatum, basi crassius, evidenter extrorsum subtiliter punctulatum, magis nitidum, totum nigrum, glabrum. Antennæ tenues, ferrugineæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax sub-trigonus, latitudine postica brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, intra apicem haud con-

strictus, lateribus obliquis; basi sub-truncatus, vel leviter bi-sinuatus, supra convexus, vix punctatus, in medio dorsi tuberculo oblongo, sub-carinato instructus; niger, squamulis læte cervinis inæqualiter obsitus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, parce squamulosum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi dimidio latiora, humeris lateraliter nonnihil extensis, rotundatis; lateribus apicem versus sensim angustata, apice ~~ipso~~ conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis alternis convexis, dorsalibus tuberculis nonnullis oblongis instructis; nigra, cervino-squamosa, parce atro-variegata. Pygidium apicem rotundatum, ferrugineum, parce squamulosum. Corpus subtus obsolete punctulatum, silaceo-squamosum, medio sub-denudatum. Pedes validi, obsolete punctulati, nigri, squamulis silaceis obsiti; femoribus clavatis, anterioribus dente breviori, posticis valida armatis; tibiis sub-compressis, rectis; tarsis angustis, ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 24. P. MITIS. Germ. — H. op. IV. p. 674. 22. — P. Brasilia borealis.

\* 25. P. MISUMENUS. Schh. — H. op. IV. p. 675. 23. — P. Minas Geraes Brasiliæ.

\* 26. P. UMBRINUS. Schh. — H. op. IV. p. 676. 24. — P. Brasilia interior.

27. P. SUBUNDATUS. (Schh.) — Ovatus, convexus, niger, opacus, squamulis cervinis inæqualiter adpersus; antennis tarsisque ferrugineis, oculis magis approximatis, rostro vix longitudine thoracis, latiori, punctulato; thorace latiori, subtiliter confertim punctulato, antice tenuiter carinato; elytris cervino-undatis, profunde sulcatis, sulcis sub-remote punctatis, interstitiis convexis, alutaceis, apice conjunctim rotundatis; femoribus anticis sub-muticis.

Patria: Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

Affinis certe *Piazuri umbrini*, nonnihil latior; rostro breviori, latiori, basi tantum arcuato, oculis magis approximatis, thorace paulo latiori, antice tenuiter carinato, femoribus anticis sub-muticis, ab illo differt. Caput orbiculatum, obsolete punctulatum, nigrum, opacum, squamulis læte cervinis sat crebre adpersum; oculi mediocres, rotundati, convexi, nigri, in fronte magis quam in *Piazuro umbrino* approximati; rostrum vix longitudine



thoracis, validum, latum, basi arcuatum, evidenter crebre punctulatum, squamosum, ~~antorsum~~ glabrum, nitidum, totum nigrum. Antennæ sub-teres, dilute ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, obscuriore. Thorax sub-conicus, latitudine postica paulo brevior, apice oblique truncatus, intra apicem haud constrictus, lateribus basin versus sensim ampliatis, obliquis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, dorso antice tenuiter carinatus, niger, parum nitidus, squamulis late cervinis inæqualiter obsitus. Scutellum sub-triangulari, nigrum, opacum, parce squamulosum. Elytra ovata, antice leviter tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus ad medium linearia, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, postice declivia, sat profunde sulcata, in sulcis sub-remote distincte punctata, interstitiis convexis, subtiliter confertim alutaceis; atra, opaca, remote cervino-undata et maculata. Corpus subtile obsolete punctulatum, nigrum, opacum, squamulis late cervinis parce inæqualiter adpersum. Pedes mediocres, validi, confertim punctulati, nigri, parce cervino-squamulosi; femoribus modice clavatis, anticis sub-muticis, posticis subtile dente valido, acuto armatis; tibiis sub-teretibus, rectis; tarsis ferrugineis, subtile brunneo-spongiosis. — BHN.

28. P. IMBELLIS. (Germar.) — *Sub-ovatus, convexus, niger, opacus, squamulis cervinis variegatus; antennis brevibus, cum tarsis ferrugineis, rostro brevi, crasso, modice arcuato, punctulato, medio sub-carinato; thorace confertim granulato, obsolete carinato; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis sub-convexis; femoribus anticis vix, mediis acute, posticis valide dentatis.*

*Cryptorhynchus id.* GERM. *Ins. Spec.* p. 280. 417.

*Hujus operis* IV. p. 717. 9.

*Patria*: Brasilia. A DOM. GERMAR communicatus.

*Ciono Scrophulariæ* nonnihil major. Antennis brevibus a congeneribus distinctus. *Piazuro miti* affinis, thorace magis convexo, non carinato, elytris profundius punctato-striatis, interstitiis omnibus convexis, alternis non elevatioribus. Caput rotundatum, convexum, crebre subtiliter rugoso-punctatum, nigrum, griseo-squamosum; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite vix dimidio longius, validum, teres, modice arcuatum,

basi squamulosum, evidenter apicem versus subtilissime punctulatum, denudatum, medio carinula parum elevata instructum, nigrum, sub-nitidum. Antennæ in medio rostri insertæ, minus tenues, ferrugineæ. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique sub-truncatus, antè angustior, lateribus obtusè rotundatus, basi leviter bi-sinuatus, supra transversim modice convexus, confertim subtiliter granulatus, medio carina obsoleta, antice posticeque abbreviata instructus; niger, inæqualiter læte cervino-squamosus. Scutellum oblongum, apice rotundatum, cervino-squamosum. Elytra ovata, antice leviter sinuata, thoracis basi duplo fere latiora, humeris obliquis, obtusè angulatis; lateribus inflexa, a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra convexa, sat profunde sub-remote punctato-striata, interstitiis convexis, subtilissime coriaceis; nigra, opaca, cervino-tessellata. Corpus subtus nigrum, opacum, subtiliter punctulatum, pectore cervino-, abdomine cinereo-squamosis. Pedes mediocres, validi, nigri, cinereo-squamulosi; femoribus anterioribus parum clavatis, anticis obsolete, mediis evidenter dentatis, posticis magis incrassatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis basi parum curvatis, ferrugineis, apice uncinatis. — BHN.

STIRPS 3. — *Articuli funiculi antennarum* 2us 3<sup>o</sup> duplo longior.  
(Spec. 29.-30.)

\* 29. P. OSTRACION. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 677. 25. — *P. Brasilia borealis.*

30. P. CONDYLIATUS. *Chev.* — *H. op.* IV. p. 678. 26. — *P. Mexico.*

31. P. CAPRINULGUS (1). *Olivier.* — *H. op.* IV. p. 679. 27. — *P. Cayenna.*

GENUS 567. — LOBOPS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ longiusculæ, tenues, funiculo 7-articulato: articulis 1-4 elongatis, obconicis, duobus basalibus longioribus, reliquis rotundatis; clava ovalis.

Rostrum longum, lineare, sub-tenue, modice arcuatum.

Oculi sub-laterales, oblongo-ovati, modice convexi, majusculi.

---

(1) Congenericus forte, mihi invisus.

Thorax brevisculus, basi bi-sinuatus, lateribus æqualiter rotundatus, pone oculos eminenter lobatus.

Elytra ovata, humeris obtuse angulatis; apice singulatim rotundata.

Pedes longiusculi; tibiæ comprimatae, basi arcuatae.

DESCRIPTIO. — *Corpus* sub-ovatum, convexum, squamosum, alatum; minoris magnitudinis. — *Antennæ* in medio rostri sitæ, thoracis basin sub-attingentes, tenues, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> elongato, clavato, oculum haud pertingente, 2-5 elongatis, obconicis, 2<sup>o</sup> paulo crassiore, 3<sup>o</sup> reliquis nonnihil longiore, 6-8 sub-rotundatis, sub-æqualibus, omnibus distantibus; clava ovalis, vix acuminata, articulis ægre discernendis. — *Frons* late impressa. — *Rostrum* longitudine thoracis cum capite, sub-tenue, lineare, teres, basi vix crassius, modice arcuatum; scrobe lineari curvata, ad basin rostri exeunte. — *Oculi* sub-laterales, in fronte distantes, ad basin rostri paulo approximati, postice longius ascendentes, oblongo-ovati, modice convexi, majusculi. — *Thorax* latitudine baseos parum brevior, basi leviter bi-sinuatus, lateribus æqualiter rotundatus, anterie nonnihil angustior, antice in medio late emarginatus, pone oculos valde lobatus, supra modice convexus, infra pone gulam profunde emarginatus; canali infero ante pedes anticos desinente, modice profundo, marginibus vix elevatis. — *Scutellum* mediocre, rotundatum. — *Elytra* sub-ovata, antice thoracis basi plus dimidio latiora et illo triplo longiora, basi sub-sinuata, humeris obtuse angulatis; apice singulatim rotundata, anum tegentia, supra modice convexa. — *Pedes* longiusculi, longitudine sub-æquales, tub-tenues; coxis anticis approximatis; femoribus nonnihil clavatis, subtus dente unico armatis; tibiis comprimatis, basi arcuatis, versus apicem extus ciliatis, apice dente valido instructis; tarsis longis, articulo penultimo latiore, bi-lobo, subtus spongioso, ultimo clavato, bi-unguiculato.

A λοβός, lobus; ὄψ, oculus.

Typus. — *Lobops setosus*; e Brasilia.

Obs. — Statura *Conotrachelo* generi fere appropinquat.

\* 1. L. SETOSUS. (Schh.) — *Sub-ovatus, niger, squamulis flavo-griseis parce adpersus; antennis tarsisque ferrugineis; fronte impressa; thorace modice ampliato, pone oculos insigniter lobato; elytris*

*punctato-striatis, interstitiis seriatim fusco-griseoque setosis, dorsalibus alternis costatis.*

Habitat in Brasilia. A Dom. FALDERMANN communicatus, Mus. SCHH.

*Grypidio Equisetii* magnitudine æqualis. Caput sub-rotundatum, disperse punctatum, nigrum, squamulis flavo-griseis, setulis griseis fuscisque immixtis obsitum; fronte late longitudinaliter impressa; oculi magni, oblongo-sub-ovales, posterius sub-divergentes, modice convexi, nigri; rostrum capite cum thorace fere longius, sub-tenuè, arcuatum, punctatum, nigrum, versus basin griseo-squamulosum, extrorsum glabrum, superne læve, nitidum, apice ipso rufescente. Antennæ basin thoracis fere attingentes, tenues, ferrugineæ, basi saturatiores. Thorax latitudine baseos paulo brevior, antè parum angustior, lateribus modice æqualiter rotundato-ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, apice dorsi late emarginatus, utrinque amplissime lobatus, inferne iterum pone gulam profunde emarginatus, supra modice convexus, punctatus, niger, squamis flavo-griseis parce obsitus, setulis atris griseisque in dorso passim immixtis. Scutellum rotundatum, nigrum, flavo-griseo-squamulosum. Elytra thorace fere duplo latiora ac triplo longiora, basi conjunctim sub-tri-sinuata, humeris calloso-elevatis, sub-angulatis; pone humeros ad medium linearia, dein sensim attenuata, margine laterali inflexo; apice singulatim sub-rotundata, supra sub-fornicata, punctato-striata, juxta apicem impressa, tota piceo-nigra, squamulis flavo-griseis minus dense obsita, interstitiis dorsalibus sub-scabris setulisque griseis fuscisque sub-seriatim adspersis, secundo, quarto sextoque a sutura elevatioribus, sub-costatis. Corpus subtus remote punctatum, nigrum, squamulis flavo-griseis adspersum. Pedes longiusculi, sub-graciles; femoribus subtus ante apicem dente distincto armatis, tibiisque compressis, nigris, silaceo-squamulosis; tarsis dilatatis, ferrugineis. — FHS.

GENUS 568. — TIMORUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 680. gen. 356. — In diagnosi lin. 2, pro « articulo », lege : « articulato. »

\* 1. T. SUTURALIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 681. 1. — *P.* Brasilia.

GENUS 569. — PINARUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 307. gen. 178. — *H. op.* IV. p. 682. gen. 357.

♂♀ 1. *P. SPICULUS.* *Germ.* — *H. op.* IV. p. 683. 1. — *P. Brasilia.*

GENUS 570. — MECOPUS. *Dalman.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 304. gen. 176. — *H. op.* III. p. 555. gen. 263. *ib.* IV. p. 684. gen. 358.

1. *M. AUDINETII.* *Schh.* — *H. op.* IV. p. 684. 1. — *P. Java.*

In descriptione l. c. data lin. 1, pro « Corpus », lege : « Caput. » — lin. 26, « pone », lege : « 4° pone. »

♂♀ 2. *M. BISPINOSUS.* *Weber.* — *H. op.* III. p. 556. 1. — IV. p. 686. 2. — *P. Borneo, Sumatra, Manilla.*

*STURM, Catal.* 1843. p. 224.

♂ 3. *M. TRILINEATUS.* *GUÉRIN.* — *H. op.* IV. p. 688. 3. — *P. Nova Guinea.*

*GUÉRIN, Voy. de la Coquille, Zool.* T. II. Part. II. Div. I. p. 128.

4. *M. HOPEI.* *Sehh.* — *H. op.* IV. p. 689. 4. — *P. Bengalìa.*

*Hujus generis mihi videtur (species mihi invisæ).*

5. *M. SPHEROPS.* *Wiedem.* — *H. op.* IV. p. 690. 5. — *P. Java.*

6. *M. VULNERATUS.* *Wiedem.* — *H. op.* IV. p. 691. 6. — *P. Bengalìa.*

7. *M. EVOLANS.* *Wiedem.* — *H. op.* IV. p. 691. 7. — *P. Bengalìa.*

GENUS 571. — ARACHNOBAS (1). *Boisduval.*

1. *A. STRIGA.* *Boisduv.* — *H. op.* IV. p. 316. 1. — *P. Nova Guinea.*

*Arachnopus id.* *GUÉRIN, Voy. de la Coquille, Ins.* II. Part. II. div. I. p. 128. T. 6. f. 5.

---

(1) Genus mihi invisus.

2. A. GAZELLA. *Olivier.* — *H. op. IV.* p. 316. 2. — *P. Nova Guinea.*

GENUS 572. — CLEOGONUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 315. gen. 183. — *H. op. IV.* p. 691. gen. 359.

♂♀ 1. C. RUBETRA. *Fabr.* — *H. op. IV.* p. 692. 1. — *P. Cayenna, Mexico.*

\* 2. C. CONICOLLIS. *Schh.* — *H. op. IV.* p. 697. 2. — *P. Brasilia.*

3. C. NUCULA. (*Germar.*) — *Ovalis, convexus, ater, nitidus, glaber; rostro thorace breviori, compresso, striolato-punctato; thorace sub-conico, sat crebre profundius punctato; elytris evidenter sub-remote striato-punctatis, interstitiis planis, vage remote punctulatis, stria nona profunda et late impressa, margine antico nonnihil reflexo; femoribus dente parvo instructis; tibiis basi extus angulato-dentatis.*

*Hujus operis IV.* p. 694. 4.

*Orobitis id. GERM. Ins. Spec.* p. 244. 372.

*Patria: Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.*

Statura et summa similitudo *Cleogoni Rubetræ*, duplo minor; rostro breviori, thorace crebre profundius punctato, elytris punctis majoribus seriatim impressis, interstitiis punctulatis, ab illo facile dignoscitur. Caput rotundatum, convexum, sub-remote punctatum, atrum, nitidum, glabrum; oculi magni, oblongi, ovati, parum convexi, nigri, in fronte approximati; rostrum thorace brevius, crassum, sub-compressum, parum arcuatum, striolato-punctatum, apice deplanatum, similiter coloratum. Antennæ sub-tenues, piceæ; clava ovata, acuminata, dilutiore, densius pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica nonnihil brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lateribus versus basin ampliatis, obliquis; postice bi-sinuatus, lobo medio sub-triangulari, parum producto; supra convexus, sat crebre evidenter punctatus, ater, nitidus, glaber. Scutellum oblongum, sub-elevatum, læve, concolor. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, tenue reflexo-marginata, basi oblique ampliata, pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, profundius sub-remote

striato-punctata, interstitiis planis, subtiliter disperse punctulatis; atra, sub-nitida, glabra. Corpus subtus atrum, nitidum, pectore profunde crebrius, abdomine parcius subtilius punctatum. Pedes mediocres, validi, confertim punctati, nigri, nitidi; femoribus modice clavatis, subtus dente parvo instructis; tibiis compressis, rectis, ad basin extus angulato-ampliatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

*Forte hujus generis (species mihi invisæ).*

4. C. TROCHILUS. *Olivier.* — P. St.-Domingo.

*DEJEAN, Catal. ed. 2. p. 301. — ed. 3. p. 326.*

*Rhynchaenus id. OLIV. Ent. V. 83. p. 118. 64. T. 34. f. 531.*

*Centrinus id. H. op. IV. p. 788. 76.*

5. C. RUBICOLLIS. *Boisduv.* — H. op. IV. p. 694. 3. — P. Nova Guinea.

GENUS 573. — OROBITIS. *Germar.*

*Curc. Disp. Méth. p. 314. gen. 182. — H. op. IV. p. 694. genus 360.*

♂♀ 1. O. CYANEUS. *Linneé.* — H. op. IV. p. 695. 1. — P. Europa septentrionalis et intermedia.

TRIBUS II. — *Scutellum aut minutissimum, fere indistinctum, aut nullum. (Gen. 574.-584.)*

GENUS 574. — OCLADIUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth. p. 316. gen. 184. — H. op. IV. p. 696. gen. 361.*

STIRPS I. — *Thorax sub-conicus. (Spec. 1.-9.)*

\* 1. O. SALICORNIAE. *Oliv.* — H. op. IV. p. 697. 1. — P. Arabia, Bucharia.

\* 2. O. PERTUSUS. *Schh.* — H. op. IV. p. 698. 2. — P. Caffraria.

\* 3. O. SUBFASCIATUS. (*Reiche.*) — *Breviter ovatus, convexus, niger, squamositate silacea parce inæqualiter adpersus; antennis*

*rufo-testaceis, rostro basi bi-canaliculato; thorace brevi, anterius angustato, supra late profunde longitudinaliter sulcato; elytris foveolis ovatis, profundis seriatim impressis, interstitiis angustis, carinatis, remote punctulatis; femoribus profunde striatis.*

*Glyphideres variegatus.* DOM. BOUQUET in Htteris.

*Patria* : Caput Bonæ Spei. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

*Statura Ocladii pertusi*, sed dimidio minor; thorace longitudinaliter late et profunde sulcato, ab illo mox distinctus. Caput parvum, rotundatum, supra modice convexum, confertim sat profunde rugoso-punctatum, nigrum, opacum, vix squamosum; oculi ovati, sub-depressi, nigro-brunnei; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, sub-tenue, teres, lineare, arcuatum, a basi fere ad apicem sulcis duobus sat profundis, et præterea alio utrinque laterali minus profundo exaratum; fundus sulcorum et apex rostri punctulata; totum nigrum, sub-opacum, setulis pallidis parce adpersum. Antennæ in medio rostri sitæ, tenues, rufo-testaceæ, parce pallido-pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata densius pubescente. Thorax latitudine baseos multo brevior, apice late emarginatus, lobis ocularibus valde prominulis, obtusis; anterius valde angustatus, lateribus versus basin obliquis, valde ampliatis; basi truncatus, supra valde convexus, antice declivis, longitudinaliter late profunde sulcatus, interstitiis carinatis, angustis; niger, sub-opacus, fundo sulcorum indumento silaceo repleto. Scutellum nullum. Elytra globosa, antice truncata, thoracis basi haud latiora, lateribus in medio nonnihil rotundato-ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra valde convexa, globosa, postice declivia, foveolis crebris ovatis, profundis seriatim impressa, interstitiis angustis, convexis, remote punctatis; nigra, opaca, basi macula utrinque in medio disci fasciaque angusta postica silaceo-squamosis, foveolis dorsalibus indumento concolore repletis. Corpus subtus punctulatum, nigrum, opacum. Pedes longiusculi, validi, mutici, nigri, parce pallido-setulosi; femoribus rectis, sub-linearibus, sulcato-punctatis; tibiis compressis, sub-inflexis, striatis; tarsis elongatis, ferrugineis. — BHN.

\* 4. O. TEXTILIS. (Chevrolat.) — *Breviter ovatus, convexus, niger, opacus; setulis pallidis parce adpersus; rostro capite cum thorace longiori, profunde bi-sulcato; thorace transverso, intra apicem constricto; lateribus sub-obliquis, dorso undique longitudinaliter*



*costato, inter costas punctato; elytris foveolis oblongis, sat profundis seriatim impressis, interstitiis angustis, sub-carinatis, remote seriatim punctatis.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm. Caput Bonæ Spei. Dom. CHEVROLAT.

Statura omnino *Ocladii pertusi*, sed triplo minor; sculptura thoracis ab illo abunde et mox distinctus. Caput rotundatum, supra parum convexum, confertim sat profunde rugoso-punctatum, nigrum, opacum, sub-denudatum; oculi parvi, rotundati, sub-depressi, glauci; rostrum capite cum thorace nonnihil longius, tenue, lineare, modice arcuatum, dorso sulcis duobus profundis insculptum, fundus sulcorum et apex punctulata; totum nigrum, opacum, setulis brevissimis, pallidis parce adpersum. Antennæ fere ad medium rostri insertæ, tenues, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra caput nonnihil rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, acutis; antice angustatus, leviter constrictus, lateribus sub-obliquis; basi truncatus, supra valde convexus, undique longitudinaliter costatus, sulcis inter costas sat profunde punctatis; niger, opacus, setulis parvis, erectis, pallidis parce adpersus. Scutellum nullum. Elytra antice truncata, thoracis basi haud latiora, humeris sub-rectangulatis, non elevatis; lateribus in medio nonnihil rotundato-ampliata, apicem versus angustata, apice ipsa conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra valde convexa, fornicata, postice abrupte declivia, foveolis oblongis, sat profundis seriatim impressa, interstitiis angustis, sub-convexis, seriatim remote punctatis; nigra, sub-opaca, setulis raris, brevibus, pallidis adpersa. Corpus subtus punctatum, nigrum, opacum. Pedes longiusculi, validi, nigri, opaci, setulis pallidis adpersi; femoribus sub-linearibus, carinatis et punctatis, subtus muticis; tibiis compressis, fere rectis; tarsis elongatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

5. O. COSTIGER. (Chevrolat.) — *Breviter ovatus, ater, sub-nitidus, setulis pallidis parce adpersus; rostro bi-sulcato; thorace transverso, intra apicem constricto, lateribus sub-obliquis, dorso undique longitudinaliter costato, inter costas punctato; elytris scrobiculato-punctatis, interstitiis carinatis, rugosis, plaga basali fasciaque postica, ad suturam ramulum posterius emittente, silaceo-squamosis.*

*Patria* : Caput Bonæ Spei. Mus. Dom. CHEVROLAT.

*Ocladio Salicorniæ* sub-similis, sed minor, thorace costato ab illo mox distinctus. Magnitudo fere *Byrrhi varii*. Caput rotundatum, parvum, parum convexum, vertice obsolete, fronte profunde crebre rugoso-punctatum, nigrum, sub-opacum; oculi laterales, ovati, sub-depressi, glauci; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, lineare, modice arcuatum, supra sulcis duobus profundis punctatis inculptum, apice punctulatum, nigrum, parum nitidum. Antennæ sub-tenues, piceæ, parce pilosæ. Thorax latitudine baseos multo brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra nonnihil rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, sub-acutis; anterieus angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus versus basin ampliatis, nonnihil rotundatis; postice truncatus, supra valde convexus, undique costis longitudinaliter instructus, sulcis inter costas punctatis; ater, sub-nitidus, setulis sub-erectis, pallidis parce adpersus. Scutellum haud conspicuum. Elytra sub-globosa, antice truncata, thoracis basi vix latiora et illi arcte applicata, pone basin ultra medium nonnihil rotundato-ampliata, dein apicem versus angustata, lateribus valde inflexa, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, postice declivia, sat profunde scrobiculato-striata, interstitiis carinatis, rugosis; tota atra, sub-nitida, in ipsa basi plaga irregulari, transversa et pone medium fascia communi dentata, ad suturam posterius ramulum emittente, dense silaceo-squamosis. Corpus subtus remote punctatum, nigrum, opacum, setulis pallidis parce adpersum. Pedes mediocres, nigri, opaci, setulis pallidis adpersi; femoribus sub-linearibus, sulcatis et in sulcis punctatis, subtus muticis; tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis, canaliculatis; tarsi ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 6. *O. COSTICOLLIS*. Schh. — *H. op. IV.* p. 699. 3. — *P.* Caput Bonæ Spei.

7. *O. ASSERCULATICOLLIS*. Schh. — *H. op. IV.* p. 700. 4. — *P.* Caput Bonæ Spei.

\* 8. *O. SENIUS*. Klug. — *H. op. IV.* p. 701. 5. — *P.* Caput Bonæ Spei.

9. *O. SUBCARINATUS* Schh. — *H. op. IV.* p. 702. 6. — *P.* Caput Bonæ Spei.

STIRPS 2. — *Thorax sub-globosus*. (Spec. 10.-15.)

- \* 10. O. BACCICOLLIS. *Klug.* — *H. op.* IV. p. 703. 7. — *P.* Caput Bonæ Spei.
11. O. LACUNATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 704. 8. — *P.* Caput Bonæ Spei.
12. O. FOVEATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 705. 9. — *P.* Caffraria.
- \* 13. O. GLOMERIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 706. 10. — *P.* India orientalis, Caput Bonæ Spei.
- \* 14. O. SULCIPES. (*Schh.*) — *Ovatus, piceus, parum nitidus, setulis pallidis parce adpersus; capite rugoso-punctato, rostro bi-sulcato; thorace ferrugineo, brevi, lato, convexo, lateribus valde rotundato-ampliato, scrobiculis remotis seriatim insculpto; elytris seriatim remote punctatis, tuberculis numerosis, sub-obtusis, poriferis obsitis.*

*Patria:* Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Ocladio Glomeridi* proximus, sed plus duplo minor; thorace ferrugineo, latiori, utrinque magis rotundato-ampliato, scrobiculis mediocribus, remotis insculpto, ab illo bene distinctus. Caput rotundatum, supra parum convexum, vertice obsolete, fronte profundius crebre rugoso-punctatum, nigrum, opacum; oculi parvi, sub-rotundati, depressi, glauci; rostrum longitudine thoracis cum capite, lineare, modice arcuatum, in dorso sulcis duobus, ultra medium extensis, sat profundis, in fundo punctatis insculptum, nigrum, opacum. Antennæ tenues, piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine media plus duplo brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra nonnihil rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, acutis; anterie subito angustior, mox pone apicem lateribus valde rotundato-ampliatis, versus basin citius angustatis; postice truncatus, supra convexus, scrobiculis minoribus, profundis, remotis seriatim insculptus, quatuor in singulo serie, basalibus majoribus, apicalibus elongatis; totus ferrugineus, sub-nitidus, setulis nonnullis pallidis adpersus. Scutellum haud conspicuum. Elytra globosa, antice truncata, thoracis basi haud latiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus valde inflexa, apice conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra præsertim posterius valde convexa, seriatim mediocriter remote punctata,

undique tuberculis rotundatis obtusis, supra poriferis confertim obsita, picea, sub-nitida, vix setosa. Corpus subtus punctulatum, nigro-piceum, opacum. Pedes validiusculi, nigri, parce albo-setulosi; femoribus sub-linearibus, sulcatis et punctatis, muticis; tibiis compressis, rectis, canaliculatis; tarsis elongatis, subtus brunneo-spongiosis — BHN.

\* 15. O. INÆQUALICOLLIS. (Schh.) — *Ovatus, piceus, setulis albidis parce adpersus; capite confertim rugoso-punctato, rostro bi-sulcato; thorace brevi, lato, convexo, lateribus valde rotundato-ampliato, supra longitudinaliter costato, sulcis inter costas profunde scrobiculatis; elytris seriatim mediocriter remote punctatis, tuberculis numerosis, sub-obtusis, poriferis obsitis, singulo dorso antico guttulis duabus e squamulis albidis insignito.*

*Patria*: Port Natal. DOM. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Statura omnino *Ocladii sulcipedis*, dimidio fere minor; sculptura thoracis ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, supra parum convexum, undique crebre sat profunde rugoso-punctatum, nigrum, opacum, vix setosum; oculi parvi, sub-rotundati, depressi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, lineare, arcuatum, a basi longe ultra medium bi-sulcatum, sulcis in fundo punctatis; nigrum, opacum, apicem versus punctulatum, obscure ferrugineum. Antennæ sub-tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine media duplo brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra nonnihil rotundato-productus, lobis ocularibus prominulis, acutis; anterie subito angustior, lateribus mox pone apicem valde rotundato-ampliatis, versus basin citius angustatis; postice truncatus, supra convexus, longitudinaliter alte costatus, sulcis inter costas scrobiculis oblongis, profundis insculptis; piceus, sub-nitidus, setulis erectis, albidis parce adpersus. Scutellum nullum. Elytra globosa, antice truncata, ibique thoracis basi vix latiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus valde inflexa, medio rotundato-ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra præsertim posterius valde convexa, seriatim mediocriter remote punctata, undique tuberculis rotundatis, obtusis, supra poriferis confertim obsita; picea, sub-nitida, setulis brevibus, pallidis parce adpersa, in dorso antico guttulis duabus parvis, longitudinaliter positis e squamulis albidis decorata. Corpus

subtus punctulatum, nigro-piceum, opacum. Pedes validi, nigropicei, setulis pallidis parce adpersi; femoribus sub-linearibus, sulcato-punctatis, subtus muticis; tibiis sub-compressis, canaliculatis, basi perparum arcuatis; tarsis elongatis, subtus brunneo-spongiosis. — *REV.*

GENUS 575. — SYMPIEZOPUS. *Nobis.*

*Hujus operis IV. p. 707. genus 362.*

- \* 1. S. ACICULATUS. *Schh.* — *H. op. IV. p. 708. 1.* — *P. Caffraria.*
- 2. S. PAUPER. *Schh.* — *H. op. IV. p. 709. 2.* — *P. Caffraria.*
- \* 3. S. CINCTUS. *Schh.* — *H. op. IV. p. 410. 3.* — *P. Caput Bonæ Spei.*

GENUS 576. — LOBOTRACHELUS. *Nobis.*

*Hujus operis IV. p. 711. genus 363.*

- \* 1. L. VESTITUS. *Schh.* — *H. op. IV. p. 712. 1.* — *P. Caput Bonæ Spei.*
- \* 2. L. CONICOLLIS. (*Schh.*) — *Ovalis, ater, nitidus, squamulis setiformibus, albidis parce adpersus; rostro longitudine thoracis cum capite, parum arcuato, sub-lævi; thorace conico, postice lævi, anterius subtiliter crebre ruguloso-punctato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter vage punctulatis, pectore basi macula parva, sub-cuneata, dense niveo-squamosa decorato; femoribus dente minuto, acuto armatis.*

*Patria:* Port Natal, Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Magnitudo Centri holosericei.* Caput rotundatum, convexum, subtiliter punctulatum, atrum, sub-nitidum, supra vix subtus parce albo-squamosum; oculi in fronte locati, ovati, parum prominenti, sub-approximati, nigri; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, teres, validiusculum, parum arcuatum, sub-læve, atrum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, nigræ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax conicus, latitudine postica haud longior, apice oblique truncatus, fere duplo angustior, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice bi-sinuatus, lobo medio triangulariter producto; supra modice convexus, postice sub-lævis, anterius subtiliter crebre ruguloso-punctatus, ater, nitidus, squamis setiformibus, albidis, parce in linea dorsali magis condensatis adpersus.

Scutellum minutum, tuberculiforme, sub-immersum, concolor. Elytra oblongo-triangularia, antice leviter tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris sub-elevatis, obtuse rotundatis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso singulatim sub-rotundata, thorace vix duplo longiora, supra modice convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter vage minus crebre punctulatis; atra, nitida, squamulis setiformibus, albidis parce adpersa. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis albidis adpersum; pectore in ipsa basi macula parva, cuneiformi, dense niveo-squamosa decorato. Pedes elongati, nigri, punctulati, tenuiter albo-squamulosi; femoribus parum clavatis, subtus dente minuto, acuto armatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BEN.

\* 3. L. EGENUS. (Schh.) — *Ovalis, ater, sub-nitidus, supra parce subtus dense niveo-squamosus; antennis tarsisque testaceis, rostro thorace nonnihil longiori, parum arcuato, sub-carinato, albo-squamoso; thorace breviter conico, undique confertim punctulato, basi macula parva oblonga, nivea decorato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter vage punctulatis; femoribus anticis sub-muticis, posterioribus dente minuto armatis.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Balanino Brassicæ nonnihil major, præsertim longior. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, atrum, sub-nitidum, fere glabrum, inter oculos niveo-squamosum; oculi magni, sub-rotundati, modice convexi, nigri, in fronte approximati; rostrum thorace nonnihil longius, parum arcuatum, teres, validiusculum, punctulatum, obsolete carinatum, atrum, niveo-squamosum, apice ipso sub-denudatum. Antennæ tenues, testacæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata. Thorax breviter conicus, latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, intra apicem obsolete constrictus, lateribus obliquis, basin versus ampliatis; postice bi-sinuatus, lobo medio triangulariter producto, supra modice convexus, sat crebre punctatus, ater, sub-nitidus, supra parce, macula parva, oblonga, in lobo postico subtusque dense niveo-squamosus. Scutellum minutum, tuberculiforme, concolor. Elytra oblongo-triangularia, antice sub-tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris vix elevatis, obliquis; pone humeros apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata,*

thorace vix duplo longiora, supra modice convexa et postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter vage punctulatis; atra, sub-nitida, squamulis parvis, angustis, niveis parce adpersa. Corpus subtus subtiliter punctulatum, atrum, nitidum, squamulis niveis dense tectum. Pedes elongati, punctulati, nigri, niveo-squamulosi; femoribus parum clavatis, anticis sub-muticis, posterioribus dente parvo armatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, fusco-testaceis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

- \* 4. L. LITIGIOSUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 713. 2. — *P. Madagascar.*
- \* 5. L. INEPTUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 714. 3. — *P. Bengalia.*
- \* 6. L. PUSUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 715. 4. — *P. India orient.*
- \* 7. L. SUBSIGNATUS. (Schh.) — *Ovalis, ferrugineus, sub-nitidus, supra parcius subtus dense niveo-squamosus; antennis tarsisque testaceis, rostro longitudine thoracis, sub-recto; thorace breviter sub-conico, confertim punctulato, macula parva, oblonga, basali angulisque posticis dense niveo-squamosis; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, vage punctulatis, fascia transversa pone medium apiceque densius niveo-squamosis; femoribus subtus dente minuto armatis.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Parvus. *Ceuthorhyncho florali* magnitudine æqualis, oblongior. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, ferrugineum, sub-nitidum, tenuiter inter oculos dense niveo-squamosum; oculi magni, sub-rotundati, parum convexi, nigri, in fronte sub-approximati; rostrum longitudine thoracis, teres, validiusculum, parum arcuatum, supra obsolete carinatum, ferrugineum, niveo-squamosum, apice ipso sub-denudato. Antennæ tenues, testaceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata. Thorax breviter sub-conicus, latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, intra apicem obsolete constrictus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice bi-sinuatus, lobo medio triangulariter producto; supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, ferrugineus, sub-nitidus, supra parce, macula parva, oblonga, in lobo postico, angulis basalibus subtusque dense niveo-squamosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, ferrugineum. Elytra

oblongo-triangularia, antice tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris obliquis, parum elevatis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix duplo longiora, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, vage punctulatis; ferruginea, sub-nitida, parce, fascia mox pone medium apiceque densius albo-squamosa. Corpus subtus punctulatum, ferrugineum, pectore dense, abdomine tenuiter niveo-squamosis. Pedes elongati, punctulati, ferruginei, niveo-squamulosi; femoribus parum clavatis, subtus dente minuto armatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis testaceis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

- \* 8. L. HISTRIO. (Schh.) — *Breviter ovalis, niger, sub-nitidus, supra parce subtus dense niveo-squamosus; antennis tarsisque testaceis, rostro longitudine thoracis, modice arcuato; thorace breviter sub-conico, confertim punctulato, macula majori, sub-cordiformi baseos angulisque posticis dense niveo-squamosis; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, vage punctulatis, fasciis duabus in medio approximatis apiceque niveo-squamosis; femoribus dente obsoleto armatis.*

*Patria*: Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Affinis certe *Lobotracheli subsignati*, nonnihil minor, præsertim brevior, aliter coloratus; rostro magis arcuato, thorace latiori, macula basali aliter formata, elytris fasciis duabus albo-squamosis, ab illo differt. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, nigrum, parum nitidum, parce inter oculos dense niveo-squamosum; oculi magni, sub-rotundati, parum convexi, nigri, in fronte sub-approximati; rostrum longitudine thoracis, teres, validiusculum, modice arcuatum, tenuiter carinatum, nigrum, niveo-squamosum, apice ipso sub-denudatum. Thorax breviter conicus, latitudine postica dimidio fere brevior, apice oblique truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice bi-sinuatus, supra convexus, confertim subtiliter punctulatus, niger, sub-nitidus, supra parce, macula sub-cordiformi basali angulisque posticis subtusque dense niveo-squamosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra sub-ovata, antice tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris parum elevatis, obliquis; lateribus apicem versus sensim parum angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra convexa, postice declivia, medio-



criter punctato-striata, interstitiis planis, vage punctulatis; nigra, sub-nitida, fasciis duabus, una mox ante et altera pone medium, approximatis apiceque albo-squamosis; sutura ad fascias lutescenti-squamosa. Corpus subtus punctulatum, nigrum, dense niveo-squamosum. Pedes elongati, punctulati, nigri, squamulis albidis obsiti; femoribus parum clavatis, subtus dente minuto, obsoleto armatis; tibiis teretibus, rectis; tarsi angustis, testaceis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 577. — CEUTHORHYNCHUS. Schüppel.

*Curc. Disp. Méth.* p. 298. genus 173. Manipulus II. — *H. op.* IV. p. 475. gen. 346. In diagnosi *huj. op.* l. c. data, lin. 1, lege: " funiculo in plerisque 7-, in nonnullis 6-articulato, etc., etc. "

STIRPS I. — *Thorax inæqualis aut tuberculatus, aut margo anticus elevatus, reflexus.* (Spec. 1.-157.)

MANIPULUS I. — *Femora mutica.* (Spec. 1.-49.)

\* 1. C. TOPIARIUS. *Illiger.* — *H. op.* IV. p. 476. 1. — *P. Hungaria, Tauria, Austria, Italia, Lusatia.*

STURM, *Catal.* 1843. p. 222.

\* 2. C. 6-TUBERCULATUS. (*Klug.*) — *Breviter ovatus, niger, opacus, lateribus thoracis subtusque silaceo-squamosus; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis, rostro longitudine thoracis, valido, crebre punctato, vertice carinato, superciliis elevatis; thorace confertim punctulato, sex-tuberculato, antice profunde constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis alternis convexis, ante medium fascia obsoleta, transversa, utrinque medio abrupta, apiceque anguste ferrugineo, silaceo-squamosis; femoribus silaceo-fasciatis.*

*Patria:* Mexico. DOM. SCHÜPPEL. Mus. SCHH.

*Ceuthorhyncho Litura* paulo minor. Caput rotundatum, parum convexum, confertim punctulatum, nigrum, squamulis silaceis parce adpersum; vertice carinula sub-elevata instructo; oculi rotundati, sub-depressi, glauci, sub callo elevato locati; rostrum longitudine fere thoracis, validum, modice arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, fere glabrum. Antennæ sub-tenues, ferrugineæ, parce pubescentes; clava parva, ovata,

picea. Thorax latitudine postica brevior, antice subito angustior, apice utrinque leviter emarginatus, intra apicem profunde constrictus, margine apicis alte elevato, obtuse bi-tuberculato; lateribus pone stricturam ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, lobo medio producto; supra paulo convexus, confertim punctulatus, longitudinaliter impressus, dorso medio transversim quadri-tuberculato; niger, sub-opacus, lateribus et subtus dense silaceo-squamosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum. Elytra antice singulatim obtuse rotundata, tenue elevato-marginata, thoracis basi dimidio latiora, humeris nonnihil elevatis, rotundatis; lateribus ante medium nonnihil ampliata, apice ipso etiam singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis elevatis, convexis, omnibus subtiliter alutaceis; nigra, opaca, margine apicali ferruginea, squamulis raris, silaceis adpersa, ante medium fascia obsoleta, transversa, in dorso interrupta apiceque silaceo-squamosa. Pygidium semi-orbiculatum, confertim punctatum, nigrum, sub-opacum, utrinque silaceo-maculatum. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, densius silaceo-squamosum. Pedes mediocres, validi, punctulati; femoribus clavatis, nigris, apicem versus silaceofasciatis; tibiis tarsisque ferrugineis. — BHN.

\* 3. *C. ALBOVITTATUS*. *Dahl.* — *H. op.* IV. p. 477. 2. — *P.* Hungaria, Constantinopolis.

\* 4. *C. MACULA-ALBA*. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 477. 3. — *P.* Germania, Gallia, Tauria.

KLINGELHOEFFER, *Stettin. Ent. Zeit.* IV. p. 88.

\* 5. *C. SUTURALIS*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 478. 4. — *P.* Germania, Gallia.

\* 6. *C. ALBOSCUTELLATUS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 478. 5. — *P.* Galliae provincia Campania.

7. *C. SERIATUS*. (*Schh.*) — *Breviter ovatus, niger, supra parcius inaequaliter, subtus dense albido-squamosus; antennis, tibiis tarsisque testaceis; thorace confertim punctulato, canaliculato, linea media distincta et alia utrinque laterali albo-squamosis; intra apicem profunde constricto, margine apicali valde elevato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim punctulatis,*

*sutura basi dense interstitiis alternis parce sub-seriatim albo-squamosis.*

*Patria* : Paris. Mus. Dom. AUBÉ.

Habitus et statura *Ceuthorhynchi suturalis*. Caput rotundatum, modice convexum, confertim punctatum, nigrum, squamulis albidis parce inæqualiter adpersum; oculi sub-globosi, nigri; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, sub-tenue, teres, arcuatum, crebre punctulatum, nigrum, sub-opacum, vix squamosum. Antennæ sub-tenues, testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine baseos multo brevior, antice duplo angustior quam basi, apice sub-truncatus, intra apicem late et profunde transversim impressus, margine apicis valde elevato; lateribus pone stricturam subito ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra convexus, undique confertim punctulatus, in medio canaliculatus, niger, opacus, parce albido-squamosus, in medio linea evidentiori et alia utrinque obsoleta e squamulis densioribus, concoloribus, instructus. Scutellum demersum, vix observandum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi paulo latiora, humeris obtuse angulatis, callo sub-elevato instructis; lateribus pone humeros apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace vix duplo longiora, supra modice convexa, postice nonnihil declivia, tenuiter striata, striis vix punctatis, interstitiis planis, confertim rugulosis; nigra, sub-opaca, sutura basi dense interstitiisque alternis parce sub-seriatim albo-squamulosis. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense albo-squamosum. Pedes mediocres, parce albo-squamulosi; femoribus modice incrassatis, muticis, nigris; tibiis tarsisque testaceis. — BHN.

\* 8. C. STEVENI. (Schh.) — *Breviter ovatus, niger, supra fusco-subtus niveo-squamosus; antennis pedibusque ferrugineis, rostro sub-compresso, modice arcuato; thorace breviori, latiori, intra apicem profunde constricto, niveo-tri-vittato; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim coriaceis, sutura vittaque lata laterali niveo-squamosis.*

*Patria* : Tauria. Dom. STEVEN. Mus. SCHH.

Affinis certe *Ceuthorhynchi suturalis*, nonnihil brevior, aliter coloratus; thorace breviori, latiori, intra apicem profundius constricto, elytris evidenter punctato-striatis, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, supra modice convexum, subtiliter crebre

punctulatum, fusco-fronte albo-squamosum, vertice tenuiter carinato; oculi rotundati, sub-depressi, nigri; rostrum thorace nonnihil longius, minus tenue, modice arcuatum, sub-compressum, subtiliter crebre punctulatum, parce albo-squamulosum, extrorsum denudatum. Antennæ sub-tenuës, ferrugineæ; clava parva, ovata, obscuriore, densius pubescente. Thorax latitudine postica duplo brevior, apice utrinque leviter emarginatus, intra apicem profunde constrictus, margine apicali elevato; lateribus pone stricturem rotundato-ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, lobò medio vix producto; supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, niger, fusco-squamosus, vittis tribus, media sub-interrupta, niveo-squamosis, decoratus. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum, niveo-squamosum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi parum latiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus nonnihil angustata, apice singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter confertim coriaceis; nigra, fusco-squamosa, sutura vittaque laterali, lata, niveo-squamosis. Pygidium semi-orbiculatum, punctulatum, dense albo-squamosum. Corpus subtus confertim punctulatum, dense niveo-squamosum. Pedes mediocres, punctulati, ferruginei, niveo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis angustis. subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

- \* 9. *C. ARATOR*. Schh. — *H. op.* IV. p. 479. 6. — *P. Tauria*,  
Germania.

*Ceuthorhynch. cinerascens*. NEES v. ESEN. secundum. Dom.  
STURM.

- \* 10. *C. SYRITES*. Germar. — *H. op.* IV. p. 480. 7. — *P. Tota*  
Europa.

FALDERM. *Faun. Ent. Transcaucas.* II. p. 205.

- \* 11. *C. ASSIMILIS*. Paykull. — *H. op.* IV. p. 480. 8. — *P. Europa*  
borealis et intermedia.

12. *C. AUSTRUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 481. 9. — *P. Gallia*,  
Parisiis.

- \* 13. *C. MELANARIUS*. (Kirby.) — *Ovatus*, niger, sub-depressus, supra parcius cinereo-, subtus densius albedo-squamosus; rostro lon-

*gitudine capitis cum thorace*, tenui, arcuato, punctulato; *thorace sub-convexo*, confertim punctulato, obsolete bi-tuberculato, intra apicem constricto; *elytris mediocriter crenato-striatis*, interstitiis sub-planis, confertim coriaceis; *humeris elevatis, rotundatis*.

*Hujus operis* IV. p. 502. 39.

*Nedyus* id. STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 31. 13.

*Patria*: Anglia. Dom. WALTON. Mus. SCHH.

Magnitudo et statura *Ceuthorhynchi Querceti*. Affinis etiam *Ceutorh. austero*, angustior, magis depressus, opacus; antennarum funiculo 6-articulato, ab illo mox distinctus. Caput parvum, rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, parum nitidum, glabrum; fronte leviter impressa; oculi rotundati, nigri, modice convexi; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ tenues, parce pilosæ; funiculo 6-articulato; clava parva, ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, anterius angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus nonnihil rotundato-ampliatis; basi bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, dorso utrinque obtuse tuberculatus, niger, parum nitidus, lateribus cinereo-squamulosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice singulatim obtuse rotundata, thorace dimidio fere latiora, humeris sub-elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, non ampliata, apice ipso etiam singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, mediocriter crenato-striata, interstitiis sub-planis, confertim coriaceis; nigra, parum nitida, parce cinereo-squamulosa. Pygidium semi-orbiculatum, punctulatum, parce cinereo-squamulosum. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense albosquamosum. Pedes mediocres, punctulati, nigri, parce squamulosi; femoribus parum clavatis, subtus muticis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

14. C. HEPATICUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 485. 10. — P. Gallia, Parisiis.

15. C. CONSPUTUS. Germ. — *H. op.* IV. p. 502. 43. — P. Germania, Gallia.

GERMAR, *Ins. Spec.* p. 233. 359.

*Ceuthorh. ægrotus*. SCHH. *H. op.* IV. p. 483. 11.

- \* 16. *C. DEPRESSICOLLIS*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 484. 12. —  
P. Suecia, Finlandia, Anglia.

*Obs.* — Funiculo 6-articulato. — *GERM. Stett. Ent. Zeit.* III.  
p. 109.

- \* 17. *C. RUBESCENS*. (*Schl.*) — *Breviter ovatus, piceus, supra parce  
subtus densius albido-pubescentis; antennis, rostro apice, elytris pe-  
dibusque rufo-ferrugineis; thorace transverso, confertim punctu-  
lato, obsolete bi-tuberculato, basi obsolete canaliculato, intra api-  
cem constricto; elytris mediocriter crenato-striatis, interstitiis planis,  
confertim coriaceis, circa scutellum densius albo-squamosis.*

*Patria* : Austria. DOM. SCHÜPPEL. MUS. SCHH.

*Ceuthorhyncho depressicollis* proximus, aliter coloratus; funiculo antennarum 7-articulato, thorace breviori, latiori, rostro longiori, tenuiori, ab illo distinctus. Caput rotundatum, parum convexum, confertim punctulatum, nigro-piceum, squamulis cinereo-albidis adpersum; oculi laterales, rotundati, parum convexi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, confertim punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, sub-glabrum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava parva, ovata, æuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica multo brevior, apice utrinque leviter emarginatus, antè angustior, intra apicem constrictus, margine apicali elevato, lateribus nonnihil rotundato-ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra parum convexus, confertim punctulatus, dorso postico obsolete canaliculatus, piceus, sub-opacus, supra squamulis albidis parce inæqualiter subtus dense adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, piceum. Elytra antice sub-truncata, tenue reflexo-marginata, thoracis basi parum latiora, humeris nonnihil elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, mediocriter crenato-striata, interstitiis planis, confertim coriaceis; rufo-ferruginea, squamulis piliformibus, albidis parce circa scutellum dense obsita. Pygidium breve, punctulatum, parce squamosum. Corpus subtus punctulatum, piceum, densius albo-squamosum. Pedes mediocres, rufo-ferruginei, tenuiter albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, recis, basi tenuioribus; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis.

- \* 18. *C. RUBIDUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 484. 13. — *P. Amer.* bor. Mississippi.
- \* 19. *C. NODICOLLIS*. Chev. — *H. op.* IV. p. 485. 14. — *P. Cayenna*.
- \* 20. *C. SUBSULTANS*. (Klug.) — *Breviter ovatus, convexus, ferrugineus, supra inæqualiter subtus densius cinereo-squamulosus; rostro longitudine thoracis, validiori, punctulato, basi carinato; thorace transverso, punctulato, dorso transversim quadri-tuberculato; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, alutaceis.*  
*Patria* : Columbia. Dom. SCHÜPPEL. Mus. SCHH.
- Magnitudo *Ceuthorhynchi nodicollis*, aliter coloratus; rostro breviori, latiori, supra sub-plano, carinato, thorace dorso quadri-tuberculato, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, supra modice convexum, subtiliter crebre punctulatum, ferrugineum, cinereo-squamulosum; oculi rotundati, parum convexi, nigro-brunnei; rostrum longitudine thoracis, sat validum, modice arcuatum, supra planum, punctulatum, a basi ultra medium carinatum, parce squamulosum, extrorsum glabrum, dilutius. Antennæ sub-tenuæ, rufo-ferrugineæ; clava parva, ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, anterieus subito angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus ampliatis; basi bi-sinuatus, lobo medio triangulariter producto; supra modice convexus, confertim punctulatus, dorso sub-depressus, medio transversim obtuse quadri-tuberculatus, ferrugineus, sub-opacus, supra parcius lateribus densius cinereo-squamulosus. Scutellum tuberculiforme, concolor. Elytra antice sub-tri-sinuata, tenue reflexo-marginata, thoracis basi latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus perparum rotundato-ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis convexis, confertim alutaceis; ferruginea, sub-opaca, squamulis cinereo-albidis inæqualiter sat dense variegata. Pygidium semi-rotundatum, punctulatum, concolor. Corpus subtus confertim punctulatum, ferrugineum, parce cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, punctulati, ferruginei, tenuiter cinereo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis tertibus, rectis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BIN.
- \* 21. *C. ERYSIMI*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 486. 15. — *P. Tota Europa*.

SYNONYMON OLIVIERI deletur, quoniam ad *Ceuth. cœrulescentem* pertinet. — Synonymon adde : *Rhynchaen. id.* ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 182. 52.

*Ceuthorh. id.* FALDERM. *Ent. Transcauc.* III. p. 205.

\* VAR.  $\beta$ . *H. op.* I. c. Var.  $\beta$ .

*Ceuthorh. smaragdinus.* DEJ. *Cat.* ed. 2. p. 299. ed. 3. p. 323.

22. *C. Cœrulescens.* Dejean. — *H. op.* IV. p. 487. 16. —  
P. Gallia.

*Rhynchaen. Erysimi.* OLIVIER. *Ent.* V. 83. p. 138. 94. T. 29.  
f. 438. secundum ejus museum, teste DOM. CHEVOLAT.

\* 23. *C. contractus.* Marsh. — *H. op.* IV. p. 488. 17. —  
P. Tota. Eur.

ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 182. 53.

\* 24. *C. atomus.* (Germar.) — *Ovatus, niger, subtus cinereo-albidosquamosus; rostro longitudine thoracis cum capite, tenui, arcuato; thorace obsolete bi-tuberculato, intra apicem constricto, confertim punctulato; elytris profundius punctato-striatis, nigro-cœrulescentibus, nitidis, interstitiis sub-lævibus, seriatim albo-setulosis.*

*Patria: Illyria.* DOM. GERMAR. *Mus. SCHH.*

Magnitudo, statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi contracti*; elytris profundius punctato-striatis, seriatim albo-setulosis, ab illo fere unice distinctus. Caput rotundatum, modice convexum, confertim evidenter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum; oculi rotundati, sub-depressi, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, confertim subtilissime punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenuis, nigræ, parce pilosæ; clava parva, ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque leviter emarginatus, antè angustior, intra apicem profunde constrictus, margine apicali elevato; lateribus nonnihil rotundato-ampliatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim evidenter punctulatus, dorso utrinque obsolete tuberculatus, niger, sub-nitidus, fere glaber. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice sub-tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris vix elevatis, rotundatis, lateribus non ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-convexis, lævibus; nigro-cœrulescentia, nitida, setulis brevibus, erectis, al-



bidis seriatim obsita. *Pygidium* semi-rotundatum, punctulatum, nigrum, sub-glabrum. *Corpus* subtus punctulatum, nigrum, parce cinereo-albido-squamosum. *Pedes* mediocres, validi, punctulati, nigri, tenuiter albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 25. *C. ATRATULUS*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 488. 10. —  
P. Europa borealis et intermedia.

\* 26. *C. SETOSUS*. (*Maerkel.*) — *Ovatus*, niger, supra parce breviter albo-setulosus, subtus similiter squamulosus; rostro vix longitudine capitis cum thorace, arcuato; thorace angustiore, confertim punctulato, obsolete bi-tuberculato, intra apicem late, profunde constricto; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis parum convexis, sub-lævibus.

*Patria*: SAXONIA. DOM. GERMAR. ANGLIA. DOM. WALTON. MUS. SCHH.

Magnitudo et similitudo *Ceuthorhynchi contracti*; thorace angustiori, profundius latius constricto, elytris setosis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, supra modice convexum, confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, cinereo-squamulosum; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum vix longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Antennæ tenues, nigrae; clava parva, ovata, acuminata, atro-pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque leviter emarginatus, anterius angustior, intra apicem late et profunde constrictus, lateribus rotundato-ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra modice convexus, confertim punctulatus, dorso tuberculis duobus obsoletis instructus, niger, parum nitidus, supra parce albo-setulosus. Scutellum tuberculiforme, concolor. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus inflexa, non ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-convexis, lævibus, breviter parce albo-setulosis; nigra vel nigro-cærulescentia, nitida. *Corpus* subtus punctulatum, nigrum, cinereo-squamulosum. *Pedes* mediocres, punctulati, nigri, parce cinereo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 27. *C. COCHLEARIE*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 489. 19. — *P. Suecia, Gallia, Anglia.*

\* 28. *C. QUERCETI*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 489. 20. — *P. Suecia meridionalis, Finlandia.*

\* 29. *C. APICALIS*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 489. 21. — *P. Europa borealis et intermedia.*

\* 30. *C. TERMINATUS*. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 503. 44. — *P. Europa intermedia.*

*Ceuthorh. Sii.* CHEVROLAT. *H. op.* IV. p. 490. 22.

STURM, *Catal.* 1843. p. 222.

\* 31. *C. PUMILIO*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 491. 23. — *P. Scania.*

\* 32. *C. ASPERULUS*. (*Aubé.*) — *Breviter ovatus, nigro-piceus, sub-nitidus, parce breviter albo-setulosus; antennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis; thorace confertim punctulato, obsolete bi-tuberculato, distincte canaliculato, antice profunde constricto, margine apicali alte elevato; elytris sub-globosis, distincte punctato-striatis, interstitiis parum convexis, lævibus, humeris obtuse angulatis, parum elevatis.*

\* VAR.  $\beta$ . *Fusco-piceus, antennis pedibusque dilutioribus.*

*Patria* : Gallia, ad Paris. Dom. AUBÉ. Mus. SCHH.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi Pumilionis*; thorace distincte canaliculato ab illo distinctus. Caput parvum, rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigropiceum, sub-nitidum, glabrum; oculi rotundati, parum convexi, nigri; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenuis, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava parva, ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice utrinque leviter emarginatus, antice late, profunde constrictus, margine apicali alte elevato, lateribus sub-obliquis, versus basin ampliatis; postice leviter bisinuatus, supra paulo convexus, confertim distincte punctulatus, dorso canaliculatus, utrinque obsolete tuberculatus, nigropiceus, sub-nitidus, squamulis albidis adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum. Elytra antice singulatim obtuse

rotundata, thoracis basi parum latiora, humeris nonnihil elevatis, obtuse angulatis; lateribus vix ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso etiam singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, postice declivia, distincte punctato-striata, interstitiis parum convexis, lævibus; nigro-picea, sub-nitida, setulis brevissimis, albidis seriatim adspersa. Corpus subtus obsolete crebre punctulatum, nigro-piceum, parce albo-squamulosum. Pedes mediocres, punctulati, parce pubescentes; femoribus modice clavatis, piceis, subtus muticis; tibiis tarsisque rufo-testaceis. — BHN.

33. C. SEPTENTRIONALIS. *Chev.* — *H. op.* IV. p. 492. 24. — *P.* America septentrionalis, Boston.

\* 34. C. ZIMMERMANNI. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 492. 25. — *P.* Pennsylvania.

\* 35. C. POSTHUMUS. *Illig.* — *H. op.* IV. p. 493. 26. — *P.* Germania.

\* 36. C. FLORALIS. *Payk.* — *H. op.* IV. p. 493. 23. — *P.* Europa borealis et intermedia.

ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 182. 54.

GERMAR, *Ent. Zeit.* III. p. 109.

*Curc. Typhæ.* HERBST, *Col.* VI. p. 415. 378. T. 92. f. 11. — Specimen illæsum; certe huc pertinet secundum Mus. HERBSTII, teste Dom. SCHÜPPEL.

*Ceuthorh. id.* Huj. *op.* IV. p. 568. 139.

*Ceuthorh. sulculus.* KIRBY, STEPH. *H. op.* IV. p. 502. 40.

*Ceuthorh. monostigma.* MARSHAM, STEPH. *H. op.* IV. p. 501. 37.

*Hujus operis l. c.* Var.  $\gamma$ . dele : « *Curc. constrictus*, MARSH. »

*Obs.* — Funiculo 6-articulato.

\* 37. C. PULVINATUS. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 494. 28. — *P.* Germania, Gallia, Persia occident., Ostrogothia Sueciæ.

FALDERM. *Faun. Ent. Transcauc.* II. p. 248. 467. — III. p. 205.

\* 38. C. CONSTRICTUS. (*Marsham.*) — *Breviter ovatus, niger, parcius albido-squamulosus; antennis basi testaceis, vertice carinato; tho-*

*rare angustiore, transversim convexo, confertim evidenter punctato, obsoletius canaliculato, intra apicem constricto, antice reflexo; elytris profunde crenato-striatis, interstitiis angustis, sub-planis, coriaceis, humeris obtuse angulatis.*

*Curculio id.* MARSHAM. *Ent. Brit.* p. 258. 61.

*Patria* : ANGLIA. DOM. WALTON. GALLIA. DOM. AUBÉ. MUS. SCHH.

Statura et similitudo *Ceuthorhynchi pulvinati*, dimidio fere major, parcius squamosus; thorace angustiore, profundius punctulato, obsoletius canaliculato, non tuberculato, elytris evidenter crenato-striatis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, squamulis albidis adpersum, vertice carinato; oculi rotundati, parum convexi, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, testaceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, nigro-fusca. Thorax latitudine postica brevior, apice late leviter emarginatus, anterieus angustior, intra apicem sat profunde constrictus, margine apicali reflexo, lateribus sub-obliquis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim evidenter punctatus, dorso obsoletius canaliculatus, niger, sub-nitidus, parce albo-squamulosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris obtuse angulatis, vix elevatis; lateribus parum ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, postice declivia, profunde crenato-striata, interstitiis angustis, confertim coriaceis; nigra, squamulis albidis tenuiter obsita. Pygidium semi-orbiculatum, punctulatum, medio carinatum. Corpus subtus punctulatum, nigrum, densius albo-squamulosum. Pedes validi, punctulati, nigri, parce albido-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 39. C. FALLAX. (Schh.) — *Breviter ovatus, niger, cinereo-pubescentis; thorace profunde canaliculato, bi-tuberculato, parum convexo, confertim punctulato, intra apicem minus profunde constricto, margine apicali elevato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, confertim rugulosis, postice muricatis; humeris obtusis, vix angulatis,*

*Patria* : Tauria. Dom. STEVEN. Mus. SCHH.

*Ceuthorhyncho constricto* simillimus, minus convexus; thorace antice minus profunde constricto, margine apicali magis elevato, elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis latoribus, minus convexis, postice muricatis, ab illo tamen abunde distinctus. Caput rotundatum, supra parum convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, parce cinereo-pubescent, vertice tenuiter carinato; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, arcuatum, subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, nigrae, parce pilosae; clava ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice truncatus, intra apicem parum profunde constrictus, margine apicali sat elevato; lateribus pone stricturam modice rotundato-ampliatus, postice leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra parum convexus, confertim punctulatus, in medio sat profunde canaliculatus, utrinque tuberculo distincto instructus, niger, parum nitidus, cinereo-pubescent. Scutellum demersum, vix observandum. Elytra antice vix sinuata, thoracis basi parum latiora, humeris obtuse angulatis, vix elevatis; lateribus apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace vix duplo longiora, supra paulo convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis subplanis, confertim rugulosis, apicem versus muricatis; nigra, sat dense cinereo-squamosa. Corpus subtus punctulatum, nigrum, albido-squamosum. Pedes mediocres, nigri, parce squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis. — BHN.

\* 40. *C. CONVEXICOLLIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 495. 29. — *P. Germania.*

\* 41. *C. PYRRHORHYNCHUS*. Marsh. — *H. op.* IV. p. 501. 38. — *P. Gallia, Anglia, Tauria.*

*Curculio id.* MARSH. *Ent. Br.* p. 257. 57.

*Ceuthorhynchus erythrorhynchus*. SCHH. *H. op.* IV. p. 496. 30.

*Ceuthorhynchus phaeorhynchus*. MARSH. *H. op.* IV. p. 502. 41.

\* VAR.  $\beta$ . Rufo-testaceus, cinereo-squamulosus, antennis pedibusque pallidis. — Nuper exclusus forte?

VAR.  $\gamma$ . *Ceuthorhynch. ruficrus*. MARSH. *H. op.* IV. p. 502. 42.

- \* 42. *C. ACHILLÆÆ*. Hellwig. — *H. op.* IV. p. 497. 31. — *P. Germania.*
- \* 43. *C. NANUS*. Besser. — *H. op.* IV. p. 497. 32. — *P. Europa intermedia, Tauria.*
- \* 44. *C. ANGUSTULUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 498. 33. — *P. Persia occidentalis.*
- \* 45. *C. GLAUCUS*. (Aubé.) — *Ovatus, sub-depressus, niger, parum nitidus, supra parcius subtus dense albo-squamulosus; rostro longitudine capitis cum thorace, tenui, arcuato; thorace confertim punctulato, basi canaliculato, intra apicem constricto, margine apicali modice elevato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis subtiliter coriaceis, sutura lateribusque densius albo-squamosis; femoribus muticis.*

Habitat Galliam in Sisymbrium Nastursium. Dom. AUBÉ. Mus. SCHH.

Magnitudo *Ceuthorhynchi floralis*, oblongior, magis depressus. Caput parvum, rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, sub-glabrum, fronte leviter impressa; oculi rotundati, modice prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice leviter emarginatus, anterius dimidio angustior quam basi, intra apicem minus profunde constrictus, margine apicali parum elevato; lateribus modice rotundato-ampliatius, basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim crebre punctulatus, basi tenuiter canaliculatus, utrinque vix vel obsoletissime tuberculatus, niger, parum nitidus, dorso parce lateribus et subtus densius albo-squamulosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice sub-trisinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris paulo elevatis, obtuse rotundatis; lateribus haud ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra parum convexa, minus profunde punctato-striata, interstitiis sub-planis, confertim coriaceis; nigra, sub-nitida, parce, sutura lateribusque densius albo-squamosis. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense albo-squamosum. Pedes mediocres, sub-tenues, punctu-

ulati, nigri, parce squamulosi; femoribus parum clavatis, mucicis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 46. C. ERICÆ. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 499. 34. — *P.* Europa borealis et media.

47. C. ALBOSETOSUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 500. 35. — *P.* Gallia.

48. C. POLLIGER. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 500. 36. — *P.* Caffraria.

\* 49. C. SPHÆRION. (*Maerkel.*) — *Ovatus, niger, parum nitidus, squamulis albidis parce adpersus; antennarum basi, tibiis tarsisque rufo-testaceis, rostro longitudine thoracis, confertim ruguloso-punctato; thorace lato, parum convexo, confertim punctulato, obsolete bi-tuberculato, intra apicem constricto; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, rugulosis.*

*Patria*: Saxonia. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

Parvus. *Ceuthorhyncho contracto* nonnihil minor; colore pedum, rostro brevior, ruguloso-punctato, thorace latiore, evidenter punctulato, ab illo facile distinctus. Caput rotundatum, parum convexum, confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, squamulis albidis adpersum; fronte depressa; oculi rotundati, sub-depressi, nigri, sub callo parum elevato locati; rostrum longitudine thoracis, minus tenue, arcuatum, supra sub-planum, confertim ruguloso-punctatum, nigrum, sub-opacum, fere glabrum. Antennæ tenues, basi fusco-testaceæ; clava parva, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica multo brevior, apice utrinque emarginatus, antè nonnihil angustior, intra apicem profunde constrictus, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, confertim evidenter punctulatus, utrinque tuberculo distincto, sub-obtuso instructus; niger, sub-opacus, dorso parce lateribus densius albo-squamosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice leviter sinuata, thoracis basi haud latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus nonnihil rotundato-ampliata, apice singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, obsolete rugulosis; nigra, parum nitida, parce albo-squamulosa. Corpus subtus punctulatum, nigrum, sub-nitidum, densius albo-squamulosum. Pedes mediocres, punctulati, albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, nigris; tibiis tarsisque rufo-testaceis. — BHN.

*Congenerici forte; species mihi invisæ.* (Spec. 50.-55.)

50. C. VARIEGATUS. *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 503. 45. — *P.* Europa.

*Obs.* — In descriptione l. c. femoribus muticis describitur, in tabula vero femoribus dentatis est depictus.

51. C. UMBELLÆ. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 503. 46. — *P.* Carolina.

52. C. TUBER. (*Reich.*) — *Niger; rostro tenui, apice rufo; thorace margine anteriori elevato, sulculo longitudinali ad foveolam in medio baseos lobato, utrinque tuberculato; elytris striatis; femoribus muticis.* — REICH.

*Curculio id.* REICH. *Mant.* p. 7. 3. T. 1. f. 3. — *P.* Germania.

53. C. FOSSARUM. *Reich.* — *H. op.* IV. p. 503. 47. — *P.* Germania.

54. C. MINUTUS. *Reich.* — *H. op.* IV. p. 503. 48. — *P.* Germania.

55. C. PULTIARIUS. *Fourcroy.* — *H. op.* IV. p. 503. 49. — *P.* Gallia.

MANIPULUS II. — *Femora dentata.* (Spec. 56.-156.)

\* 56. C. ECHII. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 504. 50. — *P.* Europa intermedia et meridionalis, Ægyptus.

57. C. GLAUCINUS. (*Waltl.*) — *Breviter ovatus, niger, supra parce inæqualiter lateribus et subtus dense cinereo-albido-squamosus; antennis tarsisque testaceis; thorace dorso sub-plano, subtiliter confertim punctulato, canaliculato, utrinque valide acute tuberculato, antice subito angustato, leviter constricto; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, confertim rugulosis, apice macula nivea ornatis; femoribus valide dentatis.*

*Patria:* Bavaria. Mus. DOM. GERMAR.

*Ceuthorhyncho crucifero* magnitudine æqualis. Caput rotundatum, supra parum convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, opacum, sat dense cinereo-squamulosum, vertice tenuiter carinato, superciliis modice elevatis; oculi rotundati, parum prominuli, brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, sub-compressum, modice arcuatum, subtiliter con-



fertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Antennæ tenues, testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata. Thorax latitudine postica dimidio fere brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus productis, sub-acutis; lateribus a medio apicem versus subito oblique angustatis, posterius sub-rectis; intra apicem leviter constrictus, margine apicali vix elevato; postice leviter bi-sinuatus, supra in dorso subplanus, medio canaliculatus, utrinque tuberculo valido, acuto instructus, undique subtiliter confertim punctulatus, niger, opacus, supra parce lateribus et subtus dense cinereo-albido-squamosus. Scutellum haud observandum. Elytra basi leviter sinuata, tenuiter reflexa, thorace multo latiora, humeris obtuse angulatis, vix elevatis; lateribus ultra medium linearia, dein apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra paulo convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-planis, confertim rugulosis, interstitio nono a sutura seriatim granulato; nigra, opaca, parce inæqualiter lateribus densius cinereo-squamulosa, in ipso apice macula transversa, dense albo-squamosa decorata. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, dense cinereo-albido-squamosum. Pedes elongati, nigri, cinereo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis anticis basi arcuatis; tarsis obscure testaceis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 58. C. RADULA. Schupp. — *H. op.* IV. p. 505. 51. — *P.* Germania.

\* 59. C. HORRIDUS. Fabr. — *H. op.* IV. p. 505. 52. — *P.* Europa intermedia et meridionalis.

\* 60. C. CARINIFRONS. Schh. — *H. op.* IV. p. 506. 53. — *P.* Caffraria.

\* 61. C. VIDUATUS. Gyllenh. — *H. op.* IV. p. 507. 54. — *P.* Europa septentrionalis et intermedia.

\* 62. C. RAPHANI. Fabr. — *H. op.* IV. p. 507. 55. — *P.* Germania.  
STURM, *Ins. Catal.* 1843. p. 223.

63. C. BORRAGINIS. Fabr. — *H. op.* IV. p. 508. 56. — *P.* Gallia.

\* 64. C. LINEATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 509. 57. — *P.* Tauria.

\* 65. C. ABBREVIATUS. Fabr. — *H. op.* IV. p. 510. 58. — *P.* Germania, Caucasus

- \* 66. *C. FATIDICUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 510. 59. — *P. Caucasus*.
- \* 67. *C. CRUCIFER*. Oliv. — *H. op.* IV. p. 511. 60. — *P. Europa septentrionalis*.
- \* 68. *C. AUBÉI*. (Schh.) — *Ovatus, sub-depressus, ater, opacus; tarsis ferrugineis, rostro thorace longiori, confertim punctulato, obsolete carinato; thorace angustiori, confertim punctulato, basi canaliculato; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter crebre alutaceis; cruce baseos minore, apice, macula utrinque laterali corporeque subtus albo-squamosis.*

*Patria* : Gallia ad Paris. Dom. AUBÉ. Mus. SCHH.

Statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi cruciferi*, nonnihil minor, ater; rostro obsolete carinato, thorace angustiore, cruce basali elytrorum minore, ab illo distinctus videtur. Caput subrotundatum, supra modice convexum, confertim ruguloso-punctatum, atrum, sub-opacum, vix squamosum; vertice tenuiter carinato; oculi rotundati, parum convexi, nigri; rostrum thorace nonnihil longius, sub-tenue, arcuatum, confertim ruguloso-punctatum, medio obsolete carinatum, atrum, sub-opacum, glabrum. Antennæ sub-tenues, fusco-ferrugineæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax quam in *Ceuthorhyncho crucifero* angustior, latitudine baseos brevior, apice utrinque leviter emarginatus, anterieus angustior, intra apicem profunde constrictus, margine apicali reflexo, elevato; lateribus modice rotundato-ampliatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim punctulatus, basi tenuiter canaliculatus, ater, opacus, squamulis albidis parce inæqualiter adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice sub-sinuata, thoracis basi latiora, humeris elevatis, obtuse rotundatis; lateribus vix ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra paulo convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, confertim subtiliter alutaceis; atra, opaca, in ipsa basi pone scutellum cruce minore, apice maculaque utrinque laterali niveo-squamosis. Pygidium semi-rotundatum, punctulatum, nigrum, medio linea e squamulis albidis divisum. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, albo-squamosum. Pedes mediocres, validi, punctulati, nigri, inæqualiter albo-squamulosi; femoribus clavatis,

subtus dente valido, acuto armatis; tarsis modice dilatatis, rufo-ferrugineis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 69. C. T-ALBUM. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 512. 61. — *P. Tauria, Hungaria.*

\* 70. C. ANDRÆ. *Germ.* — *Ins. Spec.* p. 220. 9. — *P. Germania, Volhynia.*

*Ceuthorh. ornatus.* SCHH. — *H. op.* IV. p. 513. 62.

71. C. PEREGRINUS. *Chev.* — *H. op.* IV. p. 514. 63. — *P. Sicilia, Barbaria.*

\* VAR.  $\beta$ . Supra cinereo-variegatus, plaga basali, apice maculisque duabus ante medium, una laterali majori, altera in disco parva, niveo-squamosis. — BHN.

*Patria* : Lusitania. DOM. ROSENSCHOELD.

72. C. UROLEUCUS. (*Chevrolat.*) — *Breviter ovatus, niger, supra parce subtus dense albido-squamosus; antennis, tibiis tarsisque obscure testaceis; thorace supra parum convexo, confertim punctulato, canaliculato, utrinque obtuse tuberculato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis alternis planis, alternis atro-tuberculatis cinereoque tessellatis, margine laterali antice sinuatim apiceque dense albo-squamosis.*

*Patria* : Sardinia. MUS. DOM. CHEVROLAT.

Magnitudo et fere statura *Ceuthorhynchi peregrini*; thorace angustiore, intra apicem profundius constricto, elytrorum interstitiis alternis atro-tuberculatis, ut et signaturis aliis, ab illo abunde distinctus. Caput rotundatum, supra modice convexum, confertim punctulatum, atro-squamosum; vertice obsolete carinato, utrinque albo-maculato, superciliis modice elevatis; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, tenuiter striolatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, obscure testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica brevior, apice sub-truncatus, lateribus anterieus angustatus, intra apicem profunde lateque constrictus, margine apicali elevato; supra parum convexus, confertim punctulatus, dorso obsolete canaliculatus, utrinque obtuse tuberculatus, niger, sub-opacus, dorso vix lateribus dense niveo-squamosus. Scutellum vix observandum. Elytra antice sub-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris

obtuse angulatis, vix elevatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus nonnihil angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra paulo convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis atro-tuberculatis et cinereo-tessellatis; nigra, margine laterali ultra medium sinuatim, apice ipso dense niveo-squamosis. Pygidium ovatum, niveo-squamosum, medio carinatum. Corpus subtus punctulatum, nigrum, niveo-squamosum, ventre apicem versus utrinque fusco-vittato. Pedes mediocres, albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, nigris, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis tarsisque testaceis. — BHN.

\* 73. C. LITURA. Fabr. — H. op. IV. p. 515. 64. — P. Europa septentrionalis et intermedia, Sibiria meridionalis.

*Ceuthorh. ovalis.* MARSH. STEPH. — H. op. IV. p. 566. 30. teste DOM. WALTON.

*Ceuthorh. Leucomelas.* DOM. KIRBY in litt.

*Hujus operis* IV. p. 515. 64. (Synonymon *Nedyus Litura* STEPH. deleatur, quoniam ad *Ceuth. trimaculatum* pertinet.)

\* 74. C. TRIMACULATUS. Fabr. — H. op. IV. p. 516. 65. — P. Germania, Anglia, Lusitania.

*Nedyus Litura.* STEPH. Brit. Ent. IV. p. 34. 19.

\* 75. C. TRISIGNATUS. Schh. — H. op. IV. p. 516. 66. — P. Tauria.

\* 76. C. ALBOSIGNATUS. Dahl. — H. op. IV. p. 517. 67. — P. Gallia.

\* 77. C. MELANCHOLICUS. Schh. — H. op. IV. p. 518. 68. — P. Tauria.

\* 78. C. ASPERIFOLIARUM. Kirby. — H. op. IV. p. 519. 69. — P. Anglia, Germania, Austria, Suecia.

*Ceuthorh. congener.* SCHÜPF. GERMAR. — H. op. IV. p. 567. 136.

79. C. LEPIDUS. Schh. — H. op. IV. p. 520. 70. — P. Alsacia.

\* 80. C. ULIGINOSUS. (Walton.) — *Ovatus, sub-depressus, niger, subopacus, subtus albo-squamosus; antennis, tibiis tarsisque rufo-tes-*

*taceis; thorace transverso, antice profunde constricto, utrinque tuberculato, basi canaliculato; elytris mediocriter punctato-striatis, plaga communi basos fasciaque abbreviata, obliqua, laterali ante medium, albo-squamosis.*

*Patria: Anglia. Dom. WALTON. Mus. SCHH.*

Affinis certe *Ceuthorhynchi lepidi*, nonnihil major, oblongior, aliter coloratus; thorace acutius tuberculato, elytris profundius punctato-striatis, fascia laterali aliter locata, ab illo differt. Caput rotundatum, supra modice convexum, confertim ruguloso-punctatum, nigrum, opacum, squamulis albidis parce adpersum; vertice tenuiter carinato; oculi rotundati, parum convexi, nigro-brunnei; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, sub-tenuè, teres, arcuatum, confertim punctulatum, obsolete carinatum, nigrum, parum nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenuès, rufo-testaceæ; clava obscuriore. Thorax latitudine postica brevior, antice dimidio angustior quam basi, apice leviter emarginatus, pone apicem profunde constrictus, margine apicis elevato; lateribus pone stricturam subito ampliatis et in ipso margine tuberculo sat valido, sub-acuto instructis; basi sub-truncatus, elevato-marginatus, supra modice convexus, confertim subtiliter punctulatus, basi leviter canaliculatus; niger, sub-opacus, parce inæqualiter albido-squamulosus. Elytra antice sub-truncata, elevato-marginata, thorace nonnihil latiora, humeris fere rectangularis, callo elevato instructis; lateribus non ampliata, apice singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra parum convexa, evidenter striata et in striis punctulata, interstitiis sub-convexis, confertim coriaceis; nigra, opaca, squamulis cervinis parce adpersa; in ipsa basi vitta suturali antice lineola brevi adnexa et ante medium marginis lateralis fascia obliqua, niveo-squamosis. Corpus subtus punctulatum, nigrum, dense albo-squamosum. Pedes longiusculi, minus tenuès, punctulati; femoribus nigris, subtus dente parvo armatis; tibiis tarsisque rufo-testaceis. — BRN.

\* 81. C. URTICÆ. (Walton.) — *Ovatus, niger, opacus, supra parce inæqualiter, subtus dense albo-squamosus; antennarum basi tarsisque rufo-testaceis; thorace transverso, confertim evidenter punctulato, obsolete bi-tuberculato, dorso canaliculato, intra apicem constricto; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, confertim coriaceis.*

*Patria* : Anglia. Dom. WALTON. Mus. SCHH.

*Magnitudo et statura Coeliodis didymi.* Caput rotundatum, supra modice convexum, confertim punctulatum, nigrum, squamulis albidis adpersum; vertice tenuiter carinato; oculi laterales, rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenuis, teres, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, basi parce albo-squamulosum. Antennæ sub-tenuis, basi ferrugineæ, extrorsum nigrae; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, antice dimidio angustior quam basi, intra apicem constrictus, margine apicali modice elevato; lateribus pone stricturem rotundato-amplius, postice sub-truncatus, reflexo-marginatus, supra modice convexus, confertim evidenter punctulatus, dorso tenuiter canaliculatus, utrinque obsolete tuberculatus, niger, sub-opacus, squamulis albidis parce inæqualiter adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum. Elytra antice sub-trisinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis angustis, sub-convexis, confertim coriaceis; nigra, opaca, squamulis albidis parce inæqualiter adpersa. Corpus subtus punctulatum, nigrum, dense albo-squamosum. Pedes mediocres, validi, punctulati, nigri, parce squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente brevi, obtuso armatis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis modice dilatatis, rufo-testaceis, subtus brunneo-spongiosis.

BHN.

\* 82. C. ABRUPTESTRIATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 521. 71. — *P.* Tauria.

\* 83. C. SIGNATUS. Dahl. — *H. op.* IV. p. 522. 72. — *P.* Hungaria, Germania, Austria.

84. C. SAHLBERGI. (Schh.)—*Niger, sub-depressus, squamulis albidis supra variegatus, subtus omnino tectus; thorace obsolete quadrituberculato; femoribus obsolete dentatis; tibiis tarsisque piceo-ferrugineis.*

*Rhynchenus Lamii.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 96. 122.

*Patria* : Tavastia Finlandiæ.

*Statura Ceuthorrh. Lituræ, sed multo minor. Caput rotundatum, retractum, nigrum, crebre punctulatum, squamis angustis, cinereis parcius obtectum. Oculi parvi, oblongi, brunneo-nigri. Rostrum longitudine capitis cum thorace, arcuatum, nigrum, punctulatum, ad basin parce squamulosum. Antennæ rostro cum capite paulo longiores, piceo-nigræ; clava ovata, griseo-pubescente. Thorax antice contractus, postice longitudine paulo latior, sub-bi-sinuatus, lateribus parum rotundatus, supra sub-depressus, antice transversim impressus, margine elevato, reflexo; versus latera utrinque obsolete bi-tuberculatus, crebre punctulatus, dorso niger, macula ad scutellum parva, albo-squamosa; lateribus squamulis albidis dense tectus, macula majori denudata, nigra. Scutellum minutum, immersum, nigrum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, illoque plus quam duplo longiora, posterius parum angustata, apice singulatim sub-rotundata, supra sub-depressa, tenue striata, striis obsolete punctatis, interstitiis planis, subtiliter coriaceis; nigra, linea suturali sat lata et fascia transversa adhuc latiori, ad marginem valde dilatata, albido-squamosis, magnam formantibus crucem, in cujus centro lineola longitudinalis, nigro-fusca, tum lineam suturalem quam fasciam transversam interrumpens, conspicitur, maculisque præterea duabus in utroque, altera pone humerum majori, transversa, altera apicali minori, itidem albo-squamosis notata. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, dense albido-squamosum. Pedes mediocres; femoribus obsoletius dentatis, nigris, ante apicem impressis, extrorsum albo-squamulosis; tibiis extrorsum versus apicem denticulo instructis, tarsisque piceo-ferrugineis. — SAHLB.*

\* 85. *C. CAMPESTRIS. Ziegl. — H. op. IV. p. 523. 73. — P. Austria, Bavaria, Lotharingia.*

\* 86. *C. DECORATUS. Schh. — H. op. IV. p. 524. 74. — P. Tauria.*

\* 87. *C. MOLITOR. Schh. — H. op. IV. p. 525. 75. — P. Sicilia.*

\* 88. *C. CHRYSANTHEMI. Muller. — H. op. IV. p. 526. 76. — P. Tauria, Germania, Anglia.*

*Rhynchaen. id. SAHLB. Ins. Fenn. II. p. 101. 31.*

\* 89. *C. FIGURATUS. Schh. — H. op. IV. p. 526. 77. — P. Suecia meridionalis.*

\* 90. *C. RUGULOSUS. Herbst. — H. op. IV. p. 527. 78. — P. Suecia, Germania, Anglia, Gallia.*

*Rhynchæn id.* SAHLB. *Ins. Fennica*. II. p. 100. 130.

(*Ceuthorh. melanostigma et cinereus.* MARSH. — *Scutellatus.* STEPH. — *H. op.* IV. p. 587. n. 132, 133, 134. Eadem species, teste DOM. WALTON. — An?)

*Hujus operis* IV. p. 527. 78. Synonymon *Nedyus rugulosus* STEPH. *Br. Ent.* deletur, quoniam ad *C. melanostictum*, n. 96, pertinet.)

91. *C. GALLICUS.* Chev. — *H. op.* IV. p. 528. 79. — *P. Gallia ad Paris.*

\* 92. *C. MENDOSUS.* Chev. — *H. op.* IV. p. 529. 80. — *P. Gallia, Tauria.*

\* 93. *C. OCCULTUS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 530. 81. — *P. Gallia meridionalis.*

94. *C. CONCINNUS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 531. 82. — *P. Gallia ad Paris.*

\* 95. *C. ARQUATA.* Herbst. — *H. op.* IV. p. 532. 83. — *P. Germania.*

\* 96. *C. MELANOSTICTUS.* Marsh. — *H. op.* IV. p. 532. 84. — *P. Anglia, Germania.*

*Nedyus rugulosus.* STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 35. 25. — Huc pertinet, teste DOM. WALTON.

97. *C. TRIANGULUM.* (Maerkel.) — *Oblongo-ovatus, sub-convexus, niger, opacus, subtus dense cretaceo-squamosus; antennis, tibiis tarsisque obscure testaceis; thorace sub-transverso, bi-tuberculato, antice evidenter constricto, vitta dorsali lateribusque albo-squamosis; elytris mediocriter punctato-striatis, squamositate albida dense variegatis, sutura antice fasciaque arcuata, media cum sutura connexa, densius albido-squamosis, ornatis.*

*Patria* : Saxonia. Mus. Dom. GERMAR.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi arquatae*; thorace antice profundius constricto, elytris magis albo-variegatis, tibiis tarsisque obscurioribus, ab illo differre videtur. Caput parvum, modice convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, opacum, minus dense albo-squamulosum; oculi rotundati, convexi, glauci; rostrum longitudine capitis cum thorace,



sub-tenue, teres, valde arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, opacum, fere glabrum. Antennæ sub-tenues, obscure testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica brevior, apice sub-truncatus, anterius multo angustior, intra apicem sat profunde constrictus, lateribus pone stricturam obliquis, versus basin ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, utrinque tuberculo obtuso instructus, niger, sub-opacus, vitta media lateribusque dense niveo-squamosis. Scutellum demersum, haud observandum. Elytra antice leviter sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtuse angulatis, haud elevatis; lateribus vix ampliata, apicem versus nonnihil angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, confertim rugulosis; nigra, sub-opaca, dense albo-variegata, sutura basi arcuata ante medium cum sutura connexa, adhuc densius albo-squamosa, sutura medio nigro-interrupta. Corpus subtus punctulatum, nigrum, dense niveo-squamosum. Pedes mediocres, albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, acute dentatis, nigris; tibiis tarsisque obscure testaceis. — BHN.

\* 98. C. LYCOPI. Chevr. — *H. op.* IV. p. 533. 85. — *P.* Gallia ad Paris.

\* 99. C. PERTURBATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 534. 86. — *P.* Gallia ad Paris.

\* 100. C. QUADRIDENS. Panzer. — *H. op.* IV. p. 534. 87. — *P.* Europa borealis et intermedia.

*Rhynchænus id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 98. 125.

ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 177. 25.

*Ceuth. pallididactylus.* MARSH. — *H. op.* IV. p. 536. 89. ♂ teste DOM. WALTON.

*Nedyus quercicola.* STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 35. 23. ♀.

\* 101. C. RESEDÆ. Marsh. — *H. op.* IV. p. 535. 88. — *P.* Anglia, Gallia.

\* 102. C. RUBICUNDULUS. (Schh.) — *Sub-ovatus, nigro-piceus, supra parce subtus dense pallescenti-squamosus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; thorace confertim punctato, profunde canalicu-*

*lato, utrinque tuberculato, intra apicem profunde constricto, margine apicali elevato, postice profunde bi-sinuato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, postice muricatis, medio rufo-ferrugineis, ibique cum apice albido-squamulosis.*

*Patria* : Insula Rhodos. DOM. HEDENBORG. Mus. Reg. Acad. Holm.

Magnitudo et fere statura *Ceuthorhynchi Resedæ*, aliter coloratus; thorace angustiore, elytris apice muricatis, sutura basi non albo-squamosa, ab illo bene distinctus. Caput majusculum, rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, opacum, parce cinereo-squamulosum; vertice leviter carinato; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, modice arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, denudatum. Antennæ sub-tenuæ, obscure ferruginæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique truncatus, anterieus angustior, intra apicem late et sat profunde constrictus, margine apicali sat alte elevato; lateribus pone stricturam sub-rectis; basi profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim punctulatus, dorso evidenter canaliculatus, utrinque tuberculo sub-obtuso instructus; niger, sub-opacus, lateribus et subtus dense pallescenti-squamosus. Scutellum parvum, vix conspicuum. Elytra antice sub-tri-sinuata, thoracis basi dimidio fere latiora, humeris elevatis, obtuse angulatis, lateribus non ampliata, pone medium apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, apicem versus muricatis; nigro-picea, medio obscure ferruginea, ibique et apicem versus pallido-squamosa. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, pallido-squamosum. Pedes longiusculi, rufo-ferruginei, parce squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente parvo armatis; tibiis anticis basi nonnihil arcuatis. — BHN.

\* 103. C. MURINUS. *Schl.* — *H. op.* IV. p. 537. 90. — *P.* Tauria.

\* 104. C. MARGINATUS. *Schl.* — *H. op.* IV. p. 538. 91. — *P.* Suecia, Gallia.

\* 105. C. PUNCTIGER. *Megerle.* — *H. op.* IV. p. 538. 92. — *P.* Europa intermedia et borealis, Tauria, Dauria.

*Rhynchaen. id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 97. 125.

- \* 106. *C. RUFITARSIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 539. 93. — *P. Tauria*.
107. *C. PILOSELLUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 540. 94. — *P. Gallia*.
- \* 108. *C. QUERCICOLA*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 540. 95. — *P. Europa intermedia et borealis*.
- Rhynchænus id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 100. 129.
- \* 109. *C. DENTICULATUS*. Schrank. — *H. op.* IV. p. 541. 96. — *P. Gallia, Podolia, Tauria, Caucasus*.
- \* 110. *C. NIGRIROSTRIS*. (Sturm.) — *Ovatus, sub-convexus, niger, squamulis albidis inæqualiter adpersus; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis, rostro longitudine fere thoracis cum capite, arcuato, punctulato; thorace transverso, confertim punctulato, bi-tuberculato, intra apicem profunde constricto; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis alutaceis, fascia utrinque media obsoleta apiceque albo-squamosis; tibiis anterioribus basi arcuatis.*

*Patria* : Germania. DOM. STURM. MUS. SCHH. A DOM. GERMAR ad conferendum etiam missus.

Statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi Urticæ*; tibiis anterioribus basi arcuatis, cum tarsis rufo-ferrugineis, elytris medio fascia obsoleta, albida decoratis, ab illo tamen distinctus. Caput rotundatum, modice convexum, confertim punctulatum, nigrum, opacum, squamulis albidis parce adpersum; oculi rotundati, parum convexi, nigri; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, rufo-ferrugineæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriori. Thorax latitudine postica brevior, apice utrinque leviter emarginatus, antice dimidio angustior quam basi, intra apicem profunde constrictus, margine apicali reflexo, elevato; lateribus pone stricturam rotundato-ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim punctulatus, dorso obsolete canaliculatus, utrinque tuberculo obtuso instructus, niger, sub-opacus, squamulis albidis parce inæqualiter adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum. Elytra antice sub-sinuata, tenue reflexo-marginata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris paulo elevatis, obtuse rotundatis; lateribus nonnihil rotundato-ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice

convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, confertim alutaceis; nigra, opaca, squamulis albidis parce inæqualiter adpersa, in medio singuli elytri fascia transversa plus minusve distincta, albo-squamosis. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, densius inæqualiter albo-squamulosum. Pedes mediocres, validi, punctulati, albo-squamulosi; femoribus nigris, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis rufo-testaceis, anterioribus basi arcuatis, tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 111. *C. VERRUCATUS*. Steven. — *H. op.* IV. p. 541. 97. — *P. Tauria*.

\* 112. *C. BIGUTTATUS*. (*Waterhous.*) — *Ovatus, sub-depressus, niger, opacus, supra fusco- subtus dense albido-squamosus; tibiis tarsisque testaceis; thorace antice obsolete constricto, margine apicis parum elevato, lateribus utrinque tuberculo acuto armato; elytris anguste striatis, squamulis albidis posterius parce adpersis, sutura basi apiceque macula albo-squamosa notata.*

*Patria* : Anglia. Dom. WALTON. Mus. SCHH.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi verrucati*; thorace antice minus constricto, margine apicali parum elevato, elytris apice non muricatis, ab illo facile distinctus. Caput rotundatum, supra modice convexum, confertim punctulatum, nigrum, fusco-squamosum, in vertice carinula brevi instructum; fronte leviter impressa; oculi demissi, rotundati, parum prominuli, brunnei, sub callo elevato locati; rostrum thorace nonnihil longius, minus tenue, cylindricum, arcuatum, punctulatum, nigrum, opacum, parce squamulosum. Antennæ tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, intra apicem late sed parum profunde transversim impressus, margine apicis parum elevato; lateribus pone stricturam rotundato-amplius, basi leviter bi-sinuatus, elevato-marginatus, supra parum convexus, basi canaliculatus, in utroque latere tuberculo obtuso instructus, undique subtiliter punctulatus, niger, opacus, squamositate tenuissima, fusca adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice sub-truncata, elevato-marginata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtuse angulatis, elevato-callosis; lateribus vix ampliata, apice singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra parum convexa, tenuiter striata, striis obsolete punctulatis, interstitiis planis, confertissime

alutaceis; nigra, opaca, squamositate tenui, fusca, posterius squamulis raris, albidis mixtis obsita; pone basin suturæ macula communis, oblonga, dense albido-squamulosa, et in ipso apice alia parva ejusmodi. Corpus subtus punctulatum, nigrum, dense albo-squamosum. Pedes mediocres, cinereo-squamulosi; femoribus parum crassis, nigris, apice testaceis, subtus dente parvo armatis; tibiis tarsisque testaceis. — BHN.

\* 113. C. PRUNI. (Sturm.) — *Ovatus, niger, opacus, sub-depressus, subtus dense albido-supra parce fusco-squamulosus; fronte plana; thorace punctulato, antice augustiore, constricto, lateribus obliquis, in dorso sulco sat profundo, medio sub-interrupto et versus latera utrinque tuberculo conico instructo; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis confertim coriaceis, macula suturali baseos postice holosericeo-atra, altera apicis albo-squamosis, ornatis.*

*Patria*: Germania. Dom. STURM. MUS. SCHH. Lusitania. Dom. ROSENSCHOELD. Mus. Reg. Holm.

*Ceuthorhyncho denticulato proximus, nonnihil minor, aliter coloratus; elytris apice non muricatis ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, supra modice convexum, confertim punctulatum, nigrum, opacum, squamulis fuscis adpersum; fronte plana; oculi rotundati, parum convexi, nigri; rostrum longitudine fere capitatis cum thorace, sub-tenui, teres, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, fere glabrum. Antennæ sub-tenui, nigrae, parce pilosæ. Thorax latitudine brevior, apice utrinque leviter emarginatus, anterieus angustior, intra apicem transversim impressus, margine apicis sat alte elevato, lateribus obliquis, rectis; basi leviter bi-sinuatus, elevato-marginatus, supra parum convexus, sulco dorsali minus profundo, in medio sub-interrupto, exaratus, et versus latera utrinque tuberculo parvo, conico instructo, confertim punctulatus, niger, opacus, fusco-squamulosus. Elytra antice sub-sinuata, elevato-marginata, thoracis basi nonnihil latiora, callo humerali sat rotundato, elevato; lateribus pone medium nonnihil angustata, apice singulatim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso parum convexa, distincte sed parum profunde punctato-striata, striis obsolete crenulatis, interstitiis latis, planis, confertim alutaceis, versus apicem subtiliter muricatis; nigra, opaca, fusco-squamulosa, basi macula parva, albo-squamosa, altera atro-holosericea adjecta, et in apice suturæ lineæ duæ parallelæ etiam albo-squamosæ. Pygidium apice rotundatum,*

punctulatum, nigrum, fusco-squamulosum. Corpus subtus punctulatum, dense albo-squamosum. Pedes validi, punctulati, nigri, tenuiter albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tarsis modice dilatatis, fusco-ferrugineis.

BHN.

\* 114. C. HEDENBORGI. (Schh.) — *Breviter ovatus, niger, supra vix subtus sat dense cinereo-squamulosus; fronte profunde canaliculata; thorace brevi, lato, supra modice convexo, confertim punctulato, dorso profunde lateque canaliculato, utrinque valide acute tuberculato, intra apicem late profunde constricto, margine apicali alte elevato; elytris inæqualibus, tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim coriaceis, apice ipso nonnihil muricatis; sutura apice albo-squamulosa.*

*Patria* : Insula Rhodos. DOM. HEDENBORG. Mus. Reg. Holm.

*Ceuthorhynchi Pruni* certe affinis, illo nonnihil major, parcius squamosus; fronte profunde canaliculata, thorace utrinque valide acute tuberculato, intra apicem profunde impresso; elytris tenuiter punctato-striatis, sutura basi immaculata, ab illo facile distinctus. Caput rotundatum, supra modice convexum, confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, vix squamosum; vertice leviter carinato; fronte profunde canaliculata; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, teres, arcuatum, confertim ruguloso-punctatum, nigrum, sub-opacum, glabrum. Antennæ sub-tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica multo brevior, apice oblique sub-truncatus, anterieus angustior, intra apicem profunde lateque impressus, margine apicali alte elevato; lateribus pone stricturam obliquis, versus basin nonnihil ampliatis; postice bi-sinuatus, supra paulo convexus, confertissime subtiliter punctulatus, dorso profunde lateque canaliculatus, utrinque tuberculo valido, acuto instructus; niger, parum nitidus, parce cinereo-squamulosus. Scutellum vix observandum. Elytra antice leviter sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, inæqualia, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter confertim coriaceis, apicem versus parce muricatis; nigra, sub-opaca, vix squamosa, sutura apice albo-squamosa. Corpus subtus punctula-

tum, nigrum, cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, nigri, parce squamulosi; femoribus parum clavatis, subtus dente acuto armatis; tibiis rectis, basi tenuioribus; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 115. *C. RUSTICUS*. Chevrol. — *H. op.* IV. p. 542. 98. — *P.* Europa meridionalis, Insula Rhodos.

\* 116. *C. POLLINARIUS*. Forster. — *H. op.* IV. p. 543. 99. — *P.* Anglia, Gallia, Suecia meridionalis.

*Ceuthorhynchus caliginosus*. STEPH. — *H. op.* IV. p. 566. 131. Eadem species, teste Dom. WALTON.

117. *C. ANGULOSUS*. (Germar.) — *Ovatus, niger, dense cinereo-squamulosus; antennis, tibiis tarsisque testaceis, rostro minus tenui, sub-compresso; thorace angustiore, sub-conico, confertim punctulato, tenuiter canaliculato, utrinque tuberculato, intra apicem obsolete constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis parum convexis; femoribus dente minuto instructis.*

*Patria* : Saxonia. Mus. Dom. GERMAR.

Magnitudo *Ceuthorhynchi pollinarii*, undique dense squamosus; thorace longiore, angustiore, sub-conico, ab illo distinctus. Caput rotundatum, supra parum convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamosum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, minus tenue, sub-compressum, arcuatum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, fere glabrum. Antennæ subtenuis, obscure testaceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica haud brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, anterieus angustior, intra apicem vix constrictus, lateribus obliquis, versus basin sensim ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, dorso tenuiter canaliculatus, utrinque tuberculo parvo, acuto instructus; niger, dense cinereo-squamosus. Scutellum parvum, haud conspicuum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris parum elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis parum convexis, subtiliter coriaceis; nigra, undique dense cinereo-squamosa. Corpus subtus

confertim punctulatum, nigrum, dense cinereo-albido-squamosum. Pedes longiusculi, cinereo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis; tibiis tarsisque obscure testaceis. — BHN.

\* 118. C. HUMERALIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 544. 100. —  
P. Persia occidentalis.

FALDERM. *Faun. Ent. Transcauc.* II. p. 248. 466. — III. p. 205.

\* 119. C. OBSOLETUS. Germar. — *H. op.* IV. p. 544. 101. —  
P. Borussia, Germania, Tauria.

120. C. FÆCULENTUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 545. 102. —  
P. Gallia.

\* 121. C. PICITARSIS. Steven. — *H. op.* IV. p. 546. 103. —  
P. Tauria, Helvetia.

*Obs.* — In diagnosi et descriptione, loco citato, ut glaber describitur, revera parce pilosus est.

\* 122. C. TIBIALIS. (Schh.) — *Ovatus, niger, sub-nitidus, supra tenuiter albo-pubescentis, subtus squamosus; antennarum basi, tibiis tarsisque rufo-testaceis; thorace confertim punctulato, intra apicem profunde constricto, dorso obtuse obsolete bi-tuberculato, canaliculato; elytris cærulescentibus, mediocriter punctato-striatis, interstitiis confertim alutaceis; femoribus breviter dentatis.*

*Patria* : Germania meridionalis. DOM. SCHUPPEL. MUS. SCHH.

Statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi picitarsis*, nonnihil minor; thorace subtilius punctulato, evidenter canaliculato, femoribus obsoletius dentatis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum; fronte leviter impressa; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenuæ, nigræ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice late sed parum profunde emarginatus, antice dimidio angustior, intra apicem sat profunde transversim impressus, margine apicali alte elevato; lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim punctulatus, dorso canaliculatus, utrinque obtuse tuberculatus,



niger, sub-nitidus, squamulis albidis parce adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice singulatim obtuse rotundata, thoracis basi latiora, humeris obtuse angulatis, nonnihil elevatis; lateribus vix ampliata, apice etiam singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, medio-criter punctato-striata, interstitiis planis, confertim alutaceis; nigro-cærulescentia, nitida, apice obsolete muricata, squamulis parvis, albidis adpersa. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, parce albo-squamulosum. Pedes longiusculi, sub-tenues; femoribus parum crassis, subtus dente parvo, obsolete armatis; tibiis tarsisque ferrugineis. — BHN.

*Obs.* — Secundum Dom. SCHUPPEL, color pedum in hac specie valde variabilis; tibiis cum tarsis vel totis rufo-ferrugineis, vel nigris, apice tantum cum tarsis ferrugineis, interdum nigris, tarsis solum ferrugineis.

\* 123. *C. SULCICOLLIS*. Gyllenh. — *H. op.* IV. p. 546. 104. —  
P. Europa intermedia et septentrionalis; Ægyptus.

*Rhynchænus id.* SAHLB. *Ins. Fennica.* II. p. 99. 126.

*Ceuthorhynchus affinis.* STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 26. 16. Iluc pertinet, teste Dom. WALTON.

*Cœliodes affinis.* Huj. *op.* IV. p. 307. 31.

\* 124. *C. AXILLARIS*. (Schh.) — *Ovatus, convexus, niger, parum nitidus, subtus albo- supra vix cinereo-squamosus; thorace lato, intra apicem profunde constricto, obsolete bi-tuberculato; elytris sat profunde sub-sulcatis, interstitiis rugulosis, apice muricatis; humeris lateraliter extensis, obtusis, granulatis.*

*Patria:* Dauria. Dom. SEDAHOFF. Mus. SCHH.

*Ceuthorhyncho sulcicollis* proximus, illo nonnihil major, parum nitidus; thorace latiore, intra apicem profundius constricto, margine apicali magis elevato, obsoletius punctulato, humeris lateraliter extensis, granulatis, ab illo facile dignoscitur. Caput rotundatum, supra modice convexum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, nigrum, sub-opacum, vix squamosum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, subtilissime punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica multo brevior, apice oblique truncatus, antè nonnihil angustior, in-

tra apicem late profunde constrictus, margine apicali alte elevato; lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis; basi leviter bisinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra parum convexus, obsolete crebre punctulatus, utrinque tuberculo obsoleto instructus; niger, parum nitidus, vix squamosus. Scutellum parvum, haud conspicuum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtusis, lateraliter nonnihil extensis, subtiliter granulatis; lateribus non ampliata, pone medium nonnihil angustata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, sat profunde sulcata et in sulcis obsolete punctata, interstitiis planis, confertim punctulatis, apicem versus muricatis; nigra, sub-opaca, apicem versus parce cinereo-squamulosa. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sat dense albo-squamulosum. Pedes mediocres, nigri, minus dense albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente minuto armatis; tibiis rectis, basi tenuioribus; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 125. C. RAPÆ. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 547. 105. — *P. Gallia, Germania, Suecia, Tauria.*

*Rhynchæn. sulcicollis*, var.  $\beta$ . SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 99. 126.

\* 126. C. WALTONI. (Schh.) — *Ovatus, niger, sub-nitidus, supra glaber, subtus albo-squamosus; tarsis rufo-ferrugineis, rostro thorace nonnihil longiori, arcuato, subtiliter punctulato; thorace angustiore, sat crebre punctulato, dorso postico leviter impresso, medio utrinque obtuse tuberculato, intra apicem profunde constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis confertim alutaceis, margine apicali anguste ferrugineis.*

*Ceuthorhynchus rufitarsis*. DOM. KIRBY, in litt.

*Patria* : Anglia. DOM. WALTON. Mus. SCHH.

*Ceuthorhyncho sulcicollis* duplo minor, aliter coloratus; elytris apice non muricatis. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, glabrum; oculi rotundati, modice convexi, brunnei; rostrum thorace nonnihil longius, tenue, teres, arcuatum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenues, piceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, obscuriori. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice late leviter emarginatus, antice dimidio angustior quam basi, intra apicem profunde constrictus, late-

ribus modice rotundato-ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, evidenter sat crebre punctulatus, basi leviter impressus, dorso utrinque tuberculo parum elevato instructus, niger, sub-nitidus, glaber. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice leviter sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis sub-planis, confertim alutaceis; nigra, sub-nitida, margine apicali anguste ferruginea. Corpus subtus confertim punctulatum, parce albo-squamulosum. Pedes mediocres, sub-tenues, punctulati; femoribus modice clavatis, subtus dente obsoleto armatis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis modice dilatatis, rufo-ferrugineis, subtus cinereo-spongiosis. — BHN.

127. C. ROBERTI. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 548. 106. — P. Belgia.

\* 128. C. PUNCTICOLLIS. (*Schh.*) — *Ovatus*, modice convexus, niger, sub-nitidus, parce cinereo-albido-squamosus; rostro basi striolato-rugoso; thorace transverso, canaliculato, bi-tuberculato, rude punctato, intra apicem profunde constricto, margine antico alte elevato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim subtiliter granulatis, postice muricatis.

*Patria* : Caucasus. DOM. STEVEN. MUS. SCHH.

*Ceuthorhyncho Roberti* proximus, nonnihil minor, præsertim brevior; thorace latiori, intra apicem profundius constricto, margine apicali magis elevato, supra rude punctato, elytrorum interstitiis evidenter granulatis, ab illo bene distinctus. Caput rotundatum, modice convexus, confertim rugoso-punctatum, nigrum, sub-nitidum, parce squamulosum; fronte leviter impressa, vertice tenuiter carinato; rostrum longitudine thoracis cum capite, tenue, cylindricum, arcuatum, supra basi striolato-punctatum, extrorsum sub-læve, nitidum, glabrum. Antennæ longiusculæ, sub-tenues, nigrae; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine baseos multo brevior, antice duplo angustior quam basi, apice leviter emarginatus, pone apicem profunde lateque constrictus, margine apicis alte elevato; lateribus pone stricturam subito rotundato-ampliatis, dein sub-rectis, utrinque tuberculo valido, obtuso instructis; basi bi-sinuatus, tenue elevato-marginatus, supra parum convexus, in medio dorsi sat profunde canaliculatus, undique rude punctatus, niger, sub-nitidus, parce

albo-squamulosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra antice sub-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtuse angulatis, callo oblongo, elevato instructis; lateribus non ampliata, apice singulatim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, confertim subtiliter granulatis, versus apicem muricatis; nigra, parum nitida, parce squamulosa. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, sat dense albido-squamosum. Pedes mediocres, punctulati, nigri, albido-squamulosi et pubescentes; femoribus sub-clavatis, subtus breviter dentatis; tibiis teretibus, sub-rectis, basi tenuioribus. — BHN.

\* 129. C. NAPI. Koch. — *H. op.* IV. p. 549. 107. — *P.* Germania.

\* 130. C. INAPPECTATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 550. 108. —  
*P.* Tauria, Paris.

131. C. GLABRIROSTRIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 550. 109 —  
*P.* Paris.

\* 132. C. SOPHÆ. Steven. — *H. op.* IV. p. 551. 110. — *P.* Tauria.

\* 133. C. NEUTRALIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 552. 111. — *P.* Borussia.

\* 134. C. MISELLUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 553. 42. — *P.* Caucasus.

\* 135. C. OBTUSICOLLIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 554. 113. —  
*P.* Tauria.

\* 136. C. ÆNEICOLLIS. Megerle. — *H. op.* IV. p. 555. 114. —  
*P.* Austria.

\* 137. C. SCAPULARIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 555. 115. —  
*P.* Helvetia, Paris.

138. C. OBSCURECYANEUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 556. 116. —  
*P.* Paris.

\* 139. C. MELANOCYANEUS. (Schh.) — *Ovatus, modice convexus, niger, sub-nitidus, subtus parce cinereo-squamosus; thorace canaliculato, profundius punctato, bi-tuberculato, intra apicem late constricto, margine apicali parum elevato; elytris obscure cyaneis,*

*sat profunde punctato-striatis, interstitiis parum convexis, rugulosis, postice subtiliter muricatis.*

*Patria* : Gallia meridionalis. Dom. CHEVROLAT. Mus. SCHH.

Magnitudo, statura et similitudo *Ceuthorhynchi obscurecyanei*; thorace evidenter remotius punctato, elytris postice muricatis, ab illo differre videtur. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, opacum, vix squamulosum; fronte subplana; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, subtilissime punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, nigrae, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique truncatus, antè angustior, intra apicem late sed parum profunde constrictus, margine apicali modice elevato; lateribus pone stricturnam rotundato-ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, sat profunde et crebre punctatus, dorso tenuiter canaliculatus, utrinque tuberculo sub-obtuso instructus; niger, subopacus, vix squamosus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi latiora, humeris nonnihil elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra paulo convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis confertim rugulosis, apicem versus subtiliter muricatis; obscure cyanea, parum nitida. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, parce cinereo-squamulosum. Pedes elongati, nigri; femoribus parum clavatis, subtus dente obsoleto armatis. — BHN.

\* 140. C. IGNITUS. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 568. 138. — *P. Germania, Sibiria orientalis.*

*Ceuthorhynchus viridanus.* *H. op.* IV. p. 557. 117.

GEBLER, *Addit. ad Catal. Col.* II. p. 32.

\* 141. C. CYANIPENNIS. *Illiger.* — *H. op.* IV. p. 558. 118. — *P. Suecia intermedia et borealis, Finlandia*

*Rhynchænus id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 99. 127.

142. C. TARSALIS. (*Maerkel.*) — *Ovatus, niger, sub-nitidus, supra vix subtus parce albido-squamosus; antennis basi tarsisque testaceis; thorace confertim evidenter punctulato, dorso obsolete cana-*

*liculato, utrinque tuberculato, intra apicem constricto, margine apicali elevato, ante scutellum lineola parva e squamulis albidis; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, seriatim punctulatis, apice muricatis, sutura basi albo-squamosa.*

*Patria* : Saxonia. Mus. Dom. GERMAR.

*Ceuthoryncho cyanipenni proximus, minus convexus; elytris vix cyaneis, tenuiter punctato-striatis, apice ipso tantum muricatis, ut et tarsi testaceis, ab illo differt. Caput rotundatum, supra parum convexum, confertim punctulatum, nigrum, opacum, vix squamosum; oculi rotundati, convexi, nigri; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ tenues, basi testaceæ, extrorsum nigrae, parce pilosæ; clava ovata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, antè multo angustior, intra apicem late et profunde constrictus, margine apicali sat elevato; lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, evidenter sat crebre punctulatus, dorso obsolete canaliculatus, utrinque tuberculo parum elevato instructus; niger, parum nitidus, ante scutellum lineola brevi, albo-squamosa decoratus. Scutellum vix conspicuum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, seriatim punctulatis, apicem versus muricatis; nigra, vix cyaneo-micantia, sub-nitida, sutura basi albo-squamosa. Corpus subtus punctulatum, nigrum, albo-squamulosum. Pedes mediocres, nigri, punctulati, parce albo-squamulosi; femoribus parum clavatis, subtus obsolete dentatis; tarsi angustis, testaceis.*

BHN.

\* 143. C. SITTRELLUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 558. 119. —  
P. Tauria.

\* 144. C. CARINATUS. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 559. 120. —  
P. Tauria.

\* 145. C. CHATYBEUS. *Germ.* — *H. op.* IV. p. 560. 121. — P. Ger-  
mania, Gallia, Tauria.

\* 146. *C. BIRTULLUS*, Schüppel. — *H. op.* IV. p. 560. 122. — *P. Europa intermedia et borealis.*

*Rhynchæn. id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 99. 128.

147. *C. SETIFERUS*, Schh. — *H. op.* IV. p. 560. 123. — *P. Caput Bonæ Spei.*

148. *C. SQUAMIGER*, Schh. — *H. op.* IV. p. 561. 124. — *P. Caffraria.*

\* 149. *C. RHUSII*, Schh. — *H. op.* IV. p. 562. 125. — *P. Caffraria.*

\* 150. *C. RINICÆ*, Schh. — *H. op.* IV. p. 563. 126. — *P. Caffraria.*

\* 151. *C. TROGLODYTES*, Fabr. — *H. op.* IV. p. 563. 127. — *P. Europa septentrionalis et meridionalis.*

*Rhynchæn. id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 101. 132.

\* VAR.  $\beta$ . —  $\delta$ . — *Huj. op. et SAHLB. Ins. Fenn.* I. c.

VAR.  $\epsilon$ . *Huj. op.* I. c. — *Patria : lege Bavaria, non Batavia.*

\* VAR.  $\zeta$ . *Supra niger, subtus dense albido-squamosus; antennis, rostro pedibusque ferrugineis; elytris setulis erectis, albidis, seriatis munitis.* — *P. Suecia meridionalis.*

\* 152. *C. URENS*, Hoffmannsegg. — *H. op.* IV. p. 564. 128. — *P. Lusitania.*

\* 153. *C. VALIDIROSTRIS*, Schh. — *H. op.* IV. p. 565. 129. — *P. Tauria.*

*Congenerici forte; species mihi invisæ. (Spec. 154.-156.)*

154. *C. UNIGUTTATUS*, Marsham. — *H. op.* IV. p. 567. 135. — *P. Anglia.*

155. *C. NIMULOSUS*, Germ. — *H. op.* IV. p. 568. 137. — *P. Germania.*

156. *C. MOESTUS*, Fabr. — *P. Europa.*

*Rhynchænus. id.* FABR. *Syst. El.* II. p. 479. 194. *Ad hoc genus retuli, secundum Museum Regium Danicum.*

*Cionus id.* *Huj. op.* IV. p. 743. 24.

STIRPS 2. — *Thorax sub-æqualis, nec tuberculatus, nec antice reflexus.* (Spec. 157-167.)

MANIPULUS I. — *Femora mutica.* (Spec. 157-163.)

\* 157. *C. VIRGATUS.* Schh. — *H. op. IV. p. 568. 140.* — *P. Tauria.*

\* 158. *C. NUBILOSUS.* Schh. — *H. op. IV. p. 569. 141.* — *P. Tauria, Caucasus, Sibiria.*

\* 159. *C. INTERSTINCTUS.* Schh. — *H. op. IV. p. 570. 143.* — *P. Austria.*

\* 160. *C. UNIFORMIS.* Schh. — *H. op. IV. p. 571. 143.* — *P. Caucasus.*

\* 161. *C. VILIS.* Schh. — *H. op. IV. p. 572. 144.* — *P. Tauria.*

\* 162. *C. COARCTATUS.* Schh. — *H. op. IV. p. 573. 145.* — *P. Tauria.*

\* 163. *C. CAMELINÆ.* (Chevrolat.) — *Ovatus, niger, sub-opacus, supra parce subtus densius cinereo-squamulosus; thorace transverso, convexo, æquali, subtiliter confertim punctulato, intra apicem constricto, basi profunde bi-sinuato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis paulo convexis, confertim rugulosis.*

Habitat in *Camelina amphibia* ad Paris. Dom. CHEVROLAT. Mus. SCHH.

Magnitudo et statura *Ceuthorhynchî floralis*; thorace æquali ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, opacum, parce cinereo-squamulosum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenue, teres, arcuatum, subtilissime punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ tenues, nigræ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica multo brevior, apice oblique truncatus, anterius multo angustior, intra apicem late sed minus profunde constrictus, margine apicali parum elevato, lateribus pone stricturnam rotundato-ampliatis; basi sat profunde bi-sinuatus, supra convexus, æqualis, subtiliter crebre punctulatus, ante scutellum tenuiter canaliculatus; niger, parum nitidus, parce cinereo-squa-



*mulosus*. Scutellum haud observandum. Elytra antice leviter trisinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, a medio apicem versus nonnihil angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis paulo convexis, confertim rugulosis, nigra, opaca, cinereo-squamulosa. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, densius cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, punctulati, nigri, parce squamulosi; femoribus vix clavatis, subtus dente parvo, acuto instructis; tibiis sub-rectis, basi tenuioribus; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

MANIPULUS II. — *Femora dentata*. (Spec. 164-167.)

\* 164. *C. PUBICOLLIS*. Dahl. — *H. op.* IV. p. 574. 146. — *P.* Austria, Italia.

\* 165. *C. SIGNATELLUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 575. 147. — *P.* Tauria, Caucasus.

\* 166. *C. DUBITABILIS*. (Schh.) — *Breviter ovatus, sub-convexus, niger, subtus, praesertim antice, dense niveo-squamosus, supra variegatus; antennis tarsisque testaceis, rostro longo, parum arcuato; thorace punctulato, antice leviter constricto, margine apicali paulo elevato, albo-squamoso, dorso vittis duabus latis, nigris, parce cervino-squamosis ornato; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, rugulosis, sutura basi apiceque lineolisque abbreviatis, albo-squamosis decoratis; tibiis posterioribus extus apicem versus denticulatis et setulosis.*

*Patria*: Tauria, Caucasus. Dom. STEVEN. Mus. SCHH.

Statura et summa similitudo *Ceuthorhynchi signatelli*, dimidio fere major, supra parcius albo-variegatus, et antennis testaceis ab illo differre videtur. Caput sub-globosum, confertim punctulatum, nigrum, sat dense albo-squamosum; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum longitudine elytrorum, sub-tenue, teres, parum arcuatum, supra confertim punctulatum, nigrum, basi parce albo-squamosum. Antennae mediocres, sub-tenues, testaceae, parce pilosae; clava ovata, acuminata, fusca, cinereo-pubescente. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, apice oblique truncatus, antice dimidio angustior quam basi, intra apicem leviter constrictus, margine apicali paulo elevatus, lateribus

oblique ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra in disco modice convexus, confertim subtiliter punctulatus, niger, albo-squamosus, relictis vittis duabus dorsalibus, latis, arcuatis, nigris, in illæsis parce cervino-squamosis, decoratus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice leviter sinuata, thoracis basi latiora, humeris obtuse angulatis, callo elevato instructis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apicē ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, sat distincte punctato-striata, interstitiis planis, alutaceis; nigra, vittis lineolisque numerosis interruptis, niveo-squamosis ornata, quarum vitta communi-suturalis latior, in medio semel interrupta, lineæ reliquæ breviores, interruptæ. Corpus subtus punctulatum, nigrum, squamositate nivea sat dense tectum. Pedes validi, nigri, albo-squamulosi; femoribus clavatis, subtus dente obsoleto, obtuso armatis; tibiis posterioribus apicem versus extus denticulatis et setulosis; tarsis piceis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 167. C. NUBECULOSUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 576. 148. —  
P. Sibiria meridionalis.

GEBLER, *Addit. ad Catal. Col.* II. p. 32.

GENUS 578. — RHINONCUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 577. genus 347.

\* 1. R. CASTOR. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 578. 1. — P. Europa borealis et intermedia.

STURM, *Catal.* 1843. p. 223.

*Rhynchaen. id.* ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 183. 57.

*Obs.* — *Curculio pericarpus.* MUS. LINNÆ, teste DOM. VALTON.

\* 2. R. PYRRHOPUS. (*Schh.*) — *Breviter ovatus, sub-convexus, piceus, subtus dense albo-squamosus, supra variegatus; antennis pedibusque rufo-testaceis; thorace confertim granulato, profunde canaliculato, bi-tuberculato; elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis omnibus obsolete tuberculatis, suturæ basi silaceo-squamosa.*

*Patria:* America borealis. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

Minimis *Rhinonci Castoris* adhuc minor, magis ovatus; thorace profundius canaliculato, elytrorum interstitiis obsolete tubercu-

latis, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigro-piceum, albo-squamulosum, fronte subplana; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite vix longius, crassum, parum arcuatum, punctulatum, nigrum, subnitidum, basi squamulosum. Antennæ sub-tenues, testaceæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, antice angustior quam basi, apice leviter emarginatus, margine apicis vix elevato, lateribus obliquis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, confertim subtiliter granulatus, in medio evidenter canaliculatus, utrinque tuberculo parvo, sub-obtuso instructus; piceus, squamulis albidis, brunneis mixtis adpersus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice sinuata, thoracis basi latiora, humeris obtuse angulatis, callo elevato instructis; lateribus non ampliata, apice singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra parum convexa, sat distincte striata, striis vix vel obsoletissime punctatis, interstitiis convexis, tuberculis obsoletis seriatim obsitis; picea, parce albo-squamulosa, suturæ basi macula communi, silaceo-squamosa, insignita. Corpus subtus punctulatum, piceum, squamositate densa, alba tectum. Pedes mediocres, validi, testacei, albido-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus cinereo-spongiosis. — BHN.

3. R. GRANULIPENNIS. Chev. — H. op. IV. p. 580. 2. — P. Paris.

\* 4. R. SULCICOLLIS. (Schh.) — Breviter ovatus, sub-convexus, niger, supra parce subtus dense albo-squamosus; antennis pedibusque testaceis, fronte impressa, superciliis elevatis; thorace confertim granulato, profunde canaliculato, utrinque obsolete tuberculato, albido, tri-vittato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis omnibus obsoletius tuberculatis, sutura basi niveo-squamosa.

VAR.  $\beta$ . Ferrugineus, squamulis miniatis adpersus. Nuper exclusus.

Patria: Dauria. Dom. SEDAKOFF. Mus. SCHH.

Statura et summa similitudo *Rhinonci Castoris*, dimidio tamen major; fronte evidenter impressa, superciliis magis elevatis, thorace profundius canaliculato, obsoletius tuberculato, interstitiis elytrorum minus distincte granulatis, ab illo tamen distinctus. Caput rotundatum, punctulatum, nigrum, albido-squamulosum, vertice tenuiter canaliculato, utrinque atro-maculato; fronte sat

profunde impressa, superciliis magis elevatis; oculi rotundati, convexi, nigri; rostrum capite vix longius, crassum, parum arcuatum, punctulatum, nigrum, parce albido-squamosum. Antennæ sub-tenues, testaceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, apice emarginatus, intra apicem parum constrictus, margine apicis parum elevato, lateribus anterioribus obliquis, posterioribus rotundato-ampliatis; basi bi-sinuatus, supra paulo convexus, crebre granulatus, in medio profunde canaliculatus, dorso utrinque tuberculo obtuso instructus; niger, vittis tribus obsoletis, albido-squamosis decoratus, dorsali angusta. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice leviter sinuata, thoracis basi latiora, humeris obtuse angulatis, callo elevato instructis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, sat distincte striata, striis obsolete punctatis, interstitiis sub-convexis, tuberculis parum elevatis seriatim adspersis; nigra, parce albido-squamulosa, et præterea versus basin suturæ linea communi, densius et albidius squamosa, notata. Corpus subtus punctatum, nigrum, squamositate densa, alba obsitum. Pedes breviusculi, validi, testacei, parce albo-squamulosi. — BHN.

\* 5. R. BRUCHOIDES. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 581. 3. — *P.* Europa borealis et intermedia, Sibiria.

STURM, *Catal.* 1843. p. 223.

*Pachyrhinus rufescens.* STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 50. 2. teste DOM. WALTON.

*Phytobius id.* Huj. *op.* III. p. 464. 12.

Synonymon *Curculio crassus.* MARSH. (*Huj. op.* IV. p. 581. 3.) deletur.

\* 6. R. INCONSPICUUS. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 581. 4. — *P.* Germania, Gallia, Anglia, Suecia.

In diagnosi *Huj. op.* l. c. lin 2, pro : « *rubescente* », lege : « *lutescente.* »

STURM, *Catal.* 1843. p. 223.

*Curculio crassus.* MARSH. *Ent. Brit.* p. 269. 81. — Secundum DOM. WALTON.

*Rhynchænus accipitrinus.* REICH. *Mant.* p. 5. 1. T. 1. f. 1.

- \* 7. R. PERICARPIUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 582. 5. — *P.* Europa borealis et intermedia; Sibiria orientalis.  
*Rhynchaenus id.* ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 183. 56.  
*Rhinoncus Spartii.* KIRBY. *H. op.* IV. p. 587. 10.
8. R. GRAMMINEUS (1). *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 583. 6. — *P.* Germania.
- \* 9. R. SUBFASCIATUS. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 583. 7. — *P.* Europa borealis et intermedia, Sibiria occidentalis.  
*Rhynchaenus id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 109. 145.  
*Rhinoncus tibialis.* STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 41. 3. certe.
- \* 10. R. GUTTALIS. *Gravenh.* — *H. op.* IV. p. 583. 8. — *P.* Germania, Suecia, Illyria.
11. R. DENTICOLLIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 584. 9. — *P.* Italia.
12. R. SPARSESETOSUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 585. 10. — *P.* Cap. Bonæ Spei.
- \* 13. R. PAGANUS. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, convexus, ferrugineus, supra parce subtilius densius cinereo-squamulosus; antennis pedibusque pallidioribus; thorace angustiore, confertim punctato, canaliculato, utrinque foveola impresso, intra apicem haud constricto, margine apicali vix elevato, in medio sub-emarginato; elytris punctato-striatis, interstitiis confertim coriaceis, sutura basi dense albo-squamosa.*  
*Patria:* Calcutta. Dom. SUNDEVALL. Caput Bonæ Spei. Dom. J. WAHLBERG. *Mus. Schh.*  
*Hujus operis* IV. p. 586. 11. BHN.
- \* 14. R. ALBICINCTUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 586. 12. — *P.* Gallia, Germania borealis.  
 STURM, *Catal.* 1843. p. 223.
15. R. GRYPUS (2). *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 587. 14.

(1) *Rhinoncus pericarpus* eadem species forte, teste Dom. GERMAR in litteris.

(2) Congenericus forte?

GENUS 579. — COELOGASTER. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 588. genus 348.

- \* 1. C. ZIMMERMANNI. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 589. 1. — *P.* Pennsylvania.

GENUS 580. — POOPHAGUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 590. genus 349.

- \* 1. P. SISYMBRII. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 591. 1. — *P.* Europa septentrionalis et intermedia.  
*Rhynchaenus id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 36. 21.
- \* 2. P. OLIVACEUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 592. 2. — *P.* Gallia.
- \* 3. P. NASTURTHI. *Spence.* — *H. op.* IV. p. 592. 3. — *P.* Gallia, Germania, Anglia, Scotia.

SUFFRIAN, *Stettin. Ent. Zeit.* I. p. 60. 15.

*Miarus id.* STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 16. 2. T. 20. f. 1.

GENUS 581. — TAPINOLUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 593. gen. 170. — *Huj. op.* IV. p. 593. gen. 350.

- \* 1. T. SELLATUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 594. 1. — *P.* Europa septentrionalis, Caucasus, Sibiria occidentalis.

STURM, *Catal.* 1843. p. 223.

\* VAR.  $\beta$ . et  $\gamma$ . *Huj. op.* l. c.

\* VAR.  $\delta$ . Rufo-ferrugineus; antennis pedibusque dilutioribus. Nuper exclusus forte?

*Patria* : Finlandia ad Kavantholm. DOM. COM. MANNERHEIM. MUS. SCHH.

GENUS 582. — LYPRUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 288. gen. 167. — *Huj. op.* III. p. 536. gen. 259.

- ♂♀ 1. L. CYLINDRUS. *Payk.* — *H. op.* III. p. 536. 1. — *P.* Europa borealis et intermedia.

GENUS 583. — RHYTIDOSOMUS. *Nobis.**Hujus operis* IV. p. 594. genus 351.

- \* I. R. GLOBULUS. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 596. 1. — *P.* Suecia, Germania, Gallia.

STURM, *Catal.* 1843. p. 224.*Rhynchænus id.* SAHLB. *Ins. Fenn.* II. p. 102. 133.GENUS 584. — MECYSMODERES. *Nobis.**Hujus operis* IV. p. 596. genus 352.

- \* I. M. EUGLYPTUS. *Dalman.* — *H. op.* IV. p. 597. 1. — *P.* Java.

## GENUS 584-585. — CRYPTORHYNCHIDES.

*Ad subdivisionem CRYPTORHYNCHIDES referendæ sunt incerti generis, species mihi invisæ.*

1. QUINQUETUBERCULATUS. *Rhynchænus id.* FABR. — *H. op.* IV. p. 716. 1. — *P.* America meridionalis.
2. PILOSUS. *Rhynchænus id.* FABR. — *H. op.* IV. p. 716. 2. — *P.* Java.
3. ZEBRA. *Rhynch. id.* OLIV. — *H. op.* IV. p. 716. 3. — *P.* Java.
4. OBTEXTUS. *Curculio id.* HERBST. — *H. op.* IV. p. 716. 4. — *P.* America borealis.
5. LITHODERMUS. *Cryptorhynchus id.* LATR. — *H. op.* IV. p. 718. 11. — *P.* Nova Hollandia.
6. EPHIPPIGER. *Cryptorhynchus id.* DEJEAN. — *H. op.* IV. p. 718. 12. — *P.* Nova Hollandia.
7. COROSUS. *Cryptorhynchus id.* DEJEAN. — *H. op.* IV. p. 718. 14. — *P.* Nova Hollandia.
8. AUSTRALIS. *Cryptorhynchus id.* DEJEAN. — *H. op.* IV. p. 719. 15. — *P.* Nova Hollandia.
9. TETER. *Cryptorhynchus id.* BOISDUV. — *H. op.* IV. p. 719. 16. — *P.* Nova Hollandia.

10. APICALIS. *Cryptorhynchus id.* BOISDUV. — *H. op.* IV. p. 719. 17  
— *P.* Insula Vanikoro.

## DIVISIO III. — CONOPHORIDES.

*Antennæ longiusculæ, tenues; funiculus 7-articulatus; clava sub-solidâ, indistincte bi-articulata. Rostrum inflexum. Thorax præ receptione rostri canaliculatus.*

GENUS 585. — CONOPHORUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 719. gen. 364. — *Conodres.* Huj. op. I. p. 26.

- \* 1. C. ALBIDUS. *Klug.* — *H. op.* IV. p. 721. 1. — *P.* Caput Bonæ Spei.

SECTIO II — *Antennæ 10-vel 9-articulatæ.* (Genus 586.-589.)

## DIVISIO IV. — CIONIDES.

*Antennæ breviusculæ; funiculus 5-articulatus; clava 3-vel 4-articulata. Pedes antici basi aut approximati, aut distantes.* (Genus 586.-589.)

GENUS 586. — CIONUS. *Clairville.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 318. 185. — *Huj. op.* IV. p. 722. gen. 365. — ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 183. genus 114.

- ♂♀ 1. C. SCROPHULARIÆ. *Linné.* — *H. op.* IV. p. 723. 1. — *P.* Tota Europa.

ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 184. 1.

DAHLBOM, *Skandin. Ins.* p. 65. 49.

- ♂♀ 2. C. VERBASI. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 724. 2. — *P.* Tota Europa.

- ♂♀ 3. C. OLIVIERI. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 725. 3. — *P.* Gallia, Germania, Volhynia, Tauria, Persia occidentalis.

- ♂♀ 4. C. THAPSUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 726. 4. — *P.* Tota Europa.

FALDERM. *Faun. Ent. Transcauc.* III. p. 206.



- ♂♀ 5. *C. UNGULATUS*. *Germa.* — *H. op.* IV. p. 728. 5. —  
P. Dalmatia, Croatia, Gallia, Lusitania.
- ♂♀ 6. *C. HORTULANUS*. *Marsh.* — *H. op.* IV. p. 729. 6. —  
P. Europa septentrionalis et intermedia.
- ♀ 7. *C. GEBLERI*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 729. 7. — P. Sibiria me-  
ridionalis.
- ♂♀ 8. *C. CLAIRVILLEI*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 730. 8. —  
P. Gallia, Podolia, Tauria.
- ♂♀ 9. *C. SIMPLEX*. *Rosensch.* — *H. op.* IV. p. 731. 9. —  
P. Podolia.
- ♂ 10. *C. OLENS*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 732. 10. — P. Gallia,  
Germania.
- ♂♀ 11. *C. BLATTARIE*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 732. 11. —  
P. Italia, Germania, Anglia.
- ♂♀ 12. *C. PULVEREUS*. *Parreys.* — *H. op.* IV. p. 733. 12. —  
P. Dalmatia, Græcia.

13. *C. LUCTUOSUS*. (*Chevrolat.*) — *Breviter sub-ovatus, modice convexus, ater, subtus silaceo-squamosus; rostro longiusculo, cylindrico; thorace breviter sub-conico, intra apicem constricto, macula oblonga, basali, lateribus scutelloque apice silaceo-squamosis; elytris mediocriter punctato-striatis, annulo pone scutellum, lateribus apiceque inæqualiter silaceo-squamosis, macula apicali rotunda, communi, atra decoratis; femoribus silaceo-fasciatis.*

*Patria*: Teneriffa. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Magnitudo et statura *Cioni Thapsi*. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, atrum, opacum, subtus parce silaceo-squamosum; oculi oblongi, ovati, depressi, brunnei; rostrum capite cum thorace longius, validum, cylindricum, paulo arcuatum, supra confertim punctulatum, nigrum, opacum, glabrum. Antennæ mediocres, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuta, atro-holosericea. Thorax breviter sub-conicus, latitudine postica dimidio brevior, apice oblique truncatus, antice multo angustior, ibique constrictus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, lobo medio parum producto, obtuso; supra modice convexus, obsolete crebre punctu-

latus, atro-squamosus, macula basali, oblonga, medio angustiori; lateribus et subtus silaceo-squamosus. Scutellum oblongum, nigrum, apice rotundatum, ibique silaceo-squamosum. Elytra antice sub-tri-sinuata, thoracis basi plus duplo latiora, humeris sub-elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata, quam lata dimidio fere longiora, supra in dorso paulo convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, nigra, atro-squamosa, annulo pone scutellum, lateribus, apice inæqualiter guttulisque nonnullis dorsi silaceo-squamosis; non procul ab apice macula rotunda, communi, atra insignita. Corpus subtus punctulatum, squamulis silaceis dense medio parcius silaceo-squamosum. Pedes validi, punctulati, nigri; femoribus clavatis, anticis vix reliquis obtuse dentatis, omnibus medio extus silaceo-fasciatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 14. C. TRISTIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 734. 13. — *P. Caffraria.*

♂♀ 15. C. METICULOSUS. *Sparrrn.* — *H. op.* IV. p. 734. 14. — *P. Caffraria.*

In descriptione hujus speciei, loc. cit. lin. 14, pro: « angustatis », angulatis legendum.

♂ 16. C. NOTATUS. *Rosensch.* — *H. op.* IV. p. 735. 15. — *P. Caffraria.*

\* 17. C. ALBIDUS. *Rosensch.* — *H. op.* IV. p. 736. 16. — *P. Africa australis.*

\* 18. C. ANGULICOLLIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 737. 17. — *P. Caput Bonæ Spei.*

\* 19. C. VIRGATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 738. 18. — *P. Caput Bonæ Spei.*

\* 20. C. DECORUS. (*Schh.*) — *Sub-ovatus, niger, convexus, ochraceo-squamosus; rostro basi compresso, modice arcuato; thorace acute bi-tuberculato, dorso utrinque fusco-vittato; elytris subtiliter punctato-striatis, vitta lata laterali, punctaque nonnulla silacea includente, cum sutura antice brunneo-squamosis.*

*Patria* : Port Natal Africæ. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Statura et summa similitudo *Cioni virgati*, nonnihil minor, ut videtur magis convexus, aliter coloratus. Anne species distincta? Caput majusculum, sub-exsertum, rotundatum, crebre punctulatum, ochraceo-squamosum, medio sub-denudatum; fronte foveola parva impressa; oculi sub-ovati, depressi, obscure brunnei; rostrum capite cum thorace paulo longius, validum, sub-compressum, modice arcuatum, extrorsum deplanatum, crebre punctulatum, sat dense ochraceo-squamosum. Antennæ mediocres, piceæ; clava parva, oblongo-ovali, acuminata. Thorax sub-conicus, latitudine baseos vix duplo brevior, apice oblique truncatus, antice plus dimidio angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam sub-obliquis; basi leviter bi-sinuatus, lobo medio brevi, sub-emarginato; supra modice convexus, crebre punctulatus, versus latera utrinque tuberculo valido, acuto instructus; dense ochraceo-squamosus, dorso vittis duabus latis, indeterminatis, fusco-squamosis. Scutellum parvum, apice rotundatum, dense silaceo-squamosum. Elytra sub-oblongo-quadrata, latitudine vix dimidio longiora, basi conjunctim leviter tri-sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris paulo elevatis, sub-rectangulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata, supra modice convexa, postice declivia, subtiliter punctato-striata, interstitiis planis; dense ochraceo-squamosa, sutura a basi longe ultra medium late vittaque laterali, puncta nonnulla silacea includente, fusco-squamosis decorata, præterea ad suturam guttulæ silacæ interdum adsunt. Corpus subtus punctulatum, nigrum, dense ochraceo-squamosum. Pedes validi, punctulati, ochraceo-squamulosi; femoribus modice clavatis, dente valido, acuto, in anticis tamen minore, armatis; tibiis terebibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis.

BUN.

- \* 21. C. NUBILOSUS. *Rosensch.* — *H. op.* IV. p. 739. 19. — *P.* Caput Bonæ Spei.
- \* 22. C. HISTRIO. *Schlh.* — *H. op.* IV. p. 739. 20. — *P.* Caffraria.
- \* 23. C. FRAXINI. *De Geer.* — *H. op.* IV. p. 740. 21. — *P.* Europa septentrionalis et intermedia.
- \* 24. C. FULCHELLUS. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 741. 22. — *P.* Europa septentrionalis et intermedia.

- \* 25. *C. SOLANI*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 742. 23. — *P. Europa intermedia.*

Confer. *GERMAR, Stettin. Ent. Zeit.* III. p. 109.

- \* 26. *C. MIXTUS*. *Dejean.* — *P. Gallia.*

*Phytonomus id.* *Huj. op.* II. p. 380. 20. et VI. p. 384. 84.

27. *C. TRINOTATUS* (1). *Fischer.* — *H. op.* IV. p. 743. 25. — *P. Rossia orientalis.*

GENUS 587. — GYMNETRON. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 319. gen. 186. — *Huj. op.* IV. p. 743. gen. 366.

STIRPS I. — *Rostrum filiforme, sub-lineare, deflexum; elytra sub-ovata, paulo convexa; pygidium ab elytris vix tectum.* (Spec. 1.-17.)

MANIPULUS I. — *Femora denticulata.* (Spec. 1.-3.)

- ♂♀ 1. *G. PASCUORUM*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 744. 1. — *P. Europa borealis et intermedia.*

*GERMAR, Stett. Ent. Zeit.* III. p. 110.

- \* 2. *G. BICOLOR*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 745. 2. — *P. Tauria, Gallia septentrionalis.*

- \* 3. *G. MELAS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 746. 3. — *P. Parisiis.*

MANIPULUS II. — *Femora mutica.* (Spec. 4-17.)

- \* 4. *G. VILLOSULUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 747. 4. — *P. Europa media et meridionalis.*

- \* 5. *G. VERONICÆ*. *Germar.* — *H. op.* IV. p. 748. 5. — *P. Europa media et meridionalis.*

- \* 6. *G. BECCABUNGÆ*. *Linne.* — *H. op.* IV. p. 349. 6. — *P. Europa borealis et media.*

- \* 7. *G. CONCINNUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 749. 7. — *P. Europa borealis et media.*

---

(1) Forte hujus generis? Mihi invisus.

\* 8. *G. ICTERICUS*. Schh. — *H. op.* 750. 8. — *P. Hungaria, Borussia.*

♂♀ 9. *G. LABILIS*. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 751. 9. — *P. Europa borealis et media.*

STURM, *Catal.* 1843. p. 225.

10. *G. BIPARTITUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 751. 10. — *P. Caffraria.*

\* 11. *G. ROSTELLUM*. Schh. — *H. op.* IV. p. 752. 11. — *P. Suecia, Germania.*

\* 12. *G. MELANARIUS*. (*Germar.*) — *Oblongo-ovatus, convexus, niger, parce breviter cinereo-setulosus; antennis basi testaceis, rostro breviori, compresso, parum arcuato; thorace pulvinate, subtiliter confertim punctulato, scutello transverso; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, seriatim parce setosis, coriaceis; femoribus muticis.*

*Hujus operis* IV. p. 753. 14.

*Gymnætron intaminatus*. KIRBY. *H. op.* IV. p. 769. 41. — GERMAR, *Stettin. Ent. Zeit.* III. p. 110.

*Patria*: Germania. Mus. Dom. GERMAR. Anglia. Dom. WALTON. Mus. SCHH.

*Obs.* — *Gymnetroni rostelli* proximus, in elytris breviter parcius setulosus; rostro breviori, tibiis tarsisque nigris, ab illo tamen distinctus.

BHN.

\* 13. *G. PERPARVULUS*. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, parum convexus, niger, sub-nitidus, glaber; antennis basi rufis, rostro parum arcuato, apice nonnihil attenuato; thorace transverso, confertim subtiliter punctulato, anterius angustato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, haud setosis; femoribus muticis.*

*Patria*: Halæ Saxoniae. Mus. Dom. SCHH.

Affinis certe *Gymnet. melanarii*, sed multo minor, magis nitidus; elytris haud setosis ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, parum convexum, subtiliter punctulatum, nigrum, sub-opacum, vix squamosum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum thorace nonnihil brevius, parum arcuatum, extrorsum angustius, punctulatum, nigrum, glabrum. Antennæ breviusculæ, nigrae, basi ferrugineæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente.

Thorax transversus, postice fere latitudine elytrorum, antice subito angustior, apice sub-truncatus, margine apicali haud elevato; lateribus antice obliquis, a medio ad basin fere rectis; basi leviter rotundatus, supra parum convexus, obsolete crebre punctulatus, niger, fere glaber. Scutellum minutissimum, tuberculiforme, nigrum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata vel sub-truncata, humeris vix antrorsum prominulis; lateribus recta, non ampliata, apice conjunctim rotundata, anum tegentia, thorace plus duplo longiora, supra in dorso paulo convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, obsolete coriaceis; nigra, sub-nitida, fere glabra, haud setulosa. Corpus subtus subtiliter punctulatum, nigrum, parce albido-squamosum. Pedes breviusculi, validi, nigri, vix squamulosi; femoribus clavatis, nigris. — БНН.

\* 14. G. CAFFER. Schh. — *H. op.* IV. p. 752. 12. — *P. Caffraria.*

\* 15. G. STIMULOSUS. Germar. — *H. op.* IV. p. 753. 13. —  
*P. Germania, Borussia.*

\* 16. G. ROTUNDICOLLIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 753. 15. —  
*P. Tauria.*

17. G. BISIGNATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 754. 16. — *P. Caffraria.*

STIRPS 2. — *Rostrum deflexum, versus apicem saepius attenuatum; elytra planiuscula, sub-quadrata; pygidium apertum.* (Spec. 18.-40.)

MANIPULUS. I. — *Femora dentata.* (Spec. 18.-33.)

\* 18. G. TETER. Fabr. — *H. op.* IV. p. 755. 17. — *P. Europa intermedia et meridionalis, Sibiria occidentalis.*

\* 19. G. EOUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 755. 18. — *P. Nepal.*

20. G. COMOSUS. Chevr. — *H. op.* IV. p. 756. 19. — *P. Anatolia.*

\* 21. G. ASELLUS. Gravenh. — *H. op.* IV. p. 765. 33. — *P. Germania, Polonia.*

*Gymnetron Polonicus.* *H. op.* IV. p. 757. 20. — *Eadem species, secundum Mus. GERMAR.*

22. G. NASUTUS. Rosensch. — *H. op.* IV. p. 757. 21. — *P. Anatolia.*

- ♂ 23. *G. PLAGIATUS*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 758. 22. —  
P. Volhynia.
- ♂♀ 24. *G. PLAGIELLUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 759. 23. —  
P. Odessa Bessarabiæ.
- ♂ 25. *G. FUSCESCENS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 760. 24. —  
P. Tauria.
- ♂♀ 26. *G. ANTIRRHINI*. *Germar.* — *H. op.* IV. p. 760. 25. —  
P. Austria, Gallia, Caucasus.
- ♂♀ 27. *G. NOCTIS*. *Herbst.* — *H. op.* IV. p. 761. 26. —  
P. Europa septentrionalis et intermedia.
- ♂♀ 28. *G. COLLINUS*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 761. 27. —  
P. Suecia, Gallia.
- ♂♀ 29. *G. NETUS*. *Germar.* — *H. op.* IV. p. 762. 28. — P. Bo-  
russia, Persia occidentalis.
- Gymnetron pelliceus*. *Falderm. Faun. Ent. Transcaucas.* II.  
p. 249. 468. et III. p. 206.
- \* 30. *G. EVERSMANNI*. *Falderm.* — *H. op.* IV. p. 763. 29. —  
P. Buchara, Dauria.
- ♂♀ 31. *G. PILOSUS*. *Besser.* — *H. op.* IV. p. 763. 30. — P. Po-  
dolia, Germania.

*Species mihi invisæ.*

32. *G. AMICTUS*. *Germar.* — *H. op.* IV. p. 764. 31. — P. Lusi-  
tania.
33. *G. VESTITUS*. *Germar.* — *H. op.* IV. p. 765. 32. — P. Lusi-  
tania.

MANIPULUS II. — *Femora mutica*. (Spec. 34.-40.)

- ♀ 34. *G. VERBASI*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 765. 34. — P. Tiflis  
Iberiæ.
- ♀ 35. *G. CYLINDRIROSTRIS*. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 766. 35. —  
P. Podolia, Volhynia, Tauria, Germania, Sardinia.

36. *G. THAPSICOLA*. (Müller.) — *Ovatus, sub-depressus, niger, supra griseo-virescenti- subtus cinereo- dense pubescens; rostro longitudine thoracis, tenui, cylindrico, parum arcuato, apice denudato; thorace transverso, utrinque rotundato, confertim punctulato; elytris tenuiter striatis, interstitiis planis; femoribus modice clavatis, muticis.*

*Hujus operis* IV. p. 769. 40.

*Patria* : Bavaria. Mus. DOM. GERMAR.

*Obs.* — Statura et summa similitudo *Gymnætr. Antirrhini*, nonnihil major; colore indumenti, rostro tenuiore, cylindrico, medio non sulcato, thorace latiori, utrinque magis rotundato, ab illo distinctus. — BHN.

\* 37. *G. TRIGONALIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 767. 36. — *P. Odessa Bessarabiæ.*

\* 38. *G. SPILOTUS*. Germar. — *H. op.* IV. p. 768. 37. — *P. Germania, Gallia, Italia.*

STURM, *Catal.* 1843. p. 225.

\* 39. *G. HIRSUTUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 768. 38. — *P. Caput Bonæ Spei.*

♂♀ 40. *G. LINARIÆ*. Panzer. — *H. op.* IV. p. 769. 39. — *P. Suecia, Finlandia, Germania, Anglia.*

STIRPS 3. — *Rostrum filiforme, inflexum, in rima thoracis immersum; elytra planiuscula, sub-quadrata; pygidium apertum.* (Spec. 41.-50.)

MANIPULUS I. — *Femora dentata.* (Spec. 41.-45.)

♂♀ 41. *G. LONGIROSTRIS*. Dejean. — *H. op.* IV. p. 770. 42. — *P. Gallia meridionalis.*

42. *G. SUTURALIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 771. 43. — *P. Caffraria.*

♂♀ 43. *G. GRAMINIS*. Gyllenh. — *H. op.* IV. p. 772. 44. — *P. Suecia, Finlandia, Lapponia, Volhynia, Sibiria.*

*Rhynchænus id.* ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 176. 23.

44. *G. PLEBEIUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 772. 45. — *P. Caput Bonæ Spei.*



- \* 45. G. PLANTARUM. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 773. 46. —  
P. Gallia meridionalis, Helvetia, Anglia.

MANIPULUS II. — *Femora mutica.* (Spec. 46.-50.)

- ♂♀ 46. G. CAMPANULÆ. *Linne.* — *H. op.* IV. p. 773. 47. —  
P. Tota Europa.

*Rhynchænus id.* ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 181. 48.

47. G. DISTINCTUS. (*Chevrier.*) — *Ovatus, niger, sub-depressus, supra dense olivaceo-subtus cinereo-pilosus; rostro elongato, tenui, parum arcuato; thorace subtiliter confertim punctulato, antè angustiori; lateribus obliquis, angulis baseos vix rotundatis; elytris sat profunde punctato-sub-sulcatis; interstitiis planis, confertim rugulosis; femoribus muticis; pygidio convexo.*

*Patria:* Geneva. DOM. CHEVRIER. MUS. GERMAR.

Magnitudo et statura *Gymnætr. Campanulæ*, dense olivaceo-pubescentis; rostro minus arcuato, thorace angulis basalibus minus obtuse rotundatis, ut et pygidio convexo, ab illo distinctus. Caput sub-globosum, subtilissime confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, haud pubescens; fronte leviter foveolata, densius olivaceo-pubescenti; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum thorace nonnihil longius, deflexum, sub-tenuè, teres, parum arcuatum, basi nonnihil crassius, confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, sub-nudum. Antennæ mediocres, tenues, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, antice duplo angustior quam basi; apice truncatus, anguste constrictus et tenuiter elevato-marginatus, lateribus oblique ampliatus, angulis baseos haud rotundatis, basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, confertim subtiliter punctulatus, niger, sub-nitidus, pube densa, depressa, olivacea obsitus. Scutellum mediocre, sub-triangulare, nigrum, pubescentia densa, olivacea tectum. Elytra antice conjunctim late sed minus profunde emarginata, thoracis basi paulo latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso fere plana, sat profunde sub-remote punctato-sulcata, interstitiis planis, obsolete rugulosis; nigra, sub-nitida, pube longa, olivacea dense tecta. Corpus subtus punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamulo-

sum. Pedes validi, breviusculi, nigri, albo-pilosi; femoribus modice clavatis, muticis. — BHN.

\* 48. G. TRIVIALIS. Schh. — H. op. IV. p. 775. 48. — P. Caffraria.

♂♀ 49. G. SERIEPILOSUS. Schh. — H. op. IV. p. 775. 49. — P. Caffraria.

\* 50. G. MICROS. Germ. — H. op. IV. p. 776. 50. — P. Germania.

GENUS 588. — MECINUS. Germar.

Curc. Disp. Méth. p. 321. gen. 187. — Huj. op. IV. p. 776. gen. 367.

♂♀ 1. M. PYRASTER. Herbst. — H. op. IV. p. 777. 1. — P. Europa septentrionalis et intermedia, Tauria.

STURM, Catal. 1843. p. 225.

Obs. — SYNONYMON STEPHENSI huj. op. l. c. deletur, utpote ad *Mec. circulatum* pertinens.

2. M. BARBARUS. Schh. — H. op. IV. p. 778. 2. — P. Barbaria.

3. M. LONGIUSCULUS. (Chevrolat.) — *Lineari-elongatus, niger, sub-nitidus, densius cinereo-pubescens; rostro longo, tenui, arcuato; thorace oblongo, confertim punctulato, dorso antico obsolete carinato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, subtiliter coriaceis; femoribus muticis.*

*Patria:* Corsica. Mus. Dom. CHEVROLAT.

Statura et summa similitudo *Mecini barbari*, nonnihil major, dense cinereo-pubescens; rostro antice obsolete carinato, elytrorum margine laterali concolore, ab illo unice distinctus. Caput, oculi, rostrum et antennæ omnino ut apud jam dictum. Thorax latitudine fere longior, anterieus multo angustior, apice sub-emarginatus, intra apicem obsolete constrictus, margine vix elevato; lateribus ultra medium ampliatus, basi sub-truncatus, supra modice convexus, subtiliter punctulatus, dorso antico obsolete carinatus, niger, sub-nitidus, dense albo-pubescens. Scutellum rotundatum, concolor. Elytra linearia, thoracis basi paulo latiora, humeris elevatis, rectangulatis; lateribus non ampliata, apice singulatim obtuse rotundata, thorace triplo longiora, supra parum convexa, anguste striata, striis confertim obsolete punctulatis,

interstitiis sub-convexis, confertim coriaceis; tota nigra, sub-nitida, dense albo-pubescentia. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, densius albo-pubescentia. Pedes mediocres, validi, nigri, albo-pubescentes; femoribus modice clavatis, muticis, anticis crassioribus; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

4. *M. TERETIUSCULUS*. (Schh.) — *Lineari-elongatus, niger, sub-nitidus, densius albo-pubescentia; rostro breviori, validiori, minus arcuato, apice denudato; thorace breviori, utrinque magis rotundato, confertim punctulato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis angustis, subtiliter coriaceis; femoribus anticis crassioribus, subtus acute dentatis.*

*Patria* : Lusitania. Dom. ROSENSCHOELD. Mus. Reg. Holm.

Statura et summa similitudo *Mecini barbari*, nonnihil minor; rostro breviori, validiori, minus arcuato, thorace breviori, utrinque magis ampliato, femoribus anticis valide acute dentatis, ab illo mox distinctus. Caput sat magnum, rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, albo-pubescentia; fronte inter oculos leviter impressa; oculi laterales, rotundati, parum convexi, nigri; rostrum vix longitudine thoracis, minus tenue, modice arcuatum, confertim punctulatum, nigrum, albo-pubescentia, apice denudatum, nitidum. Antennæ mediocres, nigrae; clava magna, ovata, atro-holosericea. Thorax latitudine nonnihil brevior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem anguste constrictus, margine vix elevato; lateribus ultra medium ampliatum, basi sub-truncatus, supra modice convexus, confertim subtiliter punctulatus, niger, parum nitidus, parce cinereo-pubescentia. Scutellum rotundatum, concolor, densius albo-pubescentia. Elytra linearia, antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi parum latiora, humeris vix elevatis, rectangulatis; lateribus non ampliatum, apice singulatim obtuse rotundata, thorace triplo longiora, supra parum convexa, anguste striata, striis confertim punctulatis, interstitiis angustis, sub-convexis, coriaceis; nigra, sub-nitida, albo-pubescentia. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum, albido-pubescentia. Pedes mediocres, punctulati, nigri, pubescentes; femoribus anticis clavatis, subtus dente valido, acuto armatis, posticis minus incrassatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus, tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

♂ 5. *M. COLLARIS*. Germar. — *H. op.* IV. p. 779. 3. — *P.* Austria, Saxonia, Dauria.

♂♀ 6. *M. JANTHINUS*. — *Germar.* — *H. op.* IV. p. 779. 4. — *P.* Bavaria, Austria, Gallia.

♂♀ 7. *M. CIRCULATUS*. Marsh. — *H. op.* IV. p. 779. 5. — *P.* Germania, Anglia, Gallia, Hispania.

GERMAR, *Stettin. Ent. Zeit.* III. p. 110.

*Mecinus marginatus*, GERMAR, et *Lixus id.* BECK. — Huc pertinet, certe.

*Mecinus hæmorrhoidalis*. STEPH. *Brit. Ent.* IV. p. 12. 2. var. — Teste DOM. WALTON.

8. *M. COMOSUS*. (Schh.) — *Lineari-elongatus, niger, sub-nitidus, pube densa, albida obsitus; rostro brevi, sub-recto, antennarum basi, tibiis tarsisque ferrugineis; thorace parum convexo, confertim punctulato; elytris ferrugineis, linea dorsali atra decoratis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis punctulatis; femoribus muticis.*

*Patria* : Lusitania. DOM. ROSENSCHOELD. *Mus. Reg. Holm.*

Statura fere *Mecini circulati*, nonnihil minor, aliter coloratus; rostro recto ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, convexum, confertim punctulatum, nigrum; vertice transversim denudato; fronte dense albo-pubescente; oculi laterales, rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius, minus validum, teres, sub-rectum, punctulatum, a basi ultra medium tenuiter canaliculatum, pube albida adpersum, apice denudatum, magis nitidum. Antennæ mediocres, ferrugineæ; clava parva, ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica haud brevior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem leviter constrictus, margine vix elevato; lateribus ultra medium ampliatus, basi sub-truncatus, supra parum convexus, subtiliter crebre punctulatus, niger, parum nitidus, pube longa, sub-erecta, cinereo-albida dense obsitus. Scutellum parvum, rotundatum, albo-pubescent. Elytra linearia, antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi haud latiora, humeris vix elevatis, rotundatis, lateribus non ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra parum convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, punctulatis; ferruginea,

parum nitida, linea dorsali inter strias 3 et 4 nigra, decorata, pube densa, cinereo-albida obsita, ante apicem fasciculo densiori, albido insignita. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, tenuiter albo-pubescent, segmento ultimo abdominis ferrugineo. Pedes mediocres, punctulati, albido-pubescentes; femoribus modice clavatis, nigris; tibiis tarsisque rufo-ferrugineis. — BHN.

GENUS 589. — NANOPHYES. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 780. gen. 368. — NANODES. *Curc. Disp. Méth.* p. 322. gen. 188.

\* 1. N. SICULUS. (Schh.) — *Ovatus, convexus, niger, sub-nitidus, pube albida obsitus; antennis basi testaceis, rostro longitudine capitis cum thorace, sub-tenui, modice arcuato, basi striolato; thorace sub-conico, confertim evidenter punctulato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, confertim punctulatis; femoribus clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis.*

*Nanophyes globulus.* DEJEARDIN in litteris.

*Patria:* Sicilia. DOM. CHEVROLAT. MUS. SCHH.

*Anthonomo Rubi* sub-similis, minoribus ejus magnitudine æqualis, magis ovatus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, parum nitidum, pube albida parce adpersum; oculi sat magni, rotundati, modice convexi, nigri, in fronte approximati; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenui, teres, modice arcuatum, punctulatum, basi striolatum, nigrum, sub-nitidum, parce pubescens. Antennæ in medio rostri insertæ, minus tenues, testacæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, atra. Thorax breviter conicus, latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, antice duplo angustior quam basi, lateribus obliquis, versus basin sensim ampliatis; postice vix sinuatus, fere truncatus, tenui marginatus, supra modice convexus, crebre evidenter punctulatus, niger, sub-nitidus, pube depressa, albida adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra ovata, antice sub-truncata, thoracis basi vix latiora, humeris parum elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim rotundata, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis parum convexis, confertim subtiliter punctulatis; nigra, sub-nitida, pube depressa,

albida sat dense adpersa. Corpus subtus punctulatum, nigrum, sub-nitidum, pectore densius, abdomine parcius albo-pubescent. Pedes elongati, validi, nigri, parce pubescentes; femoribus clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis modice dilatatis, subtus cinereo-spongiosis. — BEN.

\* 2. N. ARMATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 781. 1. — P. Caput Bonæ Spei.

\* 3. N. ANNULATUS. Chev. — *H. op.* IV p. 782. 2. — P. Italia.

4. N. HEMISPHERICUS. (Olivier.) — *Ovatus, convexus, niger, nitidus, parce cinereo-pubescent; fronte inter oculos, antennis, pedibus elytrisque, plaga basali semi-lunata excepta, pallide testaceis; rostro longitudine capitis cum thorace, parum arcuato; thorace breviter conico, confertim subtiliter punctulato; elytris sat profunde punctato-sulcatis, interstitiis convexis, lævibus; femoribus muticis.*

*Cionus id.* OLIV. *Ent.* V. 83. p. 113. 58. T. 29. f. 434.

*Hujus operis* IV. p. 789. 12.

*Patria* : Sicilia. DOM. GERMAR. Paris. DOM. OLIV.

*Nanophye Lythri* duplo fere major, magis ovatus. Caput parvum, oblongum, obsolete punctulatum, nigrum, nitidum, vix pubescens, inter oculos testaceum; oculi rotundati, parum convexi, brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, validiusculum, teres, parum arcuatum, confertim punctulatum, a basi longe ultra medium canaliculatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Antennæ sub-tenues, testacæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, atra, parce pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica brevior, antice plus duplo angustior quam basi, apice oblique sub-truncatus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice vix sinuatus, elevato-marginatus, supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, niger, nitidus, subtus testaceus, pube depressa, albida parce adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum, nitidum, parce pubescens. Elytra ovata, antice sub-truncata, thoracis basi parum latiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra convexa, sat profunde punctato-sulcata, interstitiis convexis, lævibus; pallide testacea, basi plaga magna, semi-lu-

nata, nigra decorata, undique pube brevi, depressa, albida parce adpersa. Corpus subtus punctulatum, nigrum, nitidum, parce pallido-pubescent. Pedes longiusculi, pallide testacei, parce pubescentes; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, fusco-annulatis, subtus cinereo-spongiosis.

BHN.

\* 5. N. LYTHRI. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 782. 3. — *P.* Tota Europa.

*STURM, Catal.* 1843. p. 225.

*Rhynchœn. id.* ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 181. 47.

\* 6. N. CHEVRIERI. (*Germar.*) — *Oblongo-ovatus, rufo-ferrugineus, pallido-pubescent; capite, antennarum clava, femorum annulo apicali, signaturis elytrorum, pectore abdomineque nigris, pectore dense niveo-squamoso, rostro basi striolato; thorace obsolete punctulato; elytris testaceis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis parum convexis; femoribus subtus uni-spinosis.*

*Patria* : Geneva. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

*Nanophye Lythri* nonnihil longior et angustior. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, nigrum, nitidum, parce pallido-pubescent; oculi laterales, rotundati, parum convexi, nigri; rostrum thorace nonnihil longius, validiusculum, teres, arcuatum, supra obsolete striatum, ferrugineum, pallido-pubescent, extrorsum punctulatum, apice ipso infuscatum. Antennæ sub-tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, atra, nitida, vix pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica dimidio longior, antice plus duplo angustior quam basi, apice oblique truncatus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice vix bi-sinuatus, elevato-marginatus, supra modice convexus, obsolete punctulatus, rufo-ferrugineus, nitidus, parce pallido-pubescent. Scutellum parvum, tuberculiforme, nigrum, parce pubescent. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi parum latiora, humeris fere rectangulatis, vix elevatis; lateribus haud ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis parum convexis; testacea, basi apiceque fusco-variegata, pube pallida sat dense adpersa. Thorax subtus punctulatus, rufo-ferrugineus, atro-variegatus; pectus et venter punctulata, nigra, nitida, hoc dense, illo parce albo-pubescente. Pedes longiusculi, rufo-testacei, parce pubescentes; femoribus clavatis, subtus spina acuta armatis, apice nigro-annulatis. — BHN.

\* 7. *N. WAHLBERGI*. (Schh.) — *Ovatus, rufo-testaceus, pube albida adpersus; rostro longitudine capitis cum thorace, sub-tenui, modice arcuato, punctulato; thorace sub-conico, evidenter crebre punctulato; elytris tenuiter punctato-striatis, fascia ante medium maculisque crebris, oblongis, posticis dense albo-pubescentibus, insignitis; femoribus clavatis, subtus apicem versus tri-spinulosis.*

*Patria* : Port Natal, Africae mer. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Nanophye Lythri* nonnihil brevior et latior. Caput parvum, rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, rufo-testaceum, pube pallida parce adpersum; oculi laterales, rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenui, teres, modice arcuatum, subtiliter confertim punctulatum, rufo-testaceum, nitidum, apice ipso infuscatum, parce pubescens. Antennae ad thoracis basin fere pertingentes, sub-tenui, testaceae, parce pilosae; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique truncatus, antice plus duplo angustior quam basi, lateribus obliquis, versus basin sensim ampliatis; postice sub-truncatus, tenui marginatus, supra convexus, evidenter crebre punctulatus, rufo-testaceus, nitidus, pube depressa, albida inaequaliter obsitus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra breviter ovata, antice truncata, thoracis basi vix latiora, humeris haud prominulis, sub-rectangulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis parum convexis, subtilissime coriaceis; rufo-testacea, nitida, macula parva basali prope scutellum, fascia obliqua ante medium maculisque posticis oblongis, crebris, dense albo-pubescentibus, insignita. Corpus subtus punctulatum, rufo-testaceum, parum nitidum, parce pubescens. Pedes elongati, validi, testacei, parce pubescentes; femoribus clavatis, praesertim anticis, subtus spinulis tribus, exterioribus brevioribus, instructis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 8. *N. GLOBULUS*. *German.* — *H. op.* IV. p. 784. 4. — *P. Germania, Suecia meridionalis.*



- \* 9. N. BREVIS. (Schh.) — *Breviter ovatus, ferrugineus, parce pallido-pubescentis; antennarum basi pedibusque dilutioribus, rostro longitudine thoracis, arcuato, basi striolato; thorace sub-conico, obsolete punctulato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, subtilissime coriaceis, ante medium fascia pallidiori insignitis; pectore dense albo-pubescente; femoribus muticis.*

*Patria: Geneva. DOM. GERMAN. MUS. SCHH.*

*Longitudo Nanophysis Lythri, sed multo latior, breviter ovatus, aliter coloratus. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, obscure ferrugineum, sub-nitidum, vix pubescens; oculi laterales, rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine thoracis, minus tenue, modice arcuatum, punctulatum, supra tenuiter striatum, ferrugineum, parum nitidum, pallido-pubescentis. Antennæ sub-tenues, dilutius ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, sub-acuminata, obscuriore. Thorax sub-conicus, latitudine postica brevior, antice plus duplo angustior quam basi, apice oblique truncatus, lateribus obliquis, versus basin sensim ampliatis; postice vix sinuatus, elevato-marginatus, supra modice convexus, obsolete crebre punctulatus, ferrugineus, nitidus, parce pallido-pubescentis. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor, parce pubescens. Elytra breviter ovata, antice sub-truncata, thoracis basi parum latiora, humeris vix elevatis, fere rectangularis; lateribus non ampliata, a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis parum convexis, subtilissime coriaceis; ferruginea, ante medium fascia pallidiori insignita. Thorax subtus punctulatus, ferrugineus; pectus et venter nigra, punctulata, hoc dense niveo-pubescente. Pedes longiusculi, dilutius ferruginei, parce pubescentes; femoribus crassis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.*

- \* 10. N. ULMI. *Megerle. — H. op. IV. p. 784. 5. — P. Austria, Italia, Anatolia.*

- \* 11. N. LANGUIDUS. (Schh.) — *Ovatus, rufo-testaceus, pube depressa, pallida undique dense obsitus; rostro longitudine fere capituli cum thorace, parum arcuato, basi striolato; thorace sub-conico, obsolete crebre punctulato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, sub-lævibus; femoribus clavatis, subtus bispinosis.*

*Orobitis Tamarisci. DOM. HELFER in litt.*

*Patria* : Sicilia. DOM. FALDERMANN. MUS. SCHH.

Magnitudo et statura *Nanophyis Tamarisci*, rufo-testaceus, densius pubescens; elytris unicoloribus ab illo differt. Caput parvum, oblongum, convexum, obsolete punctulatum, rufo-testaceum, sub-nitidum, pube depressa, albida densius obsitum; oculi laterales, rotundati, parum convexi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenue, teres, parum arcuatum, punctulatum, basi striolatum, rufo-testaceum, sub-nitidum, fere glabrum, apice ipso infuscatum. Antennæ sub-tenues, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, densius pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, antice duplo angustior quam basi, postice vix sinuatus, sub-truncatus, tenue marginatus, supra modice convexus, obsolete crebre punctulatus, rufo-testaceus, pube depressa, pallida undique adpersus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra ovata, antice truncata, thoracis basi laud latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis parum convexis, sub-lævibus; rufo-testacea, sub-nitida, pube depressa, albida undique sat dense obsita. Corpus subtus punctulatum, albo-pubescens, pectore fusco-piceo, ventre testaceo. Pedes longiusculi, validi, rufo-testacei, pallido-pubescentes; femoribus clavatis, subtus versus apicem spinulis duabus, interiore paulo majore, armatis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis parum dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 12. N. NITIDULUS. *Hoffmannsegg*. — *H. op.* IV. p. 785. 6. — *P. Lusitania*.

\* 13. N. TAMARISCI. *Dejean*. — *H. op.* IV. p. 786. 7. — *P. Gallia meridionalis, Lusitania*.

14. N. PALLIDUS. (*Olivier.*) — *Ovatus, convexus, pallide testaceus, pube brevi, albida adpersus; rostro vix longitudine capitis cum thorace, parum arcuato, basi striolato; thorace breviter sub-conico, obsolete punctulato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-lævibus, parum convexis; pectore piceo; femoribus obsolete dentatis.*

*Cionus id.* OLIV. *Ent.* V. 83. p. 113. 57. Tab. 29. f. 444.

*Hujus operis* IV. p. 786. 8.

*Patria* : Lusitania. MUS. DOM. CHEVROLAT.

Obs. — Magnitudo et statura *Nanophysis Tamarisci*, aliter coloratus; femoribus sub-dentatis ab illo distinctus. — BHN.

\* 15. N. PALLIDULUS. *Gravenhorst.* — *H. op.* IV. p. 787. 9. —  
P. Gallia meridionalis, Lusitania.

\* 16. N. POSTIGUS. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 787. 10. — P. Gallia meridionalis.

\* 17. N. SAHLBERGI. *Schl.* — *H. op.* IV. p. 788. 11. — P. Finlandia.

18. N. MARMORATUS (1). *Fourcroy.* — *H. op.* IV. p. 789. 13. —  
P. Gallia.

SECTIO III. — *Antennæ* 10, 9, 8, 7-articulatæ. (Funiculus variat numero articularum, in plerisque 6, 7, et in nonnullis 4 et 5.) (Gen. 590.-631.)

#### DIVISIO I. — CAMPYLOSCELIDES.

*Antennæ* mediocres; funiculus 7-articulatus; clava sub-solida, indistincte articulata. Rostrum deflexum, teres. Pedes antici basi distantes; tibiæ curvatæ. (Genus 590.-592.)

#### GENUS 590. — CAMPYLOSCELUS. *Nobis.*

*Character generis.* — *Antennæ* mediocres, minus tenues; funiculo 7-articulato: articulis omnibus brevissime obconicis, 1° et 2° paulo longioribus; clava elongata, sub-fusiforimi, spongiosa, solida.

Rostrum longiusculum, teres, sub-rectum.

Thorax amplus, oblongus, antice angustior, lateribus rectis; supra sub-planus.

Elytra oblonga, sub-ovata, basi tri-sinuata, apice conjunctim rotundata.

Pygidium nudum, semi-circulare.

Pedes robusti, femora valde crassa, clavata, subtus valide dentata; tibiæ compressæ, arcuatæ; tarsi angustati.

(1) Forte hujus generis? Mihi invisus.

DESCRIPTIO. — *Corpus* sub-ellipticum, parum convexum, squamosum, alatum; mediæ magnitudinis. — *Antennæ* ad thoracis medium haud pertingentes, mox pone medium rostri insertæ, validiusculæ, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculum sub-attingente, recto, clavato, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> longiusculis, sub-obconicis, 4-8 brevibus, sub-turbinatis, sub-æqualibus, ultimo clavæ adpresso; clava elongata, funiculo dimidio fere brevior, sub-fusiformi, vel potius sub-cylindrica, sub-obtusa, apice nonnihil compressa, spongiosa, solida, cute coriacea vestita. — *Rostrum* sub-deflexum, fere porrectum, capite triplo longius, validum, teres, sub-rectum, stria dimidiata, sensim attenuata, impressa, e medio oculorum exeunte, notatum; scrobe pone medium rostri incipiente, lineari, in basi rostri subtus cum opposita connexa. — *Oculi* laterales, sub-ovati, parum convexi. — *Thorax* latitudine postica paulo longior, basi distincte bi-sinuatus, lateribus rectis; versus apicem rotundatus, antè multo angustior, apice sub-truncatus, supra sub-planus. — *Scutellum* rotundatum, apice acuminatum, convexum. — *Elytra* antice tri-sinuata, thoracis basi non latiora illoque dimidio longiora, humeris antrorsum vix prominulis; oblongo-ovata, apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim rotundata, anum haud obtegentia, supra parum convexa, dorso antico paulo depressa. — *Pygidium* exsertum, sub-deflexum, apice semi-rotundatum, supra planum. — *Pedes* robusti, æquales, antici basi nonnihil distantes; femoribus valde clavatis, compressis, subtus dente unico, valido, acuto armatis; tibiis compressis, modice curvatis, apice extus unco valido, deflexo, acuto munitis; tarsis sub-angustatis, subtus spongiosis; articulo ultimo bi-unguiculato.

A *καμπύλος*, curvus, *σέλος*, crus.

TYPEUS. — *Campyloscelus Westermanni*; e Guinea.

Obs. — Generi *Sphenophoro* quoad habitum sub-simile est hoc genus.

\* I. C. WESTERMANNI. (Schh.)—*Ellipticus, depressus, niger, nitidus, silaceo-squamosus; capite rostroque denudatis; thorace amplo, sub-oblongo, dorso subtiliter minus crebre punctulato, plaga magna antice angustata, nuda insignito, lateribus rugulosis; elytris medio-criter punctato-striatis, interstitiis confertim coriaceis, macula disci ante et fascia transversa pone medium obscure umbrino-squamosis; sutura medio abdomineque basi denudatis.*

*Patria*: Guinea. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Magnitudo *Sphenophori hemipteri*. Caput rotundatum, convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum, sub-tus parce silaceo-squamosum; fronte obsolete foveolata; oculi sub-ovati, parum convexi, nigro-brunnei; rostrum capite triplo longius, validum, teres, parum arcuatum, subtiliter sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ minus tenues, nigro-piceæ, nitidæ; clava elongata, sub-fusiformi, fere cylindrica, apice acuminata, atro-pubescente. Thorax amplus, latitudine postica nonnihil longior, apice sub-truncatus, antè angustior, haud constrictus, lateribus mox pone apicem rotundato-amplatis, dein rectis; basi bi-sinuatus, supra in dorso sub-planus, subtiliter minus crebre punctulatus, lateribus evidenter confertim rugulosus, niger, nitidus, silaceo-squamulosus, disco plaga magna, oblongo-quadrata, antè angustata, denudata insignitus. Scutellum rotundatum, nigrum, silaceo-squamosum. Elytra antè tri-sinuata, thoracis basi fere angustiora, humeris antrorsum vix prominulis; lateribus apicem versus sensim attenuata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra in dorso fere plana, mediocriter striata, et in striis obsolete punctata, interstitiis planis, coriaceis; nigra, nitida, dense silaceo-squamosa, disco ante medium macula mediocri, sub-rotunda, fasciæque transversa, communi pone medium, obscure umbrino-squamosis, sutura medio denudata. Pygidium magnum, semi-ovatum, silaceo-squamosum. Corpus sub-tus subtiliter sub-remote punctulatum, nigrum, nitidum, silaceo-squamosum; abdomine basi plaga magna, sub-quadrata, denudata. Pedes robusti, nigri, silaceo-squamulosi; femoribus valde clavatis, sub-tus dente magno, acuto armatis; tibiis latis, compressis, basi modice arcuatis; tarsis angustis, sub-tus silaceo-spongiosis. — BHN.

GENUS 591. — AMORBAIUS. *Nobis*.

*Character generis*. — Antennæ mediocres, minus tenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus brevissime obconicis, reliquis brevioribus, sub-turbinatis; clava ovata, acuminata, sub-solidata.

Rostrum longiusculum, teres, basi utrinque longitudinaliter impressum; in uno sexu basi paulo crassius, parum arcuatum, in altero sexu lineare, sub-rectum.

Thorax oblongus, sub-conicus, intra apicem coarctatus, supra carinatus.

*Elytra* oblongo-ovata, basi bi-sinuata, apice conjunctim rotundata.

*Pygidium* apertum, deflexum.

*Pedes* validi; femora clavata, crassa, valide dentata; tibiæ compressæ, curvatæ; tarsi angustati, subtus spongiosi.

DESCRIPTIO. — *Corpus* sub-ellipticum, paulo convexum, sculpturatum, opacum, parce squamosum, alatum; medioeris magnitudinis. — *Antennæ* longitudine capitis rostrique, in mare versus apicem, in femina in medio rostri insertæ, minus tenues, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1° oculum sub-attingente, recto, clavato, 2° et 3° brevissime obconicis; 4-8 brevibus, sub-turbinitatis, exterioribus gradatim perparum latioribus, ultimo clavæ haud adpresso; clava ovata, acuminata, spongiosa, articulis haud discernendis. — *Rostrum* deflexum, capite triplo longius, validiusculum, basi utrinque impressione dimidiata, non profunda, basi lata, sensim attenuata, ad medium ducta, exaratum; in uno sexu (quem opinor esse masculum) lineare, sub-rectum, secundum totam longitudinem multi-costatum; in altero sexu, seu in femina, parum arcuatum, ante antennarum insertionem paulo crassius, dense costatum, postea paulo angustius, glabrum. — *Oculi* laterales, sub-rotundati, parum convexi. — *Thorax* latitudine baseos fere dimidio longior, basi profunde bi-sinuatus, angulis sub-rectis; anterius multo angustior, sub-conicus, intra apicem coarctatus, apice ipso truncatus, supra parum convexus, in medio argute carinatus. — *Scutellum* rotundatum. — *Elytra* basi thoracis parte postica haud latiora illoque dimidio longiora, basi tri-sinuata, humeris antrorsum sub-prominulis; oblongo-ovata, apicem versus sensim attenuata, apice ipso conjunctim rotundata, supra nonnihil convexa, dorso antico depressa. — *Pedes* mediocres, antichi paulo breviores et crassiores, basi nonnihil distantes; femoribus clavatis, subtus dente magno armatis; tibiis paulo curvatis, intus in medio latioribus, apice unco valido, deflexo armatis; tarsis angustatis, subtus haud spongiosis, articulo ultimo longo, clavato, falcato, bi-unguiculato.

Ab ἀμορβῆσις, tenebricosus, obscurus.

TYPE. — *Amorbaius infestus*; e Guinea.

Obs. — Generi *Campyloscelo* proximum; clava vero antennarum rostroque aliter constructis, hoc genus præcipue distinguitur.

♂♀ 1. *A. INFESTUS*. (Schh.) — *Sub-ellipticus, niger, opacus, squamulis cervinis inæqualiter adpersus; thorace longo, sub-conico, confertim rugoso-punctato, dorso carinato, intra apicem constricto; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, obsolete rugulosis.*

*Mas*: antennis apicem rostri propius insertis; rostro lineari, sub-recto, usque ad apicem multi-striato.

*Femina*: antennis fere in medio rostri insertis; rostro nonnihil arcuato, basi crassiore, striato, dein apicem versus punctulato.

*Patria*: Guinea. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Magnitudo *Sphenophori meridionalis*, sed variat etiam dimidio vel fere duplo minor. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre transversim aciculatum, nigrum, parum nitidum; fronte cervino-squamosa, leviter carinata; oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri; rostrum capite triplo longius, validum, pro sexu ut in diagnosi descriptum, nigrum, parum nitidum, basi parce squamulosum. Thorax latitudine postica fere dimidio longior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem late sed minus profunde constrictus, lateribus obliquis, versus basin sensim ampliatis, angulis sub-rectis; postice sat profunde bi-sinuatus, supra paulo convexus, confertim rugoso-punctatus, dorso anguste sed distincte carinatus, niger, parum nitidus, squamulis cervinis inæqualiter adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, parce squamulosum. Elytra antice tri-sinuata, thoracis basi perparum latiora, humeris vix elevatis, antrorsum haud prominulis; lateribus a basi apicem versus sensim perparum angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra paulo convexa, evidenter punctato-striata, interstitiis parum convexis, obsolete rugulosis; nigra, sub-opaca, inæqualiter, præsertim in dorso antico, cervino-variegata. Corpus subtus confertim rugoso-granulatum, nigrum, sub-opacum, squamulis cervinis parce apicem versus densius adpersum. Pedes validi, nigri, confertim punctulati, parce cervino-squamulosi; femoribus valde clavatis, subtus dente magno, acuto armatis; tibiis compressis, in medio latioribus, basi nonnihil arcuatis; tarsis angustis, subtus haud spongiosis. — BEN.

GENUS 592. — EPIPHYLAX. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ longiusculæ, sub-tenuæ; funiculo 7-articulato: articulo 1° breviusculo, turbinato, 2° elongato, sub-clavato, 3-4 brevissime obconicis, reliquis sub-rotundatis; clava spongiosa, aut elongata, sub-cylindrica, aut sub-ovalis, acuminata.

Rostrum longum, basi ultra medium validum, dein tenue, teres, arcuatum.

Oculi in fronte parum distantes, sub-rotundati, nonnihil convexi, majusculi.

Thorax conicus, anterieus multo angustior, basi profunde bisinuatus, supra utrinque longitudinaliter depressus.

Elytra ovata, basi bi-sinuata, humeris antrorsum prominulis, dorso depressa.

Pedes longiusculi, validi; tarsi longi, angustati.

*DESCRIPTIO.* — *Corpus* ellipticum, supra depressum, sculpturatum, dense squamosum, alatum; minoris magnitudinis. — *Antennæ* thoracis basin attingentes, ante medium rostri insertæ, sub-tenuæ, fractæ, 12-(?) articulatæ: articulo 1° seu scapo oculos attingente, clavato, 2° breviusculo, turbinato, 3° longiusculo, sub-clavato, 4° et 5° brevibus, sub-obconicis, 6-8 sub-rotundatis, ultimo clavæ haud adpresso; clava spongiosa, indistincte articulata, aut longa, sub-cylindrica, apice sub-acuminata (an mas?), aut sub-ovalis, apice magis acuminata (an femina?). — *Caput* paulo elongatum, conicum. — *Rostrum* deflexum, thorace fere longius, basi paulo crassius, utrinque compressum, dein magis tenue, teres, valde arcuatum, scrobe ante medium incipiente, lineari, curvata, in basi rostri infra cum altera coeunte. — *Oculi* majusculi, laterales, in fronte sub-approximati, paulo convexi. — *Thorax* conicus, latitudine postica paulo longior, anterieus dimidio angustior, intra apicem paulo coarctatus, basi manifeste bisinuatus, rectangulus, apice ipso oblique truncatus, supra utrinque longitudinaliter depressus, in medio paulo elevatus, carinatus. — *Scutellum* mediocre, depressum, apice rotundatum. — *Elytra* antice thoracis basi haud latiora et latitudine sesqui-longiora, sub-conica, basi tri-sinuata, humeris acutangulatis, antrorsum parum prominulis; lateribus a basi apicem versus sensim attenuata, apice ipso conjunctim acute rotundata, pygidium obtegentia, supra,



præsertim dorso, depressa. — *Pedes* longiusculi, validi, medio paulo breviores; femoribus ~~omnibus~~ modice, anticis solummodo perparum, distantibus, *clavatis*, subtus unidentatis; tibiis teretibus, paulo curvatis, *apice unco* valido, acuto, deflexo armatis; tarsis valde *elongatis*, *angulatis*, articulo penultimo paulo latiore, subtus spongioso, *ultimo clavato*, bi-unguiculato.

A ἐπιφυλαξ, custos.

TYPUS. — *Epiphylox ephippiger*; ex insula Madagasear.

Obs. — Generi *Amorbaia* similitudo paulo intercedit, sed notæ, in diagnosi indicatæ, facile distinguunt.

\* I. E. EPHIPPIGER, (Schh.) — *Ellipticus*, *niger*, supra parce subtus densius silaceo-squamosus; antennis rufo-piceis, capite elongato, confertim punctulato; thorace sub-conico, dorso parum convexo, utrinque longitudinaliter depresso, dense silaceo-tri-maculato, medio elevato, undique confertim rugoso-punctato, subtus silaceo-pubescente; elytris oblongo-triangularibus, mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, subtilissime coriaceis, macula media suturali punctisque nonnullis basi et apicis dense silaceo-squamosis.

*Patria*: Madagascar. E Mus. Reg. Gall. missus. Mus. SCHH. A Dom. GERMAR ad conferendum etiam communicatus.

Habitus et magnitudo *Mecopi bispinosi*. Caput sub-elongatum, conicum, modice convexum, confertim punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum; oculi magni, ovati, in fronte sub-approximati, convexi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, arcuatum, basi crassius, compressum, evidenter crebre punctatum, extrorsum magis tenue, teres, vix vel subtilissime punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenuæ, rufo-piceæ, parce pilosæ; clava aut longa, sub-cylindrica, sub-acuminata, aut sub-ovali, apice magis acuminata, fusco-pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine longior, anterius quam basi dimidio angustior, apice oblique truncatus, intra apicem paulo coarctatus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice bi-sinuatus, supra parum convexus, confertim ruguloso-punctatus, utrinque longitudinaliter depressus, dense silaceo-tri-maculatus, in medio elevatus, sub-carinatus, niger, sub-opacus, squamulis silaceis parcissime adpersus, subtus ante pedes dense silaceo-pubescentis. Scutellum mediocre, rotundatum, vix squamosum. Elytra oblongo-triangularia, antice tri-sinuata, thoracis basi vix latiora,

humeris antrorsum haud prominulis, rectangulatis; lateribus a basi apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra in dorso sub-plana, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, confertim rugulosis; nigra, sub-opaca, squamulis parvis, silaceis adpersa, in medio macula communi, sub-quadrata, punctisque duobus basalibus et totidem versus apicem, dense silaceo-squamosis, insignita. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, parce pleuris, dense silaceo-squamosum. Pedes elongati, validi, nigri, parce squamulosi; femoribus clavatis, subtus acute uni-dentatis; tibiis compressis, arcuatis; tarsis valde elongatis, angustis, articulo penultimo subtus silaceo-spongiosis. — BHN.

\* 2. E. BINODULUS. (Schh.) — *Ellipticus, niger, opacus, parce læte silaceo-squamosus; antennis femorumque medio rufo-ferrugineis, capite elongato, confertim rugoso-punctulato; thorace sub-conico, dorso parum convexo, confertim rugoso-punctato, utrinque longitudinaliter depresso, medio elevato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis rugulosis, secundo in medio tuberculo parum elevato instructo.*

*Patria:* Madagascar. E Mus. Reg. Gall. communicatus. Mus. SCHH. A DOM. CHEVROLAT ad conferendum etiam missus.

Magnitudo *Sphenophori meridionalis*. Caput sub-elongatum, conicum, modice convexum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, nigrum, opacum, antice leviter carinatum; oculi magni, ovati, in fronte sub-approximati, convexi, nigri; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, arcuatum, basi crassius, compressum, subtiliter crebre punctulatum, dein magis tenue, teres, subtilissime punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ sub-tenuis, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, obscuriore, dense fusco-pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica longior, apice oblique truncatus, anterieus angustior, intra apicem haud constrictus, lateribus versus basin sensim ampliatis; basi sat profunde bi-sinuatus, supra haud convexus, subtiliter confertim ruguloso-punctatus, dorso utrinque longitudinaliter depressus, medio elevatus, sub-carinatus, niger, opacus, parce silaceo-squamulosus. Scutellum mediocre, nigrum, vix squamosum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris vix elevatis, antrorsum haud prominulis; lateribus a basi apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim

acute rotundata, thorace dimidio longiora, supra parum convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, confertim rugulosis; interstitio secundo in medio dorsi tuberculo parum elevato, sub-obtuso instructo; nigra, opaca, squamulis silaceis parce inæqualiter adpersa. Corpus subtus crebre punctulatum, nigrum, magis nitidum, punctis squamis silaceis repletis. Pedes elongati, validi, nigri, parce squamulosi; femoribus clavatis, medio rufo-sanguineis, subtus dente mediocri, acuto instructis; tibiis sub-compressis, arcuatis; tarsis elongatis, angustis, obscure ferrugineis. — BHN.

DIVISIO II. — RHYNCHOPHORIDES (1). (CALANDRIDES. Fabr.)

*Antennæ mediocres; funiculus 6-, in nonnullis 5-articulatus; clava aut bi- aut indistincte articulata, sub-solida. Rostrum aut deflexum, aut porrectum. (Genus 593-619.)*

SUBDIVISIO I. — CRYPTOPYGI.

*Antennæ versus medium rostri insertæ. Pygidium elytra tegunt. (Gen. 593-597.)*

GENUS 593. — RHINA. Olivier.

*Curc. Disp. Méth. p. 323. gen. 189. — Huj. op. IV. p. 790. gen. 369.*

STIRPS I. — *Tibiæ in utroque sexu nude. (Spec. 1-4.)*

1. R. EBRIOSA. Chev. — *H. op. IV. p. 791. 1. — P. Mexico.*

♂♀. 2. R. BARBIROSTRIS. Fabr. — *H. op. IV. p. 792. 2. — P. Brasilia septentrionalis.*

LACORDAIRE, *Extr. des Annales des Sciences nat. XX. p. 125.*

♂♀. 3. R. COSTALIS. Schh. — *H. op. IV. p. 793. 3. — P. Brasilia septentrionalis.*

(1) *Rhynchophorus* hoc genus jam a Dom. HERBST, 1795, denominatum fuit, cui postea a DD. CLAIRVILLE, 1798, et FABRICIO, 1801, nomen *Calandra* datum est. Antiquiorem denominationem censui servandam. Observandum etiam est, ex more recepto, nomina generum græcam derivationem rectius habere. At vocabulum *Calandra* probabiliter ex lingua gallica sumptum est; gallice enim *Calandra granaria* dicitur *Calandre*. Frustra igitur hoc nomen a lingua græca derivare studuit LUNG in *Web. e Mohr. Archiv. I. I. p. 71*, a nobis cit. in *Curcul. Disp. Méth. p. 328.*

4. R. AFFABER. Schh. — *H. op. IV. p. 794. 4. — P. Mexico.*

STIRPS 3. — *Tibiæ maris subtus ciliatæ. (Spec. 5.-7.)*

♂ 5. R. SCRUTATOR. Olivier. — *H. op. IV. p. 795. 5. — P. Insula St.-Domingo.*

STURM, *Catal. 1843. p. 225.*

♂ 6. R. AFZELII. Schh. — *H. op. IV. p. 777. 6. — P. Sierra Leona Africæ.*

♂♀ 7. R. NIGRA. Drury. — *H. op. IV. p. 798. 7. — P. Madagascar.*

GENUS 594. — HARPACTERUS. *Nobis.*

*Character generis.*—Antennæ mediocres, validiusculæ; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, turbinatis, reliquis brevibus, sub-lenticularibus; clava ovata, sub-solida, spongiosa.

Rostrum porrectum, rectum, sub-teres, in medio ad insertionem antennarum ampliatum, crassius; mandibulæ divaricatæ, bi-dentatæ.

Oculi maximi, oblongi, sub-depressi, supra sub-approximati, subtus omnino connati.

Thorax sub-ovatus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus æqualiter rotundatus, supra modice convexus.

Elytra elongata, cylindrica, humeris obtuse angulatis.

Pedes minus validi, antici paulo longiores; femora sub-clavata; tibiæ sub-teretes, intus spinulis nonnullis munitæ, apice unco magno armatæ.

DESCRIPTIO. — *Corpus* oblongum, cylindricum, sub-glabrum, haud squamosum, alatum; majusculæ magnitudinis. — *Antennæ* thoracis medium attingentes, in medio rostri sitæ, validiusculæ, fractæ, 8-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculum attingente, clavato, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> longiusculis, turbinatis, 4-7 brevibus, lenticularibus, haud coarctatis, omnibus æqualibus; clava ovalis, sub-solida, cute coriacea vestita. — *Rostrum* thoracis fere longitudine, validum, porrectum, rectum, sub-teres, in medio ad antennarum insertionem ampliatum, abrupte crassius; mandibulæ exsertæ, diva-

ricatæ, bi-dentatæ; fovea antennali brevi. — *Oculi* oblongi, magni, supra parum distantes, infra caput conniventes, depressi. — *Thorax* latitudine baseos sesqui-longior, basi leviter bi-sinuatus, lateribus æqualiter modice rotundato-ampliatus, intra apicem anguste coarctatus, apice ipso truncatus, supra modice convexus. — *Scutellum* mediocre, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis medio vix latiora, quo vero fere triplo longiora, basi conjunctim introrsum emarginata, humeris obtuse angulatis; sub-cylindrica, convexa, apice obtuse rotundata. — *Pygidium* apertum, semi-rotundatum. — *Pedes* mediocres, antici reliquis longiores, basi parum distantes; femoribus sub-clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, rectis, apice inflexis, unco magno, acuto armatis, intus spinulis paucis instructis; tarsis elongatis, sub-angustatis, subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, bi-unguiculato.

Ab ὄρπακτῆρος, raptor.

TYPUS. — *Harpacterus* 4-signatus. — *Patria*: Brasilia.

Obs. — Quoad habitum inter hoc et genus *Rhina* pariter ac *Baridii* quædam intercedit similitudo.

f. H. EBENINUS. (Schh.) — *Oblongus, cylindricus, ater, sub-nitidus, glaber; capite remote sat profunde punctato, inter oculos canaliculato, rostro supra granulato, inter antennis obsolete canaliculato; thorace sub-remote mediocriter punctato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, seriatim remote punctulatis.*

*Patria*: Novum Friburgum, Brasiliæ. Dom. BESCKE. Mus. Dom. SOMMER.

*Sipalo subulato* magnitudine æqualis. Caput sub-rotundatum, convexum, remote sat profunde punctatum, atrum, nitidum, glabrum, inter oculos tenuiter canaliculatum; oculi magni, oblongi, in fronte sub-approximati, modice prominuli, nigri, infra caput conniventes; rostrum thorace nonnihil brevius, validum, porrectum, sub-teres, in medio ad antennarum insertionem ampliatus, abrupte crassius, supra granulatum, inter antennis obsolete canaliculatum, atrum, nitidum, glabrum. Antennæ validiusculæ, nigræ, basi piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax sub-ovatus, latitudine postica longior, apice truncatus, intra apicem profunde sed anguste constrictus, antice posticeque angustatus, lateribus æqualiter modice rotundato-am-

pliatiss; basi leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra paulo convexus, remote mediocriter parce punctatus, ater, sub-nitidus, glaber. Scutellum breve, apice rotundatum, rugoso-punctatum, concolor. Elytra antice conjunctim introrsum emarginata, thoracis medio vix latiora, humeris obtuse angulatis, haud elevatis; lateribus linearia, non ampliata, thorace fere triplo longiora, apice ipso conjunctim rotundata, supra modice convexa, postice declivia, ante apicem gibbere obtuso instructa, mediocriter punctato-striata, interstitiis parum convexis, seriatim remote punctulatis; atra, nitida, glabra. Pygidium semi-rotundatum, punctulatum, atrum, glabrum. Corpus subtus minus profunde sub-remote punctulatum, atrum, nitidum, glabrum. Pedes mediocres, sub-remote punctati; femoribus modice clavatis, atris, muticis; tibiis teretibus, obscure ferrugineis, intus spinulis brevibus, remotis instructis; tarsis concoloribus, valde elongatis, modice dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BEN.

2. *H. 4-SIGNATUS*. (Chevrolat.) — *Oblongus, cylindricus, niger, sub-nitidus; capite sat profunde crebrius punctato, inter oculos carinato, rostro granulato, inter antennis canaliculato; thorace sub-remote mediocriter punctato, cum linea media lævi; elytris squamulis raris, pallidis adpersis, macula irregulari basali et altera pone medium majore squamis concoloribus insignitis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, seriatim remote punctulatis.*

*Rhina id.* CHEVROLAT in litt.

*Patria*: Brasilia. Mus. Dom. CHEVROLAT.

*Harpactero ebenino* dimidio minor, præsertim angustior. Caput rotundatum, convexum, sat profunde et crebre punctatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum, inter oculos carinatum; oculi magni, ovati, in fronte sub-approximati, infra caput connexi, modice convexi, nigri; rostrum thorace nonnihil brevius, validum, teres, sub-rectum, medio ampliatus, supra granulatum, inter antennis profunde canaliculatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ validæ, nigræ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius fusco-pubescente. Thorax latitudine postica longior, apice truncatus, intra apicem profunde et anguste constrictus, antice posticeque angustatus, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra modice convexus, niger, sub-nitidus, sub-remote mediocriter punctatus, linea media sub-lævi instructus. Scutellum breve, apice rotundatum,

atrum, nitidum, læve. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtuse angulatis; lateribus linearia, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, mediocriter sulcata, sulcis in fundo crebre punctatis; nigra, sub-nitida, squamulis raris, pallidis adspersa, in ipsa basi macula irregulari et longe pone medium altera transversa e squamulis concoloribus. Pygidium semi-rotundatum, punctulatum, atrum, cinereo-squamulosum. Corpus subtus remote punctulatum, atrum, nitidum. Pedes mediocres, sub-remote punctati, punctis squamis pallidis repletis; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, intus remote crenulatis; tarsis elongatis, modice dilatatis, obscure ferrugineis. — BHN.

GENUS 595. — SIPALUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 324. gen. 190. — *H. op.* IV. p. 8po. gen. 370.

♂ 1. S. GUINENSIS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 800. 1. — *P. Guinea.*

♂ 2. S. BURMEISTERI. *Boheman.* — *H. op.* IV. p. 802. 2. — *P. Nova Guinea.*

♂♀ 3. S. GRANULATUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 803. 3. — *P. Ins. Sumatra et Java.*

*Mas* : rostro validiore, basi modice incrassato, extrorsum rugoso-punctato, opaco.

*Femina* : rostro paulo tenuiore, basi crassiore, extrorsum vix punctato, glabro, nitido.

♂ 4. S. HYPOCRITA. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, niger, pulvere fusco-umbrino tectus; rostro basi profundius canaliculato, rugoso; thorace oblongo, supra convexo, dorso crebre scrobiculato, carinato, lateribus modice rotundato-ampliato, noduloso; elytris a basi ultra medium sat profunde remote striato-punctatis, interstitiis alternis inæqualiter atro-maculatis, postice leviter albo-granulatis.*

*Patria* : Himalaya. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Primo intuitu *Sipalo granulato* simillimus, dimidio fere major, præsertim latior; thorace latiore, dorso crebrius profundius scrobiculato, late carinato, lateribus non rectis, sed modice rotundatis, ab illo differre videtur. Caput rotundatum, convexum, obso-

lete remote punctatum, nigrum; vertice transversim denudato; fronte umbrino-pulverulenta; oculi magni, infra caput conniventes, ovati, depressi, nigri; rostrum longitudine fere thoracis, validum, teretiusculum, valde arcuatum, ante insertionem antennarum incrassatum, supra in dorso sat profunde canaliculatum, rugoso-granulatum, pulvere umbrino obsitum, dein apicem versus glabrum, sub-opacum, sub-remote ruguloso-punctatum. Antennæ crassiusculæ, nigræ, pulvere brunneo tectæ; clava sat magna, pyriformi, apice sub-obtusa, fusco-pubescente. Thorax oblongus vel latitudine baseos longior, apice late sed parum profunde emarginatus, antè angustatus, leviter coarctatus, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi truncatus, supra convexus, dorso scrobiculis oblongis, sat crebris impressus, linea media sat lata, sub-elevata, lævi instructus, lateribus valide nodosus, niger, parce umbrino-pulverulentus. Scutellum minutum, triangulare, dense pulverulentum. Elytra basi conjunctim emarginata, antice thorace dimidio latiora, humeris parum elevatis, oblique angulatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, thorace fere triplo longiora, supra convexa, postice declivia, a basi ultra medium profunde remote dein subtiliter striato-punctata, interstitiis fere planis, posterius sub-seriatim albo-granulatis; tota nigra, umbrino-squamosa, interstitiis alternis maculis inæqualibus, atro-squamosis. Corpus subtus nigrum, pectore profunde, ventre obsolete punctatis; pulvere umbrino obsitum. Pedes longi, validi, nigri, pulvere fusco-brunneo tecti, granulis parvis, setiferis minus dense adpersi; femoribus parum incrassatis, mucosis; tibiis sub-teretibus, apicem versus inflexis, unco valido armatis; tarsis elongatis, angustis, subtus canaliculatis, haud spongiosis. — BEN.

♂♀ 5. S. MISUMENUS. (Schh.) — Oblongo-ovatus, niger, opacus, parce fusco-umbrino-squamosus; rostra basi canaliculata, granulata; thorace oblongo, lateribus recto, acute spinoso, dorso profunde crebre scrobiculato; elytris a basi ultra medium profunde sat crebre dein subtiliter striato-punctatis, interstitiis postice remote granulatis, maculis nonnullis obsolete, atris variegatis.

Mas: rostro validiore, extrorsum rugoso-punctato, opaco, thorace dorso remotius scrobiculato.

Femina: rostro tenuiore, extrorsum sub-lævi, glabro, nitido, thorace dorso crebre scrobiculato.

Patria: Ins. Philippines. DOM. WALTON. Mus. SCHH.



Magnitudo, statura et summa similitudo *Sipali granulati*, parcius squamosus; thorace, lateribus præsertim antè spinulosis, ab illo differt. Caput rotundatum, convexum, valde remote subtiliter punctatum, nigrum, sub-nitidum, vertice transversim denudatum, fronte fusco-squamosum; oculi magni, infra caput conniventes, ovati, sub-depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis, validum, valde arcuatum, teres, a basi fere ad medium crassius, supra canaliculatum, granulatum, fusco-squamosum, extrorsum tenuius, glabrum. Antennæ validæ, nigræ; clava sub-pyriformi, apice sub-obtusa, fusco-pubescente. Thorax omnino ut in *Sipalo granulato* constructus, tuberculis lateralibus magis prominentibus, acutis, dorso in femina crebrius scrobiculato; cæterum ut in jam dicto, parcius tamen squamosus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, opacum, vix squamosum. Elytra antice conjunctim emarginata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris modicè elevatis, oblique angulatis; lateribus linearia, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse acuminata, thorace triplo fere longiora, supra convexa, postice declivia, a basi ultra medium sat profunde remote seriatis, dein subtiliter punctata, interstitiis sub-planis, postice remote granulatis; nigra, opaca, parce fusco-squamulosa, dorso maculis nonnullis sparsis, obsoletis, atris variegata. Corpus subtus remote pectus profundius punctatum, nigrum, opacum, vix squamosum. Pedes longi, validi, nigri, parce granulati et griseo-pulverulenti. — BHN.

♂ 6. S. MENDICUS. Schh. — *H. op. IV. p. 804. 4.* — *P. Sierra Leona Africæ.*

♂♀ 7. S. STRIATUS. Dejean. — *H. op. IV. p. 805. 5.* — *P. Cayenna.*

♂♀ 8. S. MEMNONIUS. (Schh.) — *Oblongus, niger, glaber, nitidus, rostro sub-lævi, basi strictura sub-tri-foveolata a fronte distincto; thorace remote punctulato, apice constricto; elytris punctato-striatis, interstitiis convexis, tenuissime serie-punctulatis.*

*Mas*: minor; rostro basi crassiori, apicem versus minus attenuato.

*Femina*: major; rostro basi minus incrassato, apicem versus magis attenuato.

Habitat in Brasilia. E Mus. DD. GERMAR, CHEVROLAT et SCHH. descriptus.

A *Sipalo striato*, cui magnitudine paulo minor, differt præcipue statura magis convexa, rostro fere lævi vel subtiliter tantum punctulato, thorace subtilius et parcius punctato superficieque glabra. Corpus totum cum pedibus antennisque nigrum, nitidum. Caput parvum, semi-globosum, disperse punctulatum; oculi infra connati, depressi; rostrum thorace brevius, extrorsum nonnihil attenuatum, modice arcuatum, basi versus latera utrinque canalicula brevi, plus minusve distincta, insculptum, ibique tenuiter sub-ochraceo-pulverulentum, alibi glabrum, sub-læve, vel punctulis tantum minutissimis raro adpersum, sub ipsa fronte transversim impressum; strictura medio puncto obsoleto et ad singulum oculum foveola insculpta. Antennæ brevissimæ, crassæ, parce griseo-setulosæ. Thorax latitudine paulo longior, apice subbi-sinuatus, intra apicem constrictus, pone stricturam mox rotundato-ampliatus, dein versus basin leviter angustatus, postice oblique truncatus, marginatus, supra perparum convexus, minus profunde punctatus, punctis in dorso rarioribus, vix pulverulentis. Scutellum breviter sub-ovale, apice impressum, læve. Elytra thoracis antica parte vix latiora, at illo plus duplo longiora, antice conjunctim leviter emarginata, pone humeros parum prominentes haud ampliata, margine laterali medio sinuato; posterior angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, supra parum convexa, ante apicem utrinque impressa, regulariter striata, et in striis sat crebre punctata, interstitiis parum convexis, tenuissime sub-simpliciter seriato-punctatis. Corpus subtus parce punctatum, sterno longitudinaliter impresso. Pedes mediocres, crassiusculi; femoribus subtus tibiisque pilis setulisque griseis parce adpersis.

FHS.

9. *S. CYLINDRACEUS*. (Schh.) — *Oblongus, angustior, niger, glaber, nitidus; rostro valido, sub-lævi, apicem versus parum angustato, basi non constricto; thorace oblongo, remote punctulato, apice profunde constricto; elytris minus profunde punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, lævibus.*

*Patria*: Brasilia. Mus. DOM. GERMAR.

Similis certe *Sipali Memnonii*, sed dimidio major, præsertim longior; rostro validiore, basi non constricto, thorace apice profundius constricto, elytris minus distincte punctato-striatis, interstitiis lævibus, ab illo differt. Caput parvum, semi-globosum, disperse sat crebre ruguloso-punctatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum; oculi mediocres, infra connati, depressi, nigri; ros-

trum thorace brevius, validum, modice arcuatum, extrorsum nonnihil attenuatum, ante antennarum insertionem utrinque ampliatus; totum nigrum, nitidum, sub-læve, vel obsoletissime punctulatum, basi non constrictum. Antennæ breves, crassæ, nigrae, parce setulosæ; clava brevi, sub-obtusa, apice cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica paulo longior, apice sub-sinuatus, intra apicem profunde constrictus, pone stricturam mox modice rotundato-ampliatus, dein versus basin leviter angustatus, postice truncatus, tenuiter marginatus, supra perparum convexus, remote minus profunde punctatus, niger, sub-nitidus, glaber. Scutellum breviter sub-ovale, concolor, læve. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis parte antica parum latiora et illo plus duplo longiora, pone humeros parum prominentes non ampliata, posterius sensim angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, supra parum convexa, postice declivia, ante apicem utrinque leviter impressa, regulariter striata, in striis sat crebre minus profunde punctata, interstitiis sub-convexis, lævibus; nigra, sub-nitida, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, concolor. Pedes mediocres, crassiusculi, nigri; femoribus subtus tibiisque pilis setisque griseis parce adpersis.

BHN.

♂♀ 10. *S. SUBULATUS*. Germ. — *H. op.* IV. p. 806. 6. — *P. Brasilia borealis*.

\* 11. *S. PAPULATUS*. (Schh.) — *Elongatus, sub-cylindricus, niger, opacus, parce griseo-pulverulentus; fronte foveola impressa; rostro basi haud constricto; thorace oblongo, crebre rugoso-punctato, æqualiter rotundato-ampliato; elytris tenuiter striatis, interstitiis griseo-leprosis.*

Habitat in Brasilia, prope Novum Friburgum. Dom. BESCKE. E Mus. Dom. SOMMER descriptus.

Longitudo, præter rostrum, 6, latitudo, 2 lin. Par. Caput parvum, semi-globosum, sat crebre punctatum, nigrum; fronte foveola impressa; oculi depressi, nigri; rostrum thorace brevius, leviter arcuatum, sub-teres, ruguloso-punctatum, nigrum, ad basin utrinque griseo-pulverulentum, margine scrobis antennarum inferiore insigniter elevato. Antennæ medium thoracis parum excedentes, nigrae; clava apice rotundata, ibique griseo-spongiosa. Thorax latitudine baseos dimidio longior, basi oblique truncatus, marginatus; lateribus æqualiter rotundato-ampliatus, apice superne sub-

truncatus, pone oculos leviter lobatus, mox intra apicem constrictus, supra parum convexus, crebre sub-rugoso-punctatus, dorso antice carinula obsoleta notatus, niger, punctis plus minusve griseo-pulverulentis, basi plaga semi-circulari, atra. Scutellum sub-ovatum, læve, basi sub-canaliculatum, apice impressum. Elytra thoracis medio vix latiora, illo autem fere triplo longiora, linearia, basi conjunctim levissime emarginata, apice conjunctim acute sub-rotundata, supra convexa, ante apicem utrinque obsolete impressa, tenuiter striata, striis vix punctulatis, interstitiis sub-planis; nigra, opaca, vesiculis exiguis, griseo-pulverulentis vage adspersa. Corpus subtus remote punctatum, nigrum, opacum, parce griseo-vesiculosum et pulverulentum. Pedes elongati, disperse griseo-pulverulenti, nigri; femoribus sub-simplicibus; tibiis tere-tibus, arcuatis, apice acute uncinatis. — FHS.

♂♀ 12. *S. SPHACELLATUS*. *Dejean.* — *H. op. IV. p. 808. 7.* —  
*P. Carthagena Columbiae.*

13. *S. RUGICOLLIS*. (*Chevrolat.*) — *Elongatus, sub-cylindricus, niger, parum nitidus, griseo-pulverulentus; fronte crebre punctata, rostro punctato, basi haud constricto, foveolato; thorace oblongo, lateribus modice rotundato, confertim rugoso-punctato; elytris cylindricis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis crebrius griseo-leprosis.*

*Patria: Cayenna. Mus. Dom. CHEVROLAT.*

Minoribus *Sipali sphacellati* magnitudine æqualis et facies sub-similis; rostro subtilius punctato, thorace utrinque minus rotundato-ampliato, confertim ruguloso-punctato, elytris crebrius griseo-leprosis, ab illo distinctus. Caput parvum, semi-globosum, nigrum, nitidum, vertice parce fronte sat crebre punctatum, foveolatum, inter oculos griseo-pulverulentum; oculi mediocres, depressi, nigri, infra caput conniventes; rostrum thorace brevius, validum, parum arcuatum, sub-teres, sat crebre punctatum, basi parce griseo-pulverulentum, extrorsum glabrum, totum nigrum, nitidum. Antennæ breves, crassæ, nigræ, parce pilosæ; clava apice rotundata, ibique cinereo-spongiosa. Thorax latitudine baseos vix dimidio longior, apice late sed parum profunde emarginatus, pone oculos leviter lobatus, mox intra apicem anguste constrictus, lateribus pone stricturam modice rotundato-ampliatas, versus basin iterum angustatis; basi oblique truncatus, tenue marginatus, supra parum convexus, confertissime rugoso-punctatus, niger, parum nitidus, sat dense

griseo-pulverulentus. *Scutellum* sub-ovatum, læve, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis medio vix latiora, illo autem triplo longiora, linearia, humeris obtuse rotundatis; apice ipso conjunctim rotundata, supra convexa, postice declivia, ante apicem utrinque obsolete impressa, tenuiter striata, striis vix punctatis, interstitiis sub-planis; nigra, parum nitida, vesiculis exiguis, griseo-pulverulentis, vage sat crebre adspersa. Corpus subtus remote punctatum, nigrum, sub-nitidum, abdomine fusco-pulverulentum. Pedes elongati, nigri, parce griseo-pulverulenti; femoribus subtus parce breviter griseo-setulosis; tibiis teretibus, apicem versus inflexis, apice acute uncinatis. — **BAN.**

♀ 14. *S. BRACTEOLATUS*. *Chev.* — *H. op.* IV. p. 809. 8. — *P. Mexico.*

\* 15. *S. LEPROSUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 810. 9. — *P. Columbia.*

\* 16. *S. FORRIGINOSUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 811. 10. — *P. Ins. Guadeloupe.*

17. *S. RUBETRA* (1). *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 812. 11. — *P. Cayenna.*

GENUS 596. — SPHÆNOGNATHUS (2). *Nobis.*

*Orthognathus* (3). *Huj. op.* IV. p. 812. gen. 371.

\* 1. *S. LIVIDUS*. *Schh.* — *P. Brasilia.*

*Orthognathus. id.* *Huj. op.* IV. p. 813.

GENUS 597. — STROMBOSCERUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 814. gen. 372.

\* 1. *S. SCHÜPPELI*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 815. 1. — *P. Madagascar.*

## SUBDIVISIO II. — GYMNOPLYGI

*Antennæ versus basin rostri insertæ; funiculus semper 6-articulatus. Pygidium nudum, seu ab clytris non tectum. (Gen. 598-619.)*

(1) Forte hujus generis? Mihi invisus.

(2) Α σφηνός, cuneus, γνάθος, mandibula.

(3) Hoc nomen inter *Lucanides* usitatum.

GENUS 598. — RHYNCHOPHORUS. *Herbst.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 326. genus 191. STIRPS 1. — *Huj. op.* IV. p. 816. gen. 373. — *Calandra*, LACORDAIRE, *Extr. des Ann. des Scienc. Nat.* XX. p. 125. — *Cordylus* (1), THUNBERG, *N. Acta Ups.* VII. p. 107.

STIRPS 1. — *Thorax postice productus, bi- vel quadri-sinuatus.*  
(Spec. 1-7.)

♂♀ 1. R. BORASSI. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 818. 1. — *P. Amer. meridionalis.*

♀ 2. R. POLITUS. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 819. 2. — *P. Cayenna.*

3. R. PALMARUM. *Liné.* — *H. op.* IV. p. 820. 3. —  
*P. Brasilia, Cayenna, Surinam.*

\* 4. R. NOXIUS. *Chev.* — *H. op.* IV. p. 821. 4. — *P. America borealis, Bostoni, Brasilia.*

*Calandra Germari.* PERTY, *Delect. Anim. artic.* p. 82. T. 16. f. 12.

*Calandra crassirostris.* DEJEAN. *Catal.* ed. 2. p. 303. ed. 3. p. 328.

5. R. NITIDIPENNIS. (*Chevrolat.*) — *Ater, nitidus, glaber; rostro sat valido, parum arcuato, sat crebre punctulato; thorace subtilissime remote lateribus evidenter punctulato, lobo postico rotundato; elytris apice singulatim rotundatis, singulis supra sulcis quinque sublevibus exarato, quarto et quinto apice non connexis, interstitiis subtilissime valde remote punctulatis; pedibus subtus atro-ciliatis.*

*Patria* : Cayenna. A Dom. CHEVROLAT ad describendum communicatus.

*Rhynchophoro noxio* proximus, sed duplo minor, supra nitidus; lobo postico thoracis apice rotundato, non emarginato, striis elytrorum 4<sup>o</sup> et 5<sup>o</sup> apice non arcuatim conjunctis, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter minus crebre punctulatum, atrum, sub-nitidum, glabrum, inter oculos foveola

(1) *Cordylus*, genus quoddam Reptilium, secundum Aristoteles.

sat profunda insculptum; oculi oblongi, depressi, nigro-brunnei; rostrum thorace dimidio fere brevius, validum, parum arcuatum, teres, apice nonnihil incrassatum, angulatum, mandibulis exsertis; sat crebre punctulatum, atrum, nitidum. Antennæ mediocres, atræ; clava securiformi, apice griseo-pubescente. Thorax amplus, ellipticus, latitudine media dimidio longior, apice truncatus, intra apicem in utroque latere striga transversa impressus, lateribus pone strigam oblique ampliatis, dein sub-rectis; basi valde productus, lobo medio rotundato; supra parum convexus, dorso subtilissime lateribus evidenter remote punctulatus, ater, nitidus, glaber. Scutellum oblongo-triangulare, subulatum, atrum, læve. Elytra antice conjunctim profunde emarginata, angulo humerali antrorsum producto, rotundato; pone basin oblique ampliata, lateribus dein fere rectis; apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra plana, in singulo interne sulcis quinque sat profundis, impunctatis exarata, quarto et quinto apice non conjunctis, interstitiis convexis, valde remote subtiliter lateribus sub-seriatim punctulatis; tota atra, nitida, glabra. Pygidium magnum, triangulare, medio elevatum, disperse punctatum, atrum, sub-opacum, ad margines atro-setosum. Corpus subtus obsolete remote punctulatum, atrum, nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, atri, nitidi; femoribus tibiisque subtus atro-ciliatis. — BHN.

♂♀ 6. R. SERRIROSTRIS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 823. 6. — *P.* Ins. Java.

*Mas*: rostro brevior, sub-recto, evidenter tuberculato, versus apicem lamina triangulari, valde elevata, compressa instructo; clava antennarum magis elongata; femoribus tibiisque subtus densius rufo-ciliatis.

*Femina*: rostro longior, arcuato, rugoso, longe ante apicem in medio crista modice elevata instructo, antennarum clava minus elongata; femoribus tibiisque subtus parcius rufo-ciliatis.

♂ VAR.  $\beta$ . Ater, supra opacus, limbo corporeque nitidus.

*Rhynchophorus Reaumuri.* *Huj. op.* IV. p. 822. 5. — BHN.

♂♀ 7. R. RUBIGINEUS. *Wiedem.* — *H. op.* IV. p. 824. 7. — *P.* Bengalia, Java.

STURM, *Catal.* 1843. p. 226.

STIRPS 2. — *Thorax postice obtuse rotundatus.* (Spec. 8-12.)

♂♀ 8. R. PHÆNICIS. Fabr. — *H. op.* IV. p. 825. 8. — P. Guinea, Senegalia, Sierra Leona.

♂♀ 9. R. SCHACH. Fabr. — *H. op.* IV. p. 287. 9. (Synonymon OLIVIERI deletur.)

♂♀ VAR. β. Obscure purpurascens, opacus, subtus nitidus. *Rhynchophorus ferrugineus.* *H. op.* IV. p. 287. 10.

♀ VAR. γ. Dilutius purpurascens, thorace plus minusve nigromaculato.

*Rhynchophorus ferrugineus.* VAR. β. *H. op.* IV. p. 287. 10.

♀ VAR. δ. Thoracis vitta dorsali ferruginea, elytris obscure ferrugineis, sutura vittaque externa nigris; subtus cum pedibus ferrugineus, nitidus.

♀ VAR. ε. Niger, supra opacus, subtus nitidus, thoracis vitta lata dorsali segmentoque basali abdominis tibiisque anterioribus ferrugineis.

*Rhynchophorus vulneratus.* VOET. *H. op.* IV. p. 828. 11.

STURM, *Catal.* 1843. p. 226.

*Calandra ferruginea.* OLIV. *Ent.* V. 83. p. 80. 8. Tab. 16. fig. 204.

*Patria* : Java et Sumatra. Mus. SCHH.

BHN.

♂♀ 10. R. PASCHA. (Kunze.) — *Niger, sub-nitidus, glaber; thorace convexiore, levi, postice obtusissime rotundato, vitta lata dorsali purpurascente ornato, scutello elongato, sub-acuminato; elytris externe vix striatis, versus marginem evidenter punctulatis, apice singulatim obtuse sub-rotundatis pedibusque obscure rufescenti-ciliatis; pygidio triangulari, disperse punctulato.*

*Mas* : rostro validiore, supra anterius crista dense fusco-setosa instructo.

*Femina* : rostro longiore, attenuato, glabro.

♂♀ VAR. β. Supra opacus, subtus nitidus, interdum subtus cum tibiis obscure ferrugineus.

*Patria* : Insulæ Philippines. A DD. GERMAR et WALTON communicatus. Mus. SCHH.



Magnitudo, statura et summa similitudo *Rhynchophori Schach*, ab illo tamen differre videtur pubescentia rostri et pedibus obscurioribus, elytris externe evidenter punctulatis et præsertim apice singulatim obtuse rotundatis. Caput rotundatum, brevissimum, atrum, sub-nitidum, subtilissime remote punctulatum; fronte foveola parva insculpta; oculi elongati, parum convexi, nigri; rostrum thorace brevius, porrectum, in mare validius, sub-rectum, confertim ruguloso-punctatum, anterius crista dense fusco-setosa; in femina longius, attenuatum, apicem versus non-nihil arcuatum, glabrum. Antennæ breves, crassæ, nigræ, parce pilosæ; clava transversim ovata, ferruginea. Thorax latitudine media longior, apice truncatus, pone apicem constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-amplius, postice obtusissime rotundatus, tenue marginatus, supra modice convexus, sub-lævis, niger, nitidus, glaber, vitta lata, dorsali, purpurascenti ornatus. Scutellum elongatum, apicem versus attenuatum, sub-acuminatum, læve, concolor. Elytra antice profunde conjunctim emarginata, angulo humerali antrorsum prominulo, rotundato; lateribus anterius oblique ampliata, dein sub-recta, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra plana, in singulo introrsum sulcis quinque simplicibus, apicem non attingentibus, exarata, externe evidenter punctulata, nigra, sub-nitida, glabra. Pygidium triangulare, modice convexum, apice acutum, nigrum, subtiliter remote punctulatum, lateribus ferrugineo-ciliatum. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, vel obscure ferrugineum, nitidissimum. Pedes breviusculi, validi, nigri; tibiis interdum ferrugineis. — BHN.

♂ I I. R. ZIMMERMANNI. (*Germar.*) — *Niger, nitidus; thorace lævi, postice obtuse rotundato, scutello subulato; elytris apice truncatis, dorso sulcis sex, extimo tenui abbreviato, exaratis; femoribus tibiisque fulvo-ciliatis.*

*Mas* : rostro parum arcuato, dorso scabro.

*Femina* : rostro distincte arcuato, lævi.

*Patria* : America borealis. A DD. GERMAR et CHEVROLAT communicatus.

*Rhynchophorus basicornis*. Dom. CHEVROLAT in litt.

*Rhynchophoro Palmarum* mediocri dimidio minor. Caput parvum, sub-rotundatum, punctulatum, nigrum; fronte puncto impressa; oculi elongati, sub-depressi, nigri; rostrum dimidio tho-

racis paulo longius, extrorsum attenuatum, nigrum, maris parum incurvum, temere punctatum, dorso granulis sub-seriatis exasperatum, feminae distincte arcuatum, basi modo punctulatum, extrorsum laeve, lateribus utrinque sub-elevato-bi-lineatum. Antennae piceae, scapo extrorsum clavaque ferrugineis. Thorax latitudine media dimidio longior, apice truncatus, intra apicem evidenter constrictus, pone stricturam abrupte ampliatus, dein versus basin sub-linearis, postice obtuse rotundatus, ibique tenuiter marginatus, supra deplanatus, apice et subtus tenuissime disperse punctulatus, in dorso de caetero vix nisi laevis, niger, nitidus, disco dorsi nonnunquam languide carbonario. Scutellum oblongum, attenuatum, apice subulatum, concolor, laeve. Elytra antice conjunctim profunde sinuato-emarginata ibique thorace non latiora, ad humeros subito at breviter ampliata, posterius leviter angustata, apice sub-truncata, thorace parum longiora, supra sub-depressa, sulcis sub-laevis; in singulo elytro sex interne exarata, intimis tribus fere ad apicem extensis, quarto quintoque successive brevioribus, illo apice arcuato, sexto tenuiore, utrinque admodum abbreviato, adjectis externe seriebus duabus vel tribus, eodem modo abbreviatis, e punctis minutissimis, aegre observandis, striolaque intra-marginali ad apicem laterum utrinque impressa; tota nigra, vix nisi posterius disperse subtilissime punctulata, maris nitida, femina in disco languide carbonaria, sulcis striisque modo nitidis. Pygidium magnum, sub-triangulari, parum convexum, disperse punctulatum, nigrum. Corpus subtus nigrum, nitidissimum, glabrum, sub-laeve vel punctulis obsoletissimis parce adpersum. Pedes breviusculi, validi, nigri; femoribus tenuiter sub-granulatis tibiisque omnibus subtus fulvo-ciliatis. — FHS.

12. R. BARBIROSTRIS (1). *Thunb.* — *H. op.* IV. p. 828. 12. —  
*P. Amer. meridionalis.*

GENUS 599. — PROTOCERIUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 828. gen. 374.

- ♂♀ 1. P. COLOSSUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 831. 1. — *P. Ins. Java.*  
*STURM, Catal.* 1843. p. 226.

2. P. DRURYI (1). *Schh.* — *H. op.* IV. p. 831. 2. — *P. Insula Johanna prope Madagascar.*

3. P. MOLOSSUS. Oliv. — *H. op.* IV. p. 831. 3. — *P.* India orient.

GENUS 600. — MACROCHEIRUS. *De Haan.*

*Hujus operis* IV. p. 831. genus 375.

♀ 1. M. PRÆTOR. Schh. — *H. op.* IV. p. 833. 1. — *P.* Ins. Java.

GENUS 601. — CYRTOTRACHELUS., *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 883. genus 376.

♂♀ 1. C. DUX. (Schh.) — *Ovato-ellipticus, rufo-brunneus, nitidus, glaber; capite nigro, obsolete remote punctulato; thorace subtilissime subtus evidenter confertim coriaceo, plaga dorsali inæquali, lateribus basi litura didyma atris, decorato; elytris mediocriter striatis, interstitiis planis, subtilissime crebre coriaceis, humeris, vitta infra medium margineque laterali nigris; corpore subtus atro-variegato.*

*Mas* : rostro longiore, supra plano, utrinque a medio apicem versus elevato-marginato, obtuse tuberculato; thorace dorso vitta lata, antice abbreviata, atra decorato; pedibus anticis longissimis; femoribus basi compressis, inflexis; tibiis valde arcuatis, subtus dense et longe fulvo-ciliatis.

*Femina* : rostro tenuiore, ruguloso, non tuberculato; thorace basi litura anchoræformi, atra decorato; pedibus anticis mediocribus; femoribus rectis; tibiis subtus parcius, brevius fulvo-ciliatis.

*Patria* : Assam. DOM. WESTERMANN JUNIOR. MUS. SCHH.

*Habitus* *Cyrtotracheli longipedis*, sed plus duplo major. Caput breve, rotundatum, convexum, remote subtiliter punctulatum, nigrum, parum nitidum, glabrum, inter oculos foveola parva, profunda insculptum; oculi elongati, sub-depressi, nigri, infra caput conniventes; rostrum in mare longitudine thoracis, validum, rectum, angulatum, margine laterali a medio apicem versus elevatum, ibique obtuse tuberculatum, apice nonnihil ampliatus, emarginatus, feminae basi crassius, extrorsum nonnihil tenuius, non tuberculatum, in utroque subtiliter crebre rugulosum, ferrugineum, parum nitidum. Antennæ sub-tenuis, nigrae, nitidae. Thorax latitudine media paulo longior, anterieus angustior, apice sub-truncatus, longe pone apicem in utroque latere striga profunda insculptus, lobo antico tubulato, obscure ferrugineo; late-

ribus pone strigam oblique ampliatis, pone medium sub-rectis; basi obtuse rotundatus, utrinque leviter sinuatus, elevato-marginatus; supra modice convexus, pulvinatus, sub-lævis, vel obsolete crebre coriaceus, subtus, præsertim in mare, confertim granulatus, rufo-brunneus, nitidus, dorso in mare vitta lata, antice attenuata, ibique nonnihil abbreviata, in femina signo brevi, anchoræformi, basali, in utroque ad latera, non procul a basi, litora didyma, atris insignitus. Scutellum oblongo-triangulare, apice subulatum, nigrum, subtilissime coriaceum, basi remote punctulatum. Elytra antice conjunctim profunde emarginata, thoracis basi nonnihil latiora, angulo humerali antrorsum producto; pone basin oblique ampliata, dein posterius angustiora, apice singulatim acute rotundata, ibique ad suturam mucrone parvo, acuto instructa; thorace vix dimidio longiora, supra fere plana, striis interioribus profundis, impunctatis, exterioribus obsolete punctulatis, interstitiis sub-planis, subtilissime crebre coriaceis; rufo-brunnea, nitida, glabra, humeris, striis exterioribus in fundo, plaga oblonga, versus latera fere in medio margineque laterali, nigris. Pygidium sub-triangulare, convexum, obsolete remote punctulatum, rufo-ferrugineum, in femina magis acuminatum. Corpus subtus læve, rufo-ferrugineum, pectore apice abdomineque medio atris. Pedes pro sexu ut in diagnosi, rufo-ferruginei; femoribus anticis totis, reliquis apicem versus nigris; tarsi elongatis, articulo tertio valde dilatato, subtus flavo-spongiosis.

BHN.

♂♀ 2. *C. LONGIPES*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 835. 1. — *P.* India orientalis, China.

♂ 3. *C. LAR.* *Erichson.* — *H. op.* IV. p. 836. 2. — *P.* Insula Manilla.

STURM, *Catal.* 1843. p. 226.

GENUS 602. — LITORHYNCHUS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ longiusculæ, sub-tenues; articulis tribus basalibus funiculi longiusculis, sub-obconicis, reliquis brevibus, sub-turbinatis; clava mediocri, transversa, compressa, securiformi.

Rostrum longum, sub-tenue, teres, apice supra planiusculum, perparum arcuatum.

Thorax breviter ovatus, basi angulato-productus, antice subito angustior, apice tubulatus, supra pulvinatus.

Elytra sub-cordata, apice singulatim rotundata.

DESCRIPTIO. — *Corpus* elliptico-ovatum, supra paulo convexum, glabrum, alatum; mediæ magnitudinis. — *Antennæ* thoracis basin pertingentes, mox prope basinrostri insertæ, sub-tenues, fractæ, 9-articulatæ; scapo elongato, apicem versus incrassato; funiculo 6-articulato: articulis 1-3 oblongis, sub-obconicis, reliquis brevibus, sub-turbinatis, apice truncatis, omnibus distantibus; clava mediocri, oblique sub-ovata, compressa, bi-articulata: articulo 1° corneo, apice sinuato, 2° spongioso, apice obtuso, semi-retundato, cultrato. — *Caput* rotundatum. — *Rostrum* longitudine capitis una cum thorace, basi breviter nonnihil incrassatum, dein tenue, teres, apice supra planiusculum, deflexum, perparum arcuatum, fere rectum. — *Oculi* laterales, infra caput approximati, sub-ovati, depressi. — *Thorax* latitudine baseos paulo longior, breviter ovatus, basi rotundato-productus, leviter 4-sinuatus, anguste elevato-marginatus, antice cito angustior, intra apicem valde coarctatus, tubulatus, apice oblique sub-truncatus, supra convexus, sub-pulvinatus. — *Scutellum* oblongo-triangulari, apice acuminatum. — *Elytra* antice thoracis basi parum latiora, illoque sesqui-longiora, basi conjunctim introrsum profunde emarginata, reflexo-marginata, pone basin manifeste ampliata, lobo humerali producto; posterius valde angustiora, apice singulatim rotundata, supra parum convexa. — *Pygidium* sub-porrectum, apicem versus attenuatum, supra argute 3-carinatum. — *Pedes* validi, antici paulo longiores; femoribus sub-clavatis; tibiis paulo compressis, nonnihil arcuatis, apice unco fixo, valido, inflexo armatis; articulo penultimo tarsorum latiore, ob-cordato, subtus spongioso; unguibus longis, acutis.

A λυτὸς, tenue, ῥύγχος, rostrum.

TYPUS. — *Litorhynchus Westernmannii*; e regno Assam Bengalice, prope montes Himalaya.

Obs. — In hoc genere feminam solum possideo; marem non vidi. Habitu haud dissimile generis *Cyrtotrachelii*.

♀ I. WESTERMANNI. (Schh.) — Ovato-ellipticus, rufo-ferrugineus, nitidus; antennis, capite rostroque nigris; thorace sub-ovato, remote subtiliter basi profunde punctato, vitta media angusta, macula

*parva, rotunda, laterali basi apiceque nigris; elytris sub-triangularibus, punctato-striatis, interstitiis planis, remote vage punctulatis; pygidio profunde punctato, tri-carinato; corpore subtus atro-variegato; femoribus basi apiceque infuscatis.*

*Patria* : Assam, Bengalîæ. Dom. WESTERMANN JUN. Mus. SCHH.

Femina nobis tantum cognita. *Cyrtotrachelo longipedi* sub-similis, sed plus duplo minor. Caput rotundatum, convexum, sat profunde minus crebre punctatum, nigro-piceum, nitidum, glabrum, inter oculos foveola minus profunda insculptum; oculi elongati, parum convexi, nigri, infra caput fere conniventes; rostrum longitudine capitis cum thorace, in ipsa basi nonnihil incrassatum, dein tenue, teres, parum arcuatum, extrorsum paulo ampliatus, ibique supra planiusculum, sub-remote punctulatum, apicem versus crebre aciculatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ longiusculæ, sub-tenues, nigræ, nitidæ, glabræ; clava compressa, oblique sub-ovata, apice dense griseo-pubescente. Thorax latitudine baseos paulo longior, sub-ovatus, apice truncatus, antè angustior, pone apicem constrictus, lobo antico tubulato, nigro, profundius punctato; lateribus pone stricturem rotundato-ampliatus, basi rotundato-productus, leviter quadri-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter remote punctulatus, basi punctis paucis sparsis majoribus impressus, rufo-ferrugineus, nitidus, glaber, ipsa basi transversim, vitta angusta media maculaque parva, rotunda, in medio lateris, nigris. Scutellum oblongo-triangulare, apice acuminatum, atrum, nitidum, glabrum, basi punctatum. Elytra basi conjunctim profunde emarginata, reflexo-marginata, thoracis basi parum latiora, lobis humeralibus productis; pone basin oblique ampliata, dein posteriorius valde angustata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace nonnihil longiora, supra in dorso fere plana, punctato-striata, striis interioribus profundis, exterioribus tenuioribus, omnibus mediocriter punctatis, interstitiis planis, subtiliter remote vage punctulatis; rufo-ferruginea, nitida, glabra, limbo laterali et apicis pallido-fimbriato. Pygidium sub-triangulare, apice truncatum, sat crebre et profunde punctatum, alte tri-carinatum, rufo-ferrugineum, parce silaceo-setulosum. Corpus subtus sub-remote lateribus evidenter punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, pectore ventreque basi atro-variegatis, segmentis ultimis abdominis utrinque silaceo-setulosis. Pedes validi, antici paulo longiores, remote punctulati, rufo-ferruginei, nitidi; fe-

moribus basi apiceque infuscatis; tibiis compressis, nonnihil arcuatis; tarsis elongatis, nigro-piceis. — BHN.

GENUS 603. — OMMATOLAMPUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 837. genus 377.

\* 1. O. CUVIERI (Schh.) — *Lineari-elongatus*, ater, nitidus; thorace sub-conico, subtiliter remote punctulato, ferrugineo, tri-vittato; elytris interne anguste striatis, maculis quatuor manis, ferrugineis ornatis; pygidio ferrugineo, vitta media atra decorato; pedibus ferrugineis; femoribus apice tarsisque nigris.

*Patria*: Java. Dom. WESTERMANN. Mus. SCHH.

*Ommatolampo hæmorrhoidali* dimidio major. Caput majusculum, sub-quadratum, modice convexum, vix punctulatum, atrum, parum nitidum, fronte inter oculos longitudinaliter impressa; oculi magni, convexi, nigri, in fronte sub-approximati; rostrum thorace brevius, validum, teres, sub-rectum, capite angustius, basi crassum, apice etiam dilatatum et lobo magno, rotundato, sub-reflexo utrinque instructum, supra rugoso-punctatum, atrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ validiusculæ, atræ, vix pilosæ; clava apice griseo-spongiosa. Thorax latitudine multo longior, antè angustior, apice truncatus, intra apicem utrinque constrictus, lateribus oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, lobo medio magno, valde producto, rotundato; supra parum convexus, subtilissime remote punctulatus, ater, lateribus et vitta lata dorsali, ferruginea ornatus. Scutellum oblongo-triangularè, acutum, basi impressum, punctulatum, piceum, nitidum. Elytra antè conjunctim profunde emarginata, angulo humerali antè producto, rotundato; lateribus non ampliata, apice fere truncata, angulo laterali rotundato; thorace vix dimidio longiora, supra in dorso fere plana, et in singulo striis quinque tenuibus, obsolete punctatis exarata; atra, parum nitida, singulo maculis duabus, magnis, ferrugineis, una basali et altera apicali, notato. Pygidium magnum, semi-ellipticum, parum convexum, ferrugineum, punctulatum, vitta media atra decoratum, apice impressum, pallido-ciliatum. Corpus subtus remote subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum, lateribus ferrugineo-variegatis. Pedes breviusculi, validi, rufo-ferruginei; femoribus apice tarsisque nigris; femoribus subtus tibiisque intus ferrugineo-setosis. — BHN.

\* 2. O. HÆMORRHOIDALIS. *Wiedemann*. — *H. op.* IV. p. 838. 1.  
— *P. Bengalia*.

3. O. GERMARI. (*Schh.*) — *Lineari-elongatus*, ater, sub-nitidus, supra fusco-squamosus; thorace sub-conico, obsolete remote punctulato, linea dorsali postice abbreviata, sub-elevata, lævi instructo, vitta infra-laterali, ferruginea ornato; elytris interne evidenter striatis, plaga magna, communi, a basi ad medium extensa, denudata insignitis; femoribus medio ferrugineis.

*Patria* : Java. Mus. Dom. GERMAR.

Statura omnino *Ommatolampi hæmorrhoidalis*, sed dimidio minor, aliter coloratus. Caput majusculum, sub-quadratum, obsolete remote punctulatum, nigrum, parum nitidum, fusco-squamulosum, inter oculos leviter impressum; oculi magni, convexi, brunnei, in fronte sub-approximati; rostrum thorace brevius, validum, sub-compressum, parum arcuatum, basi crassius, apice etiam nonnihil dilatatum, lobo magno, rotundato, sub-reflexo utrinque instructum, supra confertim punctatum, atrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ validiusculæ, atræ, parce pilosæ. Thorax latitudine longior, anterieus angustior, apice truncatus, lateribus oblique ampliatis; basi bi-sinuatus, lobo medio magno, magis rotundato; supra fere planus, remote subtiliter punctulatus, ater, opacus, fusco-holosericeus, linea media sub-elevata, postice abbreviata, denudata insignitus, lateribus denudatis, cum vitta ferruginea. Scutellum oblongo-triangulare, acutum, sub-læve, atrum, nitidum. Elytra antice conjunctim profunde emarginata, angulo humerali antrorsum producto, rotundato; lateribus non ampliata, apice fere truncata, angulo laterali rotundato; thorace vix dimidio longiora, supra in dorso plana, fere depressa, et in singulo striis quinque tenuibus, evidenter punctatis, exarata; atra, nitida, margine laterali et posteriori opaca, fusco-holosericea, plaga magna, communi, a basi ultra medium denudata. Pygidium magnum, semi-ellipticum, parum convexum, subtiliter punctulatum, nigrum, fusco-holosericeum, apice impressum. Corpus subtus nigrum, nitidum, glabrum, remote segmento ultimo abdominis crebrius punctatum. Pedes breviusculi, atrii; femoribus medio ferrugineis. — BHN.



GENUS 604. — CONOCEPHALUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 839. genus 378.

♂ 1. C. GYLLENHALI, *Schh.* — *H. op.* IV. p. 841. 1. — *P. Cochinchina.*

♂♀ 2. C. LIMBATUS, *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 841. 2. — *P. Insula Bourbon, Ile de France.*

♂ 3. C. GUERINI, *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 842. 3. — *P. Madagascar.*

GENUS 605. — TRIGONOTARSUS. *Guérin.*

*Hujus operis* IV. p. 843. genus 379.

♂♀ 1. T. CALANDROIDES, *Guérin.* — *H. op.* IV. p. 844. 1. — *P. Nova Hollandia.*

*Mas* : rostro brevior, parum arcuato, basi magis incrassato, undique confertim profunde rugoso-punctato, opaco.

*Femina* : rostro longior, recto, apicem versus subtiliter crebre punctato, nitido.

STURM, *Catal.* 1843. p. 226.

GENUS 606. — POTERIOPHORUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 845. genus 380.

♂♀ 1. P. NIVEUS, *Klug.* — *H. op.* IV. p. 846. 1. — *P. Java.*  
STURM, *Catal.* 1843. p. 226.

♀ 2. P. VITTATUS. (*Schh.*) — *Oblongus, niger, silaceo-squamosus; rostro valido, valde arcuato, supra leviter carinato, subtus tuberculis duobus silaceo-barbatis instructo; thorace sub-conico, subtiliter sub-remote punctato, virescenti-quinque vittato; elytris tenuiter striatis, interstitiis planis, sub-seriatim punctulatis, sutura, vitta inæquali disci margineque laterali virescenti-squamosis; pygidio leviter tri-carinato.*

*Patria* : Insula Java. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

*Amerhino Dufresnii* nonnihil minor, præsertim angustior. Caput rotundatum, convexum, sub-remote punctulatum, nigrum,

nitidum, inter oculos silaceo-squamosum; oculi oblongi, subdepressi, nigri; rostrum longitudine fere thoracis, valde arcuatum, basi crassum, apicem versus nonnihil attenuatum, subcompressum, supra sat crebre punctulatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum, silaceo-squamosum, dein nigrum, nitidum, glabrum, subtus infra antennis tuberculis binis, sub-conicis, barba silacea cinctis, instructum. Antennæ validæ, nigræ, silaceo-incrustatæ; clava breviter ovata, apice cinereo-pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica multo longior, apice truncatus, antè angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam ad medium obliquis, dein fere rectis; basi leviter bisinuatus, tenuè marginatus, supra modice convexus, subtiliter subremote punctatus, niger, dense silaceo-squamosus, vittis quinque, dorsali latiori, virescenti-squamosis, decoratus. Scutellum oblongum, apicem versus attenuatum, silaceo-squamosum. Elytra antè leviter tri-sinuata, thoracis basi nonnihil latiora, mox pone basin oblique ampliata, humeris non elevatis; lateribus apicem versus perparum angustata, apice conjunctim rotundata, vel subtruncata, thorace vix dimidio longiora, supra modice convexa, postice declivia, interstitiis planis, sub-seriatim punctulatis; nigra, silaceo-squamosa, sutura, vitta inæquali disci lateribusque virescenti-squamosis. Pygidium sub-triangularè, apice truncatum, elevato-marginatum, in medio carinatum, disperse punctatum, silaceo-squamosum. Corpus subtus vage subremote punctulatum, nigrum, crusta silacea tectum, vitta utrinque sub thorace et in pectore, indumento virescenti tectum. Pedes mediocres, validi, cinereo-incrustati; femoribus disperse punctulatis, subtus pube densa, silacea obsitis; tibiis subcompressis, striatis, intus silaceo-barbatis; tarsis valde dilatatis, subtus dense spongiosis. — BHN.

GENUS 607. — PHACECORYNES. *Nobis.*

*Calandra.* BURMEISTER.

*Character generis.* — Antennæ mediocres, sub-tenuès; articulo basali funiculi brevissime obconico, reliquis transversis, sub-lenticularibus, exterioribus sensim crassioribus; clava rotundata, compressa, argute lentiformi.

Rostrum longiusculum, sub-tenuè, teres, basi crassius, rectum.

Thorax breviter ovatus, intra apicem coarctatus, supra parum convexus.

Elytra oblongo-ovata, apice ipso singulatim rotundata; humeri obtuse rotundati; supra modice convexa.

Pedes mediocres, validi, longitudine æquales.

DESCRIPTIO. — *Corpus* sub-ellipticum, supra nonnihil convexum, alatum; majusculæ magnitudinis. — *Antennæ* thoracis medium pertingentes, prope basin rostri sitæ, sub-tenuis, fractæ, 9-articulatæ; scapo thoracem apice sub-attingente, clavato; funiculo 6-articulato: articulo 1<sup>o</sup> brevissime obconico, 2-5 transversis, sub-lenticularibus, 6<sup>o</sup> paulo latiore, sub-perfoliato; clava majuscula, sub-rotundata, compressa, argute lentiformis, bi-articulata: articulo 1<sup>o</sup> brevi, corneo, 2<sup>o</sup> spongioso, apice acietato. — *Rostrum* thorace dimidio brevius, basi abrupte incrassatum, ubi antennæ insertæ, in medio canaliculatum, dein tenue, cylindricum, rectum, porrectum. — *Oculi* laterales, infra caput fere connexi, oblongi, depressi. — *Thorax* latitudine baseos dimidio longior, basi paulo rotundato-productus, vix bi-sinuatus, lateribus nonnihil rotundatus, antè angustior, mox intra apicem anguste coarctatus, apice ipso truncatus, supra parum convexus. — *Scutellum* triangulare. — *Elytra* antice thoracis basi parum latiora, illoque fere duplo longiora, ovata, basi conjunctim introrsum rotundato-emarginata, pone basin nonnihil ampliata, humeris obtusis; dein posterius sensim nonnihil attenuata, apice ipso singulatim rotundata, abdomine breviora, supra modice convexa. — *Pygidium* apice sub-rotundatum, deflexum. — *Pedes* mediocres, longitudine sub-æquales, validi; femoribus crassioribus, muticis; tibiis rectis, sub-compressis, apice unco fixo, valido armatis; tarsis mediocribus, subtus spongiosis; articulo ultimo clavato, falcato, bi-unguiculato.

A φαχή, lenticula, κορύνη, clava.

TYPUS. — *Phacecorynes Sommeri*; e Capite Bonæ Spei.

Obs. — Quoad habitum generi *Sphenophoro* sub-simile, dissimile vero clavæ antennarum rostrique structura.

\* 1. P. SOMMERI. (*Burmeister.*) — *Ellipticus, niger, sub-nitidus, subtus parce griseo-pubescentis, rostro capiteque rufo-ferrugineis, hoc basi profunde sulcato; thorace remote inæqualiter punctato, dorso longitudinaliter sub-impreso, canalicula brevi, tenui insculpto, vittis quatuor rufo-ferrugineis, medio abruptis insignito; elytris profunde sulcato-punctatis, interstitiis convexis, subtilissime punctulatis, parce ferrugineo-maculatis.*

*Calandra* id. BURMEISTER. *Naturg. der Gatt. Calandra.* Tab. fig.

*Patria*: Caput Bonæ Spei. D. SOMMER. A DOM. COM. MANNERHEIM donatus.

*Sphenophoro abbreviato* nonnihil minor. Caput breve, rotundatum, convexum, subtiliter confertim punctulatum, rufo-ferrugineum, glabrum; oculi oblongi, depressi, nigri, infra caput fere connexi; rostrum thorace dimidio brevius, rectum, basi abrupte incrassatum, ibique supra profunde sulcatum, dein tenue, cylindricum, sub-nitidum, glabrum, fere læve. Antennæ mediores, nigrae, parce pilosæ; clava magna, compressa, lentiformis. Thorax latitudine baseos dimidio longior, apice truncatus, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis; basi paulo rotundato-productus, vix bi-sinuatus, supra parum convexus, inæqualiter remote punctatus, niger, sub-nitidus, setulis brevissimis, griseis parce adpersus, dorso longitudinaliter obsolete impressus et in impressione canalicula brevi, tenui insculptus, vittis quatuor rufo-ferrugineis, medio sub-abruptis, decoratus. Scutellum triangulare, nigrum, opacum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi nonnihil latiora; humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus nonnihil angustata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra modice convexa, sat profunde et crebre sulcata, sulcis in fundo mediocriter punctatis; interstitiis convexis, subtilissime vage punctulatis; nigra, sub-nitida, glabra, maculis nonnullis ferrugineo-translucentibus decorata. Pygidium breve, apice rotundatum, piceum, punctatum. Corpus subtus nigrum, nitidum, parce breviter griseo-setulosum, pectore evidenter crebre ventre obsolete punctulatum. Pedes mediocres, punctulati, nigri; femoribus sub-compressis, clavatis, muticis; tibiis rectis, apice uncinatis. — BHN.

GENUS 608. — EUGNORISTUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 848. genus 381.

♂♀ 1. E. MONACHUS. *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 849. 1. — *P. Madagascar.*

STURM, *Catal.* 1843. p. 226.

GENUS 609. — CERCIDOCERUS. *Guérin.*

*Hujus operis* IV. p. 850. genus 382.

♂ 1. *C. BIPUNCTATUS*. De Haan. — *H. op.* IV. p. 851. 7. —  
P. Java.

♂ 2. *C. BIMACULATUS*. Schh. — *Oblongo-ellipticus, niger, parum nitidus, supra fere glaber, subtus cinereo-variegatus; rostro valde arcuato, basi crassiore, ibique supra canaliculato; thorace latiore, oblongo, supra plano, dorso impresso, medio carinato, rude crebre rugoso-punctato, antice utrinque cinereo-vittato; elytris profunde punctato-sulcatis, macula rotundata, holosericeo-atra in singulis medio notatis; pygidio medio leviter carinato.*

*Patria* : Assam, Ind. orient. Dom. WESTERMANN. JUN. Mus. SCHH.

*Affinis certe Cercidoceri bipunctati et C. fabricatoris; ab utroque thorace latiore, dorso magis rude crebre rugoso-punctato, ut et indumento aliter disposito, distinctus. Caput parvum, rotundatum, convexum, postice parce antierius crebrius disperse punctatum, nigrum, nitidum, glabrum; oculi perpendiculares, valde elongati, sub-depressi, nigri, infra caput conniventes; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, valde arcuatum, basi crassius, anguste canaliculatum, disperse punctatum, extrorsum attenuatum, teres, sub-læve, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ validæ, nigræ; clava transversa, utrinque valde elongata, compressa. Thorax oblongus, latitudine postica longior, antice angustior, apice truncatus, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliatum, lateribus dein sub-rectis; basi bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra planus, dorso longitudinaliter impressus, in medio carinatus, rude sat crebre rugoso-punctatus, lateribus minus crebre sat profunde punctatus, niger, sub-nitidus, utrinque antice vitta cinereo-squamosa decoratus. Scutellum oblongum, parce pallido-squamulosum. Elytra antice singulatim obtuse rotundata, thoracis basi latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus nonnihil ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra fere plana, profunde punctato-sulcata, interstitiis sub-convexis, lævibus; nigra, sub-opaca, in medio disci singuli elytri macula rotundata, holosericeo-atra, notata. Pygidium magnum, apice obtuse rotundatum, elevato-marginatum, medio tenuiter carinatum, profunde punctatum, nigrum, opacum, sub-nudum. Corpus subtus remote punctatum, nigrum, sub-nitidum, lateribus et plaga pectorali cinereo-squamosum. Pedes validiusculi, nigri, nitidi, remote punctulati; femoribus clavatis, muticis, subtus parce setulosis; tibiis sub-rectis, intus densius silaceo-barbatis. — BEN.*

- ♂♀ 3. *C. FABRICATOR*. Schh. — *H. op.* IV. p. 852. 2. — *P. Borneo*.
- ♂ 4. *C. FABRILIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 853. 3. — *P. Borneo*.
- ♀ 5. *C. ERYTHROCEUS*. Chevr. — *H. op.* IV. p. 854. — *P. Java*.
6. *C. NIGROLATERALIS*. Guérin. — *H. op.* IV. p. 854. 5. — *P. Java*.
- Cercidoc. securiformis*. GAEDE. — *H. op.* IV. p. 855. 6.

♂ 7. *C. LATERALIS*. (De Haan.) — *Sub-ellipticus, niger, nitidus; thorace subtus vittaque laterali dorsi, scutello necnon limbo anteriore pectoris ventrisque eborino-tomentosis; tergo thoracis longitudinaliter impresso, temere excavato-punctato, medio carinulato; elytris crenato-striatis, posterius lineolis oblitteratis, cano-pruinosis pictis.*

STURM, *Catal.* 1843. p. 226.

*Calandra id.* DOM. DE HAAN in litt.

*Patria*: Java. A DOM. DE HAAN amicissime communicatus. MUS. SCHH.

Magnitudo *Sphen. hemipteri*. Caput parvum, sub-rotundatum, disperse punctatum, nigrum; oculi elongati, depressi, supra satis approximati, subtus sub-conniventes; rostrum longitudine thoracis, valde arcuatum, extrorsum attenuatum, ad insertionem antennarum leviter sub-tumescens, basi subtus lateribusque rude scrobiculatum, superne tenuiter punctulatum, linea media abbreviata insculptum, versus apicem læve, ibique ad latera utrinque sulco vadoso exaratum, totum nigrum, glabrum. Antennæ validiusculæ, nigræ; clava compressa, transversim utrinque lineari-elongata. Thorax latitudine baseos fere duplo longior, basi marginatus, medio rotundato-productus, utrinque levissime sub-sinuatus, a basi ultra medium indistincte, dein subito angustatus, apice truncatus, intra apicem constrictus, sub-tubulatus, supra in medio longitudinaliter impressus, carinatus, juxta carinulam lacerato-scrobiculatus, in disco præterea ut etiam ad latera inferne sub-remote excavato-punctatus, niger, nitidus, pagina inferiore, vitta laterali dorsi utrinque margineque tenuissimo baseos eborino-tomentosis. Scutellum elongatum, apice sub-acuminatum, tomento eborino obductum. Elytra antice conjunctim distincte emarginata, thoraci arcte applicata ibique illo non latiora, mox

vero breviter ampliata, dein manifeste sensim angustata, apice singulatim rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra sub-depressa, mox intra apicem transversim impressa, regulariter striata, striis punctis excavatis confertim crenatis; nigra, nitida, interstitiis sub-lævibus, in medio dorsi et juxta apicem interne lineolis aliquot exiguis, canescenti-sericeis obliteratis. Pygidium exsertum, basi angulato-lobatum, apice obtuse rotundatum, nonnihil convexum, undique sub-remote excavato-punctatum, griseo-pruinosum, medio longitudinaliter denudatum. Corpus subtus nigrum, nitidum, disperse punctatum, pectoris basi illiusque et abdominis lateribus inæqualiter tomento eborino, concreto, sericeo-nitido indutis; sterno impresso. Pedes mediocres, nigri, nitidi, disperse punctati; femoribus subtus linea albido-tomentosa, ciliisque ejusdem coloris præditis; tibiis tenuiter griseo-ciliatis; tarsis subtus helvo-spongiosis. — FHS.

GENUS 610. — SCYPHOPHORUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 855. genus 383.

♂♀ 1. S. INTERSTITIALIS. *Sturm.* — *H. op.* IV. p. 856. 1. —  
P. St-Domingo, Mexico.

STURM, *Catal.* 1843. p. 227.

♀ 2. S. ACUPUNCTATUS. *Chevrol.* — *H. op.* IV. p. 857. 2. —  
P. Mexico.

STURM, *Catal.* 1843. p. 227.

3. S. ANTHRACINUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 858. 3. — P. Mexico,  
Amer. meridionalis.

GENUS 611. — CREPIDOTUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 859. genus 384.

♂ 1. C. AUDOUINI. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 860. 1. — P. Madagascar.

2. C. VARIOLOSUS (1). *Klug.* — *H. op.* IV. p. 861. 2. — P. Madagascar.

---

(1) Mihi invisus.

GENUS 612. — ACANTHARHINUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 861. genus 385.

♂ 1. A. DREGEI. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 863. 1. — *P.* Caput Bonæ Spei.

GENUS 613. — AXINOPHORUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 863. genus 386.

1 A. GAGES. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 865. 1. — *P.* Guinea.

GENUS 614. — SPHENOCORYNUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 866. genus 387.

♂♀ 1. S. QUADRIPUNCTATUS. *Weber.* — *H. op.* IV. p. 867. 1. — *P.* Java, Sumatra.

*STURM, Catal.* 1843. p. 227.

GENUS 615. — MEGAPROCTUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 868. genus 388.

1. M. ACUTUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 870. 1. — *P.* Sumatra.

\* 2. M. EXCLAMATIONIS. *Wiedemann.* — *H. op.* IV. p. 871. 1. — *P.* Java.

\* 3. M. FUNEBRIS. *Illiger.* — *H. op.* IV. p. 872. 3. — *P.* Sierra Leona.

GENUS 616. — BELOPOEUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 872. genus 389.

♂♀ 1. B. CARMELITUS. *Hoffmanns.* — *H. op.* IV. p. 873. 1. — *P.* Brasilia.

*Calandra id.* DRAPIÈZ, *Annal. d. Scienc. phys.*

GENUS 617. — SPHENOPHORUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 874. genus 390.



STIRPS 1. — *Articulo penultimo tarsorum sæpissime majusculo, in nonnullis paulo angustiore, subtus semper spongioso.* (Spec. 1-64.)

\* 1. S. SCHOENHERRI. Hope. — *H. op.* IV. p. 875. 1. — P. Melville, Novæ Hollandiæ.

\* 2. S. CRENATUS. Billberg. — *H. op.* IV. p. 876. 2. — P. Brasilia septentrionalis et interior.

\* 3. S. SENEGALENSIS. Dejean. — *H. op.* IV. p. 877. 3. — P. Senegallia.

4. S. STRIATOFORATUS. Chevrol. — *H. op.* IV. p. 878. 4. — P. Columbia.

\* 5. S. SERICANS. (Wiedemann.) — *Ellipticus, planus, rufo-piceus, sub-nitidus; rostro breviusculo, valido, punctato; thorace oblongo, medio longitudinaliter sub-impreso, lateribus et in area dorsali punctato, vittis duabus lævibus insignito; elytris rufo-ferrugineis, sub-remote punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, lævibus, apice truncatis, singulo maculis tribus nigris notato.*

*Calandra id.* WIED. *Zool. Mag.* Huj. op. IV. p. 986. 7.

*Sphenophorus Hypocrita.* Huj. op. IV. p. 879. 5.

*Calandra 6-maculata.* DEJ. *Cat.* ed. 2. p. 303. ed. 3. p. 328.

VAR.  $\beta$ . Dilutius rufo-ferrugineus; elytris immaculatis.

*Patria:* Insula Java.

BHN.

6. S. FERRUGINEUS. (Schh.) — *Ellipticus, sanguineus, sub-nitidus, glaber; rostro breviusculo, crasso, recto, basi remote punctato; thorace sub-conico, parum convexo, vix punctato, scutello apice rotundato, piceo; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, lævibus, apice ipso truncatis.*

*Patria:* Sumatra. Mus. Imp. Russ.

Habitus et statura fere *Sphenophori sericantis*, dimidio minor, dilutius sanguineus; rostro basi tantum remotius punctulato, thorace angustiore, magis conico, sub-lævi, interstitiis planis, ab illo bene dignoscitur. Caput mediocre, rotundatum, convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, sanguineum, nitidum, glabrum;

fronte foveola sat profunda insculpta; oculi oblongi, parum convexi, nigri; rostrum capite duplo longius, validum, teres, fere rectum, basi parum crassius, ibique remote punctatum, extrorsum læve. Antennæ mediocres, validæ, piceæ, parce pilosæ; clava magna, rotundata, compressa, apice cinereo-pubescente. Thorax conicus, latitudine postica multo longior, apice truncatus, intra apicem leviter impressus, lateribus dein obliquis, versus basin ampliatis; basi obtuse rotundatus, supra parum convexus, subtilissime remote punctulatus, sanguineus, nitidus. Scutellum rotundatum, elevatum, læve, piceum. Elytra antice leviter conjunctim emarginata, thoracis basi latiora, humeris modice elevatis, obtuse rotundatis; lateribus a basi apicem versus nonnihil angustata, apice ipso truncata, thorace dimidio longiora, supra in dorso parum convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, lævibus; sanguinea, sub-nitida, glabra. Pygidium triangulare, sat crebre punctatum, ferrugineum, parce griseo-pubescent. Corpus subtus dilutius sanguineum, nitidum, glabrum, ad latera disperse punctatum. Pedes mediocres, sanguinei, nitidi, geniculis parum infuscatis; tibiis sub-teretibus, intus in medio paulo ampliatis. — BHN.

\* 7. S. DE HAANI (1). Schh. — *H. op.* IV. p. 880. 6. — *P. Java.*

\* 8. S. MACULATUS (1). Schh. — *H. op.* IV. p. 881. 7. — *P. Java.*

\* 9. S. CARINICOLLIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 882. 8. — *P. Java.*

♂♀ 10. S. SPINOLÆ. Schh. — *H. op.* IV. p. 883. 9. — *P. Mexico.*  
*Calandra Hoepfneri.* DEJEAN, *Cat. Col.* 2. p. 304. ed. 3. p. 328.

\* 11. S. FAHRÆI. Schh. — *H. op.* IV. p. 884. 10. — *P. Mexico.*

♂♀ 12. S. PERFORATUS. (Dejean.) — *Sub-ellipticus, ater, opacus; rostro arcuato, basi canaliculato; thorace obsolete punctulato, basi leviter bi-sinuato; elytris tenuissime striatis, in striis punctis majusculis, sat crebris pertusis.*

*Calandra perforata.* DEJEAN in litt.

Habitat in N. Granada, ad S<sup>ia</sup> Fé de Bogota. A Dom. Com. DEJEAN benevole communicatus. Mus. SCHH.

---

(1) De genere Hæreo; an femina generis *Cercidoceri*?

Statura et magnitudine *Sphenophoro Spinolæ* sub-æqualis. Corpus totum, cum antennis pedibusque, atrum, opacum. Caput parvum, sub-rotundatum, disperse punctulatum; oculi elongati, depressi; rostrum thorace vix brevius, insigniter arcuatum, teres, basi nonnihil crassius, undique subtilissime disperse punctulatum, dorso sub ipsa fronte foveola oblonga insculptum, e qua linea tenuis emittitur, ante medium evanescens. Antennæ longitudine rostri, sub-nudæ; clava apice helvo-spongiosa. Thorax latitudine postica dimidio fere longior, basi levissime bi-sinuatus, a basi ultra medium sub-linearis, tum cito angustatus, apice truncatus, intra apicem leviter constrictus, sub-tubulatus, supra sub-depressus, limbo tenuiter punctulato, disco fere lævi. Scutellum oblongo-sub-triangulare, læve. Elytra antice conjunctim emarginata, ibique thorace vix latiora, juxta humeros aliquantulum ampliata, dein sensim attenuata, apice conjunctim rotundata, thorace dimidio longiora, supra parum convexa, punctis majusculis seriatim superforata, striis tenuissimis, longitudinalibus, connexis, interstitiis versus latera apicemque obsolete disperse punctulatis. Pygidium semi-ellipticum, apice obtusum, dorso longitudinaliter elevatum, punctis sub-setuliferis, in limbo et elevatione dorsali crebrius, alibi parcius et profundius excavatum. Pectus tenuissime, limbus abdominis profundius punctata, hic basi impressus. Pedes longiusculi, obsoletissime dispersi, punctulati; tibiis anticis leviter sub-arcuatis, subtus tenuiter fulvo-ciliatis; tarsis subtus fulvo-spongiosis. — Fhs.

13. S. BIFASCIATUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 885. 11. — *P. Mexico.*

14. S. VALIDIROSTRIS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 886. 12. —  
*P. Mexico.*

\* 15. S. SIERRAKOWSKYI. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 887. 13. — *P. Antioquia Columbiae.*

♂ 16. S. DECORATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 888. 14. — *P. Guadeloupe.*

17. S. AMBIGUUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 889. 15. —  
*P. Cayenna.*

♂♀ 18. S. HEMIPTERUS. *Linné.* — *H. op.* IV. p. 889. 16. —  
*P. Cayenna, Brasilia, Indiae occidentalis insulae.*

♂ 19. *S. SACHARI*. *Guilding*. — *H. op. IV.* p. 891. 17. — *P. Insulæ Guadeloupe et St.-Vincent.*

♀ 20. *S. DISPAB.* *Schh.* — *H. op. IV.* p. 892. 18. — *P. Brasilia septentrionalis.*

♂♀ VAR. β. et γ. *Hujus operis* l. c.

VAR. δ. Thorace nigro, strigis sex sanguineis notato; elytris nigris, maculis tribus sanguineis ornato.

*Calandra ensirostris.* *GERM. Ins. Spec.* p. 296. 435.

*Sphenophorus id.* *Huj. op. IV.* p. 965. 95.

\* 21. *S. RIMORATUS.* *Schh.* — *H. op. IV.* p. 893. 19. — *P. Antioquia Columbiae.*

\* 22. *S. ANCEPS.* *Schh.* — *H. op. IV.* p. 894. 20. — *P. America septentrionalis.*

\* 23. *S. OBSOLETUS.* *Dejean.* — *H. op. IV.* p. 895. 21. — *P. Cayenna, Brasilia, Columbia.*

*Calandra suffusa.* *DOM. KLUG* in litteris.

24. *S. VARIEGATUS* (1). *Fabr.* — *H. op. IV.* p. 896. 22. — *P. Caput Bonæ Spei.*

♂♀ 25. *S. SERICEUS.* *Latreille.* — *H. op. IV.* p. 897. 23. — *P. America meridionalis, Peru, Mexico, Cuba, St.-Domingo.*

\* 26. *S. CARBONARIUS.* (*Chevrolat.*) — *Ellipticus, niger, atro-velutinus; rostro arcuato, basi incrassato, subtiliter crebre punctulato; thorace anterieus angustato, vix punctato, basi leviter bi-sinuato; elytris sub-remote punctato-striatis, interstitiis sub-planis, singulo mox pone basin macula obliqua, obsoleta, ferruginea signato; abdomine lateribus tenuiter rufo-ferrugineo.*

*Hujus operis* IV. p. 897. 24.

*Rhynchophorus id.* *CHEV. Coleopt. du Mexique. I.*

*Patria:* Mexico. *DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.*

Magnitudo et statura *Sphenophori sericei*, aliter coloratus; thorace anterieus magis angustato. Caput rotundatum, convexum, subtiliter minus crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, gla-

(1) *Mihi invisus.*

brum; fronte foveola parva impressa; oculi oblongi, sub-depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis, minus tenue, teres, arcuatum, basi crassius, undique subtiliter crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ validæ, piceæ, nitidæ, glabræ; clava compressa, truncata, apice cinereo-spongiosa. Thorax latitudine baseos nonnihil longior, antè multo angustior, apice truncatus, sub-tubulatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam fere ad medium obliquis, dein sub-rectis; basi bi-sinuatus, supra sub-planus, impunctatus, niger, opacus, dense atro-velutinus. Scutellum oblongo-triangulare, basi impressum, læve, nigro-piceum. Elytra antè singulatim vix rotundata, thoracis basi latiora, sed pone basin oblique ampliata, pone humeros apicem versus sensim perparum angustata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra in dorso parum convexa, sub-remote punctato-striata, interstitiis planis, sub-lævibus; nigra, dense atro-holosericea, opaca, singulo in ipsa basi macula obliqua, obsoleta, ferruginea insignito, margine apicis anguste testaceo. Pygidium triangulare, convexum, punctatum, apicem versus fulvescenti-squamosum. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, pectore obsolete ventre evidenter remote punctulatum, segmento ultimo fulvescenti-setoso. Pedes mediocres, obsolete remote punctulati, nigri, sub-nitidi; femoribus modice clavatis, subtus parce setulosis; tibiis compressis, apice inflexis, intus parce setulosis; tarsis obscure ferrugineis, unguibus dilutioribus. — BHN.

\* 27. *S. TREDECIMPUNCTATUS*. Illig. — *H. op.* IV. p. 898. 25. — *P. America borealis et meridionalis.*

28. *S. PULCHELLUS*. Chev. — *H. op.* IV. p. 898. 26. — *P. Mexico.*

\* 29. *S. VARIABILIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 899. 27. — *P. America, præcipue septentrionalis, Florida, Carolina, Mexico, Columbia.*

\* VAR.  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ . *Hujus operis* l. cit.

\* VAR.  $\zeta$ . *Hujus operis* loco citato.

*Sphenophorus Lebasii*. DEJEAN, *Hujus operis* IV. p. 902. 29.

VAR.  $\eta$ . Thorace plaga disci trapeziformi, maculisque quatuor nigris notato, posticis basin adnexis; elytris rufis, opacis, callo humerali, sutura, macula minore in medio et plaga magna

transversa ante apicem, suturæ connexis, nigris instructis; pedes maxima parte rubri.

*Sphenophorus implicatus*. Huj. op. IV. p. 901. 28.

\* 30. S. SANGUINEUS. Klug. — H. op. IV. p. 903. 30. — P. Mexico.

\* VAR.  $\beta$ . et  $\gamma$ . Huj. op. l. c.

\* VAR.  $\delta$ . Thoracis vitta dorsali maculaque utrinque laterali atris, elytris litura communi baseos, macula humerali apiceque atris.

\* 31. S. SUTURALIS. Schh. — H. op. IV. p. 904. 31. — P. Brasilia meridionalis.

\* 32. S. SAUCIS. Germar. — H. op. IV. p. 905. 32. — P. Brasilia interior.

33. S. LEUCOGRAPHUS. (Schh.) — *Sub-ellipticus, supra rufus, opacus; thorace elytrisque vittis atro-fuscis, illo linea flexa, laterali, guttulisque numerosis, sub-seriatis, his litura composita pone medium dorsi, punctisque sparsis flavo-albidis.*

*Patria* : Mexico. A DD. GERMAR et SOMMER communicatus.

Magnitudo et habitus *Sphen. sanguinei*. Caput parvum, sub-rotundatum, punctulatum, rufum; vertice maculis duabus rotundis, atris; oculi oblongo-ovati, depressi, nigri; rostrum longitudine fere thoracis, basi sub-elevatum, extrorsum parum attenuatum, valde arcuatum, punctis versus basin dorsi utrinque sub-seriatis, alibi vage obsitum, totum rufum. Antennæ longiusculæ, rufæ; clava sub-rotundata, piceo-nigra, apice griseo-spongiosa. Thorax latitudine baseos plus quam dimidio longior, postice medio leviter productus, a basi ultra medium modice, dein distinctius angustatus, apice sub-tubulatus, truncatus, supra parum convexus, juxta basin transversim leviter impressus, rufus, opacus, lævis, in dorso vittis tribus, totidemque inferne, exterioribus marginalibus, omnibus ad stricturam apicis desinentibus, atro-fuscis; linea laterali, antice intus flexa, guttulis aliquot intra flexuram ejusdem sub-seriatis numerosisque, circa vittam mediam dorsi sparsis, flavo-albidopruinosus. Scutellum oblongum, atro-fuscum. Elytra thoracis basi parum latiora illoque vix dimidio longiora, antice conjunctim emarginata, humeris prominulis, juxta basin leviter ampliata, dein ultra medium sub-parallelâ, apice conjunctim obtuse sub-rotundata, supra sub-depressa, tenuissime punctato-striata, rufa,

*opaca, vitta prope suturam, antice geminata, aliaque intra-marginali, simplici, atro-fuscis; in illa pone medium signatura, e maculis duabus vel tribus connexa, punctisque aliquot cum illa sub-semi-circulariter utrinque dispositis, necnon lituris aliquot parvis juxta marginem lateralem apicemque flavo-albido-pruinosis. Pygidium semi-ellipticum, longitudinaliter convexum, punctatum, obscure rufum. Corpus subtus parce punctatum, medio nigrum, nitidum, lateribus atris, opacis, linea intra-marginali pectoris vittaque laterali abdominis apicis rufis, illa guttatum albido-pruinosa. Pedes parce punctulati, obscure rufi; femoribus apice plaga atra. — FHS.*

34. *S. SPADICEUS. Schh. — H. op. IV. p. 906. 33. — P. Cayenna.*

\* 35. *S. QUADRISIGNATUS. Schh. — H. op. IV. p. 907. 34. — P. Americes meridionalis insulæ.*

♀ 36. *S. BISBISIGNATUS. Schh. — H. op. IV. p. 908. 35. — P. Rio-Janiero Brasiliæ.*

\* 37. *S. FOSSOR. Guilding. — H. op. IV. p. 909. 36. — P. Ins. St.-Vincent.*

♂ 38. *S. QUADRIMACULATUS. Westermann. — H. op. IV. p. 910. 37. — P. Caput Bonæ Spei, Guinea.*

39. *S. DELUMBATUS. (Schh.) — Ellipticus, sub-depressus, niger; rostro minus arcuato, basi parum incrassato, extrorsum ferrugineo; thorace oblongo, supra plano, subtiliter remotius punctato, lateribus et subtus cinereo-furfuraceo; elytris sulcato-punctatis, interstitiis subtiliter seriatim punctulatis, disco ferrugineis; pedibus obscure ferrugineis.*

*Patria: Benguela Africæ. Mus. Dom. SOMMER.*

*Statura et affinitas Sphenophori quadrimaculati, dimidio minor; rostro minus arcuato, basi parum incrassato, thorace supra plano, remote subtiliter punctulato, interstitiis elytrorum subtiliter punctulatis, aliter coloratis, ab illo differt. Caput rotundatum, sub-globosum, obsolete punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum; oculi elongati, depressi, nigro-brunnei, subtus conniventes; rostrum basi haud constrictum, ante antennarum insertionem crassum, obsolete punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum, dein extrorsum tenue, cylindricum, modice arcuatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum, sub-læve. Antennæ validæ, nigrae; clava*

parva, sub-obtusa, apice cinereo-pubescente. Thorax oblongus, latitudine postica dimidio longior, apice truncatus, intra apicem profunde constrictus, lateribus parum ampliatus, basi obtuse rotundatus, supra planus, subtiliter remotius punctatus, niger, sub-nitidus, glaber, lateribus et subtus furfure cinereo-vestitus. Scutellum oblongum, apicem versus attenuatum, ruguloso-punctatum, nigrum. Elytra antice conjunctim emarginata, thorace latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice singulatim obtusissime rotundata, vel sub-truncata, thorace vix dimidio longiora, supra plana, distincte sulcata, sulcis parum profunde punctatis, interstitiis subtiliter seriatim punctulatis; nigra, sub-nitida, glabra, disco longitudinaliter late obscure ferruginea. Pygidium magnum, fere quadratum, subtiliter granulatum, piceum, pulvere griseo obsitum. Corpus subtus disperse punctatum, piceum, segmento ultimo evidenter punctato et foveola profunda insculpto. Pedes breviusculi, obscure ferruginei; femoribus clavatis, muticis; tibiis anticis canaliculatis, apice inflexis. — BHN.

♂♀ 40. S. PLANIPENNIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 911. 38. —  
P. Java.

Mas : rostro supra confertim punctato.

Femina : rostro paulo longiore, supra glabro.

♀ VAR. β. Thorace ut in α, sutura elytrorum humerisque nigris.

♂ VAR. γ. Corpore, thorace elytris que nigris immaculatis.

\* 41. S. MAURUS. Dejean. — *H. op.* IV. p. 912. 39. — P. Insula  
Martinique.

♂♀ 42. S. GLABRICOLLIS. Chev. — *H. op.* IV. p. 913. 40. —  
P. Bengalia, Java.

STURM, *Catal.* 1843. p. 227.

*Rhynchophorus gages*. HERBST. — *Huj. op.* IV. p. 988. 12. — forte.

\* 43. S. LIRATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 914. 41. — P. Insula  
Guadeloupe.

\* 44. S. NIGERRIMUS. Gyllenh. — *H. op.* IV. p. 915. 42. —  
P. Amer. meridionalis.



- \* 45. *S. ATRATUS*. Dejean. — *H. op.* IV. p. 916. 43. — *P. Cayenna*.  
*Calandra atrata*. DEJEAN, *Catal.* ed. 3. p. 328.
- \* 46. *S. AUSTERUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 916. 44. —  
*P. Cayenna*.
- \* 47. *S. MELANCHOLICUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 917. 45. — *P. Brasilia septentrionalis*.
- \* 48. *S. POLYGRAMMUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 918. 46. — *P. Brasilia interior*.
- \* 49. *S. HEBETATUS*. (Schh.) — *Ellipticus, niger, opacus, olivaceo-furfuraceus; rostro longitudine thoracis, sub-tenui, arcuato, basi crassiore, canaliculato, extrorsum nitido, glabro; thorace sub-conico, remote punctato, postice obsolete canaliculato, basi bisinuato; elytris anguste punctato-striatis, interstitiis parum convexis, antice plagis nigris, ornatis.*  
*Hujus operis* IV. p. 919. 47.  
*Patria*: Antioquia, Columbiæ. BHN.
- \* 50. *S. LATERITIVUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 920. 48. — *P. Sierra Leone Africae*.
- \* 51. *S. CINCTUS*. Sturm. — *H. op.* IV. p. 921. 49. — *P. Mexico*.  
STURM, *Catal.* 1843. p. 227.
52. *S. MACULIFER*. (Schh.) — *Sub-ellipticus, purpurascens, opacus; thorace laevi, basi profunde impresso, vittis supra et subtus simul quinque, margineque apicis, scutello maculisque tribus distantibus singuli elytri atris; striis elytrorum tenuissimis; interstitiis seriatim obsolete griseo-guttulatis.*  
*Patria*: Mexico. E Museo Dom. SOMMER descriptus.

Magnitudo *Sphen. hemipteri*. Caput parvum, sub-rotundatum, fere laeve, purpurascens, maculis duabus verticis nigris, fronte foveola impressa; oculi oblongi, depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis, insigniter arcuatum, basi crassius, evidentius punctatum, dorso canalicula abbreviata insculptum, supra radices antennarum nonnihil tumescens, extrorsum cylindricum, sublæve, totum purpurascens. Antennæ basin thoracis fere attingentes, piceæ; clava sub-rotundata, apice late atro-spongiosa. Thorax

latitudine postica dimidio longior, basi bi-sinuatus, inde ad mediam linearis, dein sensim attenuatus, apice sub-truncatus, intra apicem obsolete constrictus, supra parum convexus, intra basin transversim profunde impressus, purpurascens, opacus, vittis supra et subtus simul quinque, una scilicet in medio dorsi, sub-lanceolata, duabus inferne, singulaque ad latera utrinque, antice abbreviata, necnon margine apicis atris; totus lævis, atomis tantum guttulisque griseo-leprosis obsolete parce adpersus. Scutellum oblongum, atrum, læve. Elytra antice sub-sinuata ibique thorace vix latiora, juxta basin subito at breviter ampliata, dein evidenter angustata, apice conjunctim obtuse sub-rotundata, thorace dimidio longiora, supra parum convexa, intra apicem transversim impressa, tenuissime striata, striis ad basin remote punctulatis, alibi vix nisi lævibus; purpurascens, opaca, interstitiis atomis guttulisque griseis seriatim adpersis, maculis in singulo tribus, una ante medium juxta suturam utrinque insigniore, rotundata, altera humerali minore tertiaque ante impressionem apicis obliqua, languide carbonariis, glabris. Pygidium semi-ellipticum, convexum, purpurascens, punctis profundis, griseo-setulosis adpersum. Corpus subtus medio disperse punctatum, nitidum, pectoris vittis duabus abdominisque basi nigris, limbo omni opaco, purpurascens, margine pectoris laterali atro; segmento abdominis anali temere punctato. Pedes purpurascens; femoribus subtus tenuiter griseo-ciliatis; tarsis piceis, subtus helvo-spongiosis.—FHS.

53. S. STIGMATICUS. (Schh.) — *Ellipticus, niger, pruina fusco-cinerea, valde opaca obductus; thorace basi profunde impresso; elytris maculis quatuor distantibus, atris.*

*Patria*: Mexico. E Museo Dom. SOMMER descriptus.

Magnitudine *Sphenophoro hemiptero* æqualis. Caput parvum, rotundatum, parce punctulatum, nigrum, sub-glabrum; oculi oblongi, depressi, nigri; rostrum longitudine fere thoracis, arcuatum, basi superne foveola, in lineam abbreviatam continuata, impressum, pone insertionem antennarum paulo tenuius, totum nigrum, disperse punctatum, versus basin fusco-cinereo-pruinoso, opacum. Antennæ mediocres, nigrae, scapo cinereo-pruinoso; clava apice albido-spongiosa. Thorax latitudine baseos dimidio longior, posterius sub-linearis, antrorsum sinuato-atenuatus, basi bi-sinuatus, apice sub-truncatus, supra perparum convexus, ad basin transversim late impressus, niger, sub-lævis,

pruina fusco-cinerea, opaca obductus. Scutellum oblongum, attenuatum, concolor. Elytra thorace dimidio longiora et versus basin illo paulo latiora, antice singulatim sub-rotundata, humeris margine tamen sub-rectangulatis; juxta basin breviter ampliata, dein sensim angustata, apice conjunctim sub-rotundata, supra parum convexa, in dorso obsolete, intra apicem distinctius impressa, tenuissime striata, striis vix nisi ad latera punctulatis; nigra, pruina fusco-cinerea, opaca induta, atomis griseis in interstitiis seriatis vix observandis; maculis quatuor in singulo elytro, una humerali, rotunda, altera ante medium prope suturam, illi æquali, tertia ad medium marginis laterum, obsolete, quarta ante impressionem apicis, obliqua, atris. Pygidium minus amplum, sub-porrectum, convexum, nigrum, opacum, punctis griseo-setosis obsitum. Corpus subtus nigrum, medio impressum, disperse punctatum, limbo fusco-pruinoso, opaco. Pedes mediocres, nigri, fusco-pruinosi, opaci; femoribus subtus parce griseociliatis, spongiis tarsalibus argilaceo-albidis. — FHS.

54. S. MELANOCARDIUS. Linné. — *H. op.* IV. p. 922. 50. — *P. India* (Orientalis?).

\* 55. S. SQUAMOSUS. (Schh.) — *Oblongo-ellipticus, niger, squamulis rotundatis, silaceis dense obsitus; rostro longitudine thoracis, valde arcuato, basi incrassato, confertim punctato, extrorsum remotius punctato, nitido; thorace sub-conico, confertim rugoso-punctato, scutello triangulari, linea arcuata impresso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim rugoso-punctatis, segmento ultimo abdominis subtus fasciculis duabus silaceis instructo.*

*Patria*: Guinea. DOM. WESTERMANN. Mus. SCHH.

*Sphenophoro glabricolli* magnitudine æqualis, nonnihil tamen angustior. Caput rotundatum, convexum, postice remotius, anterius crebrius punctatum, nigrum, sub-nitidum, inter oculos silaceo-squamosum; oculi oblongi, parum convexi, nigri; rostrum longitudine thoracis, valde arcuatum, teres, basi crassius, ibique supra confertim punctatum, obsolete canaliculatum, parce squamulosum, extrorsum glabrum, nitidum, remotius punctulatum. Antennæ non procul a basi rostri insertæ, validæ, nigrae, sub-nitidæ, vix pilosæ; clava parva, ovata, apice truncata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica longior, sub-conicus, apice truncatus, intra apicem tenuiter constrictus, lateribus obli-

quis, versus basin sensim ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, supra in dorso parum convexus, confertim mediocriter rugoso-punctatus, niger, sub-nitidus, squamulis silaceis dense obsitus. Scutellum triangulare, linea arcuata insculptum, nigrum, nitidum, glabrum. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi parum latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus a basi apicem versus sensim perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, supra parum convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, confertim rugoso-punctatis; nigra, sub-nitida, squamulis rotundis, silaceis sat dense obsita. Pygidium sub-triangulare, apice leviter emarginatum, nigrum, confertim punctatum, silaceo-squamosum. Corpus subtus punctatum, nigrum, silaceo-squamosum, ventre medio sub-denudato, segmento ultimo utrinque fasciculo e setis silaceis instructo. Pedes mediocres, confertim punctati, nigri, silaceo-squamosi; femoribus modice clavatis, muticis, subtus breviter pallido-setulosis; tibiis compressis, intus setulosis, apicem versus inflexis. — BHN.

56. *S. DISCOLOR.* (Eschscholtz.) — *Elongato-ovatus, niger, glaber; rostro crebre punctato, basi tumido, apice compresso; thorace oblongo, disperse punctato, tenue canaliculato; elytris punctato-striatis, striis profunde exaratis, interstitiis remote punctulatis, thoracis lateribus, elytrorum apice, corpore subtus pedibusque extus albidis.*

Longit., sine rostro, 7  $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3 lin.

MANNERH. *Beitrag. Zur Käfer Faun. d. Aleut. Ins., etc.* p. 221. p. 251.

DEJEAN, *Catal.* ed. 2. p. 304. ed. 3. p. 329.

Habitat in California. Dom. ESCHSCHOLTZ. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Caput rotundatum, globosum, subtilissime disperse punctulatum, nigrum, ad basin rostri foveola profunda impressum; oculi depressi, nigri; rostrum thorace paulo brevius, arcuatum, basi crassum, ad antennarum insertionem utrinque tumidum, dein angustatum, compressum, crebre punctatum, basi profunde canaliculatum. Antennæ rostro longiores, tenues, nigrae; clava orbiculari apice albida. Thorax latitudine baseos plus quam sequi-longior, antice ante medium angustatus, apice leviter emarginatus, margine depresso; intra apicem profunde constrictus, lateribus mox pone medium sinuatus, basi bi-sinuatus, lobo medio

rotundato; supra sub-depressus, disperse punctulatus, in medio tenue canaliculatus, et postice utrinque lineis divergentibus longitudinaliter impressus, niger, nitidus, margine apicali angusto, laterali latius albido, versus basin striga obliqua, nigra notato. Scutellum triangulare, nigrum, punctatum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, pone basin nonnihil ampliata, humeris rotundatis; deinde mox posterius angustata, apice singulatim obtuse rotundata, thorace paulo longiora, supra sub-depressa, punctato-striata, striis interioribus profunde exaratis, interstitiis planis, remote punctulatis; nigra, summo apice albida. Pygidium apice truncatum, albidum, disperse nigro-punctatum. Corpus subtus remote punctulatum, thorace, pectoris abdominisque lateribus albidis, nitidis, disperse nigro-punctatis, relicto pectoris abdominisque medio longitudinaliter nigro. Pedes validi, remote punctulati, nigri, latere exteriori late albidi, nitidi, tarsorum articulo penultimo reliquis multo latiore, subtus dense fulvo-spongioso. — MANNERHEIM.

\* 57. S. PUSTULOSUS. Chev. — H. op. IV. p. 923. 51. —  
P. Mexico

Diagnosi et descriptioni l. c. hæc addenda: « *elytris apice singulatim rotundatis.* »

\* 58. S. ADSPERSUS. Klug. — H. op. IV. p. 924. 52. —  
P. Mexico.

Diagnosi l. c. adde: « *elytris apice conjunctim rotundatis.* »

\* 59. S. GUTTATUS. (Sturm.) — *Sub-ellipticus, niger; fronte cum basi rostri, thorace, pectore, femoribus tibiisque furfure concreto, griseo-flavescente obductis; elytris fusco-virescenti-pruinosis, guttulis albidis sparsis.*

STURM, Catal. 1843. p. 227.

*Patria*: Mexico. A Dom. STURM communicatus. Mus. SCHN.

*Sphenophoro hemiptero* magnitudine sub-æqualis. Caput parvum, semi-globosum, disperse punctatum, nigrum; fronte furfure griseo-flavescente obducta; oculi majusculi, oblongi, depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis, admodum arcuatum, nigrum, basi nonnihil elevatum, ibique ad insertionem antennarum crassius, superne uti frons vestitum et punctatum, sub ipsa fronte foveola, in lineam abbreviatam continuata, impressum, extrorsum cylin-

dricum, glabrum, nitidum, læve. Antennæ prope basin rostri insertæ, piceo-nigræ; clava apice atro-brunneo-holosericea. Thorax latitudine postica parum longior, basi leviter sub-sinuatus, a basi ad medium sub-linearis, dein admodum angustatus, apice sub-truncatus, intra apicem constrictus, supra parum convexus, undique furfure concreto, griseo-flavescente, opaco æqualiter obductus, punctis ad latera profundioribus et crebrioribus, in dorso tenuioribus et remotioribus, sparsis, his obsolete flavo-albido-sub-cingulatis; area longitudinali dorsi lævi. Scutellum oblongum, attenuatum, nigrum, griseo-flavescenti-pruinose. Elytra antice sub-sinuata, ibique thorace parum latiora, humeris nonnihil prominulis; juxta basin subito at breviter ampliata, dein indistincte attenuata, apice conjunctim sub-rotundata, thorace duplo longiora, supra parum convexa, intra apicem obsolete impressa, tenuiter striata, striis suturæ proximis fere lævibus, exterioribus successive evidentius punctatis; tota nigra, pruina fusco-virescente, opaca, obducta, interstitiis guttulis numerosis, flavo-albidis, singulo punctulo centrali, sub-setulifero notato, adspersis. Pygidium parvum, semi-ellipticum, longitudinaliter convexum, disperse punctatum, silaceo-pruinose. Corpus subtus nigrum, in apice ventris rude, alibi subtiliter et parce punctatum, pectore toto abdominisque lateribus uti thorax vestitis, hoc medio et postice sub-glabro, nitido. Pedes mediocres, nigri, furfure albido-flavescente vestiti; genubus, tibiis apice tarsisque glabris, his subtus ferrugineo-spongiosis. — FHS.

\* 60. *S. sordidus*. Schupp. — *H. op.* IV. p. 925. 53. — *P.* Java.

\* 61. *S. inæqualis*. Dejean. — *H. op.* IV. p. 926. 54. —  
*P.* Cayenna, Brasilia.

62. *S. canalipes*. Chevr. — *H. op.* IV. p. 927. 55. — *P.*.....

\* 63. *S. leprosus*. (Schh.) — Oblongus, niger; thorace dorso depresso, pruina fusca, sericeo-micante obducto, crebre sub-granulato-punctato; elytris evidenter striatis, striis umbrino-furfurosis, interstitiis atris, vesiculis inæqualibus, griseis seriatim adspersis.

*Patria*: Java. A Dom. DE HAAN benevole communicatus. Mus. SCHH.

Magnitudo *Sphen. cincti*. Caput parvum, semi-globosum, sat crebre punctatum, nigrum, glabrum, nitidum; oculi oblongi, de-

pressi, nigri; rostrum longitudine fere thoracis, extrorsum arcuatum, basi nigrum, confertim griseo-sub-leprosum, foveola sub ipsa fronte insculptum, pone insertionem antennarum angustatum, sub-compressum, piceum, læve, lateribus utrinque obsolete sulcatum. Antennæ basin thoracis vix attingentes, atræ; clava apice griseo-spongiosa. Thorax latitudine duplo longior, basi medio nonnihil rotundato-productus, a basi ultra medium sub-linearis, dein modice angustatus, apice truncatus, intra apicem constrictus, sub-tubulatus, supra sub-depressus, undique pruina fusca, certo lumine sub-flavo-sericeo-micante, obductus, sat confertim punctatus, punctis dorsalibus singulo granulo griseo-pulverulento antrorsum terminatis. Scutellum elongatum, griseo-furfurosum. Elytra antice conjunctim emarginata ibique thorace parum latiora, ad basin subito at breviter ampliata, dein sensim angustata, apice singulatim rotundata, thorace vix ultra dimidium longiora; dorso depressa, evidenter striata, striis fufure fusco-umbrino indutis, interstitiis atris, opacis, vesiculis griseis, partim punctiformibus, partim plus minusve oblongis, seriatis, sat confertim obsitis. Pygidium convexum, punctatum, helvo-tomentosum. Corpus subtus atrum, opacum, medio impressum, undique sat crebre punctatum. Pedes mediocres, atri, fusco-pruinosi; femoribus griseo-punctulatis; tarsis subtus fusco-spongiosis.

FHS.

\* 64. S. CASTANEIPENNIS. (Schh.) — *Lineari-elongatus, niger, nitidus, glaber; rostro longitudine thoracis, basi crassiore, valde inflexo, ibique supra canaliculato, extrorsum vix punctato; thorace intra apicem constricto, lateribus recto, supra parum convexo, mediocriter sub-remote punctato; elytris rufo-castaneis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, vage punctulatis.*

*Patria* : Caput Bonæ Spei. Dom. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Magnitudo *Sphenophori* 13-punctati. Caput rotundatum, convexum, sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum; oculi oblongi, parum convexi, nigri, infra fere conniventes; rostrum longitudine thoracis, basi crassius, sub-compressum, valde inflexum, ibique supra canaliculatum, dein extrorsum tenuius, cylindricum, obsoletius punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ basi rostri insertæ, longe ultra thoracis medium pertinentes, validæ, nigræ, parce pilosæ; clava brevi, apice truncata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica dimidio longior,

apice truncatus, intra apicem constrictus, mox pone stricturam modice rotundato-ampliatu, dein lateribus rectis; basi sub-truncatus, tenue reflexo-marginatus, supra parum convexus, mediocriter sat crebre punctatus, niger, nitidus, glaber. Scutellum sub-triangulare, basi impressum, nigrum, nitidum, glabrum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi haud latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra paulo convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis parum convexis, subtiliter vage punctulatis, rufo-castanea, nitida, glabra. Pygidium sub-triangulare, granulatum, nigrum, parce cinereo-squamosum. Corpus subtus sub-remote punctatum, nigrum, nitidum, glabrum, segmento ultimo utrinque fasciculo silaceo-setoso instructo. Pedes mediocres, sub-remote punctati; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis sub-compressis, canaliculatis, apice uncinatis, mox intra apicem fasciculo parvo e pilis longis, pallidis instructis. — BEN.

STIRPS 2. — *Tarsi angustati, saepissime pilosi, articulo penultimo parvo, reliquis paulo latiore, subtus haud spongioso.* (Spec. 65-110.)

♀ 65. *S. PICEUS*. Pallas. — *H. op.* IV. p. 928. 56. — *P.* Sibiria, Caucasus, Gallia.

♀ VAR. β. Elytris castaneis.

♂♀ 66. *S. ABBREVIATUS*. Fabric. — *H. op.* IV. p. 929. 57. — *P.* Europa intermedia et meridionalis, Sibiria occidentalis, Caucasus.

♂♀ 67. *S. PARUMPUNCTATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 931. 58. — *P.* Europa merid.

♂ 68. *S. OPACUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 932. 59. — *P.* Italia.

♂♀ 69. *S. MUTILATUS*. Laicharting. — *H. op.* IV. p. 933. 60. — *P.* Europa intermedia et meridionalis.

♂♀ 70. *S. MERIDIONALIS*, Dejean. — *H. op.* IV. p. 934. 61. — *P.* Gallia meridionalis, Sardinia.

71. *S. ANGUSTUS*. (Schh.) — *Oblongo-ellipticus, ater, supra sub-opacus, glaber; rostro thorace brevior, minus tenui, modice ar-*



cuato, basi crassiore, subtiliter punctulato, thorace oblongo, anterieus angustato, lateribus parum rotundato, supra paulo convexo, subtilissime punctulato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, obsolete vage punctulatis; pygidio cinereo-setuloso.

\* VAR.  $\beta$ . Elytris castaneis.

*Patria*: Mexico. DOM. GERMAN. MUS. SCHH. E. MUS. IMP. RUSS. ad conferendum etiam communicatus.

*Sphenophoro meridionali* longitudine æqualis, nonnihil angustior. Caput rotundatum, convexum, subtiliter sub-remote punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum, inter oculos puncto profundiori insculptum; oculi oblongi, parum convexi, nigri, infra caput fere conniventes; rostrum thorace dimidio brevius, minus tenue, teres, modice arcuatum, basi crassius, subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ non procul a basi rostri insertæ, minus tenues, piceæ; clava ovata, acuminata, apice cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica longior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem utrinque constrictus, lateribus mox pone stricturam nonnihil rotundato-ampliatis; basi sub-truncatus, supra paulo convexus, subtilissime punctulatus, niger, sub-opacus, glaber. Scutellum oblongum, apicem versus attenuatum, concolor, læve. Elytra antice conjunctim vix emarginata, thoracis basi nonnihil latiora, lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra paulo convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter vage punctulatis; nigra, sub-opaca, glabra. Pygidium sub-triangularè, granulatum, nigrum, parce cinereo-setulosum. Corpus subtus subtiliter remote punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Pedes mediocres, validi, nigri, nitidi, subtilissime punctulati; femoribus modice clavatis; tarsi angustis, ferrugineis. — BHN.

72. S. MEMNONIUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 935. 62. — P. Mexico.

73. S. IMUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 936. 63. — P. Mexico.

\* 74. S. STRIATUS. (Petit.)—*Sub-ellipticus, niger; capite lævi, rostro thoraceque supra nitidis, confertim punctatis; elytris profunde punctato-sub-sulcatis, atro-fuscis, interstitiis interioribus antice callisque humeralibus nitidis; pygidio tibiisque densius griseo-pruinosis.*

*Calandra striata*. DEJEAN, *Cat. Col.* ed. 2. p. 304. ed. 3. p. 329.

*Patria* : Brasilia. A Dom. CHEVROLAT et AUBÉ missus. Mus. SCHH.

Magnitudo *Sphenophori Memnonii*. Caput parvum, rotundatum, glabrum, nigrum, nitidum, læve; fronte puncto impressa; oculi oblongi, depressi, nigri; rostrum longitudine fere thoracis, modice arcuatum, basi sub-elevatum ibique satis robustum, dorso crebre punctatum, extrorsum evidenter angustius, sub-cylindricum, læviusculum, nitidum, basi nigrum, versus apicem piccum. Antennæ validæ, atræ; clava ob-ovata, apice griseo-spongiosa. Thorax latitudine media dimidio longior, apice truncatus, intra apicem profunde constrictus, pone stricturam subito ampliatus, dein versus basin sub-linearis, postice levissime rotundato-productus, angulis obtusis; supra parum convexus, sat crebre, præsertim ad latera, excavato-punctatus, niger, nitidus, vitta laterali paginaque inferiore tenuissime, certo lumine quoque punctis in fundo griseo-pruinosis, his fere omnibus setulo minutissimo centrali foëtis. Scutellum breviter ovatum, atrum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, ibique thorace non latiora, ad humeros abrupte at breviter ampliata, dein angustata, apice conjunctim sub-emarginata, thorace vix dimidio longiora, supra modice convexa, striis sub-sulciformibus, remote punctatis exarata, interstitiis dorsalibus angustioribus, convexis; nigra, atro-fusco-furfurosa, opaca, sutura interstitiisque interioribus antice callisque humeralibus glabris, nitidis, illis ibi seriatim, his vage punctatis. Pygidium sub-deflexum, convexum, nigrum, griseo-pruinosum, punctis excavatis, setuliferis adpersum. Corpus subtus atrum, profunde et disperse punctatum, ventre posterius griseo-sub-pruinosum, sterno impresso. Pedes validiusculi; femoribus disperse punctatis, apice tibiisque griseo-pruinosis. — FHS.

\* 75. *S. RUSTICUS*. *Dejean*. — *H. op.* IV. p. 937. 64. —  
P. Cayenna.

\* 76. *S. NUBILLUS*. *Say*. — *H. op.* IV. p. 938. 65. — P. America borealis.

\* 77. *S. PERTINAX*. *Oliv*. — *H. op.* IV. p. 938. 66. — P. Amer. borealis, N. Orlean.

\* VAR.  $\beta$ . *Hujus operis* l. c. var.  $\beta$ .

\* VAR.  $\gamma$ . Niger, opacus, sub-denudatus, sutura interstitiisque minus elevatis.

78. *S. CANALICULATUS*. (Schh.) — *Ellipticus, niger, sub-opacus, indumento griseo adpersus; rostro validiori, basi profunde canaliculato; thorace rude rugoso-punctato, plaga in dorso antico ramulum utrinque fere ad basin emittente, elevata, impunctata, notato; elytris profundius punctato-striatis, interstitiis sub-planis, 5 et 7 angustioribus.*

*Patria*: America septentrionalis. Mus. Imp. Russ.

Magnitudo fere et similitudo *Sphenophori pertinacis*; rostro basi profundius canaliculato, thorace profundius et magis etiam basi rugoso-punctato, plaga elevata, lævi, aliter constructa, elytris profundius punctato-striatis, interstitiis non elevatis, ab illo differt. Caput rotundatum, modice convexum, vix punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum; oculi oblongi, depressi, nigri; rostrum thorace nonnihil brevius, basi crassius, et supra longius et profundius canaliculatum, sat validum, arcuatum, subtiliter remote punctulatum, extrorsum læve, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ sat validæ, rufo-piceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, apice cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil longior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam nonnihil rotundatis, dein sub-obliquis, basin versus perparum ampliatis; postice bi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra parum convexus, dorso antico plaga magna utrinque posterius ramulum fere ad basin emittente, elevata, subtiliter punctulata; cæterum profunde rugoso-punctatus et in punctis griseo-pulverulentus. Scutellum oblongo-triangularè, læve, nigrum, nitidum. Elytra leviter sinuata, thorace parum latiora, humeris haud elevatis, obtuse rotundatis; lateribus a basi apicem versus sensim angustata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra parum convexa, profunde punctato-striata, interstitiis parum convexis, 5<sup>o</sup> et 7<sup>o</sup> angustioribus; nigra, sub-opaca, indumento griseo in stris repleta. Pygidium sub-triangularè, granulatum, nigrum, griseo-pulverulentum. Corpus subtus confertim profundius ventre medio parcius punctatum, nigrum, nitidum, lateribus parce griseo-pulverulentum. Pedes mediocres, remote punctulati, nigri, nitidi; tarsis angustis, obscure ferrugineis. — BRN.

\* 79. *S. CURVALIS*. Germ. — *H. op.* IV. p. 941. 68. — *P. Amer. borealis*, N. Orleans.

*Sphenophorus flexuosus*. *H. op.* IV. p. 940. 67.

80. *S. CARIOSUS* (1). *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 941. 69. — *P. Amer.* septentr.
- \* 81. *S. EQUALIS*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 941. 70. — *P. Missouri* Amer. septentr.
82. *S. CALLOSUS*. *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 942. 71. — *P. America* septentrionalis.
- \* 83. *S. SATI*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 943. 72. — *P. N. Orleans,* Amer. bor.

Diagnosi l. c. adde: « *elytris..... interstitiis planis, alternis sub-elevationibus, suturali seriato-punctato, nitido.* »

- \* 84. *S. HOEGBERGII*. (*Schh.*) — *Oblongus, niger, opacus, dense fusco-furfuraceus; antennis pedibusque obscure ferrugineis; rostro validiori, compresso, basi canaliculato; thorace oblongo, sub-remote profundius punctato, medio breviter carinato, utrinque longitudinaliter leviter impresso: elytris evidenter punctato-striatis, sutura interstitiisque alternis elevationibus, convexis.*

*Patria*: Vera-Cruz, in Mexico. *DOM. HOEGBERG.* Mus. Reg. Holm.

Magnitudo et similitudo *Sphenophori Sayi*; rostro validiori, compresso, thorace remotius profundius punctato, utrinque minus profunde longitudinaliter impresso, elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis alternis elevationibus, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, postice vix inter oculos evidenter punctatum, nigrum, glabrum; fronte indumento fusco tecta; oculi oblongi, depressi, nigri; rostrum thorace brevius, validum, modice arcuatum, compressum, apice ipso inferne utrinque acuminatum, basi crassius, ibique supra canaliculatum, fusco-aquamosum, punctulatum, extrorsum glabrum, parum nitidum. Antennae sat validae, obscure ferrugineae, vix pilosae; clava breviter ovata, apice cinereo-pubescente. Thorax oblongus, latitudine postica longior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem leviter constrictus, pone stricturam rotundato-ampliatus, dein lateribus fere rectis; postice leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, sub-remote profunde punctatus, dorso carinula brevi, denudata

instructus, utrinque longitudinaliter leviter impressus, niger, dense griseo-furfuraceus. Scutellum sub-triangularē, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi paulo latiora, humeris haud elevatis, obtuse rotundatis; lateribus sensim angustata, apice ipso conjunctim sub-truncata, thorace dimidio longiora, in dorso sub-plana, evidenter punctato-striata, interstitiis alternis sub-planis, alternis elevatioribus, convexis; nigra, dense fusco-furfuracea. Pygidium triangulare, remote punctulatum, piceum, griseo-squamosum. Corpus subtus sub-remote punctatum, nigrum, indumento fusco dense tectum, pectore ventreque basi denudatis. Pedes mediocres, validi, sub-remote punctulati, obscure ferruginei, indumento fusco parce adpersi. — **BHN.**

Dom. D. HOEGBERG, studiosus, iter ad Mexicum 1842 fecit, ibique plura insecta nova detexit, sed præmature morte 1843 abscessit.

85. *S. SUBCARINATUS.* (Mannerheim.) — *Elongatus, niger, glaber; rostro canaliculato, basi tumido, thorace varioloso-punctato, plagis tribus longitudinalibus, elevatioribus; elytris opacis, anguste striatis et in striis punctis minutis, remotis impressis, interstitiis impunctatis, suturali levissimo, nitido.*

Longit., sine rostro,  $\frac{1}{4}$  lin.; latit. 1  $\frac{1}{2}$  lin.

MANNERH. *Beitr. Zur Käfer Faun. d. Aleut. Ins., etc.*, p. 222, 252.

Habitat in California. Dom. ESCHSCHOLTZ. Mus. Univ. Imp. Mosq.

*Sphenophoro confuso* DEJ. SÆGEN. affinis, sed longior, angustior et variis notis ab illo diversus, niger, glaber. Caput rotundatum, modice convexum, remote punctatum, nigrum, nitidum; fronte ad basia rostri impressa; oculi sub-depressi, nigri; rostrum thorace multo brevius, basi incrassatum, ibique sat profunde punctatum, ad antennarum insertionem utrinque tumidum, per totam longitudinem canaliculatum et supra remote punctatum, in medio compressum, apice nonnihil dilatatum. Antennæ longitudine rostri, piceæ; clava rotundata, nigra, nitida, apice albido-pubescente. Thorax latitudine baseos duplo longior, antice subito

(1) Mihi invisus.

fere duplo angustior quam basi, apice sub-truncatus, summo margine fulvo; pone apicem constrictus, lateribus pone stricturam subito ampliatis, dein rectis; basi lævissime bi-sinuatus, supra sub-depressus, inæqualis, varioloso-punctatus, plagis tribus paulo elevatioribus, sparsim punctulatis notatus, media a basi ad apicem extensa, ante medium nonnihil dilatata, lateralibus arcuatis, a basi ultra medium adscendentibus; niger, in impressionibus obscure herbaceo-opacus. Scutellum oblongum, fere lineare, apice obtusum. Elytra pone basin nonnihil oblique ampliata, posterius modice angustata, apice obtuse conjunctim rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra sub-depressa, tenuiter striata et in striis punctis remotis impressa, interstitiis impunctatis; testaceo-nigra, opaca, interstitio suturali nigro, nitido, lævissimo, margine omni anguste testaceo. Pygidium convexum, apice obtusum, remote punctulatum. Corpus subtus nigrum, opacum, sparsim punctatum. Pedes breviusculi, minus validi, remote punctulati, nigri, nitidi, tarsis angustatis, articulo penultimo parvo, subtus haud spongioso. — MANNERHEIM.

\* 86. S. CONFUSUS *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 944. 73. — *P. Amer. borealis.*

\* VAR.  $\beta$ . Antennis, rostro basi pedibusque rufo-ferrugineis.  
*Sphenophorus placidus.* *SAX.* — *H. op.* IV. p. 947. 76.

\* 87. S. FALLAX. (*Schh.*) — *Oblongo-ellipticus, niger, parce griseo-pulverulentus; rostro validiore, extrorsum compresso, basi canaliculato; thorace profunde varioloso-punctato, in medio antico sub-impresso, plagis tribus elevatioribus, subtiliter punctulatis notato; elytris subtiliter striatis, striis punctis remotis, parum profundis impressis, interstitiis sub-planis, obsolete seriatim punctulatis.*

*Patria:* America Borealis. *Dom.* HOPE. *Mus.* SCHH.

Statura et summa similitudo *Sphenophori confusi*, dimidio major; elytris tenuiter striatis, striis remotius minus profunde punctatis, ab illo differt. Caput rotundatum, modice convexum, subtiliter sparsim punctulatum, nigrum, sub-opacum, glabrum; oculi oblongi, sub-depressi, nigri; rostrum thorace brevius, arcuatum, basi crassum, ibique sat profunde punctatum, canalicula antrorsum attenuata impressum, extrorsum compressum, modice arcuatum, obsolete punctulatum, totum nigrum, nitidum. Antennæ mediocres, nigro-piceæ; clava ovata, acuminata,

apice cinereo-pubescente. Thorax latitudine baseos longior, antice subito fere duplo angustior quam basi, apice leviter emarginatus, pallido-marginatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis, dein fere rectis; basi levissime bi-sinuatus, fere rotundatus, supra parum convexus, inæqualis, in medio antico sub-impessus, confertim sat profunde varioloso-punctatus, plagis tribus paulo elevatioribus, sparsim punctulatis notatus, media antica, posterior attenuata, lateribus arcuatis, a basi ultra medium adscendentibus; totus niger, parum nitidus, parce griseo-pulverulentus. Scutellum oblongo-triangulari, nigrum, nitidum, læve. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi nonnihil latiora, pone basin oblique nonnihil ampliata, posterior angustiora, apice singulatim obtuse rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra parum convexa, tenuiter striata et in striis punctis minoribus remotis impressis, interstitiis planis, seriatim obsolete punctulatis; nigra, sub-opaca, parce griseo-pulverulenta, margine laterali posterior apiceque anguste testaceo. Pygidium sub-triangulari, punctatum, nigrum, griseo-pulverulentum et setosum. Corpus subtus sparsim punctatum, nigrum, sub-nitidum, parce griseo-pulverulentum. Pedes breviusculi, validi, punctulati, nigri, nitidi; tarsi angustis, obscure ferrugineis. — BHN.

\* 88. S. TETRICUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 945. 74. — *P.* Brasilia.

\* 89. S. MONILIS. Chevr. — *H. op.* IV. p. 946. 75. — *P.* Mexico.

90. S. RETICULATICOLLIS. (Schh.) — *Oblongo-ellipticus, niger, dense griseo-pulverulentus; rostro extrorsum compresso, basi ferrugineo; thorace profunde crebre rugoso-punctato, in medio antico sub-impreso, plaga antica triangulari, alia utrinque obliqua, elevatioribus, evidenter crebre punctatis, notato; elytris striatis et in striis punctis majusculis, sub-remotis impressis, interstitiis alternis dorsalibus, elevatis, sub-cancellatis, ferrugineo-variegatis.*

*Patria:* California. Mus. DOM. CHEVROLAT.

*Sphenophoro confuso* longitudine æqualis, nonnihil angustior. Caput rotundatum, supra parum convexus, evidenter sat crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum; oculi oblongi, sub-depressi, nigri; rostrum thorace brevius, arcuatum, basi crassius, ibique supra evidenter punctatum, obsolete canaliculatum, extrorsum compressum, sat crebre punctulatum, basi ferrugineum,

dein nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ mediocres, piceæ; clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica longior, antice subito fere duplo angustior quam basi, apice leviter emarginatus, pallido-marginatus, pone apicem constrictus, lateribus pone stricturam subito rotundato-ampliatis, dein subrectis; basi levissime bi-sinuatus, fere rotundatus, tenue reflexo-marginatus, supra parum convexus, inæqualis, in medio antico sub-impessus, confertim sat profunde rugoso-punctatus, plagis tribus paulo elevatioribus, evidenter crebrius punctulatis, media antica sub-triangulari, lateralibus arcuatis, a basi ultra medium adscendentibus; totus niger, sub-nitidus, sat dense griseo-pulverulentus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum. Elytra antice conjunctim sub-emarginata, thoracis basi parum latiora, pone basin oblique nonnihil ampliata, dein posterius angustiora, apice singulatim obtuse rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra modice convexa, tenuiter striata et in striis punctis majusculis remotis impressa, interstitiis alternis dorsalibus elevatis, subcancellatis, ferrugineo-variegatis; tota nigra, griseo-pulverulenta. Pygidium sub-triangulare, convexum, punctatum, nigrum, parce griseo-pulverulentum. Corpus subtus sparsim sat crebre punctatum, nigrum, nitidum, parce griseo-pulverulentum. Pedes breviusculi, validi, punctulati; femoribus nigris; tibiis tarsisque obscure ferrugineis. — BEN.

\* 91. S. BRUTUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 948. 77. — P. Peru.

92. S. COMPRESSIROSTRIS. (Germar.) — *Oblongo-ellipticus, niger, parum nitidus, dense griseo-pulverulentus; rostro valido, valde compresso, extrorsum ampliato; thorace amplo, crebre rude rugoso-punctato, medio arcuatim transversim impresso, utrinque postice foveolato; elytris brevibus, apicem versus attenuatis, tenuiter striatis, punctatis et scrobiculatis; tibiis anterioribus intus medio angulariter ampliatis, apice bi-calcaratis.*

*Hujus operis* IV. p. 952. 81.

*Calandra id.* GERM. *Ins. Spec.* p. 300. 440.

*Patria:* Kentucky, Americæ Borealis. Mus. DOM. GERMAR.

*Sphenophoro confuso* vix longior, sed dimidio latior; thorace amplo, elytris brevioribus, scrobiculatis, tibiis anterioribus intus angulato-ampliatis, etc., ab illo abunde distinctus. Caput rotundatum, supra parum convexus, postice parce anterieus profunde crebre punctatum, nigrum, opacum, inter oculos foveolatum;



oculi oblongi, sub-depressi, nigri; rostrum thorace brevius, basi crassum, ibique supra crebre rugoso-punctatum, extrorsum valde compressum et dilatatum, modice arcuatum, subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ mediocres, piceæ, parce pilosæ; clava breviter ovata, apice cinereo-pubescente. Thorax amplus, latitudine postica parum longior, antice subito fere duplo angustior quam basi, apice leviter emarginatus, pallido-marginatus, intra apicem constrictus, lateribus pone stric-turam rotundato-amplius, basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, dense rude rugoso-punctatus, medio transversim arcuatim impressus, utrinque non procul a basi foveola oblonga, parum profunda insculptus, niger, parum nitidus, dense griseo-pulverulentus. Scutellum triangulare, basi impressum, nigrum, parce griseo-pulverulentum. Elytra antice leviter tri-sinuata, tho-racis basi paulo latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; pone basin apicem versus citius angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace vix longiora, tenuiter obsolete striata, mediocriter punctulata et inordinate fossulata, nigra, sub-opaca, dense griseo-pulverulenta. Pygidium sub-triangulare, nigrum, punctulatum, vix squamosum. Corpus subtus disperse sat rude punctatum, nigrum, parce griseo-pulverulentum. Pedes medio-cres, validi, punctati, nigri, griseo-pulverulenti; femoribus mo-dice clavatis, muticis; tibiis anterioribus intus in medio valde angulariter ampliatis, apice valide bi-calcaratis; tarsis angustis, piceis. — BHN.

\* 93. S. RETUSUS. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 949. 78. — *P. Amer. borealis.*

\* 94. S. SERIEPUNCTATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 950. 79. — *P. Peru.*

\* 95. S. CULTRIROSTRIS. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 951. 30. — (Synonymon GERMARI deleatur.) *P. America septentrionalis.*

\* 96. S. GAGATINUS. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 952. 82. — *P. Amer. borealis.*

\* 97. S. CONTRACTUS. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 953. 83. — *P. America septentrionalis.*

\* 98. S. CINCTICOLLIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 954. 87. — *P. America meridionalis.*

In diagnosi l. c. lin. 3, lege : *vittis tribus nigrioribus, valde obsoletis notato.*

\* 99. *S. BRUNNEIPENNIS.* (Germar.) — *Oblongo-ellipticus, niger, subglaber; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; fronte foveolata, rostro compresso; thorace oblongo, sub-remote punctulato, basi impresso, profunde punctato, ibique medio sub-carinato, ferrugineo-quadrivittato; elytris rufo-castaneis, sat profunde sulcato-punctatis, interstitiis sub-convexis, subtilissime punctulatis.*

*Hujus operis* IV. p. 965. 96.

*Calandra id.* GERM. *Ins. Spec.* p. 297. 437.

\* VAR.  $\beta$ . Thorace nigro, utrinque vitta ferruginea notato; elytris obscure castaneis.

*Sphenophorus signaticollis.* Huj. op. IV. p. 955. 85.

*Sphenophoro cincticollis* magnitudine æqualis, sed paulo angustior; thoracis medietate basi longitudinaliter profunde punctata, elytrorum sulcis distinctius punctatis. Caput sub-globosum, obsolete punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum; fronte ad basin rostri fovea rotunda insculpta; oculi oblongi, depressi, nigri; rostrum thorace brevius, validum, basi crassius, extrorsum compressum, arcuatum, undique sparsim punctulatum, nigro-piceum, nitidum. Antennæ mediocres, obscure ferrugineæ; clava breviter ovata, acuminata, apice cinereo-pubescente. Thorax oblongus, latitudine baseos longior, antice subito fere duplo angustior quam basi, apice sub-emarginatus, mox pone apicem sat profunde constrictus, lobo antico sub-tubulato, punctato, pallidomarginato, lateribus pone stricturam subito ampliatis, dein rectis; basi obtuse rotundatus, supra modice convexus, disco sparsim obsolete punctulatus, a basi ultra medium profunde impressus et in impressione tenuiter carinatus, ibique cum lateribus profunde punctatus, niger, sub-nitidus, vittis quatuor rufo-ferrugineis, duabus in dorso et una utrinque laterali, insignitus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, læve. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi paulo latiora, humeris sub-prominulis, elevato-callosis; posterius angustiora, apice singularim rotundata, thorace nonnihil longiora, supra modice convexa, late sulcata et in sulcis evidenter sub-remote punctata, interstitiis convexis, obsolete sparsim punctulatis; rufo-castanea, parum nitida, margine laterali dilutius ferrugineo. Pygidium sub-triangulare, punctatum, fusco-piceum, parce cinereo-setulosum.

Corpus subtus nigrum, nitidum, in medio læve, versus latera punctatum. Pedes breviusculi, validi, rufo-ferruginei; tibiis sub-rectis, cum tarsis elongatis, angustis, dilutius ferrugineis.

BHN.

\* 100. S. DEFRICTUS. (Schh.) — Oblongo-ellipticus, sub-convexus, nigro-piceus, parum nitidus; rostro compresso, thorace oblongo, lateribus et in medio postico profunde punctato, in disco parcius subtiliter punctulato, lateribus basi ferrugineis; elytris profunde sulcatis, sub-remote punctatis, interstitiis angustis, convexis, seriatim evidenter punctulatis.

*Patria*: Monte-Video. Mus. Gothob.

Magnitudo, statura et summa similitudo *Sphenophori cincticollis*; elytris profundius sulcatis, interstitiis angustioribus, evidenter punctulatis, ab illo distinctus. Caput breve, rotundatum, convexum, sparsim obsolete punctulatum, nigro-piceum, sub-nitidum; fronte ad basin rostri fovea rotunda insculpta; oculi oblongi, sub-depressi, nigri; rostrum thorace brevius, basi crassius, extrorsum compressum, arcuatum, undique sparsim punctulatum, nigro-piceum, nitidum, glabrum. Antennæ breviusculæ, validæ, rufo-piceæ; clava ovata, apice cinereo-pubescente. Thorax oblongus, latitudine baseos dimidio longior, antice fere duplo angustior quam basi, apice leviter sinuato-emarginatus, pone apicem constrictus, lobo antico sub-tubulato, punctato et pallido-marginato; lateribus pone stricturam oblique ultra medium ampliatis, dein fere rectis; basi obtuse rotundatus, supra modice convexus, æqualis, versus latera inæqualiter in medio posteriori sub-seriatim profunde punctatus, disco reliquo subtiliter sparsim punctulato; nigro-piceus, nitidus, basi ad latera obscure ferrugineus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, medio impressum. Elytra antice conjunctim emarginata, thoracis basi paulo latiora, humeris sub-prominulis, elevato-callosis; posterius angustiora, apice singulatim obtuse rotundata, thorace haud longiora, supra modice convexa, sat late profunde sulcata, sulcis sub-remote subtiliter punctatis, interstitiis angustis, convexis, subtiliter evidenter seriatim punctulatis. Pygidium triangulare, convexum, punctatum, nigrum, parce griseo-furfuraceum. Corpus subtus versus latera punctatum, in medio læve, nigrum, nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, remote punctulati, nigri, nitidi; tibiis sub-compressis, fere rectis; tarsis angustis, rufo-piceis.

BHN.

\* 101. *S. PUNCTATOSTRIATUS*. Chevr. — *H. op.* IV. p. 956. 86. —  
P. Campos Geraës *Brasiliae*.

102. *S. INCURRENS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 957. 87. — P. Mexico.

\* 103. *S. CICATRISTRIATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 958. 88. —  
P. Mexico.

\* 104. *S. CICATRIPENNIS*. (Schh.) — *Sub-ellipticus, niger; rostro basi canaliculato, thorace in disco disperse punctulato, basi apiceque sub-impresso, ibique rude excavato-punctato ac plagiatis ochraceo-pulverulento; elytris tenuiter striatis, variolis partim sub-geminatis, ochraceo-pulverulentis adpersis; antennis tarsisque fusco-ferrugineis.*

*Patria*: Mexico. A Dom. STURM communicatus. Mus. SCHH.

*Sphenophori cicatristriati* meram esse varietatem suspicari licet Etenim in eo tantum differt, quod variolæ elytrorum paulo minus numerosæ et quod istæ in fundo, utpote impressiones thoracis, fuffure sub-ochraceo repletæ. Cæterum speciei citatæ simillimus, quare pro reliquis partibus, ut descriptio ejusdem conferatur, rogamus. — FHS.

\* 105. *S. COESIFRONS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 959. 89. — P. Mexico.

\* 106. *S. FUMILUS*. Leconte. — *H. op.* IV. p. 960. 90. — P. Amer. septentrionalis.

\* 107. *S. PARVULUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 962. 91. — P. Amer. septentrionalis.

108. *S. QUADRIVITTATUS*. Chevr. — *H. op.* IV. p. 962. 92. —  
P. Mexico.

109. *S. STRANGULATUS*. Chevr. — *H. op.* IV. p. 963. 93. —  
P. Java.

♂♀ 110. *S. ZAMIÆ*. Schh. — *H. op.* IV. p. 963. 94. —  
P. Caffraria.

*Incertæ species, mihi invisæ.* (Spec. 111-121.)

111. *S. NECYDALOIDES*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 965. 97. — P. Carolina.

112. *S. MELANOCERHALUS*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 965. 98. —  
P. Carolina.
113. *S. LONGICOLLIS*. *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 965. 99. —  
P. St.-Domingo.
114. *S. TERREBRANS*. *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 966. 100. — P. Senegallia.
115. *S. ALBICOLLIS*. *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 966. 101. — P. Africa  
æquinoctialis.
116. *S. ARDESIUS*. *Oliv.* — *H. op.* IV. p. 966. 102. — P. Gallia.
117. *S. TRUNCATUS*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 966. 103. — P. Amer.  
borealis.
118. *S. CICATRICOSUS*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 966. 104. — P. Amer.  
borealis.
119. *S. VENATUS*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 966. 105. — P. Amer.  
borealis.
120. *S. RECTUS*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 966. 106. — P. America  
borealis.
121. *S. IMMUNIS*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 966. 107. — P. Amer. bor.

GENUS 618. — SITOPHILUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 967. genus 391.

- ♂♀ 1. *S. INCARNATUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 968. 1. —  
P. Birmans?
2. *S. SETULOSUS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 969. 2. — P. Mexico.
- ♂♀ 3. *S. EXARATUS*. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 970. 3. — P. Ins.  
Bourbon.
- \* 4. *S. SUBFASCIATUS*. *Dalm.* — *H. op.* IV. p. 971. 4. — P. Java.
- \* 5. *S. STIGMATICOLLIS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 972. 5. — P. Ile de  
France.
- STURM, *Catal.* 1843. p. 227.
- \* 6. *S. SUBSIGNATUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 973. 6. — P. India  
(*Orientalis?*).

\* 7. ♂. *S. SCULPTURATUS*. Schh. — *H. op. IV. p. 974. 7.* — *P. Bengal.*

♀ 8. *S. RUGOSUS*. Thunberg. — *H. op. IV. p. 975. 8.* — *P. Guinea.*

\* 9. *S. MELLERBORGI*. Schh. — *H. op. IV. p. 976. 9.* — *P. Java.*

♂♀ 10. *S. GRANARIUS*. Linné. — *H. op. IV. p. 977: 10.* — *P. Tota Europa.*

*Calandra granaria*. DAHLBOM, *Skandin. Ins. p. 66. 50.*

\* 11. *S. REMOTEPUNCTATUS*. Schh. — *H. op. IV. p. 979. 11.* — *P. Newyork, Amer. borealis.*

\* 12. *S. LINEARIS*. Herbst. — *H. op. IV. p. 979. 12.* — *P. India occidentalis et orientalis.*

♂♀ 13. *S. ORYZÆ*. Linné. — *H. op. IV. p. 981. 13.* — *P. Totus orbis, præsertim plagæ meridionales in seminibus.*

MANNERH. *Oryzæ. Beitr. zur Käfer. Faun. d. Aleut. Ins. p. 222. 253.*

*Curculio Oryzæ*. *Manual of British. Col. p. 216. 1671.*

*Incertæ species, mihi invisæ.*

14. *S. TAITENSIS*. Guérin. — *H. op. IV. p. 982. 14.*

15. *S. FRUMENTI*. Fabr. — *H. op. IV. p. 982. 15.* — *P. Sumatra.*

16. *S. QUADRINOTATUS*. Wiedem. — *H. op. IV. p. 982. 16.* — *P. Java.*

GENUS 619. — CATAPYGES. *Nobis.*

*Hujus operis IV. p. 982. genus 392.*

1. *C. ALBOSTRIATUS*. Fabr. — *H. op. IV. p. 984. 1.* — *P. Guinea.*

(Genus 619-620.)

*Ad divisionem RHYNCHOPHORIDES, referendæ sunt incerti generis species, mihi invisæ.*

1. *INDUS*. Linné. — *H. op. IV. p. 985. 1.* — *P. India.*

2. CRUENTATUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 985. 2. — *P. Carolina.*
3. PAGANUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 985. 3. — *P. India.*
4. SANGUIOLENTUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 986. 4. —  
*P. Insula Tabago Americae.*
5. FASCIATUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 986. 5. — *P. Amer. bor.*
6. CRUSTATUS. *Illiger.* — *H. op.* IV. p. 986. 6. — *P. Sierra  
Leona.*
7. BIFASCIATUS. *Kollar.* — *H. op.* IV. p. 987. 8. — *P. Nova  
Hollandia.*
8. TASMANII. *Boisduval.* — *H. op.* IV. p. 987. 9. — *P. Insula  
Vanikoro.*
9. OBSCURUS. *D'Urville.* — *H. op.* IV. p. 987. 10 — *P. Nova  
Irlandia.*
10. MELANOSOMUS. *Dupont.* — *H. op.* IV. p. 987. 11. — *P. Nova  
Hollandia.*
11. PRÆPOTENS. *Say.* — *H. op.* IV. p. 988. 13. — *P. Amer. bor.*
12. INTERSTITIALIS. *Say.* — *H. op.* IV. p. 988. 14. — *P. Amer. bor.*
13. OCHREATA. *Eydoux et Souleyet.*  
*Calandra id.* EYD. et SOUL. — *Revue Zool. Cuvier.* 1839.  
p. 266. — *P. Manilla.*

## DIVISIO III. — COSSONIDES.

*Antennæ breves; funiculus 7-articulatus; clava aut indistincte articu-  
lata, aut sub-solida, apice semper spongiosa. Rostrum deflexum.  
Pygidium elytra tegunt, abdominis segmenta duo prima multo  
longiora, arcte juncta, ægre discernenda. Pedes antici basi dis-  
tantes.* — (Gen. 620-630.)

GENUS 620. — AMORPHOCERUS. *Nobis.*

*Curc. Disp. Méth.* p. 329. gen. 192. — *Huj. op.* IV. p. 989.  
gen. 393.

- ♂ 1. *A. RUFIPES*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 990. 1. — *P. Caffraria*.  
 \* 2. *A. ZAMIE*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 991. 2. — *P. Caffraria*.  
 \* 3. *A. TALPA*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 992. 3. — *P. Caffraria*.  
 4. *A. SETOSUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 993. 4. — *P. Caffraria*.

GENUS 621. — GOSSONUS. *Clairville*.

*Curc. Disp. Méth.* p. 330. gen. 193. *Huj. op.* IV. p. 994. gen. 394.

STIRPS I. — *Clava antennarum sub-ovata*. (Spec. 1-52.)

MANIPULUS I. — *Rostrum extrorsum ampliatum*. (Spec. 1-50.)

CENTURIA I. — *Thorax postice truncatus*. (Spec. 1-4.)

- \* 1. *C. LINEARIS*. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 995. 1. — *P. Austria, Gallia, Helvetia*.

♂ 2. *C. FERRUGINEUS*. *Clairv.* — *H. op.* IV. p. 996. 2. — *P. Suecia, Helvetia, Belgia, Polonia, Livonia*.

STURM, *Catal.* 1843. p. 228.

- \* 3. *C. PLATALEA*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 998. 3. — *P. America borealis*.

- \* 4. *C. CYLINDRICUS*. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 999. 4. — *P. Suecia meridionalis, Styria, Westphalia, Gallia, Sibiriâ meridion.*

CENTURIA II. — *Thorax postice bi-sinuatus*. (Spec. 5-56.)

A.) *Thorax antice plus minusve coarctatus, haud constrictus*. (Spec. 5-47.)

†.) *Thorax supra sub-æqualis, vix impressus, confertim punctatus*. (Spec. 5-14.)

- \* 5. *C. SUBAREATUS*. (*Schh.*) — *Niger, glaber, supra paulo convexus; antennis tarsisque ferrugineis; rostro breviori, crassiori, apice minus dilatato, confertim punctulato; thorace latiore, sub-quadrangulo, undique minus profunde remotius punctato, utrinque*



*plaga dorsali subtiliter punctata insignito, linea dorsali lævi, basi leviter bi-sinuato; elytris convexis, sulcatis, sulcis sat profunde punctatis, interstitiis sub-convexis, lævibus.*

*Patria: Philadelphia. Dom. GERMAR. Mus. SCHH.*

Magnitudo et statura *Cossoni cylindrici*; rostro non canaliculato, thorace remotius minus profunde punctato, basi haud impresso, utrinque plaga dorsali subtiliter punctulata, elytrorum interstitiis latioribus, ab illo distinctus. Caput parvum, porrectum, obsolete punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum; oculi laterales, rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite dimidio longius, porrectum, nonnihil arcuatum, a basi ultra medium modice crassum, teres, apice modice quadrangulariter ampliatus, undique subtiliter confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ minus tenues, ferrugineæ; clava ovata, acuminata, dense pallido-pubescente. Thorax latitudine media haud longior, apice truncatus, anterieus subito angustatus, mox pone apicem coarctatus, tum rotundato-ampliatus, lateribus fere rectis, versus basin perparum rotundato-angustatis; postice leviter bi-sinuatus, supra paulo convexus, remote minus profunde punctatus, utrinque plaga dorsali subtiliter punctulata, linea media lævi instructus; basi non impressus, totus niger, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, læve, concolor. Elytra basi sub-truncata, thorace nonnihil latiora, humeris sub-elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, profunde sulcata et in sulcis sat profunde crebre punctata, interstitiis latioribus, modice convexis, sub-lævibus; tota nigra, picea, nitida, glabra. Corpus subtus sub-remote punctatum, nigro-piceum, nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, minus tenues; femoribus clavatis, muticis, nigro-piceis; tarsis gracilibus, ferrugineis, subtus fulvo-spongiosis. — БНН.

\*6. *C. XYLOPHILUS. Schh. — H. op. IV. p. 999. 5. — P. Mexico.*

\*7. *C. MULTIFORUS. Schh. — H. op. IV. p. 1000. 6. — P. Mexico.*

\*8. *C. IMPRESSIFRONS. Schh. — H. op. IV. p. 1001. 7. — P. Pennsylvania, Carolina meridion.*

\*9. *C. PINIPHILUS. Eschscholtz. — H. op. IV. p. 1002. 8. — P. California.*

MANNERH. *Beitr. zur Käffer. Faun. d. Aleut. Ins. p. 223. 254.*

10. *C. PUNCTICOLLIS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1003. 9. —  
P. Mexico.
11. *C. DEPRESSICOLLIS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1004. 10. —  
P. Mexico.
- \* 12. *C. CORTICOLA*. *Say.* — *H. op.* IV. p. 1005. 11. —  
P. Amer. borealis.
- \* 13. *C. CONCINNUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1006. 12. —  
P. Connecticut.
- \* 14. *C. CONVEXIUSCULUS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1007. 13. —  
P. Mexico.
- ††) *Thorax supra impressus, confertim punctatus.* (Spec. 15-33.)
- \* 15. *C. EPHIPPIGER*. *Guérin.* — *H. op.* IV. p. 1007. 14. —  
P. Java.
- \* 16. *C. CASTANEIPENNIS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1008. 15. —  
P. Brasilia.
17. *C. RUFUS*. (*Schh.*) — *Obscure ferrugineus, sub-nitidus, glaber; antennis, thorace elytris que rufo-ferrugineis; fronte profunde foveolata, rostro tenuiore, apice parum ampliato, dilutiore; thorace sub-quadrangulo, profunde sat crebre punctato, basi leviter impresso, breviter carinato; elytris profunde crebre punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, lævibus, sutura infuscata.*
- Patria*: Brasilia. Mus. Dom. GERMAR.
- Magnitudo *Cossoni ferruginei*. Caput porrectum, postice læve, inter oculos parce punctulatum, piceum, nitidum, glabrum, inter oculos foveola profunda insculptum; oculi laterales, rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite dimidio longius, porrectum, parum arcuatum, a basi ultra medium sub-tenuè, nigro-piceum, apicem versus parum quadrangulariter ampliatum, rufo-ferrugineum, inter antennas tenuiter canaliculatum, undique subtiliter punctulatum, nitidum, glabrum. Antennæ minus validæ, obscure ferrugineæ; clava ovato-acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax sub-quadrangulus, apice truncatus, anterius subito angustior, intra apicem coarctatus et transversim impressus, lateribus pone stricturam sub-rectis; basi leviter bisinuatus, supra parum convexus, sat crebre profunde punctatus, basi leviter impressus, breviter carinatus, rufo-ferrugineus, niti-

dus, glaber, margine apicali nigro-piceo. Scutellum parvum, rotundatum, læve, piceum. Elytra antice conjunctim leviter trisinuata, thoracis basi haud latiora, humeris sub-elevatis, rectangulatis; lateribus linearia, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso planiuscula, undique profunde crebre punctato-striata, interstitiis angustis, parum convexis, lævibus; tota rufo-ferruginea, nitida, glabra. Corpus subtus sub-remote punctatum, nigro-piceum, nitidum. Pedes breviusculi, rufo-ferruginei; femoribus latiusculis, compressis, muticis; tarsis gracilibus, subtus fulvo-spongiosis.

BHN.

18. C. SEMIRUFUS. Chev. — *H. op.* IV. p. 1009. 16. —  
P. Mexico.

\* 19. C. DEPLANATUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1010. 17. —  
P. Minas Geraës, Brasiliæ.

\* 20. C. SULCIROSTRIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1011. 18. —  
P. Mexico.

\* 21. C. CORTICALIS. Fabr. — *H. op.* IV. p. 1012. 19. —  
P. Brasilia, Columbia.

\* 22. C. SCROBICULATOSTRIATUS. (Schh.) — *Elongatus, paulo convexus, niger, sub-nitidus, glaber; rostro brevi, crasso, convexo, confertim punctulato, apice abrupte ampliato; thorace sub-quadrangulo, minus profunde sub-remote punctato, anterieus angustato, basi profunde bi-sinuato, ibique impresso, profundius punctato; elytris crebre et profunde punctato-striatis, interstitiis carinatis, sub-lævibus.*

*Patria* : St.-Vincent. Dom. AUBÉ. Mus. SCHH. Brasilia. Dom. BESCKE. Mus. Dom. SOMMER.

*Cossono corticali* proximus, nonnihil minor; rostro non impresso, thorace minus profunde punctato, basi profundius impresso, non carinato, ab illo mox distinctus. Caput breve, convexum, subtiliter punctulatum, postice sub-læve, nigrum, nitidum, glabrum; fronte foveola parva, profunda insculpta; oculi laterales, sub-ovati, depressi, nigri; rostrum capite nonnihil longius, crassum, sub-rectum, basi angustatum, teres, apice quadrangulariter valde ampliatum, convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ validiusculæ, nigropiceæ; clava ovata, dense cinereo-holosericea. Thorax latitudine

baseos haud longior, sub-quadrangulus, apice truncatus, antice angustior, vix coarctatus, lateribus pone stricturam obliquis, dein sub-rectis; basi profunde bi-sinuatus, supra parum convexus, basi foveola sub-ovata, profunda impressus, sat confertim medioeriter punctatus, area utrinque parva, dorsali, remotius subtilius punctulata, insignitus; niger, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, concolor, laeve. Elytra antice conjunctim sub-tri-sinuata, thoracis medio parum angustiora, humeris obtuse angulatis; linearia, apice obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra in dorso paulo convexa, crebre profunde punctato-striata, interstitiis convexis, minus angustis, sub-laevibus. Corpus subtus sat profunde et crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, nigri, punctati; tarsis angustis, ferrugineis. — BHN.

\* 23. C. AMBIGUUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1013. 20. — *P.* . . . .

\* 24. C. PYRIROSTRIS. *Mannerh.* — *H. op.* IV. p. 1014. 21. — *P.* St.-Domingo.

\* 25. C. GUILDINGI. Schh. — *H. op.* IV. p. 1015. 22. — *P.* Ins. St.-Vincent.

\* 26. C. PERFIDIOSUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1016. 23. — *P.* Caracas Amer. merid.

27. C. CONVEXICOLLIS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1017. 24. — *P.* Mexico.

\* 28. C. EXARATUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1018. 25. — *P.* Mexico.

\* 29. C. SUBCOSTATUS. (*Chevolat.*) — *Elongatus, sub-depressus, niger, nitidus, glaber; fronte punctulata, leviter foveolata, rostro breviora, apice valde ampliato; thorace basi bi-sinuato, confertim punctulato, dorso longitudinaliter leviter impresso, profunde crebre punctato; elytris confertim punctato-striatis, interstitiis convexis, laevibus.*

*Patria* : Cuba. DOM. CHEVOLAT. MUS. SCHH.

*Cossono exarato affinis, nonnihil major; rostro apice magis ampliato, thorace lateribus subtiliter punctulato, dorso latius profundius punctato, ab illo distinctus. Caput parvum, convexum, postice sub-laeve, fronte evidenter crebre punctulatum, inter oculos foveola oblonga insculptum, nigrum, nitidum, glabrum;*

oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite parum longius, perfectum, parva arcuatum, a basi ultra medium teres, modice crassum, apicem versus valde quadrangulariter ampliatum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ minus tenues, nigro-piceæ. Thorax latitudine baseos parum longior, apice truncatus, anterior angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam obliquis, dein sub-rectis; basi sat profunde bi-sinuatus, supra fere planus, medio longitudinaliter leviter impressus, ibique profunde crebre punctatus, lateribus confertim mediocriter punctulatus, niger, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, læve; concolor. Elytra basi conjunctim leviter tri-sinuata, thorace paulo latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apice obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra in dorso planiuscula, sat profunde confertim punctato-striata, interstitiis angustis, convexis, lævibus; nigra, sub-nitida, glabra. Corpus subtus sat crebre punctulatum, nigro-piceum, nitidum. Pedes breviusculi, nigro-picei, nitidi, obsolete punctati; tarsi angustis, obscure ferrugineis. — BHN.

\* 30. *C. IMPRESSUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1019. 26. —  
*P. Jamaica, Cuba.*

\* 31. *C. FOSSATUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1020. 27. — *P. Amer. meridionalis.*

\* 32. *C. MARGINALIS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1021. 28. —  
*P. Insula Bourbon.*

\* 33. *C. ELONGATULUS*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 1022. 29. —  
*P. Caput Bonæ Spei, Ile de France.*

+++ ) *Thorax supra impressus, area utrinque magna, lævi, vel subtilissime punctulata.* (Spec. 34-45.)

\* 34. *C. CANALICULATUS*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 1023. 30. —  
*P. Java.*

\* 35. *C. SQUAMA*. Fabr. — *H. op.* IV. p. 1024. 31. — *P. America meridionalis.*

\* 36. *C. LATITHORAX*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1025. 32. —  
*P. India orientalis?*

37. *C. FOVEATUS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1026. 33. — *P. Mexico.*

38. *C. PUNCTIFRONS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1027. 34. —  
*P. Mexico.*

39. *C. LIGNIPERDUS*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1028. 35. —  
*P. Mexico.*

\* 40. *C. LEBASII*. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 1029. 36. — *P. Car-*  
*thagena Columbiæ.*

\* *VAR. β. totus niger.*

*Patria* : Columbia, Caracas. *Dom. MORITZ.*

\* 41. *C. VULNERATUS*. *Illiger.* — *H. op.* IV. p. 1030. 37. —  
*P. Carthagena, Amer. merid.*

*STURM, Ins. Catal.* 1843. p. 228.

42. *C. DECEPTOR*. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1031. 38. — *P. America.*

43. *C. THORACICUS*. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1032. 39. —  
*P. Mexico.*

\* 44. *C. AFRICANUS*. (*Schh.*) — *Elongatus, sub-depressus, niger, nitidus; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis; fronte foveolata, cum rostro subtiliter punctulato, apice quadrangulariter valde ampliato; thorace medio carinato, ibique utrinque leviter impresso, profunde punctato, lateribus subtiliter punctulato; elytris mediocriter crebre punctato-striatis, interstitiis latioribus, sub-convexis, lævibus.*

*Patria* : Caput Bonæ Spei. *Dom. Y. WAHLBERG. Mus. Reg. Acad. Holm.*

*Cosson thoracico* magnitudine æqualis; fronte foveolata, thorace convexiore, evidenter carinato, lateribus distinctius punctulato, ut et interstitiis elytrorum latioribus, ab illo distinctus. Caput porrectum, modice convexum, postice læve, inter oculos subtiliter punctulatum, foveolatum, nigrum, nitidum, glabrum; oculi laterales, rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite vix longius, validum, sub-rectum, basi angustius, teres, extrorsum quadrangulariter ampliatum, deplanatum, sub-remote subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ validiusculæ, ferruginæ; clava ovata, acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine baseos non longior, apice truncatus, mox intra

apicem coarctatus et transversim leviter impressus, anterie angustior, lateribus sub-rectis; postice leviter bi-sinuatus, supra nonnihil convexus, dorso medio longitudinaliter carinatus, utrinque leviter impressus, profunde sat crebre punctatus, dein dorso subtiliter lateribus evidenter crebre punctulatis; niger, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, læve, concolor. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris rotundatis, sub-rectangulatis; lateribus linearia, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra paulo convexa, crebre mediocriter punctato-striata, interstitiis latioribus, parum convexis, lævibus; nigra, sub-nitida, glabra. Corpus subtus sat crebre mediocriter punctatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, punctulati; femoribus nigro-piceis; tibiis tarsisque ferrugineis. — BHN.

\* 45. C. SUTURALIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1033. 40. — *P. Caput Bonæ Spei.*

††††) *Thorax supra æqualis, lævis.* (Spec. 46-47.)

\* 46. C. GLABRICOLLIS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1034. 41. — *P. Caput Bonæ Spei.*

\* 47. C. POLITUS. (Klug.) — *Elongatus, depressus, niger, nitidus; antennis pedibusque dilute ferrugineis, rostro capite parum longiore, obsolete punctulato, apice quadrangulariter ampliato; thorace sub-quadrangulo, supra plano, sub-lævi, lateribus crebre punctato, ferrugineo; elytris vitta disci ferruginea decoratis, interne lævibus, extrorsum sub-remote punctato-striatis, interstitiis parum convexis, lævibus.*

*Patria:* Columbia. DOM. SCHÜPPEL. MUS. SCHH.

*Cossono Lebasii* paulo minor, magis nitidus, aliter coloratus; thorace supra plano, sub-lævi, elytris dorso ad suturam impunctatis, ab illo distinctus. Caput porrectum, subtilissime punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum, inter oculos haud foveolatum; oculi laterales, sub-rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius, crassiusculum, sub-rectum, basi angustius, teres, extrorsum modice quadrangulariter ampliatum, deplanatum, subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ validiusculæ, dilutius ferrugineæ; clava ovata, acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica vix

longior, apice truncatus, anteriora angustior, intra apicem profunde constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliatum, dein paulo rotundato-ampliatum, basi bi-sinuatus, supra planus, dorso sub-lævi, lateribus sat crebre evidenter punctatus, niger, nitidus, glaber, lateribus vitta ferruginea decoratus, Scutellum parvum, rotundatum, læve, concolor. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi parum latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apice conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra planiuscula, dorso ad suturam impunctata, lateribus sub-remote punctato-striata, interstitiis ibique parum convexis, lævibus; nigra, nitidissima, glabra, vitta longitudinali disci postice latiora, ferruginea insignita. Corpus subtus lateribus sat crebre punctatum, medio læve, nigrum, nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, dilute rufo-ferruginei.

BHN.

B) *Thorax antice profunde constrictus.* (Spec. 48-50.)

- \* 48. C. SPATHULA. Chev. — *H. op.* IV. p. 1035. 42. — *P.* Cuba.  
 49. C. ABSCISSUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1036. 43. — *P.* Caffraria.  
 50. C. TORRIDUS. Chev. — *H. op.* IV. p. 1037. 44. — *P.* Senegallia.

MANIPULUS II. — *Rostrum teres, sub-lineare.* (Spec. 51-59.)

51. C. LATUS. Chev. — *H. op.* IV. p. 1038. 45. — *P.* Mexico.  
 52. C. AFFABER. (Schh.) — *Elongatus, parum convexus, niger; sub-nitidus; rostro tereti, sub-lineari, crassiusculo, apice sub-depresso, parum arcuato, evidenter confertim punctulato; thorace crebre profunde punctato, ante scutellum foveola oblonga, profunda in-sculpto; elytris crebre profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, lævibus.*

*Patria:* Mexico. Mus. Dom. SOMMER.

Magnitudo fere et statura *Cossoni lati*; rostro evidenter crebrius punctato, apice supra depresso, thorace undique confertim punctato, foveola basali magis oblonga in-sculpto, ab illo distinctus. Caput mediocre, convexum, mediocriter crebre punctatum, fronte canaliculata; totum nigrum, nitidum, glabrum; oculi sub-ovati, parum prominuli, nigri; rostrum capite parum longius, validum,



teres, sub-lineare, parum arcuatum, supra convexum, apice evidenter deplanatum, distincte crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ validæ, nigro-piceæ; clava ovata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica fere brevior, apice truncatus, antè angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis, dein sub-rectis; postice bi-sinuatus, supra paulo convexus, undique confertim profunde punctatus, in ipsa basi ante scutellum foveola sat profunda, oblonga insculptus; totus niger, parum nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, læve, concolor. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso paulo convexa, sat profunde punctato-striata, interstitiis angustis, convexis, lævibus; tota nigra, parum nitida, glabra. Corpus subtus confertim mediocriter punctatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Pedes breves, validi, punctulati, nigri; tarsi obscure ferrugineis. — BHN.

STIRPS 2. — *Clava antennarum elongata, oblongo-ovata.*  
(Spec. 53-56.)

\* 53. C. DEPRESSUS. Chev. — *H. op. IV. p. 1039. 46.* —  
P. Mexico.

\* 54. C. CUBÆ. (Chevrolat.) — *Elongatus, parum convexus, niger, sub-nitidus; antennis validis, rostro confertim punctulato, medio canaliculato, apice quadrangulariter ampliato; thorace sat crebre mediocriter punctato, medio longitudinaliter impresso, carinato, ibique profunde crebre punctato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, convexis, lævibus.*

*Patria: Insula Cuba. Dom. CHEVROLAT. Mus. SCHH.*

*Cossona pyrastro paulo interdum dimidio major; rostro canaliculato, antennis validioribus, clava longiore, thorace medio longius impresso, profundius punctato, ab illo distinctus. Caput porrectum, supra modice convexum, subtiliter punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum; oculi laterales, rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite nonnihil longius, validum, sub-rectum, basi teres, extrorsum quadrangulariter valde ampliatum, medio canaliculatum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ validæ, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-*

ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica haud longior, apice truncatus, antèrius angustior, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliat, dein fere rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, mediocriter sat crebre punctatus, medio longitudinaliter impressus et carinatus, ibique profunde crebre punctatus, niger, nitidus, glaber, Scutellum parvum, rotundatum, læve, concolor. Elytra antice conjunctim leviter tri-sinuata, thoracis basi fere angustiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apice ipso obtuse rotundata, thorace duplo longiora, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, convexis, lævibus; nigra, nitida, glabra. Corpus subtus sat crebre mediocriter punctatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, remote punctati, nigri, nitidi. — BHN.

\* 55. *C. CONICIROSTRIS*. Chev. — *H. op.* IV. p. 1040. 47. —  
P. Mexico.

56. *C. TENELLUS* (1). Klug. — *H. op.* IV. p. 1041. 49. —  
P. Madagascar.

GENUS 622. — PORTHETES. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 1041. genus 395.

♂♀ 1. *P. ZAMIÆ*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1042. 1. —  
P. Caffraria.

GENUS 623. — MESITES. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 1043. genus 396. — In diagnosi et descriptione l. c. lege: « articulis antennarum duobus basalibus aut brevibus sub-turbinatis, aut longiusculis sub-obconicis. »

♂ 1. *M. TARDII*. (Vigors.) — *Elongatus, nigro-piceus, parum nitidus, glaber; antennis pedibusque obscure ferrugineis, rostro modice arcuato; thorace oblongo, intra apicem profunde constricto, confertim mediocriter punctato, basi obsolete impresso, antice tenuiter carinato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter rugulosis.*

(1) Mihi invisus.

*Mas* : rostro validiori, confertim punctulato, canaliculato, extorsum quadrangulariter ampliato, antennis ante medium rostri insertis.

*Femina* : rostro tenuiore, tereti, mox pone basin ampliato, lævi; antennis propè basin rostri insertis.

♀ VAR. β. Rufo-piceus; elytris castaneis.

*Cossonus id.* Huj. op. IV. p. 1041. 46.

STEPHENS. *Brit. Ent.* IV. p. 7. 1.

*Patria* : Anglia. Dom. WALTON. Mus. SCHH.

Variat valde magnitudine. *Lixo Ascanii* æqualis, interdum tamen duplo et ultra minor. Caput mediocre, rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigro-piceum, sub-nitidum, glabrum; fronte foveola oblonga insculpta; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum pro sexu ut in diagnosi, nigrum, sub-opacum. Antennæ sat validæ, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax oblongus, latitudine postica dimidio longior, apice truncatus, intra apicem profunde constrictus, anterieus angustior, lateribus pone stricturam magis dein modice rotundato-ampliatis, basi leviter bi-sinuatus, tenuiter marginatus, supra convexus; confertim mediocriter punctatus, dorso ante scutellum leviter impressus, antice tenuiter carinatus, nigro-piceus, parum nitidus, glaber. Scutellum minutissimum, sub-quadratum, læve, concolor. Elytra antice leviter tri-sinuata, thoracis basi paulo latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace vix duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis latis, planis, subtilissime crebre rugulosis; nigro-picea, sub-nitida, glabra. Corpus subtus subtiliter sat crebre punctulatum, nigro-piceum, nitidum, glabrum. Pedes mediocres, subtilissime punctulati, obscure ferruginei. — BHV.

♂♀ 2. *M. PALLIDIPENNIS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 1045. 1. —  
*P. Tauria*, Caucasus, Ægyptus.

STURM, *Catal.* 1843. p. 228.

*Cossonus Calandroïdes.* DEJEAN, *Catal.* ed. 2. p. 305. ed. 3. p. 330.

♂♀ 3. *M. CUNIPES.* Solier. — *H. op.* IV. p. 1046. 2. — *P. Gallia meridionalis.*

GENUS 624. — PHLOEOPHAGUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 1047. genus 397.

1. P. SILBERMANNI. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1048, 1. — P. Mexico.
- \* 2. P. EBENINUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1049, 2. — P. Caffraria.
- \* 3. P. FERRUGINEUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1050, 3. — P. Caput Bonæ Spei.
- \* 4. P. HISPIDUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1051, 4. — P. Caffraria.
- \* 5. P. ÆNEOPICEUS. (*Kirby.*) — *Latiior, convexus, piceus, æneomicans, nitidus, glaber; clava antennarum ovata, rostro capite longiore, valido, subtiliter confertim punctulato; thorace sub-ovali, mediocriter sub-remate punctato; elytris linearibus, supra humeris impressis, profunde sulcato-punctatis, interstitiis obsolete punctulatis.*

*Rhyncolus truncorum.* STEPHENS. *Brit. Ent.* IV. p. 6. 4.

*Patria* : Anglia. DOM. WALTON. *MUS. SCHH.*

*Rhyncolo truncorum* vix longior, sed nonnihil latior, aliter coloratus; thorace subtiliter punctulato, elytris supra humeros impressis, basi profundius sulcato-punctatis, ab illo distinctus. Caput breve, rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, æneo-piceum, nitidum, glabrum; oculi rotundati, parum convexi, brunnei; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, paulo arcuatum, teres, subtiliter crebre punctulatum, æneo-piceum, nitidum, glabrum. Antennæ breves, minus crassæ, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax latitudine postica parum longior, apice truncatus, anterieus angustior, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi etiam sub-truncatus, supra convexus, minus crebre et profunde punctatus, æneo-piceus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, haud conspicuum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris sub-elevatis, obtuse rectangulatis; lateribus haud ampliata, apice conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivata, supra humeros leviter longitudinaliter impressa, basi profunde dein mediocriter sulcato-punctata, interstitiis sub-convexis, obsolete punctulatis. Corpus subtus punctatum, æneo-piceum, nitidum. Pedes breves, validi, rufo-ferruginei; femoribus clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, rectis. — BHN.

- \* 6. *P. TURBATUS*. Schh. — *Patria* : Suecia, Finlandia, Sibiria.  
*Phloeophagus linearis*. Huj. op. IV. p. 1052. 5. — Synonymia  
 MARSHANI deleantur ut ad *Rhyncolum cylindrirostrum* referenda.
7. *P. FALLAX*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1052. 6. — *P. Caffraria*.
8. *P. MINIMUS*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1053. 7. — *P. Mexico*.
- ♂♀ 9. *P. SPADIX*. Herbst. — *H. op.* IV. p. 1054. 8. — *P. Austria*,  
 Illyria, Sicilia, Algier, Gallia meridionalis.
- \* 10. *P. SCALPTUS*. Schh. — *Patria* : Suecia intermedia et merid.  
*Phloeophag. sculptus*. Huj. op. IV. p. 1055. 9.
11. *P. UNCIPES*. Chevr. — *H. op.* IV. p. 1055. 10. — *P. Italia*.
- \* 12. *P. PALLIDUS*. (Schh.) — *Lineari-elongatus, depressus, rufo-testaceus, nitidus, glaber; rostro thorace brevior, parum arcuato, punctulato; thorace oblongo, intra apicem constricto, lateribus haud rotundato-ampliatis; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, laevibus.*  
*Patria* : Ohio Americæ borealis. DOM. HARRIS. MUS. SCHH.
- Minimus hujus divisionis. Anne ad hoc genus pertingens?  
*Lycto parvulo* duplo minor. Caput rotundatum, convexum, subtiliter punctulatum, rufo-testaceum, nitidum, glabrum; oculi rotundati, modice convexi, brunnei; rostrum thorace multo brevius, minus tenue, teres, modice arcuatum, subtiliter confertim punctulatum, rufo-testaceum, nitidum, glabrum. Antennæ minus tenues, rufo-testaceæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax elongatus, latitudine postica fere duplo longior, apice truncatus, intra apicem constrictus, lateribus parum rotundato-ampliatis, basi obsolete bi-sinuatus, supra fere planus, subtilissime punctulatus, rufo-testaceus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi parum latiora, humeris haud elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix dimidio longiora, supra in dorso fere plana, tenuiter punctato-striata, interstitiis sub-planis, laevibus; rufo-testacea, nitida, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, concolor. Pedes breviusculi, validi, rufo-testacei; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis. — BRN,

GENUS 625. — RHYNCOLUS. *Creutzer.*

*Hujus operis* IV. p. 1056. gen. 398. — *Curc. Disp. Méth.* p. 337. sub-gen.

- \* 1. R. PROCER. *Dalman.* — *H. op.* IV. p. 1058. 1. — *P. Java.*  
*Cossonus attenuatus.* KLUG. teste DOM. GERMAR.
- \* 2. R. ENCAUSTUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1059. 2. — *P. Madagascar.*
3. R. FILIFORMIS. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 1059. 3. — *P. India orientalis.*
- \* 4. R. CYLINDRICUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1060. 4. — *P. Iberia, Dalmatia.*
- \* 5. R. PRÆUSTUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1061. 5. — *P. Java.*
- \* 6. R. ELUMBIS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1062. 6. — *P. Columbia.*
- \* 7. R. ANGUSTATUS. *Schh.* — *H. op.* IV. p. 1063. 7. — *P. Madagascar.*
- \* 8. R. CHLOROPUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 1064. 8. — *P. Europa septentrionalis, Lapponia.*  
*Cossonus id.* ZETTERST. *Ins. Lapp.* I. p. 190. 1.
- \* 9. R. BRUNNEUS. (*Eschscholtz.*) — *Sub-cylindricus, rufo-piceus, glaber; antennis mediocribus, rostro longitudine capitis, crebre punctato, canaliculato; thorace oblongo, anterie paulo angustato, profunde punctato; elytris profunde punctato-striatis.*  
Longit. 2 lin. Latit. 1½ lin.  
DEJEAN, *Cat.* ed 2. p. 305. ed. 3. p. 330.  
MANNERH. *Beitrag. zur Käfer. Faun. d. Aleut. Ins., etc.* p. 223. 255.  
Habitat in insula Sitkha Americæ borealis. DD. ESCHSCHOLTZ et KÛPRIANOFF.

*Rhyncolo chloropo* nonnihil major; rostro obsoletius canaliculato, elytris subtiliter punctato-striatis, ab illo differt. Totus rufo-piceus, pedibus interdum dilutioribus. Caput breve, convexum, fronte crebre punctata, vertice lævi, nitido; oculi ovati, nigri, sub-depressi; rostrum latitudine fere capitis et illo vix longius,

supra depressum, crebre et profunde punctatum, medio canaliculatum, canalicula in fronte nonnihil protensa. Antennæ capite cum rostro sesqui-longiores; clava oblonga, dilutiore, dense griseo-pubescente. Thorax latitudine dimidio longior, anterius parum angustatus, ibique et basi truncatus, lateribus levissime rotundatis; intra apicem transversim profunde impressus, dorso posterius sub-depressus, profunde et sat crebre punctatus. Scutellum minutum, rotundatum, elevatum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi latiora, humeris nonnihil rotundatis, lateribus rectis; apice conjunctim rotundata, thorace fere duplo longiora, supra convexa, profunde punctato-striata, punctis magnis sub-remotis impressis, interstitiis obsoletissime punctulatis et transversim strigulosis. Corpus subtus saturatius piceum, profundius punctatum. Pedes breviusculi, validi, dilutius rufescentes.

MANNERHEIM.

\* 10. R. ELONGATUS. *Gyllenh.* — *H. op.* IV. p. 1065. 9. — *P. Europa borealis, Germania.*

*STURM, Catal.* 1843. p. 228.

\* 11. R. PORCATUS. *Müller.* — *H. op.* IV. p. 1065. 10. — *P. Germania, Iberia, Pyrenæi.*

\* 12. R. QUERCICOLUS. (*Harris.*) — *Oblongus, sub-cylindricus, niger, nitidus, glaber; rostro brevi, crasso, sub-lineari, antennarum clava compressa; thorace profunde minus crebre punctato, lateribus parum rotundato; elytris cylindricis, apice rotundatis, profunde punctato-sulcatis, interstitiis convexis, lævibus.*

*Patria: Nova Carolina. Dom. HARRIS. Mus. SCHH.*

*Rhyncolo porcato* simillimus et illo magnitudine æqualis, magis nitidus; rostro apicem versus non angustato, elytris profundius punctato-sulcatis, interstitiis lævibus, ab illo unice distinctus. Caput breve, convexum, confertim punctulatum, nigrum, nitidum, inter oculos foveola parva insculptum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite parum longius, validum, teres, sub-rectum, crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ breves, validæ, obscure ferrugineæ; clava parva, sub-compressa, apice obtusa, cinereo-pubescente. Thorax latitudine nonnihil longior, basi apiceque truncatus, longe intra apicem leviter transversim impressus, lateribus paulo rotundato-ampliatum, supra convexus, minus crebre profunde punctatus, niger, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, con-

color. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi haud latiora, humeris vix elevatis, fere rectangulatis; lateribus apicem versus non ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace vix duplo longiora, supra convexa, postice declivata, profunde sulcata, in sulcis punctis majusculis, sat crebris impressa, interstitiis convexis, laevibus; nigra, nitida, glabra. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, parum nitidum. Pedes brevifusculi, validi, nigri, nitidi, vix punctulati; tarsi angustis, ferrugineis. — **Bmn.**

\* 13. *R. COLINANS.* Reich. — *H. op.* IV. p. 1066. 11. — *P.* Germania, Gallia, Volhynia.

In observatione hujus speciei t. c. lin. 4: pro, « angulosis », lege : rugulosis. \*

\* 14. *R. EXIGUUS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 1066. 12. — *P.* Patavia Bavariae.

\* 15. *R. SUBMURICATUS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 1067. 13. — *P.* Volhynia, Caucasus, Gallia.

FALDERM. *Fam. Ent. Transcaucas.* II. p. 249. 409. et III. p. 207.

\* 16. *R. TRUNCORUM.* Schupp. — *H. op.* IV. p. 1068. 14. (Synonymon STEPHENSI deleatur.)

*Patria* : Germania, Gallia, Corsica, Suecia merid.

\* 17. *R. LATINUS.* Say. — *H. op.* IV. p. 1068. 15. — *P.* Florida.

18. *R. PLEBEIUS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 1060. 16. — *P.* Caffraria.

19. *R. TRIVIALIS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 1070. 17. — *P.* Caput Bonae Spei.

\* 20. *R. CYLINDRIROSTRIS.* Olivier. — *H. op.* IV. p. 1071. 18. *P.* Gallia, Anglia, Suecia meridionalis.

*Curculio lignarius.* MARSH. *Ent. Br.* p. 275. 113. secundum DOM. WALTON.

\* 21. *R. REFLEXUS.* Schh. — *H. op.* IV. p. 1072. 19. — *P.* Gallia, Parisiis.

\* 22. *R. PUNCTATULUS.* Ziegler. — *H. op.* IV. p. 1073. 20. — *P.* Gallia, Helvetia.

23. *R. BREVIS.* (Schh.) — *Breviter elongatus, convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, glaber; antennis pedibusque obscure ferrugineis, ros-*



tro brevissimo, lato, non impresso, confertim punctulato; thorace confertim punctulato, longe intra apicem obsolete constricto; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, ruguloso-punctatis.

*Patria* : Carolina. Mus. Dom. GERMAR.

Statura et summa similitudo *Rhyncoli punctatuli*, dimidio tamen major; rostro non canaliculato, elytris evidenter punctato-striatis, ab illo distinctus. Caput magnum, crassum, convexum, vertice obsolete, fronte evidenter crebre punctulatum, nigro-piceum, nitidum, glabrum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum latitudine fere capitis, sed illo multo brevius, crassum, rectum, supra modice convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigro-piceum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ breves, minus crassæ, obscure ferrugineæ; clava ovata, acuminata, dilutiore, pallido-pubescente. Thorax latitudine postica paulo longior, basi apiceque truncatus, anterie nonnihil angustior, longe intra apicem obsolete constrictus, lateribus sub-obliquis; supra convexus, confertim mediocriter punctulatus, nigro-piceus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, sub-rotundatum, elevatum, concolor. Elytra basi truncata, antice thorace haud latiora, humeris vix elevatis, fere rectangulatis; lateribus linearia, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, confertim subtiliter ruguloso-punctatis; dilutius picea, nitida, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigro-piceum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, obscure ferruginei; femoribus modice clavatis, muticis. — ВРН.

\* 24. R. TROGLODYTES. Schh. — *H. op.* IV. p. 1073. 21. — P. Peru.

25. R. LINEARIS. (Schh.) — *Elongatus, angustus, nigro-piceus, nitidus, glaber; antennis pedibusque ferrugineis, rostro brevi, tenuiter canaliculato; thorace oblongo, subtiliter crebre punctulato, longe intra apicem constricto, lateribus sub-recto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, lævibus.*

*Patria* : Brasilia. Mus. Dom. GERM.

*Rhyncolo cylindrirostri* longitudine æqualis, sed multo angustior. Caput breve, modice convexum, subtiliter confertim punctulatum, piceum, nitidum, glabrum; oculi rotundati, convexi, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, rectum,

supra parum convexum, confertim subtiliter punctulatum, canalicula tenuissima, usque in fronte protensa, insculptum, piceum, nitidum, glabrum. Antennæ breves, minus tenues, dilutius ferrugineæ; clava ovata, acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica multo longior, basi apiceque truncatus, antè nonnihil angustior, longe intra apicem leviter constrictus, lateribus vix ampliatis, fere rectis; supra modice convexus, subtilissime crebre punctulatus, piceus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, concolor. Elytra antice truncata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris haud elevatis, obtuse angulatis; lateribus linearia, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, regulariter mediocriter punctato-striata, interstitiis parum convexis, lævibus; picea, nitida, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, piceum, nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, obscure ferruginei. — BEN.

26. R. NITIDULUS. Schh. — *H. op.* IV. p. 1074. 22. — *P.* Caffraria.

\* 27. R. ORYZÆ. Schh. — *H. op.* IV. p. 1075. 23. — *P.*..... Inter grana Oryzæ, in tabernis mercatorum Holmiæ.

\* 28. R. LAURI. Schh. — *H. op.* IV. p. 1076. 24. — *P.* Mexico.

\* 29. R. CORTICALIS. (Schh.) — *Elongatus, sub-depressus, rufo-ferrugineus, nitidus, glaber; antennis pedibusque dilutioribus, oculis nigris, rostro capite nonnihil longiori, valido, parum arcuato; thorace oblongo, antè angustato, sat crebre evidenter punctulato, dorso obsolete longitudinaliter impresso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, lævibus.*

*Patria*: Carolina Americæ borealis. DD. SCHÜPPEL et GERMAR. Mus. SCHH.

*Rhyncolo punctatulo* nonnihil brevior, sed duplo angustior, depressus. Statura et similitudo *Phloeophagi pallidi*, sed dimidio major, thorace evidenter punctulato, rostro brevior, validiore, dorso obsolete impresso, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum: oculi rotundati, convexi, nigri; rostrum capite parum longius, validum, teres, lineare, nonnihil arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, rufo-testaceum, nitidum, glabrum. Antennæ breves, minus tenues, dilutius rufo-ferrugineæ; clava ovata, acuminata, densius cinereo-pubescente. Thorax oblongus, latitudine

postica longior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus ultra medium obliquis, dein subrectis; basi obsolete bi-sinuatus, supra sub-depressus, subtiliter evidenter crebre punctulatus, dorso longitudinaliter tenue impressus, rufo-ferrugineus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, læve, concolor. Elytra antice truncata, thoracis basi parum latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus linearia, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra sub-plana, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, lævibus; rufo-ferruginea, nitida, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum. Pedes breviusculi, validi, dilutius rufo-ferruginei. — BIN.

30. R. TERETIROSTRIS (1). *Klug.* — *H. op.* IV. p. 1077. 25. — *P.* Madagascar.

GENUS 626. — CATOLETHRUS. *Nobis.*

*Hujus operis* IV. p. 1077. genus 399.

♂♀ 1. C. LONGULUS. *Chevr.* — *H. op.* IV. p. 1078. 1. — *P.* Mexico.

Diagnosi l. c. pone punctato-striatis, adde: « striis dorsalibus apicem versus profunde impressis. »

*Mas* : rostro validiori, minus arcuato.

*Femina* : rostro tenuiori, magis arcuato.

♂ 2. C. FALLAX. (*Schh.*) — *Lineari-elongatus*, angustus, piceus, nitidus, glaber; rostro validiori, lineari, arcuato, supra basi depresso, confertim punctulato; thorace supra fere plano, mediocriter sat crebre punctulato, antice constricto; elytris rufo-piceis, subtiliter punctato-striatis, striis dorsalibus apicem versus profunde impressis, interstitiis sub-planis, lævibus.

*Patria* : Caracas Columbiae. Dom. MORITZ. Mus. Dom. SOMMER. A Dom. GERMAR ad conferendum etiam missus.

*Catolethro longulo* non longior, sed nonnihil latior, magis nitidus; rostro brevior, validior, supra basi depresso, evidenter punctulato, interstitiis elytrorum sub-lævibus, ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, ferrugineum, vix punctulatum,

(1) Mihi invisus.

nitidum, glabrum; oculi laterales, ovati, parum prominuli, nigri; rostrum capite vix duplo longius, validum, lineare, modice arcuatum, supra sub-planum, basi leviter depressum, subtiliter confertim punctulatum, piceum, nitidum, glabrum. Antennæ in medio rostri insertæ, validiusculæ, rufo-piceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius cinereo-pubescente. Thorax latitudine baseos multo longior, basi apiceque truncatus, anterius multo angustior, intra apicem late constrictus et transversim impressus, lateribus pone stricturam sub-rectis; supra parum convexus, punctis sparsis, mediocribus sub-remote impressus, piceus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, breve, apice subtruncatum, læve, concolor. Elytra antice truncata, thoracis basi paulo latiora, humeris sub-elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, linearia, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra parum convexa, minus profunde striata, striis dorsalibus apicem versus profunde impressis, mediocriter punctatis, interstitiis sub-planis, lævibus; rufo-picea, nitida, glabra. Corpus subtus rufo-piceum, nitidum, pectore evidenter ventre obsolete crebre punctulatis; segmento ultimo abdominis impresso. Pedes breviusculi, validi, rufo-picei, nitidi; femoribus clavatis, muticis; tibiis rectis; tarsis brevibus, modice dilatatis, subtus silaceo-setulosis. — BHN.

3. *C. NASALIS.* (Schh.) — *Lineari-elongatus*, obscure ferrugineus, nitidus, glaber; rostro validiore, modice arcuato, extrorsum sensim ampliato, supra plano, subtiliter crebre punctulato, basi tenuiter canaliculato; thorace supra fere plano, mediocriter sat crebre punctulato, antice constricto, dorso basi leviter impresso, lateribus modice rotundato; elytris mediocriter punctato-striatis, striis dorsalibus apicem versus profundioribus, interstitiis sub-planis, obsolete rugulosis.

*Cossonus nitidulus.* DOM. CHEVROLAT in litt.

*Patria* : Brasilia. Mus. DOM. CHEVROLAT.

Magnitudo et fere statura *Catolethri fallacis*; rostro validiore, extrorsum sensim dilatato, basi tenuiter canaliculato, thorace basi late leviter impresso, lateribus magis rotundato, ab illo differt. Caput rotundatum, convexum, vix vel obsolete punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum; oculi sub-rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum thorace brevius, validum, modice arcuatum, extrorsum sensim ampliatum, supra planum, subtiliter confertim punctulatum, inter antennis tenuiter canaliculatum,

rufo-ferrugineum, nudum, glabrum. Antennæ breves, validæ, ferrugineæ, parce pilosæ; clava parva, oblongo-ovata, acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica longior, basi apiceque truncatus, antè multo angustior, intra apicem late contractus et transversim impressus; lateribus postè stricturam modice rotundato-ampliatus, supra fere planus, basi late parum profunde impressus, mediocriter sæpe crebre punctulatus, ferrugineus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, rotundatum, concolor, læve. Elytra antice truncata, thoracis basi notè nihil latiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, linearia, apice ipso conjunctim rotundata, thorace duplo longiora, supra in dorso sub-plana, parum profunde striata, striis apicem versus profundioribus, punctis mediocribus impressis, interstitiis sub-planis, obsolete rugulosis; obscure ferruginea, nitida, glabra. Corpus subtus obscure ferrugineum, nitidum, pectore evidenter crebre ventre obsolete punctulatum, segmento ultimo abdominis medio carinato, utrinque impresso. Pedes breviusculi, validi, punctati, ferruginei, nitidi, glabri; femoribus clavatis, muticis, posticis subtus flavo-setulosis; tibiis rectis, omnibus intus basi fasciculo e pube longa, silacea, instructis. — BHN.

♀ 4. *C. rufus*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1079. 2. — *P. Brasilia*.

GENUS 627. — PROECES. *Nobis*.

*Hujus operis* IV. p. 1080. genus 400.

1. *P. nigrifrons*. Chev. — *H. op.* IV. p. 1081. 1. — *P. Madag.*

\* 2. *P. macer*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1082. — *P. Madagascar*.

GENUS 628. — EUMYCTERUS. *Nobis*.

*Hujus operis* IV. p. 1083. genus 401.

1. *E. albosquamulatus*. Chev. — *H. op.* IV. p. 1084. 1. — *P. Anatolia*.

GENUS 629. — LYMANTES. *Nobis*.

*Hujus operis* IV. p. 1085. genus 402.

\* 1. *L. scrobicollis*. Schh. — *H. op.* IV. p. 1086. 1. — *P. Amer. Borealis*.

GENUS 630. — MICROXYLOBIUS. *Chev.*

*Character generis.* — Antennæ crassæ, 10-articulatæ, ultra medium rostri insertæ: articulo 1<sup>o</sup> apice clavato, oculos attingente; funiculus 5-articulatus: 2<sup>o</sup> conico, 3<sup>o</sup> sub-triangulari, 4-6 moniliformibus; clava ovata, 4-articulata.

Rostrum capite longius, cylindricum, sub-arcuatum; scrobbis obliqua, recta, infra oculos desinens.

Caput sub-convexum, infra gutturosum.

Oculi laterales, sub-depressi, rotundati.

Thorax latitudine longior, sub-cylindricus, in medio perparum extensus, basi et apice truncatus circuatusque.

Scutellum nullum.

Elytra connata, sub-cylindrica, latescentia versus apicem, singulatim rotundata extremitate.

Pedes toti approximati; femoribus crassis, inermibus; tibiis sub-arcuatis, apice unco recurvo armatis; articulo 1<sup>o</sup> tarsorum conico, 2<sup>o</sup> brevi, 3<sup>o</sup> bi-lobo, ultimo longo, bi-unguiculate. — CHEVROLAT.

1. M. WESTWOODII. (*Chevrolat.*) — *Nigro-æneus; glaber, capite rostroque punctulatis; thorace constricto infra apice; elytris sub-rugatis; corpore subtilis punctatissimo.* — Long. corp. circiter lin. 1; lat. 1/3 lin. — CHEVROLAT.

*Transact. of the Entom. Soc. of Lon.* I.-II. p. 98. T. 10 fig. 6.

*Patria:* Insula St.-Helena.

## DIVISIO IV. — DRYOPHTHORIDES.

*Antennæ breves; funiculus 4-articulatus. Rostrum sub-deflexum. Pygidium ab elytris tectum.*

GENUS 631. — DRYOPHTHORUS. *Schuppel.*

*Curc. Disp. Meth.* p. 332. gen. 194. — *H. op.* IV. p. 1088. gen. 404.

\* 1. D. LYMEXYLON. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 1089. 1. — *P.* Germania, Gallia, Suecia, Caucasus.

\* 2. D. CORTICALIS. *Say.* — *H. op.* IV. p. 1089. 2. — *P.* Amer. bor.

\* 3. D. BITUBERCULATUS. *Fabr.* — *H. op.* IV. p. 1090. 3. — *P.* Nova Zelandia.

♂♀ 4. D. EXCAVATUS. *Dejean.* — *H. op.* IV. p. 1092. 4. — *P.* Madagascar.

# ADDENDA.

## CURCULIONIDES AB ENTOMOLOGIS VARIIS DESCRIPTI.

*Incert. Divisionis et generis; species mihi incognitæ, et ex Auctorum confusis descriptionibus non determinandæ.*

*Ex opere Domini LINNÆI.*

### GENUS CURCULIO.

1. C. BADENSIS. — *Longirostris, niger, pedibus piceis.* — LINNÆI *Syst. Nat.* I. II. p. 607. 8. — ed. GMEL. I. IV. p. 1744. 8. — P. Germaniâ.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 495. 102.  
VILL. *Ent. Linn.* I. p. 175. 5.

*Ex. Dom. FABRICII. Systema Eleutheratorum.*

### GENUS RHYNCHÆNUS.

STIRPS 1. — *Femora mutica.* (Spec. 1-15.)

2. R. STRIATUS. — *Niger, elytris holosericeo-striatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 439. 1. — P. Insula Terre-Neuve Americæ.  
OLIV. *Ent.* V. 83. p. 114. 59. T. 11. f. 140.  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 398. 16.  
HERBST. *Col.* VI. p. 440. 433. T. 94. f. 4.  
*Curculio striatulus.* FABR. *Mant.* I. p. 97. 12. — *Spec. Ins.* I. p. 163. — *Syst. Ent.* p. 129. 9.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 476. 20.  
LINNÆI *Syst. Nat.* GMEL. I. IV. p. 1746. 115.
3. R. MENDICUS. — *Ovatus, cinerascens, elytris striatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 440. 5. — P. Madagascar.  
OLIV. *Ent.* V. 83. p. 120. 68. T. 9. f. 108.  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 399. 19.  
HERBST. *Col.* VI. p. 178. 140. T. 72. f. 7.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 480. 40.

4. *R. PUNCTULATUS*. — *Flavo-fusco-que varius, abdomine cinereo, nigro-punctato*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 441. 12. — *P. Amer.*  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 400. 26. — *Mant.* I. p. 98. 18.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 477. 26.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 125. 84.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1747. 120.  
*Lixus id.?* ILLIG. *Mag.* VI. p. 328.
5. *R. BIGUTTATUS*. — *Niger, elytris puncto elevato, abdomine pedibusque posticis flavis*. — FABR. *Syst. Eleuth.* II. p. 442. 19. — *P. America.*  
*Curcul. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. 402. 32. — *Mant.* I. p. 99. 22. — *Spec. Ins.* I. p. 164. 17. — *Syst. Ent.* p. 130. 13.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 436. 427.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 478. 30.  
 LINN. *Syst. Nat.* GMEL. I. IV. p. 1747. 124.
6. *R. BILINEATUS* (1). — *Fuscus, elytris lineis duabus punctorum alborum*. — FABR. *Syst. Eleuth.* II. p. 442. 20. — *P. Germania.*  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 402. 33. — *Mant.* I. p. 99. 23. — *Spec. Ins.* I. p. 164. 18.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 478. 31.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 442. 436.  
 LATR. *Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins.* XI. p. 127. 4.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1747. 125.  
 VILL. *Ent.* I. p. 186. 37. — IV. p. 266. 37.  
 PANZ. *Ent. Germ.* p. 300. 7.
7. *R. TESSELLATUS*. — *Cinereus, elytris apice striis albis nigro-punctatis*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 443. 23. — *P. Germania.*  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 403. 36. — *Mant.* I. p. 99. 24. — *Spec. Ins.* I. p. 165. 19.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 478. 32.  
 LATR. *Hist. Nat.* XI. p. 128. 7.  
 VILL. *Ent.* I. p. 186. 38. — IV. p. 266. 38.

(1) An *Phytonomus*?



PANZ. *Ent. Germ.* p. 300. 8.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV p. 1747. 126.

8. R. FASCICULATUS. — *Niger, obscurus, thorace fasciculis duobus, elytris tribus elevatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 443. 25. — P. Amboina.

OLIV. *Ent.* V. 83. p. 192. 175. T. 22. f. 294.

9. R. GRANULATUS. — *Niger, obscurus, elytris granulatis, postice hispidis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 443. 26. — P. Amboina.

10. R. TRAGIÆ (1). — *Æneus, rostro pedibusque sub-concoloribus.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 446. 38. — P. Brasilia.

OLIV. *Ent.* V. 83. p. 152. 117. — T. 10. f. 112. a. b.

*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 404. 45. — *Mant.* I. p. 100.

35. — *Spec. Ins.* I. p. 166. 27. — *Syst. Ent.* p. 131. 21.

OLIV. *Enc. Meth.* V. p. 481. 46.

HERBST. *Col.* VI. p. 371. 347. T. 89. f. 6. a. b.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1748. 131.

11. R. CURVIROSTRIS (2). — *Ater, nitidus, rostro arcuato.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 446. 40. — P. Nova Hollandia.

OLIV. *Ent.* V. 83. p. 152. 116. T. 10. f. 115. a. b.

BOISD. *Voy. de l'Astrol.* p. 452. 1.

*Curc. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 405. 47. — *Mant.* I. p. 100.

37. — *Spec. Ins.* I. p. 166. 29.

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 481. 48.

HERBST. *Col.* VI. p. 372. 348. T. 89. f. 7. a. b.

LINN. *Syst. Nat.* GMEL. I. IV. p. 1748. 133.

12. R. UMBELLÆ. — *Nigricans, elytris striatis, scutello albo.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 450. 60. — P. Carolina.

13. R. UNIFASCIATUS. — *Supra fuscus, elytris fasciis media cinerea.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 453. 75. — P. Saxonia.

ILLIGER, *Magaz.* IV. p. 142. 75.

*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 410. 72. — *Mant.* I. p. 101. 59.

(1) An *Baridius l. Centrinus*?

(2) An *Baridius l. Centrinus*?

- LATR. *Hist. Nat.* XI. p. 136. 37.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 485. 67.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 450. 452.  
 PANZ. *Ent. Germ.* p. 304. 32.  
 VILLER. *Ent.* IV. p. 286.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1749. 140.
14. R. EXCLAMATIONIS. — *Ater, elytris puncto lineolaque apicis albis.*  
 — FABR. *Syst. El.* II. p. 456. 89. — *P. Nova Hollandia.*  
 OLIV. *Ent.* V. 83. p. 155. 121. T. 13. f. 165. a. b.  
 BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 452. 2.  
*Curcul. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 412. 83. — *Mant.* I. p. 102.  
 70. — *Spec. Ins.* I. p. 170. 53. — *Syst. Ent.* p. 133. 37.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 486. 74.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 384. 362. T. 90. f. 8. a. b.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1749. 137.
15. R. PUDICUS. — *Ovatus, cinereo-villosus, thorace elytrorumque fascia ferrugineis.* — FABR. *Suppl. Ent. Syst.* p. 165. 19. 20. — *P. Ile de France.*  
 Cfr. ILLIG. *Mag.* V. p. 242. 126.
- STIRPS 2. — *Femora dentata.* (Spec. 16-28.)
16. R. BIDENS. — *Niger, elytris unispinosis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 457. 96. — *P. Nova Zelandia.*  
 OLIV. *Ent.* V. 83. p. 201. 186. T. 10. f. 113.  
 BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* p. 453. 3.  
*Curcul. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 420. 115. — *Mant.* I. p. 104. 90. — *Spec. Ins.* I. p. 173. 72. — *Syst. Ent.* p. 136. 51.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 455. 460. T. 94. f. 8.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 499. 127.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1764. 235.
17. R. CORONATUS (1). — *Niger, thorace rotundato, antice spinis plurimis arcuatis.* — OLIV. — *P. Cayenna.*  
 FABR. *Syst. El.* II. p. 459. 105.  
 OLIV. *Ent.* V. 83. p. 163. 132. T. 6. f. 70.

---

(1) An ad *Solenopus* genus emendandus?

- Curcul. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 422. 123.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 306. 279. T. 84. f. 3.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 500. 132.
18. R. SPINIPES. — *Niger, thorace lineis duabus, elytris strigis quatuor albis, tibiis anticis spinosis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 459. 108. — *P. Americæ meridionalis Insulæ.*  
*Curcul. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 423. 126. — *Mant.* I. p. 104. 94. — *Spec. Ins.* I. p. 174. 76.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 501. 137.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 459. 464.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1765. 236.
19. R. GUTTATUS (1). — *Femoribus sub-dentatis, niger, thorace lævi, maculis duabus posticis flavescens, elytris tuberculatis, flavo-punctatis.* — OLIV. — *P. Cayenna.*  
 FABR. *Syst. Eleuth.* II. p. 462. 119.  
 OLIV. *Ent.* V. 83. p. 164. 134. T. 5. f. 46.  
*Curcul. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 424. 130.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 181. 144. T. 89. f. 14.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 502. 143.
20. R. TRIFASCIATUS (2). — *Thorace linea laterali, elytris albo-punctatis maculisque duabus brunneis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 463. 124. — *P. Cayenna.*  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 425. 135. — *Mant.* I. p. 105. 98.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 503. 148.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 462. 468.  
 LINN. *Syst. Nat.* I. IV. p. 1765. 240.
21. R. PUPILLATOR (3). — *Tuberculatus, fuscus, elytris macula marginali cinerea, nigro-punctata.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 466. 137. — *P. Cayenna.*  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 428. 147.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 378. 356. T. 90. f. 2.

(1) (2) An *Cratosomus*?(3) An *Helipus*?

- Rhynchænus pupillatus*. OLIV. *Ent.* V. 83. p. 184. 163. T. 15. f. 183.
- Curculio id.* OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 508. 170.
22. R. MIXTUS. — *Fuscus, cinereo-variis, elytris striatis; lituris duabus lateralibus ferrugineis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 470. 157. — P. Amboina.
23. R. ALIENATUS (1). — *Cinereus, rostro atro, elytris sulcato-punctatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 471. 161. — P. Sumatra.
24. R. STUPIDUS. — *Niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris sub-spinosis.* — FABR. — P. Nova Hollandia.
- OLIV. *Ent.* V. 83. p. 195. 178. T. 12. f. 151.
- Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 432. 160. — *Mant.* I. p. 107. 115. — *Spec. Ins.* I. p. 177. 91.
- HERBST. *Col.* VI. p. 387. 366. T. 90. f. 12.
- OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 510. 178.
- LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1763. 230.
- Rhynchænus strepidus.* FABR. *Syst. El.* II. p. 473. 172.
- BOISDUF. *Voy. de l'Astrol.* p. 454. 6.
25. R. SQUALIDUS. — *Villoso-griseus, rostro testaceo.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 475. 179. — P. Surinam.
- OLIV. *Ent.* V. 83. p. 206. 195. T. 15. f. 184. a. b.
- Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 433. 165. — *Mant.* I. p. 107. 118. — *Spec. Ins.* I. p. 177. 93.
- HERBST. *Col.* VI. p. 377. 355. T. 90. f. 1. a. b.
- OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 511. 182.
- LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1764. 233.
26. R. GRAVIS. — *Niger, elytris ferrugineo-variis, femoribus canaliculatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 481. 203. — P. Cap. Bonæ Spei.
- OLIV. *Ent.* V. 83. p. 206. 194. T. 14. f. 177. a. b.
- Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 435. 172. — *Mant.* I. p. 107. 122. — *Spec. Ins.* I. p. 178. 96. — *Syst. Ent.* p. 140. 69.
- HERBST. *Col.* VI. p. 380. 358. T. 90. f. 4. a. b.
- OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 513. 187.
- LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1768. 255.

(1) An *Cryptorhynchus*?

27. R. HÆMORRHOIDALIS. — *Thorace fusco; lateribus cinerascentibus, elytrorum sutura apice ferruginea.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 484. 215. — *P. Nova Hollandia.*

BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 455. 7.

- Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 437. 181. — *Mant.* I. p. 108. 126. — *Spec. Ins.* I. p. 178. 99. — *Syst. Ent.* p. 140. 71.

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 514. 191.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1769. 259.

*Curculio hæmorrhœus.* HERBST. *Col.* VI. p. 470. 481.

28. R. BICORNIS. — *Griseus, capite bi-dentata.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 489. 241. — *P. Nova Zelandia.*

- Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 443. 203. — *Mant.* I. p. 109. 140. — *Spec. Ins.* I. p. 180. 111.

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 517. 208.

HERBST. *Col.* VI. p. 474. 486.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1767. 252.

#### GENUS LIXUS.

29. L. QUADRIPUSTULATUS (1). — *Niger, elytris maculis duabus ferrugineis.* — FABR. *Syst. Eleuth.* I. p. 501. 12. — *P. Caput Bonæ Spei.*

- Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 416. 100. — *Mant.* I. p. 109. 149. — *Spec. Ins.* I. p. 183. 121. — *Syst. Ent.* p. 144. 88.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1769. 265.

VILLERS. *Ent.* IV. p. 290.

30. L. LINEOLA (2). — *Cylindricus, niger, elytris vitta testacea.* — FABR. — *Cylindricus, piceus, elytris ferrugineis vitta nigra.* — OLIV. — *P. Nova Hollandia.*

FABR. *Syst. El.* II. p. 503. 28.

BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* p. 405. 3.

- Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 419. 109. — *Mant.* I. p. 104. 86. — *Spec. Ins.* I. p. 173. 68. — *Syst. Ent.* p. 136. 48.

HERBST. *Col.* VI. p. 66. 30. T. 63. f. 6. a. b.

(1) An divisio *Brenthudes*? Cfr. FABR. *Syst. Ent.* I. c.

(2) An *Baridius*?

- OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 493. 95.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1752. 153.  
 Rhina id. OLIV. *Ent.* V. 83. p. 234. 232. T. 15. f. 185. a. b.
31. L. CLAVIPES. — *Elongatus, ater, thorace linea dorsali alba, pedibus elongatis, piceis; femoribus clavatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 503. 29. — P. Nova Cambria.  
 BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 405. 2.
32. L. CRASSIPES. — *Femoribus anticis sub-clavatis, corpore atro.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 504. 30. — P. Strasburgi.  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 419. 10. — *Mant.* I. p. 104. 88. — *Spec. Ins.* I. p. 173. 30. — *Syst. Ent.* p. 136. 50.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 494. 97.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 54. 16.  
 PANZ. *Ent. Germ.* p. 310. 65.  
 VILLERS. *Ent.* I. p. 189. 59. et IV. p. 270. 59.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1752. 155.
33. L. BRUNNEUS. — *Femoribus dentatis, brunneus; rostro fusco, elytris testaceis, punctato-striatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 505. 36. — P. Caput Bonæ Spei.  
 OLIV. *Ent.* V. 83. p. 179. 157. T. 10. f. 120.  
*Curcul. id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 427. 143. — *Mant.* I. p. 106. 106. — *Spec. Ins.* I. p. 175. 83.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 374. 351. T. 89. f. 10.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 506. 162.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1766. 246.
34. L. ELONGATUS (1). — *Femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis anticis bi-dentatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 507. 43. — P. Jamaica.  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 445. 215. — *Mant.* I. p. 110. 150. — *Spec. Ins.* I. p. 183. 122. — *Syst. Ent.* p. 144. 89.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 520. 217.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 477. 491.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1770. 266.

---

(1) An ad *Brenthus* genus emendandus ?

## GENUS CURCULIO.

STIRPS I. — *Femora mutica.* (Spec. 35-51.)

35. C. MORATUS. — *Cylindricus, niger, elytris puncto baseos apicisque viridi.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 511. 23. — *Suppl. Ent. Syst.* p. 171. 244. 5. — P. Ile de France.
36. C. SERVUS (1). — *Capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris fuscis; punctis maculisque albis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 511. 28. — *Ent. Syst.* I. II. p. 453. 249. — *Mant.* I. p. 112. 172. — P. Cayenna.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 528. 253.  
HERBST. *Col.* VI. p. 483. 501.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1792. 421.
37. C. MODESTUS. — *Cinereus, thorace elytrisque fusco-maculatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 512. 30. — *Ent. Syst.* I. II. p. 453. 250. — *Mant.* I. p. 112. 173. — *Spec. Ins.* I. p. 186. 138. — P. Nova Zelandia.  
OLIV. *Ent.* V. p. 365. 427. T. 14. f. 178. a. b. — *Enc. Méth.* V. p. 528. 254.  
HERBST. *Col.* VI. p. 381. 359. T. 90. f. 5. a. b.  
BOISDUF. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 456. 1.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. IV. p. 1792. 422.
38. C. FLAVESCENS (2). — *Obscurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 512. 31. — *Ent. Syst.* I. II. p. 454. 251. — *Mant.* I. p. 112. 174. — P. America meridionalis.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 528. 255.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1792. 423.
39. C. PORCULUS (3). — *Nigricans, cinereo-variis, capite retuso rostroque carinato.* FABR. *Syst. El.* II. p. 515. 52. — *Ent. Syst.* I. II. p. 458. 269. — P. Hungaria.  
HERBST. *Col.* VI. p. 484. 503.

(1) *Naupactus* Secundum Mus. Reg. Daniæ.(2) An *Lachnopus*?(3) An *Cleonus*?

40. *C. DISPAR.* — *Oblongus, fuscus, villis cinereis maculatus.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 517. 60. — *Ent. Syst.* I. II. p. 460. 276. — *P. India orientalis.*

HERBST. *Col.* VI. p. 490. 512.

41. *C. INTERRUPTUS.* — *Obscurus, coleopterorum fascia interrupte alba.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 519. 70. — *Ent. Syst.* I. II. p. 462. 285. — *Mant.* I. p. 115. 195. — *Spec. Ins.* I. p. 188. 148. — *P. Nova Hollandia.*

OLIV. *Ent.* V. 83. p. 365. 428. T. 10. f. 122. — *Enc. Méth.* V. p. 535. 284.

HERBST. *Col.* VI. p. 373. 350. T. 89. f. 9.

BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 457. 3.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1785. 371.

42. *C. DIADEMA.* — *Flavescente-villosus, rostro apice retuso, atro* — FABR. *Syst. El.* II. p. 523. 96. — *Ent. Syst.* I. II. p. 465. 299. — *Mant.* I. p. 116. 204. — *P. Cayenna.*

HERBST. *Col.* VI. p. 494. 521.

OLIV. *Ent. Méth.* V. p. 537. 294.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1780. 338.

43. *C. LANATUS.* — *Pilosus, cinereis, elytris striatis, fasciis duabus abbreviatis albis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 526. 110. — *P. Nova Cambria.*

BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 458. 6.

44. *C. STRIATUS.* — *Fuscus, elytris striis cinereis nigro-punctatis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 528. 122. — *Ent. Syst.* I. II. p. 470. 318. — *Mant.* I. p. 117. 214. — *P. Barbaria.*

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 539. 305.

HERBST. *Col.* VI. p. 501. 533.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1781. 346.

45. *C. VELOX.* — *Pilosus, niger, elytris margine puncto baseos, fascia interrupta punctoque apicis albis.* — FABR. *Syst. El.* II. p. 528. 124. — *Ent. Syst.* I. II. p. 470. 720. — *Mant.* I. p. 117. 216. — *P. Cayenna.*

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 540. 309.

HERBST. *Col.* VI. p. 501. 534.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1781. 348.



46. *C. ADSPERSUS* (1). — *Ater, elytris postice albo-maculatis*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 529. 31. — *Ent. Syst.* I. II. p. 472. 328. — *Mant.* I. p. 117. 220. — *Spec. Ins.* I. p. 190. 165. — *Syst. Ent.* p. 149. 118. — *P. Nova Hollandia*.  
 OLIV. *Ent.* V. 83. p. 377. 449. T. 13. p. 156. a. b. — *Enc. Méth.* V. p. 541. 314.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 385. 364. T. 90. f. 10. a. b.  
 BOISDUV. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 458. 7.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1786. 377.
47. *C. STICTICUS* (2). — *Thorace elytrisque variolosis, nigris, albopunctatis*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 531. 142. — *Ent. Syst.* I. II. p. 473. 336. — *Mant.* I. p. 118. 225. — *Spec. Ins.* I. p. 191. 170. — *Gen. Ins. Mant.* p. 227. 122-123. — *P. Caput Bonæ Spei*.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 541. 319.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 506. 542.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1786. 382.
48. *C. MARGINELLUS* (3). — *Niger, thorace elytrisque marginibus albis, elytrâ linea longitudinali interrupta alba*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 534. 160. — *Ent. Syst.* I. II. p. 478. 352. — *Mant.* I. p. 119. 240. — *Spec. Ins.* I. p. 193. 182.  
 OLIV. *Ent.* V. 83. p. 316. 352. T. 11. f. 134. — *Enc. Méth.* V. p. 542. 321.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 117. 79. T. 67. f. 13.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1784. 363.

*Eadem species, teste DOM. OLIVIER.*

- Curculio succinctus*. FABR. *Syst. El.* II. p. 351. 145. — *Ent. Syst.* I. II. p. 474. 338. — *Mant.* I. p. 118. 227. — *Spec. Ins.* I. p. 191. 172. — *Gen. Ins. Mant.* p. 227. 123. 124.  
 HERBST. *Col.* VI. p. 506. 543.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1786. 387.  
*Curc. albator*. PALLAS. *Icon.* p. 36. 21. Tab. B. fig. 21.

(1) An ad *Isomerinthus* genus emendandus?

(2) *Lixus*, teste DOM. ILLIG. — Cfr. ILLIG. *Mag.* VI. p. 328. lin. 2.

(3) An *Hypsonotus albolineatus*. SCHH. Huj. op. VI. II p. 146. 5?

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1798. 468.

*Patria* : Caput Bonæ Spei. (Anne potius Brasilia?)

49. C. VITULUS (1). — *Niger, fronte bi-dentata, elytris uni-spinosis.*—

FABR. *Syst. El.* II. p. 534. 165. — *Ent. Syst.* I. II. p. 479. 356.

— *Mant.* I. p. 119. 243. — *Spec. Ins.* I. p. 193. 185. — *Syst.*

*Ent.* p. 152. 131. — *P.* Terra del Fuego.

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 546. 337.

HERBST. *Col.* VI. p. 508. 546.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1789. 398.

*Lophotus excavatus?* DEJ. *Cat.* ed. 2. p. 261. ed. 3. p. 284.

50. C. TUBERCULATUS. — *Ater, thorace punctato, elytris striatis tuberculatisque.* —

FABR. *Syst. El.* II. p. 535. 171. — *Ent. Syst.*

II. p. 480. 361. — *P.* India orientalis.

HERBST. *Col.* VI. p. 510. 549.

51. C. VERRUCA. — *Niger, obscurus, thorace varioloso, elytris crenato-striatis.* —

FABR. *Suppl. Ent. Syst.* p. 172. 353-354. —

*P.* Europa.

STIRPS 2. — *Femora dentata.* (Spec. 52-57.)

52. C. PINGUIS. — *Gibbus, nigricans, thorace lineis, elytris strigis*

*duabus lineaque apicis flavescens.* — FABR. *Syst. El.* II. p.

537. 185. — *Ent. Syst.* I. II. p. 483. 374. — *Mant.* I. p. 121.

270. — *P.* Cayenna.

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 555. 382.

HERBST. *Col.* VI. p. 515. 556.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1774. 299.

53. C. TRIDENS. — *Cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis.* —

FABR. *Syst. El.* II. p. 537. 186. — *Ent. Syst.* II. p.

483. 375. — *Mant.* I. p. 122. 271. — *P.* Nova Zelandia.

OLIV. *Ent.* V. 83. p. 403. 490. T. 13. f. 154. — *Enc. Méth.*

V. p. 555. 383.

HERBST. *Col.* VI. p. 320. 293. T. 85. f. 5.

BOISDUF. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 458. 8.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1774. 300.

54. *C. DENTICORNIS*. — *Niger, elytris cinereo-maculatis, antennarum primo articulo apice prominulo*. — FABR. *Suppl. Ent. Syst.* p. 173. 381-382. — *Syst. El.* II. p. 539. 194. — *P. Caput Bonæ Spei*.
55. *C. PALLIDUS* (1). — *Squamoso-pallidus, antennis tibisque rufis*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 542. 214. — *Ent. Syst.* I. II. p. 488. 394. — *P. Germania*.  
HERBST. *Col.* VI. p. 262. 231.  
PANZER. *Ent. Germ.* p. 334. 202.  
*Brachyrhinus id.* LATR. *Syst. Nat.* XI. p. 183. 106.
56. *C. ARBORETI*. — *Viridi-cinereus, elytris punctato-striatis*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 543. 215. — *Ent. Syst.* I. II. p. 488. 395. — *Mant.* I. p. 122. 283. — *P. Cayenna*.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 559. 397.  
HERBST. *Col.* VI. p. 517. 561.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1776. 309.
57. *C. ATTELABOIDES*. — *Rostro elytrisque uni-tuberculatis*. — FABR. *Syst. El.* II. p. 545. 227. — *Ent. Syst.* I. II. p. 490. 405. — *Mant.* I. p. 123. 288. — *Spec. Ins.* I. p. 199. 222. — *P. Brasilia*.  
OLIV. *Ent.* V. 83. p. 423. 522. T. 14. f. 174. a. b. — *Enc. Méth.* V. p. 561. 407.  
HERBST. *Col.* VI. p. 324. 298. T. 85. f. 10. a. b.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1775. 307.

Ex Dom. OLIVIERI *Entomologia*.

GENUS RHYNCHÆNUS.

STIRPS I. — *Femora mutica*.

58. *R. CRUCIATUS*. (*Fabric.*) — *Sub-spinosus, niger, thorace lineis, elytris postice cruce albis*. — FABR. — *P. Nova Hollandia*.  
OLIV. *Ent.* V. 83. p. 121. 70. T. 11. f. 131.  
*Curculio id.* FABR. *Ent. Syst.* I. II. p. 397. 13. — *Mant.* I. p. 91. 11. — *Spec. Ins.* I. p. 163. 11. — *Syst. Ent.* p. 129. 8.

(1) An *Phyllobius vespertinus* varietas?

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 476. 19.

HERBST. *Col.* VI. p. 439. 432. T. 94. f. 3.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1746. 114.

*Calandra cruciata.* FABR. *Syst. El.* II. p. 434. 23.

BOISDUF. *Voy. de l'Astrol.* II. p. 451. 1.

59. R. REPANDUS. — *Brunneus, thoracis lateribus, vittaque elytrorum sinuata albis.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 139. 96. T. 33. f. 509. — P. Paris.

60. R. GRACILIS. — *Elytris punctato-striatis, nigris, puncto suturali liturisque lateralibus albis.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 143. 102. T. 27. f. 397. — P. Java.

STIRPS 2. — *Femora dentata.*

61. R. BIGIBBER (1). — *Pallide rufus, elytris striatis, dorso spina erecta.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 201. 187. T. 17. f. 208. a. b. — P. Surinam.

GENUS LIXUS.

62. L. PALUMBUS. — *Subtus albus, supra griseus, rostro brevi, cincto.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 268. 281. T. 20. f. 257. — P. Arabia.

GENUS CURCULIO.

STIRPS 1. — *Femora mutica.* (Spec. 63-77.)

63. C. DUCALIS. — *Viridi-aureus, thorace elytrisque nigris; punctis maculisque impressis viridi-aureis.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 298. 326. T. 18. f. 226. — P. Insula St.-Domingo.

64. C. AFRICANUS. — *Rostro sulcato, fuscus, scutello albo, elytris maculis quatuor cinereis.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 324. 364. T. 20. f. 266. — P. Senegallia.

65. C. FULGENS. — *Viridi-argenteo-nitens, rostro carinato, thoracis dorso impresso.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 329. 372. T. 25. f. 362. — P. Porto-Rico.

66. C. SILENUS. — *Rostro carinato, virescens, thoracis elytrorumque*

(1) An ad *Prionomerus* genus emendandus?

- acuminatorum lateribus pallidis.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 338. 386. T. 24. f. 339. — P. Bengalìa.
67. C. PSITTACUS. — *Viridi-cœrulescens, capite scutelloque albis.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 339. 387. T. 24. f. 341. — P. Porto-Rico.
68. C. ROBINIÆ (1). — *Squamosus, fusco-rufescens, thorace rotundato, macula dorsali nigra.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 340. 389. T. 21. f. 290. — P. Hungaria.
69. C. PERSPICAX. — *Griseus, elytris striatis, punctis plurimis oblongis, nigris.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 342. 393. T. 17. f. 214. — P. . . . .
- Curcul. œlothorax.* HERBST. Col. VII. p. 25. 583. T. 97. f. 5.
70. C. SABULOSUS (2). — *Ater, sutura striisque tribus elevatis lævibus, exterioribus brevioribus.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 347. 400. T. 25. f. 363. — P. Paris.
71. C. CHLOROTICUS (3). — *Albo-squamosus, rostro sulcato, apice nigro.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 348. 403. T. 25. f. 364. — P. Antillæ.
72. C. GLOBULARIS. — *Ater, elytris ovatis, punctato-striatis, maculis plurimis albis, ultima circulari communi.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 376. 448. T. 19. f. 241. — P. Java.
73. C. PINIPERDA. — *Fusco-flavescens, elytris pallidioribus, striatis, rostro brevissimo, sulcato.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 384. 462. T. 35. f. 552. — P. Europa borealis.
- Curculio latirostris.* HERBST. Col. VI. p. 251, 216. T. 78. f. 5.
74. C. ACANTHOIDES. — *Scaber, rufo-cinerascens, elytris ovatis, fascia obscuriore.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 385. 463. T. 25. f. 368. — P. Benin Africæ.
75. C. CRASSICORNIS. — *Cinereus, antennis pilosis, crassis, elytris ovato-inflatis.* — OLIV. Ent. V. 83. p. 386. 464. T. 25. f. 369. — P. Benin Africæ.

---

(1) An *Thylacites*? — Vix *Thylacites fritillum.* PANZ. et nob. *Curc. Robiniæ.* HERBST.

(2) An *Barynotus*?

(3) An *Cyphus* l. *Eustales*?

76. *C. STRUMOSUS*. — *Niger, elytris variolosis, postice tuberculis duobus magnis, rotundatis, scutello albo.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 394. 476. T. 4. f. 36. — *P. Madagascar.*
77. *C. LEPROSUS* (1). — *Ater, cylindricus, variolosus, elytris tuberculis duobus obtusis.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 395. 477. T. 25. f. 360. — *P. Madagascar.*

STIRPS 2. — *Femora dentata.*

78. *C. DIFFORMIS*. — *Globosus, niger, elytris piceis, punctis magnis, seriatis impressis, pedibus anticis longioribus.* — OLIV. *Ent.* V. 83. p. 422. 521. T. 35. f. 543. — *P. St.-Domingo.*

*Ex operibus Dom. HERBSTI.*

## GENUS CURCULIO.

79. *C. FRIGIDUS*. — *Longirostris, niger, griseo-ferrugineo-que varius, elytris medio tri-carinatis, lateribus foveolatis.* — HERBST. *Col.* VI. p. 91. 51. T. 65. f. 7. — *P. Surinam.*
80. *C. GRANULATUS*. — *Longirostris, cupreus, thorace punctato, elytris striatis, interstitiis punctis elevatis.* — HERBST. *Col.* VI. p. 143. 104. T. 69. f. 9. — *P. Surinam.*
81. *C. RHEI* (2). — *Longirostris, niger, antennis ferrugineis, thorace subtilissime punctato, elytris punctato-striatis, pilis griseis maculatis.* — HERBST. *Col.* VI. p. 154. 112. T. 70. f. 7. — *Arch.* IV. p. 78. 50.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1761. 279. — *P. Germania.*
82. *C. IBERIS* (3). — *Longirostris, niger, glauco-squamosus, thorace vittis duabus obscurioribus approximatis, femoribus muticis.* — HERBST. *Col.* VI. p. 168. 127. T. 71. f. 9. — *P. Germania.*
83. *C. OLIVIENSIS*. — *Brevirostris, viridis, thorace vittis duabus nigris, elytris lineis nigris.* — HERBST. *Col.* VI. p. 229. 193. T. 76. f. 6. 7. — *P. . . . .*

(1) Genus *Psuchocephalus*. LATR.(2) *Phytonomus Rumicis*, var. forte.(3) An *Phytonomus*?

84. *C. PEDICULARIUS*. — *Longirostris, brunneus, capite atro*. — HERBST. *Col. VI.* p. 236. 200. *T. 77.* f. 4. — *P. Germania.*
85. *C. CALIDUS*. — *Longirostris, niger, thorace globoso, punctato, punctis squamosis, elytris niveo-irroratis, foveolis striatis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 285. 256. *T. 82.* f. 2. — *P. Surinam.*
86. *C. HORNUS*. — *Brevirostris, griseo-albo-que varius, elytris hirsutis, femoribus muticis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 296. 267. *T. 83.* f. 2. — *P. Europa.*
87. *C. FORMICARIUS*. — *Brevirostris, niger, thorace globoso-ovato, elytris globoso-ovatis, antennis pedibusque piceis, femoribus dentatis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 297. 268. *T. 83.* f. 3. — *P. ....*
88. *C. MACELLARIUS* (1). — *Brevirostris, fusco-griseus, elytris griseo-nigro-que nebulosis, femoribus muticis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 297. 269. *T. 83.* f. 4. — *P. Germania.*
89. *C. PEDESTRI*. — *Brevirostris, niger, argenteo-squamosus, antennis pedibusque testaceis, femoribus dentatis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 298. 270. *T. 83.* f. 5. — *P. Germania.*
90. *C. VANELLUS* (2). — *Longirostris, niger, antennis pedibusque ferrugineis, femoribus muticis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 302. 275. *T. 83.* f. 10. — *Arch. IV.* p. 79. 55. *T. 24.* f. 23.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1761. 283.  
*Patria* : *Germania.*
91. *C. UNDULATUS* (3). — *Longirostris, scutellatus, elytris rufis, cinereo-undulatis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 413. 395. *T. 92.* f. 8. — *P. Germania.*
92. *C. GRUS*. — *Longirostris, globosus, thorace lateribus canescentibus, elytris sulcatis, tibiis plantisque ferrugineis*. — HERBST. *Col. VI.* p. 414. 396. *T. 92.* f. 9. — *Arch. IV.* p. 73. 28. — *P. Germania.*

(1) An *Sitones crinitus*?(2) An *Orchestes*?(3) *Balaninus rubidus*. DEJEAN. *Huj. op.* III. p. 384. 12. et VII. II. p. 283. 20. teste DOM. GERMAR in litteris.

93. *C. NIGELLUS* (1). — *Ater, rostro thoraceque linea elevata longitudinali, elytris punctato-striatis.* — HERBST. Col. VII. p. 21. 579. T. 96. f. 12. — *P. India orientalis.*
94. *C. MANDUCUS* (2). — *Longirostris, tomentosus, niger fusco-que varius, elytris maculis duabus magnis niveis, medio fuscis, subtus niveus.* — HERBST. Col. VII. p. 33. 591. T. 100. f. 2. — *P. America (meridionalis?).*
95. *C. COMUS.* — *Brevirostris, ater, elongatus, femoribus incrassatis, rufis, dentatis.* — HERBST. Col. VII. p. 40. 598. T. 100. f. 11. K. — *P. America septentrionalis.*
96. *C. HOSTILIS.* — *Sub-longirostris, ater, griseo-variegatus, rostro crassiusculo, antennis piceis.* — HERBST. Col. VII. p. 44. 602. T. 98. f. 1. a. — *P.....*
97. *C. CROBYLUS* (3). — *Longirostris, griseo-nigro-que nebulosus, punctis niveis, rostro ferrugineo.* — HERBST. Col. VII. p. 57. 615. T. 100. f. 6. D. — *P. America septentrionalis.*
98. *C. IRRISUS.* — *Brevirostris, niger, thorace granulato, elytris globosis, punctato-striatis.* — HERBST. Col. VII. p. 67. 623. T. 100. f. 9. G. — *P. America septentrionalis.*
99. *C. NORMATUS.* — *Longirostris, niger, luteo-irroratus, thorace lateribus macula scutellari fasciaque elytrorum albis.* — HERBST. Col. VII. p. 68. 624. T. 99. f. 11. — *P. Surinam.*
100. *C. MANNUS* (4). — *Longirostris, niger, elytris basi interiori pedibusque fuscis.* — HERBST. Col. VII. p. 69. 625. T. 100. f. 4. B. — *P. America septentrionalis.*
101. *C. CRETURA* (5). *Longirostris, niger, thorace lateribus dentato, margine anteriori bi-dentato, elytris sulcatis, pedibus obsolete fuscis.* — HERBST. Col. VII. p. 70. 626. T. 100. f. 5. C. — *P. America.*

(1) An *Cleonus*?(2) An *Heilipus*?(3) An *Centrinus*?(4) (5) An *Ceuthorhynchus*?



102. C. ALAUDA. — *Longirostris, cinereus, sub-globosus, thoracis dorso fascia transversa maculisque nigris, pedibus fuscis.* — HERBST. *Arch.* IV. p. 74. 29. T. 24. f. 16. — P. Pomerania.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 498. 124.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV p. 1755. 173.
103. C. BICOLOR. — *Longirostris, piceus, albido-pubescens, rostro nigro.* — HERBST. *Arch.* IV. p. 75. 34. — P. Germania.  
*Curc. versicolor.* OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 563. 12.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1755. 178.
104. C. OCELLATUS. — *Cinereus, thorace sub-globoso, granulato, elytris rotundatis, striatis, oculis rubro-aureis.* — HERBST. *Arch.* IV. p. 84. 78. — P. Borussia.  
*Curculio Herbsti.* OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 571. 61.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1800. 485.
105. C. PYRICOLA. — *Angustus, ater, subtus antennisque spadicis, thorace granulato, elytris sulcatis.* — HERBST. *Arch.* IV. p. 84. 79. — P. Pomerania.  
*Curculio Pyricola.* OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 572. 62.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1800. 486.
106. C. EREMITA. — *Supra flavescens, pilosus, rostro tenui thoraceque sub-punctato-nigris, antennis elytris punctato-striatis, fuscis.* — HERBST. *Arch.* IV. p. 85-83. — P. Borussia.  
OLIV. *Enc. Méth.* IV. p. 572. 66.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1800. 490.
107. C. ROSARUM. — *Niger, albido-pubescens, elytris striatis.* — HERBST. *Arch.* VII. p. 167. 97. — P. Borussia.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1755. 180

## EX OPERIBUS AUCTORUM VARIORUM.

(Secundum ordin. alphabet.)

## GENUS RHYNCHÆNUS.

108. R. RUBROMACULATUS (1). — *Ater, pubescens, elytris striatis, tibiis rubris maculis; femoribus dentatis.* — DRAPIEZ. *Des An-*

(1) An ad genus *Balaninus* emendandus?

nales générales des Sciences phys. III. II. p. 9. T. 39. f. 4. —  
P. Java.

109. R. CANUS. — *Femoribus dentatis, totus cinereo-tomentosus, thorace elytrisque hirtis.* — THUNB. *Nova Acta Ups.* VII. p. 115. — P. Caput Bonæ Spei.
110. R. FIMBRIATUS — *Femoribus muticis, ater, elytris purpureis; margine nigro.* — THUNB. *Nova Acta Ups.* VII. p. 115. — P. Caput Bonæ Spei.
111. R. VETULUS. — *Femoribus muticis, ater, pilis albis irroratus, tibiis tarsisque rubris.* — THUNB. *Nova Acta Upsal.* VII. p. 116. — P. Caput Bonæ Spei.

#### GENUS CURCULIO.

112. C. MURICATUS. — *Femoribus dentatis, fusco-cinereus, elytris striatis, verrucosis.* — DRURY. *Illustr.* II. p. 63. I. 34. f. 4. — P. Honduras Americæ.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 503. 146.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1762. 285.  
*Curc. Murex.* HERBST. *Col.* VI. p. 477. 492. T. 34. f. 4.
113. C. SCALARIS. — *Longirostris, femoribus muticis, ater, thorace utrinque vitta flava, elytris lateribus vitta lata flava, serrata.* — DRURY. *Illustr.* III. p. 73. T. 49. f. 2. — P. Honduras.  
HERBST. *Col.* VI. p. 433. 423. T. 94. f. 1.
114. C. PILICORNIS. — *Brevirostris, femoribus dentatis, niger, cinereo-variis, elytris striato-punctatis, antennis pilosis, nigris, pedibus rufis.* — FORSTROEM, *Diss. Mus. Acad. Upsal. App.* VI. p. 112. 2. — P. Dalecarlia Sueciæ.
115. C. CONSPERSUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, oblongo-ovatus, obscure cinereus, rostro carinato, thorace tri-lineato, elytris punctato-striatis, maculis nigris sparsis.* — FORSTROEM, *Diss. Mus. Acad. Upsal. App.* VI. p. 112. 3. — P. Dalecarlia Sueciæ.
116. C. SPINIFER. — *Brevirostris, femoribus muticis, totus fuscus, spinosus, elytris striis elevatis villosospinosis.* — FOURCR. *Ent. Par.* I. p. 125. 30. — P. Gallia.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 496. 112.  
VILLERS. *Ent.* I. p. 216. 190.

117. *C. SULCATUS*. (1) — *Brevirostris, femoribus muticis, fusco-nebulosus, thorace sulcato, elytris striatis*. — GEOFF. *Ins.* I. p. 278. 3. — *P. Gallia*.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1758. 215.
118. *C. QUADRILIS*. — *Brevirostris, femoribus muticis, cinereus, elytris punctis quatuor nigris*. — GEOFF. *Ins.* I. p. 287. 21. — *P. Gallia*.  
 FOURCR. *Ent. Par.* I. p. 122. 24.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 545. 380.
119. *C. STELLIFER*. — *Femoribus dentatis, fuscus, elytris striatis, macularum albarum fascia triplici transversa*. — GEOFF. *Ins.* I. p. 295. 41. — *P. Gallia*.  
 FOURCR. *Ent. Par.* I. p. 128. 41.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 566. 31.  
 VILLERS. *Ent.* I. p. 202. 117. et IV. p. 275. 117.  
*Curcul. fascialis*. LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1778. 330.
120. *C. SERICEUS*. — *Brevirostris, obscure rufus, villis cinereis adspersus*. — GEOFF. *Ins.* I. p. 300. 52. — *P. Gallia*.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1778. 332.  
*Curc. villosus*. VILLERS. *Ent.* I. p. 207. 144. et IV. p. 277. 144.
121. *C. MURINUS*. — *Longirostris, femoribus denticulatis, sub-villosomurinus, scutello albicante*. — GEOFF. *Ins.* I. p. 290. 29. — *P. Gallia*.  
 FOURCR. *Ent. Par.* I. p. 124. 29.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 497. 114.  
 VILLERS. *Ent.* II. p. 192. 72. et IV. p. 272. 72.
122. *C. SCUTELLATUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, fuscus, scutello puncto albo, elytris maculis rubescentibus*. — GEOFF. *Ins.* I. p. 300. 50. — *P. Gallia*.  
 FOURCR. *Ent. Par.* I. p. 131. 53.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 521. 223.  
 VILLERS. *Ent.* I. p. 202. 120. et IV. p. 275. 120.

---

(1) An *Brachycerus*?

WALCHEN. *Faun. Par.* I. p. 241. 21.

*Curcul. fuscus*. LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1772. 294.

123. C. VIRGO. — *Longirostris, femoribus dentatis, oblongus, villis cinereis adpersus*. — GEOFF. *Ins.* I. p. 301. 53. — P. Gallia.

FOURCR. *Ent. Par.* I. p. 132. 56.

VILLERS. *Ent.* I. p. 202. 121. et IV. p. 276. 121.

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 521. 224.

WALCKEN. *Faun. Par.* I. p. 241. 10.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1778. 333.

124. C. ANNULIGER (1). — *Longirostris, femoribus dentatis, rostro thoracis fere longitudine, cylindrico, laevi, incurvo; corpore oblongo, nigro, nitido, thoracis lateribus, elytrorum fasciis duabus maculaque annuliformi, ochraceis, elytris punctulatis, punctis distantibus, per strias digestis*. — LATR. — HUMB. et BONPL. *Voy.* Tab. 23. f. 7. — P. Amer. meridionalis.

GERMAR, *Magaz.* I. II. p. 127. 55.

125. C. QUADRIPUNCTATUS. — *Longirostris, griseus, thorace lineis duabus, elytris punctis quatuor albis*. — LEPECHIN. *It.* II. p. 204. T. 11. f. 23. — P.....

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1755. 181.

*Curc. quadrillus*. OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 563. 13.

126. C. VARIUS. — *Longirostris, albo-nigro-que varius, elytris apice acuminatis*. — LEPECHIN. *It.* II. p. 204. T. 11. f. 33. — P. Rossia meridionalis.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1756. 182.

*Curc. varians*. OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 563. 14.

127. C. EXOTICUS. — *Longirostris, femoribus muticis, griseus, thorace basi impresso, dorsi ruga brevi, elytris posterius gibbis; punctorum alborum ordinibus decem, interstitiis profunde nigropunctatis*. — LESKE. *Mus.* p. 18. 368. — P. India.

OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 561. 1.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1741. 544.

(1) An *Heilipus*?

128. *C. UNDATUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, niger, elytris striato-punctatis, fasciis undatis interruptis albis.* — LESKE. *Mus.* p. 18. 379. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1741. 556.  
*Curc. undulatus.* OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 562. 3.
129. *C. PILIFER.* — *Longirostris, femoribus muticis, fuscus, elytris striatis, interstitiis levissime punctatis, atomis griseis pitosis adspersis, tibiis rufis.* — LESKE. *Mus.* p. 18. 380. — *P. Europa.*  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 562. 4.  
*Curc. atomarius.* LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1741. 557.
130. *C. SUTURALIS.* — *Longirostris, femoribus muticis, griseus, elytris striatis, sutura albida, nigro-punctata, macula oblonga communi versus apicem, marginibus externis, postice nigro-punctatis, alisque dispersis nigris.* — LESKE. *Mus.* p. 18. 384. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1742. 559.
131. *C. ERYTHROPUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, griseus, elytris striatis, rostro pedibusque nigris, tibiis apice incurvis plantisque rubris.* — LESKE. *Mus.* p. 18. 385. — *P. Europa.*  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 564. 19.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1759. 560.
132. *C. CRENULATUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, niger, glaber, rostro longitudine corporis, elytris striatis, striis profunde crenatis.* — LESKE. *Mus.* p. 19. 390. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1759. 562.
133. *C. FOVEOLATUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, viridi-aureus, rostro pedibusque nigris, abdomine violaceo, elytris profunde punctatis, antennis inter oculosque fovea oblonga.* — LESKE. *Mus.* p. 19. 391. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1759. 563.
134. *C. GLABRATUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, niger, glaber, elytris nigro-æneis, striatis.* — LESKE. *Mus.* p. 19. 398. — *P. Europa.*  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 565. 23.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1759. 566.

135. *C. ATOMARIUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, fuscus, elytris striatis, atomis griseis pilosis.* — LESKE. *Mus.* p. 19. 399. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1759. 567.
136. *C. RUGOSUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, fuscus, elytris rugosis, tibiis ferrugineis.* — LESKE. *Mus.* p. 19. 405. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1759. 569.
137. *C. CRINITUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, niger, globosus, rostro glabro, incurvo, elytris striatis.* — LESKE. *Mus.* p. 19. 407. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1760. 570.
138. *C. HEMATOPUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, niger, thorace punctato, elytris striis crenatis, antennis tibiisque sanguineis.* — LESKE. *Mus.* p. 20. 417. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1760. 571.
139. *C. RETICULATUS.* — *Longirostris, femoribus dentatis, oblongus, niger, elytris profunde punctatis reticulatisque, rugis, transverse lævissime striatis.* — LESKE. *Mus.* p. 20. 423. — *P. Europa.*  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 567. 36.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1772. 573.
140. *C. SUBFASCIATUS.* — *Longirostris, femoribus dentatis, ferrugineus, elytris fulvo-obsolete fasciatis.* — LESKE. *Mus.* p. 20. 426. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* I. IV. p. 1773. 574.
141. *C. DENTATUS.* — *Longirostris, femoribus dente valido armatis.* — LESKE. *Mus.* p. 20. 431. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* I. IV. p. 1773. 576.
142. *C. MURICATUS.* — *Longirostris, femoribus dentatis, sub-globosus, niger, elytris sulcatis, pilosis, cinereis, posterius muricatis, tibiis tarsisque rufis.* — LESKE. *Mus.* p. 20. 435. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1773. 579.
143. *C. CINEREUS.* — *Longirostris, femoribus dentatis, sub-globosus,*

*cinereus, antennis pedibusque rufescentibus.* — LESKE. *Mus.* p. 20. 436. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1773. 580.

144. C. CARINATUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, griseus, oblongus, rostro carinato, carina utrinque fuscata, thorace elytris punctatis; his polline griseo conspersis; punctorum ordinibus decem, pedibus anticis longioribus; femoribus tibiisque fusco-annulatis.* — LESKE. *Mus.* p. 21. 445. Tab. 1. fig. — P. Extra Europam.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1806. 582.

145. C. CRASSIROSTRIS. — *Brevirostris, femoribus muticis, griseus, rostro crasso, supra rugoso, thorace nigro, punctato, elytris obsolete rugosis, pilis erectis, hispidis, abdomine fusco.* — LESKE. *Mus.* p. 21. 449. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1806. 583.

146. C. INCINERATUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, niger, thoracis lineis quatuor elytrorumque vittis quatuor, punctisque sparsis cinereis.* — LESKE. *Mus.* p. 21. 456. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1806. 585.

147. C. VARIUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, elytris griseo-fusco-que variis punctato-striatis; punctis holosericeis fuscis.* — LESKE. *Mus.* p. 21. 461. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1806. 587.

148. C. NÆVIUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, nævius, rostro crasso, supra plano, fusco, elytris rugosis, sutura elevata, posterius carinata, femoribus fuscis, tibiis rufis, griseo-squamosis.* — LESKE. *Mus.* p. 21. 463. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1806. 588.

149. C. CORACINUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, niger, ovatus, glaber, elytris connatis, apice acuminatis thoraceque punctatis.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 465. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 589.

REYSL. in MAYERS. *Aufs. Böhm. Naturg.* III. p. 346. 17.

150. C. RUGATUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, griseus, tho-*

*racis dorso elytrorumque rugosorum sutura ferrugineo-fusca, thoracis dorso utrinque puncto.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 471. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 592.

151. C. INFUSCATUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, rostro thoraceque fuscis; hujus lineis tribus griseis, elytris tibiisque rufescentibus.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 470. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 593.

152. C. CLAVIPES. — *Brevirostris, femoribus muticis, oblongus, fuscus, cinereo-adsersus, antennis tibiisque rufis, femoribus clavatis.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 475. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 596.

153. C. EXOLETUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque rufis.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 478. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 597.

154. C. NUBILUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, fuscus, griseonebulosus, rostro lato, plano, elytris striatis, apice obtusis.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 479. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 598.

155. C. TENEBRICOSUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, niger, sub-æneus, ovatus, hirtus, punctato-striatus, antennis pedibusque rufis.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 481. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 599.

156. C. LUTOSUS. — *Brevirostris, femoribus muticis, lutosus, ovatus, antennis rufis.* — LESKE. *Mus.* p. 22. 482. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1807. 600.

157. C. GRANULOSUS. — *Brevirostris, femoribus dentatis, niger, thorace varioloso, elytris punctis elevatis rugosis, interstitiorum punctis minoribus.* — LESKE. *Mus.* p. 23. 490. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1779. 601.

158. C. LEPROSUS. — *Brevirostris, femoribus dentatis, villosus, ferrugineus, albido-maculatus, thorace punctis confluentibus, elytris punctato-striatis.* — LESKE. *Mus.* p. 23. 491. — P. Europa.

LINN. *Syst. Nat.* I. IV. p. 1779. 602.



159. *C. SULCATUS*. — *Brevirostris, femoribus dentatis, fuscus, thorace punctis profundis rugisque longitudinalibus, elytris punctatis, rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis.* — LESKE. *Mus.* p. 29. 492. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1779. 603.
160. *C. CHRYSOSTICTUS*. — *Brevirostris, femoribus dentatis, fuscus, glaber, thorace punctato, elytrorum sulcis crenatis maculisque tribus auro-conspersis, antennis ferrugineis.* — LESKE. *Mus.* p. 29. 493. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1779. 604.
161. *C. HÆMORRHEUS*. — *Brevirostris, femoribus dentatis, fuscus, antennis, pedibus abdominisque apice rufis, elytris fusco-virescentibus.* — LESKE. *Mus.* p. 23. 501. — *P. Europa.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1779. 606.
162. *C. PORCATUS*. — *Longirostris, femoribus muticis, ater, elytris porcis duabus elevatis crenatis; interiori sub-inflexa, thorace pedibusque albo-villosis.* — MARSH. *Ent. Brit.* p. 255. 49. — *P. Anglia (?)*.  
*Brotheus id.* STEPHENS, *Brit. Ent.* IV. p. 154. *Nat.* 1.
163. *C. RESINOSUS*. — *Longirostris, femoribus muticis, piceus, elytris punctis excavato-striatis, antennis pedibusque obscure rufescentibus.* — MARSH. *Ent. Brit.* p. 268. 91. — *P. Anglia.*
164. *C. STRIATIROSTRIS*. — *Longirostris, femoribus muticis, oblongo-ovatus, fusco-cinereus, antennis plantisque rufescentibus, rostro striato.* — MARSH. *Ent. Brit.* p. 269. 94. — *P. Anglia.*
165. *C. RUFIMANUS*. — *Longirostris, femoribus muticis, fusco-cinereus, elytris obsolete punctato-striatis, rufis.* — MARSH. *Ent. Brit.* p. 270. 99. — *P. Anglia.*
166. *C. ACEPHALUS*. — *Longirostris, femoribus muticis, pubescens, capite intra thoracem retractili, elytris cinereo-striatis.* — MARSH. *Ent. Brit.* p. 271. 102. — *P. Anglia.*
167. *C. STRIGOSUS* (1). — *Longirostris, femoribus dentatis, globoso-*

---

(1) *Phytonomus Polygoni*, teste DOM. WALTON. — An?

- ovatus, niger, thorace strigis tribus albis, elytris inciso-striatis.* — MARSH. *Ent. Br.* p. 287. 146. — *P. Anglia.*
168. *C. SETOSUS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, fusco-cinereus, hispidus, antennis pedibusque rufis.* — MARSH. *Ent. Brit.* p. 304. 139. — *P. Anglia.*
169. *C. SUBGLOBOSUS.* — *Brevirostris, femoribus dentatis, cinereo-fuscus, tomentosus, thoracis lateribus pallidis, abdomine sub-globoso.* — MARSH. *Ent. Br.* p. 313. 219. — *P. Anglia.*
170. *C. SUBCLAVATUS.* — *Brevirostris, femoribus dentatis, nigro-cinerascens, rostro brevi, crasso, sub-clavato, elytris obsolete striatis.* — MARSH. *Ent. Br.* p. 314. 221. — *P. Anglia.*
171. *C. MAURUS.* — *Brevirostris, femoribus dentatis, niger, elytris punctato-striatis.* — MARSH. *Ent. Br.* p. 316. 225. — *P. Anglia.*
172. *C. GLAUCINUS.* — *Longirostris, femoribus dentatis, niger, thorace utrinque linea pallida, tibiis rufis.* — MÜLL. *Zool. Dan. Prodr.* p. 89. 989. — *P. Dania.*  
*Curcul. glaucus.* LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1758. 208.
173. *C. TARDUS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, nigricans, thorace elytrisque utrinque rufis, macula apicis atra.* — MÜLL. *Zool. Dan. Pr.* p. 86. 942. — *P. Dania.*  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1803. 516.
174. *C. FASCIATUS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, oblongus, ater, thorace utrinque, elytris fasciis duabus suturaque albis, tomentosus.* — MÜLL. *Zool. Dan. Pr.* p. 86. 944. — *P. Dania.*
175. *C. LONGICORNIS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, nigricans, thorace hirta, elytris cinereis, maculis flavicantibus, pedibus antennisque rufis.* — MÜLL. *Zool. Dan. Pr.* p. 86. 949. — *P. Dania.*  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1803. 518.
176. *C. OPACUS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, griseus, absque striis et punctis.* — MÜLL. *Zool. Dan. Pr.* p. 86. 950. — *P. Dania.*  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1803. 519.
177. *C. LATIROSTRIS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, griseus,*

*antennis pedibusque rufescentibus.* — MÜLL. Zool. Dan. Pr. p. 86. 951. — *P. Dania.*

*Curc. bicolor.* LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1803. 520.

178. *C. MACULOSUS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, ovatus, obscure flavicans, elytris luteo-maculatis.* — MÜLL. Zool. Dan. Pr. p. 86. 952. — *P. Dania.*

LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1803. 521.

179. *C. STRIATUS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, elongatus, cinereus, thorace tri-lineato, antennis nigris.* — MÜLL. Zool. Dan. Pr. p. 86. 956. — *P. Dania.*

*Curc. trilineatus.* LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1803. 523.

180. *C. PUNCTATUS.* — *Brevirostris, femoribus dentatis, ater, elytris sub-sulcatis, pallide punctatis, oculis rufis.* — MÜLL. Zool. Dan. Pr. p. 87. 964. — *P. Dania.*

*Curc. Danicus.* LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1778. 322.

181. *C. SQUAMIFER.* — *Brevirostris, femoribus dentatis, oblongus, elytris griseo-nigro-que striatis.* — MÜLL. Zool. Dan. Pr. p. 87. 968. — *P. Dania.*

LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1778. 323.

182. *C. ARVENSIS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, griseus, thorace tri-lineato, elytris rufis, obscure tessulatis.* — MÜLL. Zool. Dan. Pr. p. 88. 978. — *P. Dania.*

LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1758. 206.

183. *C. TUBERCVLATUS.* — *Brevirostris, femoribus muticis, niger, thorace rugoso, elytris lineis tuberculisque muricatis.* — MÜLL. Zool. Dan. Pr. p. 88. 979. — *P. Dania.*

LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1758. 207.

184. *C. CARIOSUS* (1). — *Longirostris, femoribus dentatis, corpore nigro, lutescente irrorato; thorace elytris-que maculis exesis albis.* — PALLAS. Icon. p. 33. 15. Tab. H. fig. B. 15. a. b. — *P. Surinam.*

*Curc. exesus.* LINN. Syst. Nat. ed. GMEL. I. IV. p. 1762. 456.

---

(1) An *Helipus*?

185. *C. CLAVATUS*. — *Brevirostris, femoribus dentatis, obscurus, elytris striatis, pallide fasciatis, oculis antennarumque clava atris.* — PANZER. *Ent. Germ.* p. 313. 81. — *P. Germania.*
186. *C. SEGETIS*. — *Brevirostris, femoribus dentatis, ciliatisque obscuris, elytris cinereo-nebulosis, antennis tarsisque flavis.* — PANZ. *Ent. Germ.* p. 316. 95. — *P. Germania.*
187. *C. PERICARPIUS* (1). — *Longirostris, sub-globosus, nebulosus, elytrorumque sutura basi alba.* — PANZ. *Faun. Germ.* XLII. 5. — *P. Germania.*  
 ROSSI. *Faun. Etr.* I. p. 115. 294. ed. HELL. p. 122. 294?  
 SCHRANK. *Enum.* p. 109. 209?  
 LAICH. *Tyrol. Ins.* I. p. 223. 17.  
 GEORF. *Ins.* I. p. 298. 46?
188. *C. BRUNNIPES*. — *Longirostris, femoribus muticis, piceus, thorace sub-globoso, coleoptris ovatis, punctato-striatis, antennis tibiisque piceis.* — PANZ. *Ent. Germ.* p. 329. 169. — *P. Germania.*
189. *C. CORVINUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, ater, opacus, laevis, elytris striato-punctatis, thorace punctatissimo.* — PANZ. *Ent. Germ.* p. 335. 207. — *P. Germania.*
190. *C. VIRIDIPENNIS*. — *Longirostris, femoribus muticis, fuscus, thorace fusco, margine pallido, elytris hispidis, alis viridibus.* — PANZ. *in Naturf.* XXIV. p. 24. 32. T. I. f. 32. — *P. Germania.*  
 SCRIBA. *Journ.* p. 16. 32.
191. *C. LATHAMI*. — *Longirostris, femoribus muticis, squamoso-cinereus, thorace conico, elytris punctato-striatis, postice linea acuta elevata, abdomine punctatissimo.* — REICH. *Mant.* p. 12. 9. T. I. f. 10. — *P. Georgia Americæ.*
192. *C. NIGRIFRONS* (2). — *Longirostris, femoribus muticis, ferrugineus, capite, scutello pectoreque nigris, rostro crassiusculo, elytris crenato-striatis.* — REICH. *Mant. Ins.* p. 12. 9. T. I. 9. — *P. Germania.*

(1) *Amalus Scortillum*. Huj. op. III. p. 396. 1. — Forte?

(2) An *Elleschus scanicus* var.?

193. *C. BOHEMICUS* (1). — *Brevirostris, femoribus muticis, corpore, capite antennisque nigris, thorace papilloso et elytris quatuor papillarum ordinibus insignitis cinereis-incanis.* — RICHTER, *Abh. Naturg. Böhm.* p. 34. — *P. Bohemia.*  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1805. 543.
194. *C. FABER.* — *Brevirostris, femoribus muticis, elytris castaneo-nigris, sulcatis, thorace plano, obscuriore.* — ROSSI. *Faun. Etr. I.* p. 120. 308. ed. HELL. p. 128. 308. — *P. Italia.*
195. *C. INFIDUS.* — *Brevirostris, piceus, nitidus, thorace punctato, femoribus clavatis, compressis, muticis.* — ROSSI. *Faun. Etr. Mant. I.* p. 38. 95. — ed. HELL. p. 376. 95. — *P. Italia.*
196. *C. VIATOR* (2). — *Brevirostris? niger, oblongus, thorace elytris squamoso-æneis, sub-nitidis.* — ROSSI. *Faun. Etr. Mant. I.* p. 41. 103. — ed. HELL. p. 379. 103. — *P. Italia.*
197. *C. BREVIROSTRIS.* — *Femoribus muticis, ater, sub-nitidus, elytris punctato-sulcatis, rostro latitudine capitis.* — ROSSI. *Faun. Etr. Mant. I.* p. 42. 105. — ed. HELL. p. 380. 105. — *P. Italia.*
198. *C. LIMOSUS* (3). — *Brevirostris, femoribus muticis, niger, obscurus, thorace elytris limo exsiccato obductis, antennis rufis.* — ROSSI. *Faun. Etr. Mant. I.* p. 42. 106. — ed. HELL. p. 380. 106. — *P. Italia.*
199. *C. BARBATUS.* — *Niger, elytris lineis rugoso-elevatis, antennis brevibus; rostro bi-sulcato, apiceque inferius barbato.* — ROSSI. *Faun. Etr. Mant. II.* p. 93. 46. F. 1. fig. D. — *P. Florentia.*
200. *C. NITIDULUS.* — *Longirostris, femoribus muticis, rufus, capite nigricante, oculis atris.* — SCHRANK. *En. Ins. Austr.* p. 108. 206. *Curc. modestus.* FOURCR. *Ent. Par. I.* p. 120. 15. *Curc. humilis.* OLIV. *Enc. Méth. V.* p. 553. 373.

(1) An *Brachycerus*?(2) An *Phytonomus*?(3) An *Bagous*?

- Curc. Geoffroæi*. LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1804. 532.  
 GEOFF. *Ins.* I. p. 284. 15.
201. *C. DANUBIALIS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, elytris cer-  
 vinis, punctis nigris sparsis*. — SCHRANK. *En. Ins. Austr.* p. 113.  
 214.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 567. 33.  
 VILLERS. *Ent. Linn.* I. p. 201. 110. et IV. p. 274. 110.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1762. 478.
202. *C. ALNETI*. — *Longirostris, femoribus dentatis, testaceus, ocu-  
 lis rostrique apice solis nigris, thorace obscuriore*. — SCHRANK.  
*Enum.* p. 115. 217.  
 VILL. *Ent. Linn.* I. p. 201. 111.
203. *C. LATRO*. — *Longirostris, femoribus dentatis, testaceus, ocu-  
 lis antennarumque clava solis nigris, thorace obscuriore*. —  
 SCHRANK. *Enum.* p. 115. 218.  
 VILLERS. *Ent. Linn.* I. p. 201. 112.
204. *C. SALICINUS*. — *Longirostris, femoribus omnibus dentatis,  
 niger, cruce alba*. — SCHRANK. *Enum.* p. 115. 219.  
 VILLERS. *Ent. Linn.* I. p. 201. 113. et IV. p. 274. 113.
205. *C. APTERUS*. — *Brevirostris, femoribus dentatis, cinereus, ap-  
 terus, elytris punctis nigris in lineis albidis dispositis*. — SCHRANK.  
*Enum.* p. 117. 222.  
 VILLERS. *Ent. Linn.* I. p. 206. 136.  
*Curc. austriacus*. LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1778. 324.
206. *C. CHRYSOPTERUS*. — *Brevirostris, femoribus muticis, niger,  
 elytris cano-variegatis, margine interiore aureo*. — SCHRANK. *Enum.*  
 p. 125. 237.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 571. 57.  
 VILLERS. *Ent. Linn.* I. p. 214. 179. et IV. p. 281. 179.
207. *C. SULCATUS*. — *Brevirostris, femoribus muticis, ovatus, niger,  
 elytris lineis elevatis quinque*. — SCHRANK. *Enum.* p. 126. 239.
208. *C. CARIOSUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, oblongus,  
 fusco-rufescens, rostro nitidulo, elytris striatis*. — SCOPOLI. *Ent.*  
*Carniolica.* p. 27. 81.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 567. 34.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1772. 292.

209. *C. QUERCUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, niger, scutello tri-lobo; lobo anteriore albo, elytris puncto albo.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 34. 106.  
*Curc. quercinus.* LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 510.
210. *C. PUNCTATUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, niger, thorace albido, elytris striis quinque elevatis, nigris, albo-punctatis.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 34. 107.  
*Curc. carniolicus.* LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1812. 511.
211. *C. FASCIATUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, rufus, subvillosus, elytris fasciis duabus obscurioribus, obsolete.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 34. 108.  
*Curc. villosulus.* LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 512.
212. *C. PRÆCOX*. — *Longirostris, femoribus dentatis, ferrugineus, elytris striatis, subvillosis.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 34. 109.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 513.
213. *C. PIGER*. — *Brevirostris, femoribus muticis, anterioribus clavatis, rostro striis elevatis, senis; lateralibus apice conjunctis.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 23. 65.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1801. 500.
214. *C. INERS*. — *Rostro linea elevata unica, elytris striis decora punctatis.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 24. 68.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1801. 501.
215. *C. PICEUS*. — *Abdomine nigro, subtus albido, femoribus clavatis.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 24. 69.  
*Curc. picatus.* LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1801. 503.
216. *C. ERRATICUS*. — *Recticornis, rostro apice concavo, elytris subvillosis, striatis, stria tertia tuberculata.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 24. 70.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 504.
217. *C. CENTAURÆ*. — *Ovatus, fuscus, sub-rufo-villosus, rostro deflexo, marginato, linea ad apicem elevata media.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 26. 76.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 564. 17.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1757. 194.

218. C. INFIDUS. — *Crassirostris, femoribus dentatis, obsolete cupreus, ccerulescenti-villosus.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 31. 94.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 574. 78.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1777. 321.
219. C. C-ALBUM. — *Crassirostris, femoribus dentatis, cupreo-nigro-que varius, angulo externo baseos elytri linea arcuata, alba.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 32. 99.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 573. 69.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 565.
220. C. NEMOREUS. — *Crassirostris, femoribus muticis, apterus, niger, opacus, rostro bi-fido, thorace elytris-que scabris, acuminatis.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 32. 101.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 573. 71.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 507.
221. C. NOMUS. — *Crassirostris, femoribus muticis, rostro supra bisulcato, abdomine posterius fulvo-villoso.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 33. 102.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 573. 72.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 508.
222. C. ZOILUS. — *Crassirostris, femoribus muticis, apterus, villosus, rostro deflexo, elytris striatis, nigro-variegatis, puncto majiori communi ad apicem.* — SCOP. *Ent. Carn.* p. 33. 103.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 573. 73.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 509.
223. C. TRICOLOR. — *Femoribus muticis, niger, thorace punctis binis albis, elytris punctatis; margine interiori albo, lineisque binis longitudinalibus flavis.* — SCOP. *Ann. Hist. Nat.* V. p. 91. 45.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1802. 514.
224. C. CALVUS. — *Brevirostris, femoribus inermibus, ater, thorace utrinque punctis elevatis prominentibus, scabro, disco læviusculo; elytris striis elevatis, glabriusculis, sulcis interjectis impresso-punctatis.* — SPARRM. *Acta Holm.* 1785. I. p. 55. 34. T. 3. f. 34. — P. Caput Bonæ Spei.  
 OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 570. 50.  
 LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1794. 438.



225. *C. SENILIS*. — *Longirostris, femoribus inermibus, thorace tere-  
tiusculo, elytris striis elevatis, lævibus, distantibus 3. s. 5; interstitiis  
planis, impresso-punctatis*. — SPARRM. in *Acta Holm.* 1785. II. p.  
55. 35. T. 3. f. 35. — *P. Caput Bonæ Spei*.  
OLIV. *Enc. Méth.* V. p. 570. 51.  
LINN. *Syst. Nat.* ed. GMEL. I. IV. p. 1794. 439.
226. *C. BOVINUS*. — *Femoribus muticis, ferrugineo-tomentosus, ely-  
trorum margine saturatiore*. — THUNB. N. *Acta Ups.* VII. p.  
120. — *P. Caput Bonæ Spei*.
227. *C. PLEBEJUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, fusco-niger,  
thorace inermi*. — VILLERS. *Ent. Linn.* I. p. 202. 119. et IV. p.  
275. 119. — *P. Gallia*.  
GEOFF. *Ins.* I. p. 299. 49.
228. *C. ARMATUS*. — *Longirostris, femoribus muticis, nigro-cinereus,  
thorace utrinque denticulato*. — VILL. *Ent.* I. p. 190. 68. et IV.  
p. 271. 88. — *P. Gallia*.
229. *C. AURIFER*. — *Brevirostris, femoribus muticis, margine ex-  
teriori aurato, lineolaque aurata ad basin*. — VILL. *Ent.* I. p.  
216. 191. et IV. p. 283. 191. — *P. Gallia*.
230. *C. PARALLELUS*. — *Longirostris, femoribus dentatis, albidus,  
thoracæ elytrisque fusco-testaceis, vitis tribus candidis, his du-  
plicatis parallelis*. — VOET. *Col.* ed. PANZ. IV. p. 51. 7. T. 35. f. 7.
231. *C. OBTUSUS*. — *Ater, nitidus, elytris truncatis, lineis tribus  
elevatis, sutura alba*. — VOET. *Col.* ed. PANZ. IV. p. 69. 47. T.  
39. f. 47.
232. *C. CYANEUS* (1). — *Longirostris, cyaneus, elytris sub-punctato-  
striatis*. — WEBER, *Obs. Ent.* p. 93. 1. — *P. Brasilia*.
233. *C. LONGIMANUS*. — *Longirostris, cinereo-niger, thorace lineis  
rufis, pedibus anticis longissimis*. — WEBER, *Obs. Ent.* p. 94. 5.  
— *P. Sumatra*.
234. *C. PORCATUS*. — *Niger, thorace planato, cubico, elytris por-  
catis, albo-vittatis*. — WIEDEM. *Zool. Mag.* II. I. p. 123. 187. —  
*P. Caput Bonæ Spei*.

---

(1) An *Eurhinus cyaneus*? Huj. op. III. p. 813. 1.

# TABULA SYNOPTICA

## FAMILIÆ

# CURCULIONIDUM.



## ORDO PRIMUS.

### ORTHOCERI.

SPECIES  
enumeran-  
dæ.

Antennæ non fractæ, h. e. ad articulum secundum haud geniculatæ; articulus basilaris non valde elongatus; scrobes rostrales, proprie sic nominandæ, vix ullæ.

### SECTIO PRIMA.

*Antennæ articulis* 11, 12.

#### DIVISIO I. — BRUCHIDES.

Rostrum latum, deflexum. Antennæ sensim crassiores, serratæ aut pectinatæ, in paucis clavatæ, 11-articulatæ. Tarsi distincte 4-articulati, articulo penultimo bi-lobo. — Genus 1-4. . . . .

274.

#### DIVISIO II. — ANTHRIBIDES.

Rostrum plerumque latum, deflexum, in paucis elongatum, sub-porrectum. Antennæ 11-articulatæ, infractæ, sæpissime clavatæ. Elytra pygidium haud occultantia. Tarsorum articulus secundus tertium minutum plerumque amplectens; unguis subtus uni-dentati. Corpus dense tomentosum, alatum. . . . .

187.

SUBDIVISIO I. — Antennæ lateribus rostri in scrobe elongata, subtus flexa, insertæ.—Gen. 5-13.

*Cohors* I. — Oculi integri. — Genus 5-12.

*Transp.* . . . 461.

*Transp.* . . . 461.

*Tribus I.* — Antennarum clava 3-articulata vel rarius nulla. — Genus 5-11.

*Tribus II.* — Antennarum clava 4-articulata, lata. — Genus 12.

*Cohors II.* — Oculi emarginati. Antennarum clavā triarticulata. — Genus 13.

SUBDIVISIO II. — Antennæ lateribus rostri in fovea insertæ. — Genus 14-38.

*Cohors I.* — Clava antennarum semper 3-articulata. Oculi integri. — Genus 14-29.

*Cohors II.* — Oculi plus minusve emarginati. — Genus 30-38.

*Tribus I.* — Antennarum clava 3-articulata. — Genus 30-37.

*Tribus II.* — Antennarum clava 4-articulata. — Genus 38.

SUBDIVISIO III. — Antennæ in pagina superiore rostri juxta oculos insertæ. — Genus 39-41.

DIVISIO III. — CAMAROTIDES.

Rostrum breve, latiusculum, deflexum. Antennæ clavatæ, 11-articulatæ. Elytra hemisphærica, margine dilatata, abdomen tegentia. Pedes breves, basi distantes; femora antica crassissima. — Genus 42. . . . . 2.

DIVISIO IV. — ATTELABIDES.

Rostrum sub-cylindricum, deflexum, sæpe filiforme, vel sæpius apice dilatatum. Caput pone oculos elongatum. Antennæ clavatæ, 11-12 articulatæ. Elytra elongata, subquadrata. Pygidium nudum. — Genus 43-47. . . . . 143.

*Transp.* . . . 606.

*Transp.* . . . . 606

**DIVISIO V. — RHINOMACERIDES.**

Rostrum elongatum, aut deflexum, aut sub-porrectum, apice in aliis dilatatum, in aliis vero cylindricum. Caput sæpissime breve, transversum; oculi magni, rotundati, valde prominuli. Antennæ 11, 12-articulatæ, aut sub-clavatæ, aut extrorsum sensim crassiores. Elytra oblonga, sub-lineararia, abdomen obtegentia. — Genus 48-54. : . 21.

**DIVISIO VI. — ITHYCERIDES.**

Rostrum breve, deflexum, sub-teres. Caput pone oculos non elongatum. Antennæ breves, clavatæ, 12-articulatæ. Elytra oblongo-ovata. Humeri rectangulati. Pygidium nudum. — Genus 55. . . . . 1.

**DIVISIO VII. — APIONIDES.**

Rostrum sub-porrectum, cylindricum vel filiforme. Antennæ clavatæ, 11-articulatæ, versus medium vel ad basin rostri insertæ. Caput pone oculos elongatum. Elytra oblongo-ovata, fornicata, anum tegentia. — Genus 56-60. 208.

**DIVISIO VIII. — TANAONIDES.**

Rostrum aut porrectum, aut sub-deflexum, cylindricum; scrobes distinctæ. Antennæ 12-articulatæ, clavatæ. Corpus convexum. — Genus 61, 62. . . . . 5.

**DIVISIO IX. — RHAMPHIDES.**

Rostrum elongatum, inflexum. Antennæ clavatæ, 11, 12-articulatæ. Oculi in fronte conniventes. Pedes postici saltatorii. — Genus 63, 64. . . . . 6.

**DIVISIO X. — BRENTHIDES.**

Rostrum porrectum. Antennæ non clavatæ, 11-articulatæ. Collum plerumque distinctum. Scutellum non ob-

*Transp.* . . . . 847.

*Transp.* . . . 847.

servandum. **Abdomen** segmento 1° et 2° longissimis, arcte junctis, ægre discernendis, 3° et 4° brevissimis, transversis instructum, ultimo breviusculo, semi-circulari. Tarsi indistincte 5-articulati. Corpus durum, sub-cylindricum, elongatum. — Genus 65-85. . . . . 153.

DIVISIO XI. — OXYCORYNIDES.

Rostrum elongatum, cylindricum, sub-rectum. Antennæ breves, porrectæ; articuli novem ante clavam; clava indistincte tri-articulata, apice sub-spongiosa. Elytra breviter ovata, abdomen obtegentia. Tarsi indistincte 5-articulati. — Genus 86. . . . . 2.

DIVISIO XII. — ANTLIARHINIDES.

Rostrum porrectum. Antennæ fere rectæ, 12-articulatæ; scapo longiusculo, clavato; clava angusta, 4-articulata. Scutellum distinctum. Corpus deplanatum, alatum. — Genus 87-88. . . . . 10.

DIVISIO XIII. — CYLADES.

Rostrum porrectum. Antennæ clavatæ, 10-articulatæ; clava longissima, linearis, uni-articulata. Thorax elongatus, sub-bi-partitus. Elytra oblongo-ovata, fornicata. — Genus 89. . . . . 8.

DIVISIO XIV. — ULOCERIDES.

Rostrum porrectum. Antennæ breves, crassæ, aut squamulatæ, aut hirtæ; articuli 7 vel 8 ante clavam; clava parva, sub-solida. Corpus aut alatum, sub-cylindricum, angustum, aut apterum, postice obtusatum, antrorsum sensim angustatum. — Genus 90-91. . . . . 22.

DIVISIO XV. — OXYRHYNCHIDES.

Rostrum elongatum, filiforme, arcuatum. Antennæ breves, porrectæ, validæ; articuli 7 ante clavam; clava apice

*Transp.* . . . 1042.

*Transp.* . . . 1042.

spongiosa, forte articulos indistinctos includens. Corpus oblongum, durum. — Genus 92. . . . . 2.

## ORDO SECUNDUS.

### GONATOCERI.

LEGIO I. — BRACHYRHYNCHI. (*Curculiones*. FABR.) —  
Genus 93-343.

Rostrum plus minusve crassum et deforme, breviusculum, parum arcuatum. Antennæ prope apicem rostri sæpe juxta sinum oris insertæ, sæpissime 12-articulatæ. (*Brachycerides* tantum excepti.) — Genus 93-343. . . . .

### PHALANX I.

Canalicula antennalis infra-ocularis curvata vel obliqua. — Genus 93-274.

### SECTIO I.

Rostrum aut deflexum, aut sub-porrectum, liberum. — Genus 93-263.

### DIVISIO I. — BRACHYCERIDES.

Rostrum breve, crassum, sæpius deflexum, in paucis porrectum. Antennæ breves, validæ, nonnihil fractæ; articuli 7 vel 8 ante clavam; clava parva, sub-solida, apice spongiosa, forte articulos indistinctos includens; tarsi angustati, setosi, haud spongiosi. Corpus durum, apterum. — Genus 93-95. . . . . 181.

### DIVISIO II. — ENTIMIDES.

Rostrum breviusculum, deflexum, teretiusculum, cras-

*Transp.* . . . 1225.

	SPECIES enumeran- da.
<i>Transp.</i> . . .	1225.
sum, extrorsum sæpissime valde incrassatum. — Genus 96-104. . . . .	110.
<b>DIVISIO III. — PACHYRHYNCHIDES.</b>	
Rostrum brevissimum, crassum, deflexum, sæpius an- gulatum, apice vix incrassatum. — Genus 105-123. . .	55.
<b>DIVISIO IV. — BRACHYDERIDES.</b>	
Rostrum sæpissime sub-horizontale, latitudine fere ca- pitis eique contiguum, supra sæpius planiusculum, raro teretiusculum, in plerisque breve vel brevissimum, in aliis vero sub-deflexum, magis elongatum. — Genus 124-210.	810.
<b>SUBDIVISIO I. — Rostrum breve vel brevissimum, parum elongatum, supra planiusculum. — Genus 124-186.</b>	
<i>Cohors I.</i> — Corpus sæpius brevius, in paucis ovatum, vel oblongo-ovatum, apterum; humeri plerumque rotundati vel obtusi, non prominuli. — Genus 124-144.	
<i>Cohors II.</i> — Corpus elongatum vel oblongum, ple- rumque alatum; humeri plus minusve distincte angulati. — Genus 145-186.	
<b>SUBDIVISIO II. — Rostrum capite fere longius sed dimidio angustius, sæpissime teretiusculum.— Genus 187-210.</b>	
<b>DIVISIO V. — CLEONIDES.</b>	
Rostrum aut nutans aut deflexum, crassiusculum, ple- rumque longiusculum, teretiusculum, raro sub-angula- tum, extrorsum sæpius sub-incrassatum.— Genus 211-247.	449.
<b>SUBDIVISIO I. — Corpus sæpissime alatum. — Genus 211- 223.</b>	
<i>Transp.</i> . . .	2649.

*Transp.* . . . 2649.

SUBDIVISIO II. — Corpus apterum. — Genus 224-247.

*Cohors I.* — Scutellati. — Genus 224-239.

*Cohors II.* — Exscutellati. — Genus 240-247.

DIVISIO VI. — MOLYTIDES.

Rostrum longius, deflexum, teres, paulo arcuatum, ple-  
rumque minus crassum. — Genus 248-263. . . . 172.

SUBDIVISIO I. — Tibiæ omnes apice unco intus armatæ. —  
Genus 248-259.

*Cohors I.* — Corpus alatum. — Genus 248-251.

*Cohors II.* — Corpus apterum. — Genus 252-263.

SUBDIVISIO II. — Tibiæ omnes apice muticæ. — Genus 260-  
263.

SECTIO II.

Rostrum inflexum, in canalicula pectorali immersum.  
Genus 264-274.

DIVISIO VII. — BYRSOPSIDES.

Rostrum breve, inflexum; thorax subtus pro receptione  
rostri plus minusve profunde canaliculatus. Scutellum sæ-  
pissime nullum. Tarsi plerumque angustati, setosi. — Ge-  
nus 264-274. . . . . 83.

*Cohors I.* — Thorax infra pro receptione rostri pro-  
funde canaliculatus. — Gen. 264-269.

*Cohors II.* — Thorax infra pro receptione rostri aut mi-  
nus profunde aut indistincte canalicu-  
latus. — Genus 270-274.

PHALANX II.

Canalicula antennalis seu scrobs sub-recta, versus me-  
dium oculi adscendens; scapus antennarum semper pone

*Transp.* : . . 2904.



Transp. . . . 2904.

oculos sese extendens; rostrum aut sub-porrectum, aut sub-deflexum. — Genus 275-346.

DIVISIO VIII. — PHYLLOBIDES.

Rostrum breve, sub-horizontale, crassiusculum, sæpius teretiusculum, nonnunquam aliquantulum incrassatum, interdum quoque supra planum. Corpus elongatum, scutellatum, alatum; humeri obtuse angulati.—Gen. 275-287.

100.

SUBDIVISIO I. — Thorax pone oculos non lobatus. — Genus 275-284.

SUBDIVISIO II. — Thorax pone oculos lobis productis. — Genus 285-287.

DIVISIO IX. — CYCLOMIDES.

Rostrum breve, plus minusve crassum, aut sub-horizontale, aut deflexum, sæpius teretiusculum, nonnunquam versus apicem sub-angulatum. Corpus sub-ovatum, apterum; humeri in plerisque rotundati vel obtusi.—Genus 288-331.

293.

DIVISIO X. — OTIORHYNCHIDES.

Rostrum breviusculum, crassiusculum, sub-horizontale, apice dilatatum et incrassatum, supra sub-planum; pterygia apicalia, divaricata. — Genus 332-343. . . .

293.

SUBDIVISIO I. — Thorax antice oblique sub-truncatus, pone oculos non lobatus. Corpus apterum. — Genus 332-342.

SUBDIVISIO II. — Thorax pone oculos lobis productis. Corpus alatum. — Genus 342, 343.

LEGIO II. MECORHYNCHI. (*Rhynchaenides*. FABR.)

Rostrum cylindricum vel filiforme, plus minusve elongatum, raro thorace brevius. Antennæ ante vel prope me-

Transp. . . . 3590.

*Transp.* . . . 3590

dium rostri, nec juxta sinum oris insertæ. Funiculus variat numero articulorum. — Genus 344-631.

SECTIO I.

Antennæ articulis 11, 12; clava 4-articulata. — Genus 344-585.

DIVISIO I. — ERIRHINIDES.

Pedes antichi basi omnino approximati. Thorax subtus integer, h. e. ante pedes anticos haud canaliculatus. — Genus 344-449. . . . . 1040.

*Cohors* I. — Scutellum plus minusve distinctum. Alati. — GENUS. 344-439.

*Cohors* II. — Exscutellati. Apteri. — Genus 440-449.

DIVISIO II. — APOSTASIMERIDES.

Pedes antichi basi in plerisque distantes, inter quos pectus aut planum, aut plus minusve distincte canaliculatum. — Genus 450-584. 1566.

SUBDIVISIO I. — (CHOLIDES). Pectus inter pedes anticos planum, integrum. — Gen. 450-482.

SUBDIVISIO II. — (BARIDIDES). Pectus inter pedes anticos aut sub-integrum, aut plus minusve distincte canaliculatum. — Genus 483-505.

SUBDIVISIO III. — (CRYPTORHYNCHIDES). Pectus inter pedes anticos in plerisque distincte canaliculatum. — Gen. 506-584.

*Cohors* I. — Thorax infra pro receptione rostri distincte canaliculatus; canalicula profunda, argute marginata, in pectore continuata, distincte terminata. — Gen. 506-548.

*Tribus* I. — Scutellum distinctum. — Gen. 506-532.

*Transp.* . . . 6196.

SPECIES  
enumeran-  
dæ.

*Transp.* . . .

6196.

*Tribus* II. — Scutellum aut minutissimum, fere indistinctum, aut nullum. — Gen. 533-548.

*Cohors* II. — Thorax infra pro receptione rostri aut minus distincte, aut vix canaliculatus, canalicula in pectore in plerisque haud continuata, sed nunquam distincte terminata. — Gen. 549-584.

*Tribus* I. — Scutellum in plerisque distinctum (in paucis omnino caret (1)). — Genus 549-573.

*Tribus* II. — Scutellum aut minutissimum, fere indistinctum, aut nullum. — Genus 574-584.

DIVISIO III. — CONOPHORIDES.

Antennæ longiusculæ, tenues, funiculus 7-articulatus, clava sub-solida, indistincte bi-articulata. Rostrum inflexum. Thorax pro receptione rostri canaliculatus. — Genus 585. . . . .

1.

SECTIO II.

Antennæ 10-vel 9-articulatæ. — Gen. 586-589.

DIVISIO IV. — CIONIDES.

Antennæ breviusculæ; funiculus 5-articulatus; clava 3-vel 4-articulata. Pedes antici basi aut approximati, aut distantes. — Gen. 586-589. . . . .

103.

SECTIO III.

Antennæ 10, 9, 8, 7-articulatæ. (Funiculus variat numero articulorum, in plerisque 6, 7 et in nonnullis 4 et 5.) — Gen. 590-631.

*Transp.* . . .

6300.

(1) Ex. gr. species nonnullæ inter genera *Ithyporus* et *Strongylopterus*.

	SPECIES enumeran- dæ.
<i>Transp.</i> . . .	6300.
<b>DIVISIO I. — CAMPYLOSCELIDES.</b>	
Antennæ mediocres; funiculus 7-articulatus; clava sub-solidâ, indistincte articulata. Rostrum deflexum, teres. Pedes antici basi distantes, tibiæ curvatæ. — Genus 590-592. . . . .	4.
<b>DIVISIO II. — RHYNCHOPHORIDES. (<i>Calandrides</i>. FABR.)</b>	
Antennæ mediocres, funiculus 6-, in nonnullis 5-articulatus; clava aut bi- aut indistincte articulata, sub-solidâ. Rostrum aut deflexum, aut porrectum. — Gen. 593-619.	228.
<b>SUBDIVISIO I. — (CRYPTOPYGI.)</b> Antennæ versus medium rostri insertæ. Pygidium elytra tegunt. — Gen. 593-597.	
<b>SUBDIVISIO II. — (GYMNOPYGI.)</b> Antennæ versus basin rostri insertæ; funiculus semper 6-articulatus. Pygidium nudum, seu ab elytris non tectum. — Gen. 598-619.	
<b>DIVISIO III. — COSSONIDES.</b>	
Antennæ breves; funiculus 7-articulatus; clava vel indistincte articulata, aut sub-solidâ, apice semper spongiosa. Rostrum deflexum. Pygidium elytra tegunt. Abdominis segmenta duo prima multo longiora, ante juncta, ægre discernenda. Pedes antici basi distantes. — Gen. 620-630.	115.
<b>DIVISIO IV. — DRYOPHORIDES.</b>	
Antennæ breves; funiculus 4-articulatus. Rostrum sub-deflexum. Pygidium ab elytris tectum. — Gen. 631. . .	4.
Tota familia continet species huc enumeratas. . .	6651.
<b>ADDENDA.</b> — <i>Curculionides</i> ab entomologis variis descripti, incert. divisionis et generis; species mihi invisæ. . . . .	234.
<i>Novæ species indscriptæ</i> , mihi cognitæ. . . . .	256.
<i>Summa summarum.</i> . . .	7141.

# CONSPECTUS

## REGIONUM ORBIS TERRARUM,

SEU

DISTRIBUTIONIS GEOGRAPHICÆ CURCULIONIDUM NOBIS COGNITORUM,  
SECUNDUM LATITUDINIS GRADUS.

Quanti momenti sit hunc exhibere conspectum, neminem naturæ studiosum fugere potest. Multum entomologiæ cultorum interesset, si conspectus hic etiam gradus longitudinis respiceret, quod vero mihi permagnæ difficultatis esse videtur. Quum enim, ex mea sententia, nullæ seu paucissimæ primitus eadem species exstent in antiquo æque ac in novo orbe terrarum, nulla talis comparatio inter has terrarum partes fieri potest. Species enim, quæ eadem utrobique occurrunt, ab altera ad alteram orbis partem fortuito translatae ibique fortasse propagatae mihi videntur, ut species quædam *Spermophagi*, *Caryobori* et *Xylophagi* (ex gr. *Bruchus Pisi* et *Nucleorum*, *Spermophagus Cardui*, *Pissodes Pini*, Etc., etc.)

Quum hoc meum consilium cum Dom. Professore Doct. C. J. SUNDEVALL communicarem, ille auctor fuit, ut in regionibus terræ definiendis, quantum fieri posset, naturalem locorum indolem sequerer, ratione habita Alpium, jugorum montium, regionum tum sylvestrium, tum campestrium, idque eo magis faciendum putavit, quo certius constaret, climata, vel sub eadem latitudine, dissimillima sæpe esse, ideoque ea sæpe parum vel nihil similitudinis inter se habere, quæ in locis ejusdem latitudinis producit natura. Quanquam hæc omnia perbene intelligo et non possum non ex toto animo probare quæ doctissimus ille monuit amicus, prætereaque nullo modo dubito, quin res, hoc modo exposita, majoris foret utilitatis et ad judicia doctorum perfectius rectiusque de hac re formanda optime conduceret, hac tamen methodo uti non possum, quum termini locorum, in quibus habitant insecta, satis accurate et diligenter definiti persæpe non cogniti sint. De cætero illæ locorum notationes, quibus interdum uti necesse est, minus certam auctoritatem sæpe produnt; quæ enim ejusmodi in operibus tum immortalis memoriæ V. LINNÉ,

tum aliorum veterum auctorum exstant, sæpe ita manca sunt et imperfecta, ut ex. gr. id tantum scripserint: « habitat in Indiis », nulla addita explicatione, utrum de India orientali, an de occidentali, fortasse aliquando de Capite Bonæ Spei, China, Guinea hoc sit intelligendum. Recentiores etiam auctores, ex. gr. FABRICIUS, de multis speciebus novi orbis id tantum monent, eas habitare in America et ad summum in America meridionali vel America septentrionali, etc. Multa etiam, tum ab Entomologis tum a collectoribus minus rei peritis mecum communicata, loci notatione satis accurata caruerunt, quum ex. gr. Brasilia indicata non addatur, utrum in maritimis an in interioribus hujus vasti imperii regionibus, utrum in septentrionali an in meridionali ejus parte hæc insecta capta fuerint. Eodem modo indefinitum etiam fuit nomen Indiæ orientalis, quod confuse complectitur peninsulas Hindostam et Sericam, necnon Chinam Insulasque Indicas. Sæpe etiam contigit, præsertim temporibus a nostra ætate remotioribus, auctores per alium quemdam accepisse insecta a Naucleo, e China (nomine Indiæ orientalis vulgo significata) reduce, qui interdum insectum emerat vel ceperat alio quodam in loco, fortasse in Java vel Capite Bonæ Spei, et hac ratione habitatorem Indiæ orientalis hoc insectum appellatum. Verosimile habeo, hanc ob causam de *Naupacto rivuloso*, cujus generis speciebus 140 cognitis patria est America meridionalis, nullique speciei alia quædam pars orbis terrarum, FABRICIUM scripsisse: « habitat in India orientali », de multisque aliis insectis ejusmodi quiddam valere, persuasum mihi est.

Vitia tamen ejusmodi, ut potui, corrigere dubiaque solvere conatus sum; sed hanc ipsam ob rationem necesse habui orbem terrarum in pauciores quam vellem, partes describere, illamque tantum sequi normam quam exhibent gradus latitudinis; hos sequens, loca indicavi ex quibus majori quadam cum certitudine species mihi cognitæ sunt, reliquas vero seorsim et nomine incertæ regionis addito exhibui.

*Obs.* — Quum species eadem diversis in latitudinis gradibus occurrit, illam non solum loco, quo frequentissima sit, sed etiam ubi minus frequenter habitat, notavimus.

EUROPÆ.

REGIO 1. — <i>Europa frigida</i> : Lapponia, Russia europæa maxime borealis, Islandia cum ceteris regionibus ultra 66°, sed in Alpinis susque ad 64 gradum latitudinis. (Spitsbergen caret Coleopteris). . . . .	105
REGIO 2. — <i>Europa septentrionalis</i> : ut Scandinavia propria, præter regionem frigidam; Finlandia, Dania, Scotia, Russia septentrionalis et intermedia, etc. 66°-55° latitudinis. . . . .	339
Species mihi incognitæ, et ex Auctorum confusis descriptionibus non determinandæ. . . . .	15
REGIO 3. — <i>Europa media</i> : Anglia, Irlandia, Gallia septentrionalis et intermedia, Helvetia, Hollandia, Belgia; Germania ut Pomerania, Borussia, Saxonia, Bohemia, Bavaria, Austria, Illyria, Hungaria; Polonia, Galizia; Russia meridionalis, Wolhynia, Podolia, Bessarabia (Odessa). 55°-46°. . . . .	1048
Species mihi incognitæ. . . . .	80
REGIO 4. — <i>Europa meridionalis</i> : Hispania, Lusitania, Gallia meridionalis, Lombardia, Croatia, Dalmatia, Italia, Sicilia, Sardinia, Tauria, Græcia, Turcia europæa, etc. 46°-36°. . . . .	743
Species mihi incognitæ. . . . .	20
REGIO 5. — <i>Europa</i> : incertæ regiones. . . . .	9
Species mihi incognitæ. . . . .	18

ASIÆ.

REGIO 1. — <i>Asia frigida</i> : Sibiria borealis, Kamtschatka tota cum ceteris terris supra 55° latitudinis. . . . .	3
REGIO 2. — <i>Asia media</i> : Asia minor vel Turcia Asiatica, Anatolia, Insulæ Cyprus, Rhodus, etc. ;	

Syria, Persia septentrionalis et occidentalis, Caucasus, Georgia vel Iberia (Tiflis); Astrachan (Kislar, Orenburg), Armenia, Bucharia, Regio Altaica, Campi Kirgisici, Turcomania, littus orientale Maris Caspici), Tataria magna, Mongolia, Sibiria meridion. occident. et orient., (Irkutsk, Dauria, Barnaul, Kolyvan), Thibet, Mandschuria vel China septentrionalis cum Insulis Curilis. 55°-30° septentr. latitud. . . . .

539

REGIO 3. — *Asia meridionalis* : Arabia, Persia meridionalis, India propria seu India orientalis ad Peninsulam ultra Baramputtram, Himalaya, Assam, Hindostan, Nepaul, Bengalia, Bombay, Goa, Madras, Tranquebar, Pondicherry; Serica ut Siam, Cochinchina, etc.; China meridionalis. 30°-10° septentr. latit. . . . .

116 }

Species mihi incognitæ. . . . .

3 }

REGIO 4. — *Asia insularis*, seu Insulæ indicæ: ut Ceylon, Java, Sumatra, Philippinæ, Borneo, Celebes, Moluccæ ut Banda, Amboina, etc.; Peninsula Malacca, etc., etc. 10°-10° latitud. merid. et septentrionalis. . . . .

204 }

Species mihi incognitæ. . . . .

7 }

REGIO 4-5. — *India orientalis* : incertæ regiones. . . . .

9 }

Species mihi incognitæ. . . . .

2 }

REGIO 5. — *Asia maxime orientalis* : Japonia cum Peninsula Korea. 45°-30° septentr. latitud. . . . .

6

## AUSTRALIÆ.

REGIO 1. — *Ulimaroa vel Nova Hollandia*. 10°-40° latitud. meridionalis. . . . .

219 }

Species mihi incognitæ. . . . .

8 }



SPECIES  
enumeran-  
de.

REGIO 2. — <i>Austral. Papuensis</i> : Nova Guinea et insulæ adjacentes, ut Insul. Hebrides, Navigatorum, Societatis (Otaïiti), etc., usque ad novam Caledoniam. 0°-24° latitud. meridionalis. . . . .	33
REGIO 3. — <i>Polynesia propria</i> , s. Insulæ parvæ, sparsæ, ut Marianæ, Carolinæ, etc. . . . .	3
REGIO 4. — <i>Terra van Diemenii</i> . — 41°-44° latit. merid.	10
REGIO 5. — <i>Nova Zelandia sola</i> . 35°-47° latit. merid.	7
Species mihi incognitæ. . . . .	6
AFRICÆ.	
REGIO 1. — <i>Africa septentrionalis</i> : Barbaria, Ægyptus inferior (Alexandria), etc. 38°-30° latitud. septentrionalis. . . . .	107
Species mihi incognitæ. . . . .	1
REGIO 2. — <i>Insulæ occidentales</i> : Promontorii viridis, Canaricæ, Azoricæ. 39°-25° latitud. septent.	9
REGIO 3. — <i>Africa æquinoctialis</i> : Senegallia, Senegambia (Sierra Leona), Ægyptus superior, Nubia, Dongola, Æthiopia interior, Abyssinia, Kordofan, etc. 30°-10° latitud. septentrionalis. . . . .	114
Species mihi incognitæ. . . . .	1
REGIO 4. — <i>Africa meridionalis s. tropica</i> : ut Guinea, Benin, Loango, Congo, Angola, Benguela; Mozambique, Zanguebar, Adel, Ajan, etc. 10° septentr. 15° meridionalis latitudinis . . . . .	56
Species mihi incognitæ. . . . .	2
REGIO 5. — <i>Africa maxime meridionalis</i> : Regio Capensis, Caffraria, Namaqua. 15°-36° meridionalis latitud. . . . .	866
Species mihi incognitæ. . . . .	8
REGIO 6. — <i>Madagascar, cum Insulis Mascarinis</i> : ut Ile	

	SPECIES enumeran- da.
de France, Ile de Bourbon, etc., Insula St.-Helena. 12°-25° meridion. latitud. . . . .	159 } 9 }
AMERICÆ.	
<b>REGIO 1.</b> — <i>America frigida, vel terræ polares septentrio- nales</i> : Groenlandia, Labrador et cæteræ regiones supra 50° septentrionalis latitu- dinis. (Unalaschka). . . . .	3
<b>REGIO 2.</b> — <i>America septentrionalis orientalis</i> : Canada, Civitates s. d. liberæ, ut Pennsylvania, etc.; Florida, præter peninsulam ejusdem no- minis. 50°-30° septentr. latitudinis. . . . .	260 } 4 }
<b>REGIO 3.</b> — <i>America septentrionalis occidentalis</i> : 55°-30° latitud. inter Oceanum pacificum et mon- tes petrosos; peninsula Alaschka, Nootka, Sitka, Oregon, Nova Albion, Nova Cali- fornia, etc. . . . .	95
<b>REGIO 3-4.</b> — <i>America septentrionalis</i> : incertæ regiones. . . . .	19 } 4 }
<b>REGIO 4.</b> — <i>America media</i> : California, Mexico, Guati- mala (Honduras), Columbia, Nova Gra- nada, Caracas, Guyana, vel Cayenna, Su- rinam. 30°-0° latitud . . . . .	726 } 17 }
<b>REGIO 5.</b> — <i>America insularis s. India occidentalis</i> : Insulæ Caraibicæ, Antillæ, ut Cuba, Jamaica, St.-Domingo, Porto-Rico, Bahama cum peninsula Florida. 12°-30° septentrionalis latitudinis. . . . .	292 } 7 }
<b>REGIO 6.</b> — <i>America meridionalis propria</i> : Peru, Lima, Bolivia, Brasilæ pars septentrionalis et in- terior, ut Para, Mattogrosso, Minas Geraes,	

	SPECIES enumeran- da.
Bahia, Rio-Janeiro, etc., fere ab æquatore ad latitud. meridionalis 24°. . . . .	554
REGIO 6-7. — <i>Brasilia</i> : incertæ regiones. . . . .	739 } 3 }
Species mihi incognitæ. . . . .	
REGIO 7. — <i>America Platensis</i> , vel <i>Campestris meridionalis</i> : Paraguay, Tucuman, Brasiliæ pars meri- dionalis, Rio-de-la-Plata (1) (Buenos- Ayres, Montevideo, Maldonado); Chili (Valparaiso), littus occidentale cum Al- pibus Andicis, etc. 24°-40°. . . . .	77
REGIO 7-8. — <i>America meridionalis</i> : incertæ regiones.	161 } 6 }
Species mihi incognitæ. . . . .	
REGIO 8. — <i>America maxime meridionalis</i> : Patagonia, Terra del Fuego, Insulæ Falklandi et cæt. infra 40° latit. meridionalis. . . . .	1

Ut diversæ terræ partes diversa animalia habent, et ex inde phy-  
siognomia, ut ita dicam, terræ vel regionis diversa et caracte-  
ristica est, ita etiam *Genera Curculionidum* a nobis descripta, in  
plagis seu regionibus terræ, quas in *Conspectu* antecedente consti-  
tuimus, latiora vel angustiora loca occupant, ideo heic sequentes  
*tabulas*, genera, quæ in unaquaque regione, ut novimus, præcipue  
occurrunt, continentes, addimus.

---

(1) Campi immensi, aridi, silvis plerumque destituti; climate majoris partis  
validiore, varietate minore naturæ organicæ ornatæ.

# MANTISSA CURCULIONIDUM

48U

DESCRIPTIONES NOVORUM QUORUMDAM GENERUM ET SPECIERUM  
CURCULIONIDUM QUOS, IN EXCUDENDO HOC OPERE,  
NACTUS SUM, HEIC ADDO.

GENUS 3-4. — DIAPHANOPS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ longiusculæ, articulis obconicis.

Oculi hemisphærici.

Thorax oblongus, basi apiceque truneatus, apicem versus angustior.

Elytra oblongo-ovata, pygidio breviora, humeris obtuse angulatis.

Femora postica maxima, inflata, subtus bi-dentata, in margine posteriore denticulata.

DESCRIPTIO. — *Corpus* oblongo-ovatum, modice convexum, dense pubescens, alatum; mediæ magnitudinis. — *Antennæ* longitudine dimidii corporis, mox infra oculos insertæ, sub-tenues, rectæ, flexuosæ, 11-articulatæ: articulis duobus basalibus, breviusculis, reliquis longiusculis, sub-æqualibus, omnibus obconicis. — *Caput* oblongum, pone oculos leviter coarctatum, basi collo formante. — *Rostrum* oblongum, lineare. — *Oculi* laterales, rotundati, valde prominuli, majusculi. — *Thorax* latitudine baseos dimidio longior, basi apiceque truncatus, lateribus vix rotundato-ampliatus, versus apicem angustior, angulis anticis, rotundatis, posticis acutis; supra modice convexus. — *Scutellum* mediocre, sub-triangulare, apice obtuse rotundatum. — *Elytra* oblonga, sub-ovata, thoracis basi duplo latiora illoque triplo longiora, humeris obtuse angulatis; ad latera sub-recta, apice obtusa, singulatim sub-rotundata, supra modice convexa. — *Pygidium* nudum, semi-rotundatum, supra deplanatum. — *Pedes* mediocres; femoribus clavatis, posticis paulo longioribus, valde incrassatis, subtus in margine posteriore denticulatis, in medio dente minore et versus apicem dente valido armatis; tibiis ante-

rioribus rectis, apicem versus sensim incrassatis, posterioribus basi arcuatis; tarsis, tibiis parum brevioribus, sub-linearibus, articulo ultimo clavato, bi-unguiculado.

A διαφανής, perlucidus; ὠψ, oculus.

TYPUS. — *Diaphanops Westermanni*; ex Australia.

\* 1. D. WESTERMANNI. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, tomento brevi, depresso, cinereo vestitus; thorace angusto, subtiliter confertim punctulato, lateribus ante medium nonnihil rotundato-ampliato; elytris subtiliter confertim punctulatis, posterius obsolete striatis.*

*Patria*: Australia occidentalis. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Statura fere *Sagræ*. Longit. 6; lat. 3 lin. Caput oblongum, pone oculos leviter coarctatum, supra parum convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, parce cinereo-tomentosum; oculi laterales, rotundati, prominuli, nigri; rostrum longitudine et latitudine capitis, deplanatum, supra planum, rectum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, nitidum, apicem versus denudatum. Antennæ longitudine dimidii corporis, sub-tenues, rectæ, nigræ, parce pilosæ. Thorax angustus, latitudine postica longior, basi apiceque truncatus, antè angustior, lateribus ante medium nonnihil rotundato-ampliat; postice leviter reflexo-marginatus, supra modice convexus, subtiliter creberrime punctulatus, niger; sub-nitidus, tomento brevi, depresso, cinereo, dorso parcius, lateribus densius obsitus. Scutellum mediocre, sub-triangulare, concolor. Elytra antice thoracis basi plus duplo latiora, conjunctim leviter emarginata, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, a medio apicem versus angustata, apice obtuse singulatim sub-rotundata, thorace triplò longiora, supra modice convexa, basi et ante medium transversim leviter impressa, subtiliter confertim punctulata, posterius obsolete striata, nigra, sub-nitida, tomento depresso, griseo vestita. Pygidium sub-triangulare, punctulatum, parce tomentosum. Corpus subtile nigrum, vix punctulatum, cinereo-tomentosum. Pedes mediocres, nigri, cinereo-tomentosi; femoribus posticis valde incrassatis, subtus in margine exteriorè denticulatis, in medio dente minore et versus apicem dente valido armatis; tibiis anterioribus rectis, piceis, posticis basi arcuatis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 11. — BRACHYTARSUS. *Nobis.* — Huj. op. V. p. 166.

LABRAM. et IMHOFF. *Gen. Curc.* I. V.

\* 2-3. B. AREOLATUS. (*Walll.*) — *Sub-ovatus, niger, pube grisea inæqualiter obsitus; antennis basi testaceis, thorace amplo, confertim ruguloso-punctato, apice rotundato-producto, basi sub-truncato, reflexo-marginato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim ruguloso-punctatis, alternis obsolete obtuse tuberculatis.*

*Patria* : Sicilia. DD. GERMAR et MÉNÉTRIÉS. Mus. SCHH.

*Brachytarso scabroso* dimidio major. Caput deflexum, latum, planum, confertim ruguloso-punctatum, nigrum, parce griseo-pubescentis; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius, latum, apicem versus angustatum, deplanatum, supra planum, colore et punctura capitis. Antennæ vix longitudine thoracis, tenues, testacæ; clava magna, oblongo-ovata, compressa, nigra, articulo ultimo acuminato. Thorax latitudinè baseos nonnihil brevior, apice rotundato-productus, anterior nonnihil angustior, lateribus modice rotundato-ampliatis; basi sub-truncatus, reflexo-marginatus, angulis posticis retrorsum nonnihil productis; supra convexus, confertim ruguloso-punctatus, niger, pube grisea inæqualiter adpersus. Scutellum minutum, rotundatum, nigrum, dense griseo-squamosum. Elytra antice leviter sinuata, ibique thoracis basi fere angustiora, humeris non elevatis, oblique angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace dimidio longiora, supra convexa, postice declivia, subtiliter punctato-striata, interstitiis planis, confertim ruguloso-punctatis, alternis remote obsolete obtuse tuberculatis; nigra, parce inæqualiter griseo-pubescentia. Pygidium rotundatum, concolor. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, parce pubescens. Pedes breviusculi, nigri, parce cinereo-pubescentes; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis rectis, basi tenuioribus. — BHN.

GENUS 14. — PILOEOTRAGUS. *Nobis.* — Huj. op. V. p. 173.

LABRAM. et IMHOFF. *Gen. Curc.* I. IV.

♀ 5-6. P. IMHOFFI. (*Schh.*) — *Elongatus, niger, tomento cervino tectus; rostro apicem versus utrinque late profunde impresso; tho-*

*race brevior, latiore, dorso bi-foveolato, basin versus non angustato, postice transversim carinato; elytris remote seriatim punctatis, plaga laterali media sub-triangulari apiceque fusco-tomentosis.*

*Phlœotragus Heros.* LABRAM. et IMHOFF. *Gen. Curc.* I. IV. Tab. 25.

*Patria:* Guinea. Dom. IMHOFF. Mus. SCHH.

**Statura et affinitas** *Phlœotragi Heros*; rostro apicem versus utrinque profunde lateque impresso, thorace brevior, latiore, posterius vix angustato, ab illo tamen facile distinctus. Caput latum, parum convexum, nigrum, vix punctatum, tomento depresso, cervino dense vestitum, medio linea denudata instructum; oculi sub-rotundati, prominuli, nigro-brunnei; rostrum capite nonnihil angustius et illo fere duplo longius, porrectum, robustum, apice ampliatus, profunde emarginatum, supra planum, apice utrinque profunde lateque impressum, nigrum, similiter ac caput tomentosum. Antennæ nigræ, parce pubescentes; clava elongata, compressa, acuminata, atro-holosericea. Thorax latitudine baseos parum longior, antice nonnihil angustior, basi apiceque truncatus, lateribus pone medium rotundato-ampliatus, dein posterius modice angustatus, postice marginatus, ante basin striga fere recta, elevata, utrinque ultra medium laterum procurrente; supra parum convexus, in disco foveolis duabus oblongis insculptus; totus niger, opacus, tomento cervino dense tectus. Scutellum minutum, rotundatum, nigrum, cervino-tomentosum. Elytra elongata, linearia, antice thorace paulo latiora et illo fere triplo longiora, basi simultaneæ leviter emarginata, elevato-marginata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, supra parum convexa, dorso fere plana, regulariter remote parum profunde seriatim punctulata, nigra, cervino-tomentosa, singulo in medio plaga magna sub-triangulari apiceque fusco-tomentosis. Pygidium breve, semi-rotundatum, medio impressum, utrinque cervino-tomentosum. Corpus subtus nigrum, vix punctatum, tomento læte cervino vestitum. Pedes mediocres, nigri, cinereo-variegati; femoribus modice incrassatis, muticis; tibiis rectis, medio apiceque cinereo-annulatis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 14-15. — DEUTEROCRATES. *Imhoff.*

*Character generis.* — Antennæ maris longissimæ, in femina plus dimidio breviores, filiformes, apice haud crassiores; articulo

1° brevi, crassiusculo, sub-ovato, reliquis longis, apice subito incrassatis.

Rostrum breve, supra impressum, apice emarginatum.

Oculi rotundati, valde prominuli.

Thorax oblongus, sub-ovatus, antice nonnihil constrictus, supra depressus, longe ante basin striga elevata, transversa, ad latera antrorsum continuata, notatus.

Elytra elongata, linearia, dorsi disco depressa.

DESCRIPTIO. — Corpus majusculæ magnitudinis, elongatum, sub-lineare, paulo convexum, alatum, tomento brevi dense tectum. — *Antennæ* in mare corpore triplo longiores, in femina corporis longitudinem æquantes, versus apicem rostri in fovea profunda insertæ, infractæ, 11-articulatæ: articulo 1° brevi, crassiusculo, sub-ovato, 2-11 longis, tenuibus, sub-linearibus, apice cito incrassatis, omnibus sub-æqualibus, ultimo etiam lineari, sub-acuminato. — *Caput* parum convexum, in medio linea elevata præditum. — *Rostrum* capite nonnihil angustior eoque vix brevius, deflexum, deplanatum, supra impressum, apice profunde rotundato-emarginatum. — *Oculi* laterales, hemisphærici. — *Thorax* latitudine baseos nonnihil longior, basi apiceque leviter introrsum emarginatus, lateribus æqualiter perparum rotundato-amplius, anterieus sensim paulo attenuatus, sub-constrictus, postice sub-elevato-marginatus, longe ante basin striga transversa, elevata, ad latera sub-angulata, antrorsum flexa notatus; supra depressus, inæqualis. — *Scutellum* parvum, apice rotundatum. — *Elytra* thorace basi dimidio latiora illoque duplo longiora, sub-linearia, antice conjunctim introrsum leviter emarginata, margine vix elevata, lateribus sub-recta, humeris obtuse angulatis; apice obtuse rotundata, dorsi disco sub-depressa. — *Pygidium* deflexum, apice rotundatum. — *Pedes* elongati, antici paulo longiores; tarsi articulo 1° secundo longiore.

TYPI. — *Deutero crates nebulosus*; e Guinea.

Obs. — Genus hocce, quoad habitum, generi *Phlæotrigo* proximum, sed differt antennis tenuioribus, articulis aliter constructis, tribus ultimis haud crassioribus, capite carinato, rostro brevioris, etc.

♂♀ 1. D. NEBULOSUS. (*Labram.* et *Imhoff.*) — *Elongatus*, niger, tomento brevi, late cervino inæqualiter obsitus; rostro lato, basi utrinque impresso; thorace sub-depresso, dorso longitudinaliter



*hi-impreso, lateribus sub-recto; elytris sat crebre punctato-striatis, interstitiis sub-convexis.*

*Mas*: duplo major; antennis corpore triplo longioribus, nigris; fronte rostroque basi carinatis; thorace latiore, evidenter impresso.

*Femina*: minor; antennis longitudine corporis, albo-annulatis; thorace angustiore, obsolete impresso.

*Deuterochrates nebulosus*. LABRAM et IMHOFF. *Gen. Curc.* I. VI. Tab. 41. et I. X. Tab. 73.

*Patria*: Guinea. DOM. IMHOFF. MUS. SCHH.

Habitus fere *Phloeotrugi Heros*. Mas illo tamen plus dimidio major. Caput latum, supra parum convexum, subtiliter confertim rugoso-punctatum, nigrum, tomento brevi, læte cervino tectum; fronte rostroque basi carinatis; oculi sat magni, prominuli, rotundati, nigri; rostrum longitudine et fere latitudine capitis, crassum, sub-rectum, supra planum, basi sat profunde impressum, apice ipso triangulariter emarginatum; totum nigrum, ruguloso-punctatum, læte cervino-squamosum. Antennæ tenues, in mare nigræ, in femina piceæ, articulis basi cinereo-albido-tomentosis. Thorax latitudine postica dimidio longior, basi apiceque truncatus, antè perparum angustior, leviter constrictus, lateribus rectis; postice marginatus, ante basin striga transversa, in medio breviter interrupta, elevata, utrinque fere ad apicem laterum procurrente; supra fere planus, dorso longitudinaliter hi-foveolatus, foveola postica majore; sat crebre ruguloso-punctatus, niger, tomento læte cervino inæqualiter obsitus. Scutellum parvum, breve, apice rotundatum, dense silaceo-tomentosum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, tenue reflexo-marginata, thoracis basi vix dimidio latiora, humeris haud elevatis, obtuse rotundatis; lateribus linearia, apice ipso conjunctim rotundata, ad suturam breviter mucronata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, basi transversim leviter impressa, subtiliter sat crebre punctato-striata, interstitiis sub-convexis, confertim subtiliter rugulosis; nigra, sat crebre inæqualiter læte cervino-tomentosa, setulis brevissimis, albidis adspersa. Corpus subtus nigrum, læte cervino-tomentosum, pectore ad latera punctis nonnullis impresso. Pedes elongati, nigri, parcius læte cervino-squamosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apicem versus nonnihil incrassatis; tarsis elongatis, subtus haud spongiosis. — BIN.

GENUS 19. — ISCHNOCERUS. *Nobis.* — Huj. op. V. p. 191.

♂♀ 1-2. I. MUSTELLINUS. (*Klug.*) — *Oblongus, niger, pube albida et læte cervina inæqualiter obsitus; rostro plano, apice ampliato; thorace confertim rugoso-punctato, dorso utrinque impresso, obtuse bi-tuberculato; elytris subtiliter punctato-striatis, singulo basi tuberculo obtuso fasciculisque plurimis dorsalibus instructo; humeris elevatis; femoribus basi tibiisque medio fusco-annulatis.*

*Mas*: major; antennis fere longitudine corporis; rostro longiore, thorace evidenter impresso.

*Femina*: minor; antennis longitudine dimidii corporis; rostro brevior, thorace obsoletius impresso.

*Patria*: Columbia. DOM. SCHUPPEL. MUS. SCHH.

*Mas* magnitudine minorum *Platyrhini latirostris*; femina duplo minor. Caput latum, deflexum, subtiliter ruguloso-punctatum, nigrum, dense albo-pubescent, utrinque supra oculos macula cervina decoratum; oculi oblongi, prominuli, brunnei; rostrum in mare capite dimidio longius, in femina brevius, crassum, rectum, versus apicem ampliatur, supra planum, ruguloso-punctatum, nigrum, supra albo-tomentosum. Antennæ tenues, obscure testaceæ; clava oblonga, atra. Thorax latitudine baseos nonnihil longior, basi apiceque truncatus, antè angustior, pone medium sub-angulato-ampliatum, supra parum convexus, dorso utrinque longitudinaliter impressus, in medio dorsi tuberculis duobus obtusis, fasciculatis, et longe ante basin striga transversa, elevata, ad latera flexuosa et nonnihil continuata, instructus; niger, dorso dense albo-, lateribus parce inæqualiter cervino-tomentosus. Scutellum parvum, rotundatum, albo-tomentosum. Elytra antice conjunctim vix emarginata, reflexo-marginata, thoracis basi duplo latiora, humeris elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, utrinque leviter sinuata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, parum profunde punctato-striata, interstitiis haud convexis, coriaceis; nigro-picea, pilis helvolo-cinereis præsertim dorso obsita, basi tuberculo valido, obtuso, fasciculato et dorso fasciculis plurimis, numero situ ac magnitudine inæqualibus instructa. Pygidium sub-quadratum, apice fere truncatum, ferrugineum, cinereo-pubescent. Corpus subtus nigrum, nitidum, punc-

tatum, tomento flavo-ochraceo inæqualiter obsitum. Pedes elongati, validi; femoribus clavatis, nigris, apice rufescentibus, annulo e pube helvolo-grisea cinctis; tibiis rectis, nigris, similiter annulatis; tarsis elongatis, ferrugineo-variegatis. — BHN.

\* 3. I. FASCICULATUS. (Schh.) — *Oblongus, niger, subtus cinereo-tomentosus; rostro lato, apice non ampliato, basi impresso; thorace amplo, convexo, confertim rugoso-punctato, antè nonnihil angustato; elytris subtiliter punctato-striatis, dorso vitta communi, inæquali, helvolo-grisea, fasciculis nonnullis atris instructis.*

*Patria*: Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Magnitudo *Ischnoceri nigelli*; rostro latiore, apicem versus haud ampliato, thorace latiore, non impresso, ab illo mox distinctus. Caput latum, deflexum, supra parum convexum, confertim ruguloso-punctatum, nigrum, sub-nitidum, pube cervina parce inæqualiter obsitum; oculi oblongi, modice prominuli, nigro-brunnei; rostrum longitudine et latitudine capitis, fere lineare, rectum, depressum, supra planum, basi impressum, subtiliter confertim rugoso-punctatum; colore capitis. Antennæ dimidio corpore nonnihil longiores, tenues, obscure testaceæ; clava oblonga, obscuriore. Thorax latitudine postica brevior, basi apiceque truncatus, antè nonnihil angustior, lateribus sub-obliquis; supra convexus, subtiliter confertim rugoso-punctatus, procul basin striga transversa, elevata, ad latera flexuosa et nonnihil continuata, instructus; niger, sub-opacus, antice maculis tribus e pube cervina decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, albotomentosum. Elytra antice sub-truncata, tenuiter reflexo-marginata, thoracis basi vix latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, parum profunde et concinne punctato-striata, interstitiis parum convexis, subtiliter coriaceis; nigra, parum nitida, dorso vitta communi, inæquali, versus apicem extensa, helvolo-cinereo-tomentosa insignita, fasciculis nonnullis atris instructa. Pygidium breve, apice rotundatum, helvolo-tomentosum. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, cinereo-tomentosum. Pedes mediocres, nigri, parce cinereo-tomentosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis elongatis; unguibus ferrugineis. — BHN.

GENUS 23. — ANALOTES. *Nobis.* — Huj. op. V. p. 198.

♂♀ I. A. DISCOIDEUS. (*Klug.*) — Huj. op. V. p. 199. 1.

LABR. et IMH. *Gen. Curc.* I. VIII. Tab. fig. ♂♀.

*Mas* : huj. op. I. c. descriptus. — *Femina* : nunc lustrata ab illo differt : antennis crassioribus, dimidio corpore longioribus, cæterum simillima.

GENUS 24. — GYMNOGNATHUS. *Nobis.* — Huj. op. V. p. 200.

LABR. et IMH. *Gen. Curc.* I. V.

\* 2-3. G. MÉNÉTRIÉSI. (*Schh.*) — *Elongatus, niger, umbrino-tomentosus; linea supra-oculari, rostro medio, vitta dorsali thoracis, scutello, elytris plaga communi utrinque bi-apice uni-emarginata, punctis tribus intra-marginalibus apiceque niveo-pubescentibus, plaga dorsali antica, maculam parvam et in medio alteram communem, umbrinas, includente, decoratis; pygidio apice obtuse rotundato, marginato, utrinque atro-maculato.*

*Patria* : Brasilia. DOM. MÉNÉTRIÉS. MUS. SCHH.

Statura et affinitas *Gymnognathi Ancoræ*, sed duplo major, aliter coloratus; thorace latiore, pygidio apice rotundato, ab illo facile dignoscitur. Caput breve, latum, supra modice convexum, subtiliter crebre coriaceum, nigrum, parce umbrino-tomentosum, linea oculari et subtus dense niveo-pubescentibus; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum latitudine capitis et illo parum angustius, lineare, rectum, depressum, supra planum, apice triangulariter leviter emarginatum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, obsolete carinatum, nigrum, medio niveo-tomentosum. Antennæ ultra thoracis medium pertingentes, subtenues, nigrae; clava ovata, compressa. Thorax latitudine postica parum brevior, anterie paulo angustior, apice truncatus, lateribus sub-rectis, nonnihil obliquis; basi sat profunde bi-sinuatus, et intra basin striga elevata, fere recta, transversa, angulatim ad latera flexa et fere ad medium continuata, instructus; supra modice convexus, subtiliter confertim coriaceus, niger, tenuiter umbrino-pubescentis, vitta dorsali posteriorius ampliata et signaturis nonnullis lateralibus dense niveo-tomentosis decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, dense niveo-tomentosum. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, thoracis basi paulo latiora, humeris

obtusè angulatis, non elevatis; lateribus apicem versus perparum angustata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso sub-plana, obsolete striata, in striis subtilissime punctulata; nigra, tenuiter umbrino-tomentosa, vitta communi, lata, a basi longe ultra medium continuata, utrinque bi-apice uni-emarginata, antè maculam parvam et in medio alteram communem, umbrinas includente, macula apicali punctisque tribus lateralibus, niveo-pubescentibus. Pygidium descendens, oblongum, elevato-marginatum, apice obtusè rotundatum, niveo-tomentosum, basi utrinque macula atra insignitum. Corpus subtus vix punctatum, nigrum, sub-nitidum, inæqualiter niveo-tomentosum. Pedes nigri, albo-pubescentes. — BHN.

GENUS 26. — TROPIDERES. Nobis. — Huj. op. V. p. 206.

LABR. et IMH. Gen. Curc. I. VI.

\* 12-13. T. NASUTULUS. (Schh.) — Oblongo-ovatus, niger, supra pube albida variegatus, subtus vestitus; rostro longiore, basi coarctato; thorace confertim punctulato, scutello niveo-tomentoso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, subtilissime coriaceis.

Patria: Port Natal. DOM. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Magnitudo, statura et similitudo *Tropideris undulati*, aliter coloratus; rostro longiore ab illo mox distinctus. Caput deflexum, latum, modice convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, brunneo-pubescentem, circa oculos niveo-tomentosum; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite dimidio longius, infra oculos coarctatum, extrorsum ampliatus, rectum, depressum, apice leviter emarginatum, supra planum, confertim subtiliter sub-rugoso-punctatum, nigrum, basi pube albida obsitum. Antennæ ultra thoracis medium pertingentes, sub-tenues, nigrae, parce pilosae; clava ovata, sub-compressa, densius pubescente. Thorax latitudine postica vix brevior, basi apiceque truncatus, antè angustior, lateribus ultra medium obliquis, dein versus basin iterum nonnihil angustatis; supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, medio transversim leviter impressus, intra basin striga transversa, elevata, sub-recta, versus margines tantummodo nonnihil antrorsum arcuata; subtiliter confertim punctulatus, niger, tomento albido inæqualiter variegatus. Scutellum parvum, rotundatum, dense niveo-tomentosum.

*Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thorace paulo latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus nonnihil inflexa, non ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace vix duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis subtiliter confertim punctulatis; tota nigra, tomento albido variegata. Pygidium sub-triangulare, apice obtuse rotundatum, punctulatum, nigrum, albido-pubescent. Corpus subtile nigrum, subtilissime punctulatum, pube densa, albida vestitum. Pedes mediocres, nigri, cinereo-tomentosi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apicem versus nonnihil incrassatis. — BHN.*

GENUS 28. — CRATOPARIS. — *Dejean.* — Huj. op. V. p. 217.

\* 10-11. C. CERODERES. (*Schl.*) — *Oblongo-ovatus, convexus, piceus, pube silacea obsitus; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis, rostro lato, lineari; thorace subtiliter punctulato, medio tuberculo valido instructo; elytris tenuiter punctato-striatis, macula magna, rotunda, communi, umbrino-marginata ornatis; dorso atro-fasciculatis.*

*Patria: Nova Hollandia? Dom. HOPE. Mus. SCHH.*

*Brachytarso scabroso magnitudine æqualis. Caput sub-quadratum, supra parum convexum, confertim subtiliter rugoso-punctatum, piceum, tomento silaceo dense obsitum; oculi rotundati, convexi, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, rectum, depressum, apice emarginatum, subtiliter confertim rugoso-punctatum, piceum, pube densa, silacea vestitum. Antennæ ad thoracis basin pertingentes, sub-tenuis, rufo-testaceæ, parce pilosæ; clava elongata, obscuriore. Thorax latitudine postica brevior, antice nonnihil angustior, truncatus, lateribus obliquis, basi leviter late sub-bi-sinuatus, margine sub-elevato, angulis lateribus prominulis, supra æqualiter modice convexus, creberrime subtilissime punctulatus, intra basin striga transversa, elevata, fere recta, ad latera arcuatim antrorsum nonnihil continuata; dorso medio tuberculo valido, sub-obtuso instructus, piceus, inæqualiter dorso antico tamen densius silaceo-tomentosus. Scutellum parvum, rotundatum, silaceo-tomentosum. Elytra antice leviter emarginata, thoracis basi haud latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim leviter emarginata, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subti-*

lissime coriaceis; rufo-picea, basi et margine dilutiora, inæqualiter silaceo-tomentosa, in medio dorsi macula magna, communi, rotunda, silacea, umbrino-marginata decorata, dorso tuberculis remotis, inæqualibus, atro-fasciculatis instructa. Corpus subtus punctulatum, nigro-piceum, silaceo-tomentosum. Pedes mediocres, cinereo-tomentosi; femoribus clavatis, nigris, muticis; tibiis tarsisque rufo-ferrugineis. — BHN.

\* 20. *C. FIGURATUS.* (Schh.) — *Oblongus, niger, supra tomento umbrino tectus; antennis testaceis, capite supra rostroque niveo-tomentosis; thorace brevi, medio obtuse valide bi-tuberculato, antice utrinque niveo-vittato; elytris dorso sub-planis, subtilissime punctato-striatis, ante medium litura communi M referente, niveo-tomentosa decoratis, fasciculis nonnullis concoloribus instructis.*

*Patria* : Bahia Brasilæ. DOM. COM. MANNERHEIM. MUS. SCHH.

Magnitudo *Cratoparis Zebrae*. Caput breve, parum convexum, subtiliter punctulatum, nigrum, supra niveo-tomentosum; oculi laterales, semi-globosi, nigro-brunnei; rostrum capite nonnihil brevius et angustius, apicem versus nonnihil angustatum, crassum, rectum, deplanatum, supra planum, basi transversim leviter impressum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, niveo-tomentosum. Antennæ breves, tenues, testacæ; clava elongata, compressa, atra. Thorax latitudine postica brevior, apice truncatus, anterieus angustior, lateribus sub-obliquis; basi bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, medio tuberculis duobus validis, obtusis instructus; niger, umbrino-tomentosus, anterieus utrinque vitta lata, obliqua, nivea decoratus. Scutellum parvum, sub-rotundatum, nigrum, umbrino-tomentosum. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, thoracis basi non latiora, humeris haud elevatis, obtuse angulatis; lateribus linearia, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso sub-plana, postice declivia, subtiliter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis; nigra, umbrino-tomentosa, ante medium litura nivea, fere ut litura M formata, et fasciculis nonnullis parvis, concoloribus, uno pone humeros, altero in medio, et tertio pone medium, instructa. Pygidium semi-rotundatum, punctulatum, brunneo-tomentosum. Corpus subtus subtilissime crebre punctulatum, nigrum, fere denudatum. Pedes mediocres, nigri, parce tomentosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, medio cinereo-annulatis. — BHN.

GENUS 43. — APODERUS. *Olivier.* — *Huj. op. V. p. 278.*

7-8. A. ASSAMENSIS. (*Schh.*) — *Rufo-testaceus, nitidus, glaber; antennarum clava nigra, capite elongato, obconico, rostro apice infuscato; thorace in disco pulvinate, lævi, basi striga transversa insculpto; elytris amplis, mediocriter striato-punctatis, pone basin transversim impressis, interstitiis secundo et tertio a sutura, antice elevatis.*

*Patria: Assam, Indiæ orientalis. Dom. WESTERMANN. Mus. SCHH.*

Statura et similitudo *Apoderi languidi*, dimidio tamen major, saturatius rufo-testaceus; antennarum clava tantum nigra, capite elongato, elytris profundius striato-punctatis, ab illo bene distinctus. Caput elongatum, obconicum, supra convexum, sub-læve; fronte sub-retusa, foveola media oblonga lineaque utrinque brevi, obliqua impressa; totum rufo-testaceum, nitidum, glabrum; oculi magni, semi-globosi, glauci; rostrum breve, crassum, basi nonnihil constrictum, obsolete sub-remote punctulatum, rufo-testaceum, ore nigricante. Antennæ breves, sub-tenuæ, testaceæ, parce pilosæ; clava elongata, acuminata, atra. Thorax parvus, sub-triangularis, latitudine baseos vix brevior, antice fere triplo angustior quam basi, apice sub-truncatus, transversim constrictus, lateribus obliquis; basi leviter bi-sinuatus, prope basin striga profunda, transversa insculptus, supra convexus, sub-lævis, medio tenuissime canaliculatus, rufo-testaceus, nitidus, glaber. Scutellum brevissimum, latum, concolor. Elytra ampla, antice sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris sub-elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, evidenter striato-punctata, pone basin transversim impressa, interstitiis planis, lævibus, secundo et tertio a sutura antice elevatis; tota rufo-testacea, nitida, glabra. Pygidium rotundatum, subtiliter punctulatum, rufo-testaceum, nitidum. Corpus subtus vix punctatum, pallidius testaceum, pectore utrinque stria et plaga cinereo-tomentosis insignito. Pedes longiusculi, rufo-testacei, nitidi; femoribus clavatis, muticis. — *BHN.*

\* 8-9. A. WESTERMANNI. (*Schh.*) — *Sanguineus, glaber, nitidus; antennarum clava nigra, capite brevior, convexo, postice minus attenuato, lævi; thorace latiori, sub-triangulari, convexo, antice*



*striga profunda constricto, medio tenuiter canaliculato; elytris bifariam crebre profunde punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis, singulo maculis duabus atris, una supra-humerali, altera mox ante medium disci notatis.*

*Patria* : BORNEO. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

*Apodero quadripunctato* proximus, illo nonnihil major; capite brevior, magis convexo, thorace breviori, canaliculato, elytris profunde crebre bifariam punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis ut et situ macularum, ab illo abunde differt. Caput breviter obconicum, thorace nonnihil brevius, posterius paulo angustatum, basi profunde anguste constrictum, supra valde convexum, sanguineum, nitidum, læve, glabrum; oculi semi-globosi, nigri, nitidi; rostrum breve, crassum, rectum, apice nonnihil ampliatum, sub-remote punctulatum, basi medio canaliculatum, sanguineum, nitidum, glabrum, apice ipso infuscatum. Antennæ capite breviores, ferruginæ; clava oblonga, acuminata, nigra. Thorax sub-triangularis, latitudine baseos nonnihil brevior, antice triplo angustior quàm basi, apice profunde emarginatus, margine elevato; intra apicem striga sat profunda constrictus, lateribus obliquis; basi sub-truncatus, intra basin striga simplici, profunda impressus, lobo postico elevatiori, striga tenui insculpto; supra in disco convexus, pulvinatus, lævis, tenuiter canaliculatus, sanguineus, nitidus, glaber. Scutellum breve, latum, apice rotundatum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, confertim sat profunde bifariam punctato-striata, interstitiis alternis elevatis, carinatis; sanguinea, sub-nitida, glabra, singulo maculis duabus rotundis, atris, una in ipso humero, altera mox ante medium in medio disci. Pygidium rotundatum, concolor, punctatum. Corpus subtus parum profunde, crebre punctulatum, testaceum, nitidum, glabrum. Pedes rufo-testacei, nitidi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, intus breviter crenulatis, apice parum inflexis.

ВЛН.

\* 16. A. NIGRIPENNIS. (Fabr.) — Sanguineus, nitidus, glaber; antennis extrorsum fuscis, capite brevior, convexo, tenuiter canaliculato, lævi, postice minus attenuato; thorace sub-convexo, medio

*obsolete canaliculato, lateribus recto, antice subito angustato; elytris atro-cyaneis, mediocriter sub-remote striato-punctatis, pone basin impressis, interstitio tertio a sutura antice elevato.*

*Apoderus id.* FABR. — *Huj. op.* I. p. 195. 18. et 5. p. 285. 16.

*Patria* : Port Natal. DOM. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Apodero quadripunctato* magnitudine æqualis. Caput majusculum, breviter obconicum, convexum, læve, sanguineum, nitidum, glabrum, medio canalicula brevi insculptum; fronte retusa, sulcis duobus obliquis impressa; oculi magni, convexi, nigricantes; rostrum brevissimum, crassum, lineare, supra convexum, læve, apice infuscatum. Antennæ breviusculæ, nigrofusæ, articulis duobus baseos rufo-testaceis. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, antice duplo angustior quam basi, apice emarginatus, anterieus subito angustatus, intra apicem anguste constrictus, lateribus sub-rectis; basi truncatus, ante basin striga profunda, sub-recta insculptus, supra in disco modice convexus, lævis, medio canalicula tenui insculptus; totus sanguineus, nitidus, glaber. Scutellum latum, brevissime triangulare, læve, sanguineum, nitidum. Elytra ampla, antice sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris parum elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus duplo longiora, supra in dorso sub-plana, postice declivia, pone basin interne transversim impressa, mediocriter sub-remote striato-punctata, interstitiis planis, tertio a sutura antice costato-elevato; tota nigro-cyanea, nitida, glabra. Pygidium apice rotundatum, confertim punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum. Corpus subtus obsolete punctulatum, pallidius sanguineum, nitidum, glabrum. Pedes longiusculi, validi, pallide ferruginei, nitidi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, sub-rectis, intus subtiliter crenulatis, apicem versus nonnihil inflexis. — BHN.

\* 19. *A. RUFICOLLIS.* (Fabr.) — *Rufo-testaceus; capite brevi, postice parum attenuato, supra nigro, antennis extrorsum piceis; thorace brevi, anterieus valde angustato, supra tenuiter canaliculato, antice utrinque impresso; elytris cœruleis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis confertim ruguloso-punctatis, humeris sub-elevatis, lateraliter nonnihil extensis; pectore abdomineque medio nigris.*

*Hujus operis* I. p. 195. 21. et V. p. 286. 19.

\* VAR.  $\beta$ . Pallide testaceus; capite supra piceo, pectore dilute infuscato.

*Patria*: Sibiria et Dauria. Dom. SEDAKOFF. Mus. SCHH.

*Apodero Coryli* magnitudine æqualis. Caput brevius, basin versus parum attenuatum, supra paulo convexum, anterius leviter canaliculatum, inter oculos obsolete foveolatum, supra nigrum, nitidum, glabrum, subtus rufo-testaceum; oculi semiglobosi, nigri vel glauci; rostrum brevissimum, crassum, apicem versus haud ampliatus, rufo-testaceum, basi leviter impressum, mandibulis nigris. Antennæ basi testaceæ, extrorsum infuscatae, parce pubescentes; clava elongata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, antice multo angustior, apice profunde emarginatus, margine elevato; mox pone apicem valde rotundato-ampliatus, basi truncatus, intra basin striga simplici profunda impressus, lobo postico elevatiore; supra in disco convexus, haud punctatus, medio tenuiter canaliculatus, antice utrinque arcuatim impressus, rufo-testaceus, nitidus, glaber. Scutellum breve, latum, apice rotundatum, nigrum, læve. Elytra antice leviter sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris sub-elevatis; lateraliter nonnihil extensis; lateribus pone medium nonnihil ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus triplo longiora, supra in dorso parum convexa, pone basin transversim leviter impressa, subtilissime punctato-striata, interstitiis planis, confertim ruguloso-punctatis, interstitiis primo et tertio a sutura antice parum elevatis; cœrulea, nitida, glabra. Pygidium apice rotundatum, crebre punctatum, rufo-testaceum, medio macula magna, nigra decoratum. Corpus subtus confertim punctulatum, rufo-testaceum, pectore, parte antica excepta, abdomineque medio nigris. Pedes longiusculi, validi, rufo-testacei, nitidi; femoribus clavatis, muticis.— BHN.

\* 24. A. ECHINATUS. (Schh.) — *H. op.* V. p. 288. 24.

\* VAR.  $\beta$ . Femoribus omnibus immaculatis.

27-28. A. HORRIDUS. (Schh.) — *Obscure ferrugineus, nigro-variegatus, vix tomentosus; capite sub-globoso, medio canaliculato; thorace transverso, obsolete canaliculato, quadri-tuberculato, spina solitaria scutelli spinisque decem elytrorum atris; elytris profunde rugoso-punctatis.*

*Patria*: Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Similis *Apoderi dumosi*, sed dimidio minor, vix tomentosus;

thorace quadri-tuberculato, elytris spinis decem brevioribus tantum instructis, ab illo mox dignoscitur. Caput majusculum, subglobosum, postice attenuatum, obsolete punctulatum, medio canaliculatum, supra obscure ferrugineum, subtus nigrum, glabrum, nitidum; oculi semi-globosi, glauci; rostrum breve, crassum, lineare, supra basi elevatum, fusco-ferrugineum. Antennæ mediocres, fusco-ferrugineæ, parce cinereo-pilosæ et pubescentes. Thorax brevis, transversus, apice sub-emarginatus, anterius multo angustior, lateribus rotundato-ampliatus, basi truncatus, intra basin striga transversa impressus, supra modice convexus, obsolete granulatus, in medio tenuiter canaliculatus, tuberculis quatuor validis, conicis instructus, supra obscure ferrugineus, subtus niger, fere glaber. Scutellum breviter triangulare, spina seu tuberculo conico, atro, nitido instructum. Elytra antice sinuata, thoracis basi multo latiora, humeris elevatis, oblique angulatis; lateribus dein recta, apice singulatim obtuse rotundata, thorace fere quadruplo longiora, supra in dorso parum convexa, postice declivia, confertim granulata, ferrugineo-nigro-que variegata, glabra; singulo spinis quinque brevibus, sub-conicis, atris instructo, quarum prima in humero longe acuta, extrorsum flexa, secunda longe ante medium ferruginea; in medio disci tertia recta, acuta, pone illum reliquæ duæ, transversim locatæ. Pygidium deflexum, apice rotundatum, confertim punctulatum, nigrum. Corpus subtus convexum, obsolete punctulatum, nigrum, abdomine utrinque et in medio rufo-testaceum. Pedes longi, pallide flavi; femoribus clavatis, muticis, extrorsum infuscatis; tibiis basi annulo fusco insignitis. — BHN.

GENUS 44. — ATTELABUS. *Linné.* — *H. op.* V. p. 299.

\* 1-2. A. CYANEUS. (*Schl.*) — *Cyaneus, nitidus, glaber; capite obsolete punctato, pone oculos leviter constricto; thorace transverso, obsolete punctulato, basi transversim subtiliter strigoso; elytris obsolete punctato-striatis, interstiliis subtiliter confertim coriaceis.*

*Patria* : Dauria. DOM. SEDAHOFF. MUS. SCHH.

*Apodero Coryli* dimidio minor. Caput deflexum, oblongo-quadratum, obsolete punctulatum, cyaneum, nitidum, glabrum, medio leviter impressum, pone oculos sub-constrictum; oculi rotundati, convexi, nigri; rostrum longitudine capitis, crassum, convexum, apicem versus quadrangulariter ampliatus, crebre

obsolete punctulatum, inter antennas transversim elevatum, cyaneum, nitidum, glabrum. Antennæ breves, nigræ, parce pubescentes; clava elongata, acuminata. Thorax latitudine postica brevior, antè multo angustior, apice leviter emarginatus, lateribus mox pòne apicem ampliatis, sub-obliquis; basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, sub-disperse obsolete punctulatus, basi subtiliter transversim stigosus, cyaneus, nitidus, glaber. Scutellum magnum, apice rotundatum, obsolete punctulatum, concolor. Elytra ampla, antice leviter sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus haud ampliata, apice conjunctim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, obsolete sat crebre punctato-striata, interstitiis planis, confertim coriaceis; cyanea, nitida, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, obscure cyaneum, nitidum, glabrum. Pedes mediocres, validi, cyanei; femoribus modice clavatis, muticis. — BHN.

1-2. A. SIMILIS (1). (Kirby.) — *Occipite, prothorace, scutello elytrisque rubris, his punctato-striatis, striarum interstitiis lævibus, capite postice transversim et inter oculos longitudinaliter impresso.* — KIRBY, *Fauna boreali-Americana*. p. 272.

*Patria* : Canada.

\* 5-6. A. SPICULATUS. (Schh.) — *Rufo-ferrugineus, nitidus, glaber; capite supra leviter impresso, utrinque oblique carinato; thorace sub-conico, modice convexo, levi, intra basin striga transversa insculpto; elytris evidenter punctato-striatis, singulo spina laterali ante medium, valida, nigra; pedibus immaculatis.*

*Patria* : Assam, Indiæ orientalis. DOM. WESTERMANN. MUS. SCHH.

Statura fere *Attelabi bispinosi*, illo tamen dimidio major, aliter coloratus; macula postica elytrorum deficiente ut et femoribus immaculatis, ab illo mox distinctus. Caput porrectum, elongatum, rufo-ferrugineum, nitidum, læve; fronte late sed parum profunde impressa, utrinque oblique carinata, pòne singulum oculum sulcus profundus in verticem continuatus, ibique e striga transversa, arcuata, impressa, terminatus; oculi laterales, semi-globosi, nigri; rostrum capite brevius, crassum, latum, convexum, punctatum, concolor, apice infuscatum, inter antennas elevatum. Antennæ crassiusculæ, thorace breviores, pallidius testaceæ,

clava valde elongata, acuminata, dense griseo-pubescente. Thorax antice paulo angustior, sub-truncatus, latitudine postica brevior, lateribus obliquis; basi bi-sinuatus, lobo medio parum producto, sub-obtusio; supra convexus, mox ante basin striga transversa, recta, profunde impressa, margines vix attingens, et ante apicem utrinque alia obsoleta; rufo-ferrugineus, nitidus, glaber. Scutellum breve, transversum, quadrangulum, læve, concolor. Elytra magna, oblongo-quadrata, antice sub-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris sub-elevatis, obtuse rotundatis; lateribus inflexa, sinuata, apice singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra valde convexa, parum profunde striata, striis punctis parvis, sub-remotis impressis, interstitiis basi sub-carinatis, dein planis, lævibus; rufo-ferruginea, nitida, glabra, in cujusvis elytri latere antico pone humerum spina valde crassa, elongata, sub-conica vel turrita, acuta, nonnihil extrorsum inclinata, tota atra. Pygidium sub-rotundatum, sat crebre mediocriter punctatum. Corpus subtus rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum, pectore profundius ventre obsoletius punctulatis. Pedes rufo-testacei, nitidi, antici validi; femoribus crassis; tibiis arcuatis, posterioribus rectis, omnibus intus crenulatis; tarsis modice dilatatis, subtus fulvo-spongiosis. — BHN.

\* 6. A. DISCOLOR. (Schh.) — *Huj. op. V. p. 301. 6.*

\* VAR.  $\beta$ . rufo-castaneus, nitidus, signaturis nigris elytrorum ut in  $\alpha$  locatis.

\* 16-17. A. RUDIS. (Schh.) — *Ferrugineus, parum nitidus; antennis, tibiis tarsisque dilutioribus, tomento pallescenti parce inæqualiter adpersus; capite oblongo, supra plano; thorace convexo, non canaliculato, confertim parum profunde rugoso-punctato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, confertim rugulosis.*

*Patria: Mexico. DOM. STURM. MUS. SCHH.*

Statura *Atelabi vestiti*, sed duplo minor, aliter coloratus, parce inæqualiter tomentosus; rostro brevior ab illo mox dignoscitur. Caput oblongum, modice convexum, dense punctatum, obscure ferrugineum et parce pallido-tomentosum; fronte plana, vix vel tenuissime canaliculata; oculi modice convexi, sub-rotundati, nigri; rostrum capite brevius, crassum, parum arcuatum, extrorsum amphiatum, dense punctatum, colore capitis, apice ipso infuscatum. Antennæ breviusculæ, rufo-testaceæ, parce pilosæ;

clava elongata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine baseos paulo brevior, antice angustior, apice leviter emarginatus, lateribus modice rotundatus, basi sub-sinuatus, supra in disco convexus, ante basin transversim leviter impressus, undique dense ruguloso-punctatus, fovea parum profunda utrinque notatus, sed non canaliculatus; totus obscure ferrugineus, tomento pallescente, nitido inæqualiter obsitus. Scutellum majusculum, convexum, rotundatum, dense punctulatum et parce tomentosum, obscure ferrugineum. Elytra antice sub-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris alte elevatis, fere rectangulatis; lateribus inflexa, non ampliata, apice singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra valde convexa, postice declivia, mediocriter crebre punctato-striata, interstitiis convexis, crebre rugulosis; tota obscure ferruginea; tomento pallescente parce inæqualiter adpersa. Pygidium breve, convexum, apice rotundatum, dense punctatum, ferrugineum, sub-nitidum. Corpus subtus subtiliter confertim punctulatum, rufo-ferrugineum, pectore infuscato, parce tomentoso. Pedes validi, parce pallido-tomentosi, antichi nonnihil longiores; femoribus crassis, clavatis, muticis; tibiis omnibus rectis, intus obsolete crenulatis, cum tarsis dilutius rufo-ferrugineis. — BHN.

18-19. A. MORTO. (Schh.) — *Ater, sub-nitidus, glaber, subtus parce cinereo-tomentosus; oculis magnis, in fronte connexis; thorace convexo, confertim punctulato, intra basin striga transversa insculpto; elytris sat profunde crebre punctato-striatis, interstitiis angustis, convexis, levibus.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. HOLM.

Parvus. *Attelabo nitido* proximus, sed nonnihil minor, parum nitidus; thorace evidenter punctulato, elytris profundius crebrius punctato-striatis, ab illo mox distinctus. Caput majusculum, oblongum, convexum, supra modice convexum, obsolete punctulatum, atrum, parum nitidum; oculi magni, ovati, modice prominuli, glauci, in fronte connexi; rostrum capite nonnihil brevius et angustius, rectum, crassum, fere lineare, crebre punctulatum, atrum, parum nitidum, fere glabrum. Antennæ breviusculæ, nigræ, cinereo-pilosæ; clava elongata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine baseos parum brevior, antice angustior, apice leviter emarginatus, lateribus nonnihil rotundatis, sub-obliquis; basi bi-sinuatus, crebre punctulatus,

*intra basin striga transversa, profunda insculptus; ater, parum nitidus, glaber. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, nitidum, glabrum. Elytra ampla, sub-quadrata, antice sinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris sub-elevatis, fere rectangularis; lateribus inflexa, non ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, crebre sat profunde punctato-striata, interstitiis elevatis, angustis, lævibus; atra, parum nitida, glabra. Pygidium rotundatum, convexum, dense punctulatum, nigrum, parum nitidum. Corpus subtus confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, parce cinereo-tomentosum. Pedes mediocres, nigri, sub-opaci, confertim punctulati; femoribus clavatis, muticis; tibiis parum arcuatis, interne crenatis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis.*

BHN.

\* 25. A. VARIABILIS. (*Schh.*) — *Huj. op. V. p. 311. 25.*

\* VAR. α. Elytris violaceis, nitidissimis. E Brasilia. DOM. WESTRING.

GENUS 46. — RHYNCHITES. *Herbst. — H. op. V p. 320.*

\* 1. R. COELESTINUS. (*Schh.*) — *H. op. I. p. 211. 1. et V. p. 320.*

*Rhynchites grandis.* LABR. et IMH. *Gen. Curc. I. X. Tab.*

*Patria* : Insula Sumatra et Ins. Philippines.

\* 42-43. R. PRÆUSTUS. (*Peyroleri.*) — *Oblongus, rufo-testaceus, pube longa, fusca dense obsitus; antennis, oculis, elytrorum apice, corpore, tibiis tarsisque nigro-fuscis; thorace parvo, utrinque parum rotundato, confertim parum profunde punctato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter crebre rugulosis.*

*DEJ. Cat. ed. 2. p. 238. ed. 3. p. 360.*

\* *Var. β.* Elytris totis atro-cœruleis.

*Rhynchites semiruber.* DEJ. in litteris.

*Patria* : Dalmatia. DD. GERMAR et SCHÜPPEL. MUS. SCHH.

*Rhynchit. Alliariæ* statura sub-similis, sed dimidio major. Caput mediocre, oblongo-quadratum, sub-convexum, obsolete crebre punctulatum, rufo-testaceum, fusco-pubescent, inter oculos canalicula tenui insculptum; oculi majusculi, rotundati, valde convexi, nigri; rostrum capite nonnihil brevius, sub-tenue, teres, rectum, lineare, punctulatum, similiter ac caput coloratum et vestitum, apice ipso nonnihil infuscatum. Antennæ sub-tenues,



**nigro-fuscae**, pilosae; **clava magna**, elongata, articulo ultimo acuminato. Thorax parvus, angustus, latitudine baseos parum longior, antrorsum vix angustior, apice truncatus, lateribus nonnihil rotundato-ampliatis; basi sub-sinuatus, supra parum convexus, sat crebre minus profunde punctulatus, rufo-testaceus, sub-nitidus, pube longa, erecta, fusca obsitus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra ampla, oblongo-quadrata, antice sub-sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris sub-elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice singulatim obtuse rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, antice pone scutellum leviter impressa, subtiliter crebre punctato-striata, interstitiis sub-planis, subtilissime crebre rugulosis; rufo-testacea, nitida, apice nigro-fusca, pube longa, erecta, fusca dense obsita. Pygidium occultatum. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, nitidum, pube cinerea adpersum. Pedes validi, cinereo-pubescentes; femoribus medio crassioribus, rufo-testaceis; tibiis rectis, nigro-fuscis, basi dilutioribus; tarsis angustis, nigro-fuscis. — BHN.

\* 42-43. R. LURIDUS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, nigro-piceus, sub-nitidus, fusco-pubescentis; capite subtus, rostro, femoribus anticis inferne geniculisque omnibus testaceis; thorace parvo, evidenter sat crebre punctulato, utrinque haud ampliato; elytris crebre profunde punctato-striatis, interstitiis transversim rugulosis.*

*Patria* : Croatia. Dom. SCHÜPPEL. Mus. SCHH.

*Rhynchites Betulae* nonnihil minor, praesertim angustior. Caput sub-quadratum, supra convexum, obsolete sat crebre punctulatum, supra nigro-piceum, basi et subtus testaceum, pube longa, erecta, fusca obsitum, inter oculos canalicula brevi, tenui insculptum; oculi magni, sub-rotundati, valde prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil brevius, tenue, rectum, lineare, obsolete punctulatum, testaceum, apice leviter infuscatum, fusco-pubescentis. Antennae sub-tenues, nigro-fuscae, pilosae; clava elongata, articulo ultimo acuminato. Thorax parvus, latitudine postica brevior, basi apiceque truncatus, anterius nonnihil angustior, lateribus parum rotundatus, postice tenue marginatus, supra paulo convexus, sub-remote evidenter punctulatus, nigro-piceus, nitidus, pube longa, fusca obsitus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra ampla, oblongo-quadrata, antice sub-sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris sub-elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim obtuse

rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, sat crebre et profunde punctato-striata, interstitiis transversim rugulosis; nigro-picea, nitida, pube longa, erecta, fusca obsita. Pygidium occultatum. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, parce cinereo-pubescent. Pedes validi, cinereo-pubescentes; femoribus modice incrassatis, anticis subtus testaceis; femoribus posterioribus cum tibiis omnibus et tarsis nigro-fuscis, geniculis testaceis. — BHN.

\* 44-45. R. LEVICOLLIS. (Stephens.) — *Oblongo-ovatus, cyaneus, nitidus, breviter fusco-pubescent; capite majusculo, sub-quadrato, profunde punctato, inter oculos striato, rostro arcuato, canaliculato; thorace parvo, convexo, confertim punctato; elytris crebre sat profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, transversim rugulosis.*

*Rhynchites id.* Huj. op. V. p. 337. 55.

*Rhynchites cyaneopennis.* STEPHENS. — *Huj. op. V. p. 338. 56.* id. spec. teste Dom. WALTON.

*Mas* : rostro brevior, crassior.

*Femina* : rostro longior, tenuior.

*Patria* : Anglia. Dom. WALTON. Mus. SCHN.

*Rhynchites munito* vix longior, sed nonnihil angustior. Caput majusculum, sub-quadratum. Supra fere planum, profunde crebre punctatum, inter oculos confertim longitudinaliter striatum, cyaneum, nitidum, vix pubescens; oculi magni, rotundati, valde prominuli, nigri; rostrum in mare longitudine capitis, in femina nonnihil longius, sat validum, arcuatum, extrorsum nonnihil ampliatus, profunde punctatum, medio canaliculatum, colore capitis. Antennæ sub-tenuis, nigræ, parce pilosæ; clava elongata, acuminata. Thorax parvus, capite vix latior et latitudine postica fere brevior, basi apiceque truncatus, antè multo angustior, pone apicem rotundato-ampliatus, postice tenuiter carinatus, supra convexus, undique confertim sat profunde punctulatus, cyaneus, nitidus, parce breviter fusco-pubescent. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra ampla, oblongo-quadrata, antice leviter sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus triplo longiora, supra modice convexa, crebre sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-convexis, transversim rugulosis; cyanea, nitida,

pube tenui, brevi, cinerea adpersa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigro-cyaneum, nitidum, sub-glabrum. Pedes mediocres, nigro-cyanei, tenuiter cinereo-pubescentes; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

45-46. R. *VILLOSUS*. (Schh.) — *Ovatus, niger, sub-nitidus, pube longa, erecta, fusca obsitus; capite convexo; obsolete punctulato, rostro tenui, longo, modice arcuato, bi-canaliculato; thorace angusto, sub-cylindrico, sat profunde crebre punctato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, convexis, transversim rugosis.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. HOLM.

*Rhynchites Betulae* nonnihil major. Caput mediocre, crassum, supra modice convexum, obsolete crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, pube longa, erecta, fusca obsitum; oculi laterales, rotundati, convexi, nigri; rostrum longitudine capitis cum thorace, sub-tenui, deplanatum, extrorsum sensim ampliatur, supra paulo convexum, bi-canaliculatum, nigrum, nitidum, fusco-pubescent. Antennae in medio rostri insertae, tenues, nigrae, parce pilosae; clava ovata, apice sub-obtusa, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica haud longior, basi apiceque truncatus, anterieus perparum angustior, lateribus haud ampliatis, fere rectis; intra basin transversim leviter impressus, supra modice convexus, sat profunde crebre punctatus, niger, nitidus, pube longa, erecta, fusca sat dense obsitus. Scutellum mediocre, sub-triangulari, punctatum, concolor. Elytra oblongo-quadrata, antice sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis, lateribus non ampliata, apice ipso singulatim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra paulo convexa, postice declivia, pone scutellum transversim leviter impressa, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, convexis, transversim rugosis; tota nigra, sub-nitida, pube longa, erecta, fusca sat dense obsita. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, parce cinereo-pubescent. Pedes mediocres, nigri, pube longa, cinerea obsiti; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus cinereo-spongiosis. — BHN.

GENUS 48. — EUGNAMPTUS. *Nobis*. — *H. op.* V. p. 339.

\* 4. E. *FLAVINUS*. (Chevrolat.) — *Oblongus, viridi-caerulescens, nitidus, glaber, pube longa, fusca adpersus; rostro, antennarum*

*basi pedibusque pallide testaceis, apice basi constricto, anterieus convexo, rostro arcuato, extrorsum ampliato; thorace angusto, sub-remote punctato, lateribus parum rotundato; elytris medio-criter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, obsolete coriaceis.*

*Patria* : Neelgheries, Indiæ orientalis. **Dom.** CHEVROLAT. **Mus.** SCHH.

*Eugnampo angustato* nonnihil minor. Caput majusculum, basi transversim constrictum, anterieus convexum, vix visibiliter punctulatum, viridi-cærulescens, nitidum, pube longa, fusca obsitum; oculi laterales, rotundati, convexi, nigri; rostrum thorace nonnihil longius, validum, arcuatum, extrorsum ampliatum, pallide testaceum, nitidum, parce pubescens. Antennæ basin rostri propius insertæ, sub-tenuës, testaceæ, pilosæ; clava valde elongata, apice acuminata. Thorax angustus, latitudine postica haud brevior, basi apiceque truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus parum rotundato-ampliat; supra paulo convexus, intra basin obsolete impressus, sub-remote evidenter punctatus, viridi-cærulescens, nitidus, pube longa, erecta, fusca obsitus. Scutellum sub-quadratum, cæruleum, nitidum, læve. Elytra oblongo-quadrata, antice leviter sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris sub-elevatis, obtuse angulatis; lateribus apicem versus perparum ampliat, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace plus triplo longiora, supra in dorso parum convexa, pone basin transversim impressa, postice declivia, medio-criter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter coriaceis; viridi-cærulescentia, nitida, pube longa, erecta, fusca obsita. Corpus subtus obsolete punctulatum, cyaneum, nitidum, parce cinereo-pubescens. Pedes mediocres, pallide testacei, cinereo-pubescentes; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis tere-tibus, rectis; tarsis modice dilatatis, articulo ultimo infuscato.

**Bin.**

**GENUS 54. — HOMALOCERUS. Nobis. — H. op. V. p. 358.**

\* **3. H. ACUMINATUS.** (Schh.) — *Lineari-elongatus, niger; thorace angustiore, confertim granulato, dorso canaliculato, vittis tribus scutelloque aureo-tomentosis; elytris punctatissimis et granulatis, plaga media antice posticeque abbreviata, aureo-pilosa ornatis, apice ipso singulatim ad suturam breviter mucronatis.*

*Patria* : Brasilia. **Dom.** CHEVROLAT. **Mus.** SCHH.

*Homalocero tyciformi* nonnihil brevior et dimidio angustior; elytris apice ad suturam breviter mucronatis ab illo mox distinctus. Caput breve, sub-quadratum, supra modice convexum, basi transversim constrictum, undique confertim punctulatum, nigrum, opacum, supra oculos, in fronte et subtus aureo-squamosum; oculi laterales, rotundati, prominuli, nigri; rostrum longitudine fere thoracis, tenue, teres, modice arcuatum, obsolete crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ in ipsa basi rostri insertæ, basi attenuatæ, glabræ, alias pilosissimæ, articulo ultimo acuminato; totæ nigrae. Thorax latitudine postica haud longior, apice truncatus, anterieus subito angustior, intra apicem transversim constrictus, lateribus pone stricturam valde rotundato-ampliatum, basi bi-sinuatus, reflexo-marginatus, supra convexus, sat crebre granulatus, niger, opacus, dorso canaliculatus, vittis tribus aureo-pilosis ornatus. Scutellum sat magnum, apice rotundatum, nigrum, aureo-pilosum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basi nonnihil latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice obtuse rotundata, singulo ad suturam mucrone brevi, acuto instructo; supra parum convexa, sat crebre punctulata et granulata; nigra, opaca, vitta lata media, antice posticeque abbreviata, aureo-pilosa decorata. Corpus subtus granulatum, nigrum, parum nitidum, breviter cinereo-pubesceus, utrinque linea pectorali aureo-pilosa decoratum. Pedes breviusculi, nigri, confertim rugulosi, cinereo-pubescentes; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis sub-rectis, intus obsolete crenulatis; tarsis modice dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

GENUS 56. — EURHYNCHUS. *Nobis.* — *H. op. V. p. 361.*

\* 3. *E. MURICATUS.* (*Kirby.*) — *Oblongus, niger, squamulis depressis, setiformibus, incanis parce adpersus; fronte profunde canaliculata, rostro thorace nonnihil longiore, extrorsum crassiore, thorace sub-cylindrico, confertim sat rude rugoso-punctato, basi tenuiter canaliculato; elytris profunde sulcato-punctatis, interstitiis granulis crebris tuberculisque remotis instructis, basi sub-cristatis.*

*Hujus operis I. p. 249. 3. et V. p. 361. 3.*

*Patria:* Nova Hollandia. *Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.*

Rostro incluso pollice fere longus. Caput sat magnum, oblongo-quadratum, paulo convexum, supra rugoso-punctatum, late-

ribus transversim aciculatum, inter oculos profunde canaliculatum, nigrum, sub-opacum, squamulis incanis parce adpersum; oculi parvi, rotundati, modice convexi, glauci; rostrum thorace nonnihil longius, porrectum, teres, validum, modice arcuatum, extrorsum incrassatum, subtiliter apicem versus obsolete rugoso-granulatum, nigrum, sub-opacum, parce squamulosum. Antennæ ante medium rostri insertæ, minus tenues, piceæ, parce pilosæ; clava elongata, fusca, opaca, pubescente. Thorax angustus, sub-cylindricus, latitudine postica longior, antice truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus haud ampliatis; basi subhi-sinuatus, tenue reflexo-marginatus, supra convexus, præsertim posterius, ibique in medio tenuiter canaliculatus, undique crebre sat profunde ruguloso-scaber, niger, sub-opacus, squamulis similibus ut in capite adpersus. Scutellum triangulare, concolor, obsolete punctulatum, medio sub-impressum. Elytra antice singularim angulariter producta, lobo depresso; basi thorace fere duplo latiora, callo humerali modice elevato, obtuse rotundato; lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, thorace fere triplo longiora, supra valde convexa, posterius declivia, sulcata, sulcis latis, rude punctatis, interstitiis crebre granulatis, alternis elevatioribus, tuberculis remotis, sub-obtusis, instructis; nigra, squamulis setiformibus, incanis parce adpersa. Corpus subtus subtiliter crebre coriaceum, nigrum, parum nitidum, squamulis cinereis parcissime adpersum. Pedes longiusculi, validi, nigri, parce pubescentes; femoribus clavatis, muticis, coriaceis; tibiis teretibus, granulatis; tarsis dilatatis, subtus fusco-spongiosis.

BHN.

GENUS 59. — PIEZOTRACHELUS. *Nobis.* — *H. op.* V. p. 261.

\* 2-3. *P. PULLUS.* (*Schh.*) — *Ater, nitidus, glaber; fronte carinata, thorace sub-conico, distincte sub-remote punctato, basi tenuiter canaliculato, anteriùs utrinque compresso; elytris magnis, striatis, striis in fundo punctatis, interstitiis planis, subtilissime alutaceis; rostro cylindrico, basi incrassato, utrinque canaliculato.*

*Patria:* Guinea. DOM. WESTERMANN. Mus. SCHH.

*Apioni Pomonæ* magnitudine æqualis. Caput oblongum, supra parum convexum, confertim punctulatum, inter oculos carinatum, atrum, nitidum, glabrum; oculi majusculi, rotundati, modice prominuli, glauci; rostrum longitudine capitis cum thorace, cylindricum, modice arcuatum, a basi ad medium crassius, crebre

punctulatum, nigrum, opacum, extrorsum tenuius, vix punctatum, nitidum, utrinque canaliculatum. Antennæ in medio rostri insertæ, minus tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, densius pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica longior, antè angustior, apice truncatus, pone apicem ad latera utrinque impressus, dein nonnihil ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, supra convexus, sub-remote minus profunde punctulatus, basi tenuiter canaliculatus, niger, nitidus, glaber. Scutellum parvum, tuberculiforme, atrum. Elytra magna, basi singulatim nonnihil rotundato-producta, pone basin subito ampliata, callo humerali oblongo, elevato instructa; in medio laterali adhuc latiora, posterius attenuata, apice conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, præsertim posterius; mediocriter striata, striis obsolete sub-remote punctatis, interstitiis latis, planis, subtiliter alutaceis; tota atra, sub-nitida, glabra. Corpus subtus obsolete granulatum et punctulatum, nigro-æneum, nitidum, glabrum. Pedes longiusculi, validi, atri, punctulati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus; tarsis modice dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

5. P. ASPHALTINUS. (Schh.) — *Ater, parum nitidus, glaber; fronte obsolete bi-caniculata, rostro cylindrico, arcuato, basi parum incrassato; thorace sub-conico, obsolete punctulato, postice sat profunde canaliculato; elytris ovatis, anguste striatis, interstitiis planis, subtilissime alutaceis.*

*Patria* : Port Natal. DOM. J. WAHLBERG. MUS. REG. HOLM.

*Apione ebenino paulo major. Caput mediocre, rotundatum, supra parum convexum, subtilissime crebre ruguloso-punctatum, atrum, opacum; fronte plana, leviter bi-caniculata; oculi laterales, rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum longitudine thoracis cum capite, cylindricum, arcuatum, a basi fere ad medium nonnihil incrassatum, subtilissime alutaceum, atrum, parum nitidum. Antennæ thorace breviores, sub-tenues, totæ atræ, parce pilosæ. Thorax sub-conicus, latitudine baseos longior, antè angustior, apice truncatus, pone apicem ad latera utrinque impressus, dein nonnihil ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, supra convexus, præsertim posterius, obsolete sub-remote punctulatus, posterius sat profunde canaliculatus, totus ater, parum nitidus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra ovata, basi sub-bi-sinuata, pone basin subito ampliata, callo humerali*

oblongo instructa, in medio nonnihil latiora, posterius attenuata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, præsertim posterius, anguste striata, striis obsolete punctatis, interstitiis latis, planis, obsolete alutaceis; tota atra, parum nitida. Corpus subtus vix punctulatum, atrum, sub-nitidum. Pedes longiusculi, validi, atri; femoribus disperse punctulatis, nitidis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

6. P. FALLAX. (Schh.) — *Atro-cyaneus, nitidus, glaber; pedibus nigro-piceis, fronte obsolete bi-canaliculata, rostro brevior, cylindrico, modice arcuato; thorace sub-conico, subtiliter sat crebre punctulato, basi foveolato; elytris amplis, tenuiter striatis, interstitiis latis, planis, subtilissime alutaceis.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Apione ebenino* nonnihil brevior, magis convexus. Caput mediocre, rotundatum, supra parum convexum, subtiliter crebre coriaceum, inter oculos obsolete bi-canaliculatum, atrum, sub-opacum; oculi laterales, rotundati, modice convexi, nigri; rostrum thorace cum capite nonnihil brevius, cylindricum, modice arcuatum, subtiliter alutaceum, atrum, parum nitidum. Antennæ longitudine fere rostri, sub-tenuis, atræ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata. Thorax sub-conicus, latitudine postica nonnihil longior, antè angustior, apice truncatus, pone apicem ad latera utrinque impressus, dein nonnihil ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, supra convexus, præsertim posterius, obsolete sat crebre punctulatus, ante basin obsolete foveolatus, atro-cyaneus, nitidus, glaber. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra ampla, antice sub-sinuata, thoracis basi dimidio latiora, pone basin subito ampliata, callo humerali oblongo instructa, in medio laterali adhuc latiora, posterius attenuata, apice ipso rotundata, supra convexa, fornicata, præsertim posterius, anguste striata, striis in fundo obsolete punctatis; atro-cyanea, nitida, glabra. Corpus subtus vix punctulatum, atrum, parum nitidum. Pedes longiusculi, validi, nigricantes, certo situ piceo-micantes; femoribus punctulatis, clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

BHN.

GENUS 60. — APION. *Herbst.* — *H. op.* V. p. 369.

15-16. A. FASCICULATUM. (Schh.) — *Oblongo-ovatum, ferrugineum, squamulis cinereis variegatum; rostro brevi, modice arcuato; tho-*



*race sub-conico, confertim rugoso-punctato, basi canaliculato; elytris sat profunde punctato-striatis, setosis, singulo in dorso fasciculis plurimis e setis crassis, fuscis instructo, plaga laterali sub-trigona, brunnea ornato.*

*Patria:* Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Magnitudo *Apionis Radioli*. Caput oblongum, supra modice convexum, obsolete punctulatum, ferrugineum, vertice transversim denudato; fronte sub-plana, dense fusco-squamosa; oculi laterales, rotundati, haud prominuli, nigro-brunnei; rostrum capite nonnihil longius, sat validum, cylindricum, modice arcuatum, basi nonnihil crassius, confertim subtiliter rugoso-punctatum, obscure ferrugineum, parce fusco-squamosum. Antennæ breves, sub-tenuæ, obscure ferrugineæ, parce pilosæ; clava ovata, sub-obtusa. Thorax fere conicus, latitudine postica parum longior, apice truncatus, anterie nonnihil angustior, lateribus obliquis, parum ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, supra convexus, confertim rugoso-punctatus, ante basin sat profunde canaliculatus, obscure ferrugineus, dorso sub-denudatus, lateribus et subtus cinereo-squamosus. Scutellum parvum, tuberculiforme, concolor. Elytra ovata, antice leviter sinuata, mox pone basin subito ampliata, humeris vix elevatis, oblique angulatis; lateribus in medio nonnihil ampliata, apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim rotundata, supra valde convexa, fornicata, profunde punctato-striata, interstitiis sub-convexis, rugulosis; obscure ferruginea, squamulis cinereis variegata, setulisque crassis, fuscis obsita, singulo in medio plaga magna, laterali, sub-triangulari, fere denudata, brunnea decorato, in dorso fasciculis nonnullis e setis crassis, posteriore magno, tuberculiformi instructo. Corpus subtus obsolete punctulatum, obscure ferrugineum, cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, validi, testacei, dense albo-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice cum tarsis fuscis. — BHN.

\* 33-34. A. TROGLODYTES. (Schh.) — *Breve, nigrum, longius griseo-pubescent; rostro capite cum thorace brevior, parum arcuato; thorace sub-cylindrico, antrorsum vix angustato, profunde et concinne foveolato-punctato; elytris ovatis, gibbis, sulcatis, sulcis remote punctatis.* — MANNERHEIM, *Beitr. zur Käfer. Faun. d. Aleut. Ins.* p. 117. 241. — P. N. California.

33-34. A. CUPRESCENS. (Mannerheim.) — *Oblongum, fusco-cæneum, griseo-pubescent; rostro longitudine thoracis cum capite, arcuato;*

*thorace antèrius angustato, profunde punctato, postice canaliculato; elytris oblongo-ovatis, punctato-sulcatis, punctis in sulcis satis approximatis.* — MANNERHEIM. *Beitr. zur Käfer. Faun. d. Aleut. Ins.* p. 117. 240. — *P. Insula Sitkha.*

GENUS 65. — ARRHENODES. *Steven.* — *H. op.* V. p. 465.

♂♀ 26-27. A. MILES. (*Schh.*) — *Rufo-ferrugineus, glaber; thorace sub-conico, convexo, subtiliter disperse punctulato; elytris rude punctato-sulcatis, flavescenti-maculatis, apice conjunctim emarginatis, singulatim obtuse acuminatis.*

*Mas:* rostro brevi, lato, supra in medio impresso, utrinque carinato, apice nigro, antennis in medio rostri insertis.

*Femina:* rostro longiori, tenui, cylindrico, recto, nitido, antennis ad basin rostri insertis.

*Patria:* Himalaya. Dom. WESTERMANN. *Mus. SCHH.*

*Arrhenod. dehiscenti proximus, sed fere duplo major, dilute ferrugineus; elytris apice singulatim breviter obtuse acuminatis, ab illo facile distinctus. Caput mediocre, porrectum, sub-remote punctatum, rufo-ferrugineum, sub-nitidum, glabrum; fronte elevata, antice triangulariter impressa; oculi semi-globosi, nigri; rostrum maris capite fere duplo longius et illo parum angustius, crassum, paulo arcuatum, extrorsum valde ampliatus, apice sub-truncatum, supra inæquale, longitudinaliter late impressum, marginibus elevatis; feminae longitudine fere thoracis, tenue, cylindricum, fere rectum, læve, in utroque rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum, apice infuscatum. Antennæ validæ, sub-filiiformes, ferrugineæ, pubescentes, articulo ultimo longo, apice acuminato. Thorax oblongus, sub-conicus, antèrius angustior, sub-truncatus, lateribus obliquis, pone medium ampliatus, versus basin iterum angustatus; basi constrictus et transversim strigosus, supra convexus, æqualis, sub-remote punctulatus, totus rufo-ferrugineus, sub-nitidus, glaber. Scutellum nullum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thorace nonnihil angustiora, humeris modice elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim triangulariter emarginata, singulatim in medio obtuse acuminata, acumine sub-reflexo; supra parum convexa, dorso sub-plana, sulcata et in sulcis punctis magnis, profundis, crebris impressa, interstitiis angustis, convexis, unde quasi favosa appareant; tota rufo-ferruginea, nitida, glabra,*

lineolis punctisque numerosis, flavo-rubrescentibus ornata, quarum prima baseos et alia versus apicem in interstitio tertio a sutura longior, aliæque breves, fascias duas irregulares formantes. Corpus subtus obsolete sub-remote punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, vix squamosum. Pedes breviusculi, validi, ferruginei; femoribus basi geniculisque infuscatis; femoribus clavatis, subtus ante apicem dente parvo, acuto armatis. — BHN.

GENUS 74. — CEOCEPHALUS. Schh. — *H. op.* V. p. 510.

♂♀ 6-7. C. SCROBICOLLIS. (Schh.) — *Elongatus, niger, sub-nitidus, glaber; thorace longo, medio profunde sulcato, lateribus rude sat crebre punctato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, carinatis; pedibus ferrugineis.*

*Mas*: rostro longiore, sub-recto, apice ampliato; thorace angustiore, longiore; elytris apice deplanatis, reflexo-marginatis; abdomine basi longe et profunde impresso.

*Femina*: rostro brevior, magis arcuato, apice non ampliato; thorace brevior, latior; elytris apice vix deplanatis; abdomine basi æquali.

*Patria*: Insulæ Philippines. DD. SOMMER et WALTON. MUS. SCHH.

Magnitudo *Ceocephali reticulati*. Caput breve, remote punctatum, nigro-piceum, sub-nitidum, inter oculos tenuiter canaliculatum; oculi laterales, semi-globosi, nigri; rostrum maris longitudine fere capitis cum thorace, sub-cylindricum, fere rectum, a basi fere ad medium nonnihil incrassatum, ibique supra canaliculatum, utrinque pubescens, extrorsum sub-læve, apice ipso ampliatum; feminae thorace nonnihil brevius, magis arcuatum, a basi fere ad medium nonnihil crassius, ibique supra canaliculatum, extrorsum tenue, apice non ampliatum, in utroque piceum, sub-nitidum. Antennæ in medio rostri sitæ, validæ, piceæ, parce pilosæ; articulo ultimo ovato, acuminato. Thorax in mare elongatus, angustus, in femina brevior, oblongus, in utroque apice truncatus, intra apicem constrictus, antè angustior, lateribus ultra medium sensim ampliatis, dein versus basin iterum angustatis; postice leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, in medio sulco profundo insculptus, lateribus rude sat crebre punctatus, niger, sub-nitidus, glaber. Elytra antè leviter emarginata, thoracis medio haud latiora, humeris non elevatis, obtuse rotun-

datis; lateribus non ampliata, maris apice deplanata, singulatim ad suturam acuminata, margine elevato, calloso; thorace dimidio longiora, feminae conjunctim rotundata, thorace duplo fere longiora, in utrisque supra modice convexa, late sulcata, in sulcis punctis magnis, profundis insculpta, interstitiis angustis, convexis, laevibus; tota nigra, sub-nitida, glabra. Corpus subtus profunde punctatum, pectore medio laeve, nigrum, nitidum, glabrum. Pedes breviusculi, validi, obscure ferruginei, cinereo-pilosi, primi paris crassiores; femoribus incrassatis, omnibus muticis; tibiis sub-compressis, granulatis, basi tenuioribus.

BHN.

GENUS 91. — EPISUS. *Billberg.* — *H. op.* V. p. 590.

\* 5-6. E. TRUNCATUS. (*Reiche.*) — *Elongatus, angustus, niger, fusco-squamosus; rostro capite longiore, cum fronte profunde sulcato; thorace elongato, lateribus recto, supra profunde tri-sulcato; elytris sub-compressis, dorso remote tuberculatis, apice retusis, ibique multi-tuberculatis.*

*Patria* : Caput Bonæ Spei. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

*Episo cyathiformi* longior et multo angustior. Caput oblongum, modice convexum, sub-remote punctatum, nigrum, dense fusco-squamosum; fronte profunde sulcata; oculi rotundati, parum prominuli, nigro-brunnei; rostrum capiti contiguum, illo parum angustius sed nonnihil longius, crassum, porrectum, supra late et profunde canaliculatum, crebre punctatum, nigrum, dense fusco-squamosum. Antennæ in apice rostri insertæ, breves, crassæ, nigrae, fusco-squosæ et nigro-setosæ. Thorax elongatus, angustus, latitudine postica fere duplo longior, apice truncatus, lateribus rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, sulcis tribus parallelis, latis et profundis exaratus, obsolete punctatus, niger, dense fusco-squamosus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice sub-sinuata, thoracis basi haud latiora, lateribus pone medium nonnihil ampliata, sub-compressa, apice conjunctim rotundata, supra in dorso parum convexa, minus regulariter parum profunde punctato-striata, dorso sub-remote tuberculata, postice abrupte declivia, sub-retusa, multi-tuberculata, in singulo tuberculis duobus suturam proximis validioribus; nigra, fusco-squamosa. Corpus subtus obsolete punctatum, nigrum, squamo-

*sitate fusca obsitum. Pedes mediocres, nigri, fusco-squamosi et setosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus fusco-setosis. — BHN.*

GENUS 93. — BRACHYCERUS. *Fabric.* — *H. op.* V. p. 605.

\* 2-3. B. BUFO. (*Kollar.*) — *Ovatus, niger; rostro profunde lateque impresso, ruguloso; thorace rude sub-remote rugoso, utrinque spina acuta armato, dorso antico plaga elevata instructo, punctato, ibique medio profunde canaliculato; elytris vage inæqualiter tuberculatis, maculis rotundis, ochraceis, seriatim dispositis ornatis; pedibus ochraceo-squamulosis.*

*Patria* : Kordofan. DOM. GERMAR. MUS. SCHH.

Statura et magnitudo *Brachyceri granosi*. Caput brevissimum, modice convexum, postice sub-remote rugulosum; fronte evidenter confertim rugosa; nigrum, sub-opacum, fere glabrum; oculi parvi, perpendiculares, oblongo-ovati, depressi, brunnei, margine sub-elevato cincti; rostrum capite plus duplo longius, crassum, parum arcuatum, apicem versus ampliatus, basi utrinque striga arcuata, profunda insculptum, supra late excavatum, cavitate versus basin rostri sensim angustata, et in frontem acuminate adscendente, in fundo rude crebre rugosa et lateribus carinulam elevatam includente; totum nigrum, opacum, squamositate ochracea parcissime adpersum. Antennæ crassæ, breves, nigrae et nigro-setosæ, apice ipso cinereo-pubescentes. Thorax latitudine media nonnihil brevior, antice posticeque angustior, apice leviter sinuato-emarginatus, lateribus fere angulatim ampliatus, et spina valida, acuta, nonnihil reflexa armatus; basi sub-emarginatus, supra modice convexus, inæqualis, versus latera et basin tuberculis sub-remotis, obtusis, inæqualibus, interdum poriferis adpersus; in medio dorso antico plaga elevata, utrinque angulum validum emittens, profunde punctata, medio canaliculata; totus niger, sub-opacus, fere glaber. Scutellum nullum. Elytra ampla, exacte ovata, antice conjunctim in medio nonnihil rotundato-producta, thoracis basi haud latiora, sed lateribus sensim valde rotundato-ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace quadruplo longiora, supra convexa, fornicata, abdominis latera includentia, undique rugoso-tuberculata, tuberculis inæqualibus, obtusis crebre obsita, nigra, sub-opaca, maculis plurimis rotundis, seriatim, e squamu-

lis ochraceis ornata. Corpus subtus nigrum, profunde sub-remote punctatum, vix squamosum. Pedes elongati, validi, nigri, ochraceo-squamulosi et nigro-setulosi; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis crassis, rectis, basi tenuioribus; tarsis elongatis, non dilatatis, subtus setosis. — BHN.

GENUS 101. — HIPPORHINUS. Nobis. — *H. op.* V. p. 746.

3-4. H. WAHLBERGI. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, convexus, niger, opacus, squamulis parvis, fuscis sat dense obsitus; fronte depressa, rostro late, parum profunde impresso; thorace brevior, crebre rugoso-tuberculato, medio sub-sulcato et breviter carinato, utrinque obtuse spinoso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis angustis, carinatis, tuberculis parvis, setiferis instructis.*

*Mas* : rostro nonnihil brevior; elytris apice conjunctim rotundatis.

*Femina* : rostro nonnihil longior; elytris apice singulatim acute mucronatis.

*Patria* : Terra Boschiesman. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Hipporhino spectro* var.  $\beta$ . affinis, sed duplo minor; fronte depressa, rostro obsolete impresso, thorace crebrius tuberculato, dorso leviter impresso, etc., ab illo abunde dignoscitur. Caput breve, posterius convexum, obsolete punctulatum, nigrum, squamulis parvis, depressis, piliformibus, cinereis sat dense adpersum; fronte inter oculos plana; oculi oblongi, sub-depressi, nigri; rostrum in mare longitudine thoracis, in femina nonnihil longius, crassum, modice arcuatum, supra secundum totam longitudinem late sed parum profunde impressum, in singulo latere stria unica impressum; totum nigrum, vix punctatum, fusco-squamosum et parce breviter setulosum. Antennæ minus tenues, nigrae, sub-pilosae, scapo fusco-squamoso; clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine media brevior, antice late sinuato-emarginatus, lateribus fere angulatim ampliatus, spina sub-obtusa armatus, basi angustior, truncatus, supra parum convexus, undique sat crebre rugoso-tuberculatus, in medio dorsi canalicula obsolete et in hac carinula elevata, abbreviata instructus; niger, sub-opacus, squamulis fuscis setisque brevibus, depressis, cervinis adpersus. Scutellum parvum, immersum,

nigrum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi paulo latiora, sed pone humeros obliquos sensim ampliata, apicem versus attenuata, apice ipso in mare conjunctim obtuse rotundata, in femina singulatim in acumen, validum, conicum producta; thorace fere quadruplo longiora, supra convexa, postice declivia, remote mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis planis, 2, 4, 6 et 8 a sutura elevata, sub-costata, tuberculis parvis, crebris, setiferis obsitis; tota nigra, opaca, squamulis parvis, angustis, fuscis sat dense adpersa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, parum nitidum, parce cinereo-squamulosum. Pedes elongati, validi, nigri, parce squamulosi et setosi; femoribus parum clavatis, punctulatis; tibiis teretibus, sub-rectis, scabris. — BIN.

GENUS 107. — POLYPHRADES. Nobis. — *H. op.* V. p. 805.

\* 1-2. P. PAGANUS. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, niger, parum nitidus, griseo-squamosus; rostro brevi, sub-tri-carinato; thorace amplo, lateribus valde rotundato, supra parum convexo, confertim rugoso-punctato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, subtiliter alutaceis, apicem versus attenuatis, apice dehiscentibus, singulatim breviter acuminatis.*

*Patria:* Nova Hollandia. Dom. HOPE. Mus. SCHH.

*Barynoto obscuro nonnihil longior et angustior, minus convexus. Caput breve, sub-rotundatum, modice convexum, subtiliter crebre ruguloso-punctatum, nigrum, squamulis griseis dense vestitum; fronte sub-plana; oculi ob-ovati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, robustum, sub-lineare, nonnihil arcuatum, angulatum, supra planum, obsolete bi-sulcatum, in medio carinula longitudinali costaque ad latera utrinque antice evanescente instructum; totum nigrum, obsolete punctulatum, griseo-squamosum. Antennæ validæ, thoracis basin haud attingentes, nigrae, griseo-squamosæ et fusco-setosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax amplus, latitudine media brevior, antice posticeque angustatus, apice sub-truncatus, pone oculos nonnihil lobatus, lateribus ante medium sat rotundato-amplius, basi iterum truncatus, tenue marginatus, supra parum convexus, præter impressionem obliquam, obsoletam; intra apicem sub-æqualis, confertim rugoso-punctatus, niger, squamulis griseis dorso parcius, lateribus densius obsitus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice truncata, thoracis basi non latiora, humeris parum prominulis, sub-angulatis; lateribus pone angu-*

los humerales leviter sinuata, dein nonnihil ampliata, apicem versus attenuata, apice ipso dehiscentia, singulatim breviter acuminata, thorace vix duplo longiora, supra in dorso parum convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-planis, subtilissime alutaceis; nigra, squamulis griseis dense dorso antico parcius obsita. Corpus subtus punctulatum, nigrum, cinereo-squamosum et setulosum. Pedes mediocres, validi, nigri, cinereo-squamulosi; femoribus modice clavatis, omnibus in medio fascia sub-denudata, nigra notatis; tibiis anticis, apice incurvis, uncinatis, intus remote denticulatis. — **BHN.**

GENUS 107-108. — **RHYPAROPHILUS. Nobis.**

*Character generis.* — Antennæ mediocres, validiusculæ; scapo crassiusculo, sub-clavato, curvato; articulis duobus basalibus funiculi brevissime obconicis, reliquis lenticularibus; clava ovata, acuminata.

Rostrum breve, crassiusculum, sub-angulatum, in medio carinatum, supra os triangulariter emarginatum.

Oculi rotundati, nonnihil convexi.

Thorax sub-rotundatus, pone oculos paulo lobatus.

Elytra oblongo-ovata, basi conjunctim introrsum emarginata, humeris rotundatis.

*DESCRIPTIO.* — *Corpus* ovatum, modice convexum, squamosum, sordidum, opacum, apterum; minusculæ magnitudinis. — *Antennæ* thoracis medium attingentes, infra medium rostri insertæ, validiusculæ, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculos sub-superante, crassiusculo, sub-clavato, basi curvato, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> brevissime obconicis, illo paulo longiore et crassiore, 4-8 lenticularibus, æqualibus; clava breviter ovata, acuminata, articulis ægre discernendis. — *Caput* depressum. — *Rostrum* capite parum longius, crassiusculum, sub-angulatum, gibbosum, deflexum, in medio linea elevata præditum, apice triangulariter profunde emarginatum; scrobe curvata, pone marginem oculorum inferum desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, paulo prominuli. — *Thorax* latitudine baseos vix brevior, basi perparum rotundatus, sub-truncatus, lateribus æqualiter rotundato-ampliatum, apice in medio nonnihil rotundato-productus, utrinque ad latera leviter emarginatus, pone oculos lobatus, infra pone gulam late sed leviter emarginatus, supra parum convexus. — *Scutellum* caret. — *Elytra* oblongo-ovata, antice thoracis parte postica vix latiora eoque fere



triplo longiora; basi conjunctim leviter emarginata, humeris rotundatis; in medio modice rotundata, ampliata, apicem versus attenuata, margine inflexo; apice ipso conjunctim rotundata, supra paulo convexa, versus apicem haud callosa. — *Pedes* mediocres, longitudine sub-æquales, mutici; femoribus clavatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis subtus spongiosis, articulo ultimo minusculo, clavato, bi-unguiculato.

A *βυρραρός*, sordidus; *φιδέω*, diligo.

TYPUS. — *Rhyparophilus alternans*.

Obs. — Affine generi *Polyphradi*.

\* I. R. ALTERNANS. (Schh.) — Oblongo-ovatus, niger, sub-opacus, fusco-squamosus; capite brevi, retracto, rostro brevi, crasso, medio carinato; thorace rotundato, confertim rugoso-granulato; elytris mediocriter punctato-striatis, sutura postice interstitiisque alternis elevatis, sub-carinatis.

Patria: Nova Hollandia. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

*Otiiorhyncho Septentrionis* magnitudine fere æqualis. Caput breve, retractum, supra parum convexum, obsolete rugoso-punctatum, nigrum, fusco-squamosum; oculi laterales, rotundati, paulo convexi, nigri; rostrum capite parum longius, crassiusculum, subangulatum, gibbosum, deflexum, arcuatum, medio linea elevata instructum, apice triangulariter profunde emarginatum, obsolete crebre rugoso-punctatum, nigrum, fusco-squamosum. Antennæ crassæ, nigrae, fusco-squamosæ et parce setulosæ; clava parva, ovata, acuminata. Thorax latitudine media nonnihil brevior, apice utrinque leviter emarginatus, supra in medio nonnihil rotundato-productus, antice posticeque angustatus, lateribus valde rotundato-ampliatus, basi sub-truncatus, supra modice convexus, confertim rugoso-granulatus; niger, dense fusco-squamosus. Scutellum nullum. Elytra oblongo-ovata, antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; pone basin nonnihil ampliata, apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, thorace triplo longiora, supra in dorso paulo convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, sutura postice interstitiisque alternis elevatis, sub-carinatis; nigra, parum nitida, fusco-squamosa, setulis brevibus, pallidis adpersa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, fusco-squamosum. *Pedes* mediocres, nigri,

fusco-squamosi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

GENUS 109. — CATASARCUS. *Nobis.* — *H. op.* V. p. 812.

\* 3-4. *C. RUGULOSUS.* (*Schh.*) — *Ovatus, niger, densius griseo-squamosus; pedibus rufo-ferrugineis, rostro profunde inciso, medio carinato; thorace brevi, lato, obsolete rugoso-punctato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, transversim rugosis.*

*Patria* : Nova Hollandia. *Dom.* HOPE. *Mus.* SCHH.

Magnitudo *Phytonomi punctati. Catasarco Hopei* dimidio minor, densius squamosus; fronte non canaliculata, rostro aliter sculpturato, thorace obsolete rugoso-punctato, elytris minus profunde punctato-striatis, etc., ab illo abunde distinctus. Caput breve, sub-rotundatum, modice convexum, subtiliter crebre alutaceum, nigrum, parum nitidum, supra inæqualiter subtus dense griseo-squamosum; fronte sub-plana, apice in medio breviter canaliculata; oculi ovales, parum prominuli, nigri; rostrum capite fere brevius, validum, sub-arcuatum, supra versus basin linea transversa impressum, utrinque leviter canaliculatum, medio tenuiter carinatum, obsolete rugoso-punctatum, nigrum, parcius griseo-squamosum. Antennæ sub-tenues, piceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, fusca. Thorax latitudine baseos dimidio brevior, anterie nonnihil angustior, apice sub-emarginatus, lobis lateralibus obtusis; lateribus parum ampliatus, intra apicem obsolete constrictus, basi sub-truncatus, angulis fere rectis; supra parum convexus, obsolete rugoso-punctatus, niger, squamulis griseis inæqualiter sat dense obsitus. Scutellum minutissimum, triangulare, concolor. Elytra ovata, antice thoracis basi paulo latiora, conjunctim leviter emarginata, humeris angulatis; lateribus mox ampliata, posterius attenuata, margine inflexo, sub-sinuato; apice conjunctim sub-acuminata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, postice modice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis convexis, transversim rugosis; ad marginem lateralem longe ante medium tuberculo obtusiore, elevato; nigra, dense griseo-squamosa. Corpus subtus punctatum, nigrum, griseo-squamosum. Pedes validiusculi, rufo-ferruginei, parce squamulosi et setosi; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis teretibus, subtus denticulatis; tarsis modice dilatatis, obscurioribus, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 113. — PACHYRHYNCHUS. Germar. — *H. op.* V. p. 822.

\* 1. P. VENUSTUS. (*Waterhouse.*)—*Oblongo-ovatus, ater, sub-nitidus, subtus aureo-cupreo-variegatus; capite subtilissime punctulato, inter oculos depresso, macula læte aureo-squamosa insignito; thorace oblongo, macula utrinque laterali et vitta infra-laterali, aureo-cupreis, ornato; elytris lævibus, maculis viginti impressis, aureo-cupreo-squamosis decoratis.*

*Pachyrhynchus id.* WATERHOUSE. *Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 23. 1. — *Transact. of the Ent. Soc. of London.* Vol. III. IV.

*Pachyrhynchus Mannerheimi.* SCHH. in litt. olim.

*Patria:* Insulæ Philippines. Dom. CUMMING. A Dom. Com. MANNERHEIM communicatus. Mus. SCHH.

Statura *Pachyrhynchi Mandarinii*, sed major. Caput rotundatum, supra modice convexum, obsolete vix visibiliter punctulatum, atrum, sub-nitidum, inter oculos depressum, ibique macula magna, oblongo-quadrata et infra oculos alia ejusdem formæ, aureo-cupreo-squamosis, decoratum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, paulo arcuatum, supra longitudinaliter basi profundius impressum, vix punctatum, atrum, nitidum, subtus parce pallido-setulosum. Antennæ breves, crassæ, nigræ, parce pilosæ; clava ovata, sub-acuminata, fusco-holosericea. Thorax oblongus, latitudine postica longior, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus in medio rotundato-ampliatus, basi leviter emarginatus, tenue reflexo-marginatus, supra modice convexus, vix vel obsolete punctulatus, ater, utrinque macula oblonga et subtus vitta sat lata, aureo-cupreo-squamosis, decoratus. Scutellum haud conspicuum. Elytra oblongo-ovata, antice conjunctim leviter emarginata, vel sub-truncata, thoracis basi paulo latiora, mox pone basin ad medium ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra valde convexa, postice declivia, subtilissime alutacea, atra, maculis viginti majoribus et minoribus impressis, aureo-cupreo-squamosis, ornata. Corpus subtus obsolete coriaceum, atrum, parum nitidum, pectore abdominisque basi aureo-cupreo-maculatis. Pedes elongati, validi, atri, nitidi; femoribus clavatis, muticis, subtus ante apicem au-

reo-cupreo-squamosis; tibiis sub-compressis, anterioribus apicem versus inflexis, omnibus intus obsolete crenulatis; tarsis dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

2. *P. RUFOPUNCTATUS.* (*Waterh.*) — *Niger, lævis; capite maculis tribus; thorace maculis duabus supra, maculaque una ad utrumque marginem; elytris viginti-duabus ornatis, his maculis e squamis rufis effectis.* — WATERH. *Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 55. — *Transact. of the Ent. Soc. of London.* Vol. III. P. IV. p. 311. — *P. Ins. Philippines.*
3. *P. GEMMATUS.* (*Waterhouse.*) — *Niger vel cupreus, lævis; capite supra maculis duabus; thorace supra tribus, infra duabus, et elytris sexdecim (duabus apud suturam) ornatis; his maculis e congerie squamarum metallice splendentium effectis; squamis centralibus nitide viridibus, circumgirantibus aureo-rubris, et inde ocellos efficientibus.* — WATERH. *Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 23. 2. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 311. 3.  
 VAR.  $\beta$ . Differt elytris maculis viginti-duabus ornatis. — *P. Ins. Philippines.*
4. *P. PERPULCHER.* (*Waterh.*) — *Niger, lævis; thorace maculis (sub-ocellatis) supra quatuor, ad latera duabus; elytris octodecim ornatis; his e squamis metallice viridibus et cupreis effectis.* — WATERH. *Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 24. 3. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 312. 4. — *P. Ins. Philippines.*
5. *P. CUMMINGII.* (*Waterh.*) — *Splendide cupreus; elytris leviter punctato-striatis; rostro nota transversa basali, capite maculis oblongis tribus, harum una inter-oculari, una utrinque sub-oculari; thorace lineis marginalibus, et supra lineis tribus, et una transversa interrupta, notato; elytris linea marginali, lineisque duabus longitudinalibus, dorsalibus, nec non linea transversa per medium excurrente, atque lineis duabus abbreviatis et ad angulos basales, et ad sub-apicales; his lineis maculisque pallido-cyaneo-viridibus.* — WATERH. *Proced. of the Ent. Soc.* 1841. p. 24. 4. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 312. 5. — *P. Insulæ Philippines.*
6. *P. ELEGANS.* (*Waterhouse.*) — *Splendide cupreus; capite maculis tribus, thorace maculis duabus supra, maculaque una ad utrumque marginem; elytris maculis duodecim ornatis; his maculis magnis et sub-ocellatis, e squamis pallide viridibus effectis.* — WATERH.

*Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 55. — *Transact. of the Ent. Soc. of Lond.* Vol. III. P. IV. p. 313. 6. — *P. Insulæ Philippines.*

7. *P. SPECIOSUS.* (*Waterh.*) — *Splendide cupreus, vel niger; elytris striato-punctatis; capite lineis tribus longitudinalibus; thorace annulis tribus elongato-ovatis; elythro utrinque lineis duabus transversis humeralibus, ad marginem elytrorum externum confluentibus, et prope suturam duabus centralibus et ad suturam et ad marginem externum ductis nec non confluentibus, et linea aream semi-humeralis circumdante, apicali, ornato, his lineis viridi-squamosis.* — *WATERH. Proced. of the Ent. Soc.* 1841. p. 24. 5. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 314. 7. — *P. Ins. Philippines.*
8. *P. SCHOENHERRI.* (*Waterh.*) — *Splendide cupreus; capite maculis tribus, earum una inter-oculari, una utrinque sub-oculari; thorace nitido, dorso bi-notato, ad latera lineis duabus; elytris octodecim punctis (duobus apud suturam) ornatis; his notis, lineis maculisque pallide viridibus.* — *WATERH. Proced. of the Ent. Soc.* 1841. p. 24. 8. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 315. 8. — *P. Insulæ Philippines.*
9. *P. ERICHSONI.* (*Waterh.*) — *Æneus; capite maculis tribus, earum una inter-oculari, una utrinque sub-oculari; thoracis dorso bi-notato, lateribus bi-maculatis; elytris maculis sexdecim ornatis; maculis omnibus flavo-squamosis.* — *WATERH. Proced. of the Ent. Soc.* 1841. p. 24. 9. — *Transact.* III. P. IV. p. 315. 9. — *P. Insul. Philippines.*
10. *P. ESCHSCHOLTZII.* (*Waterh.*) — *Ater, nitore violaceo; thorace maculis duabus; elytris striato-punctatis; maculis quatuor rotundatis ad basin; sex ad medium, sex prope apicem, duabus ad apicem, albescentibus.* — *WATERH. Proced. of the Ent. Soc.* 1841. p. 24. 10. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 316. 10. — *P. Ins. Philippines.*
11. *P. LATIFASCIATUS.* (*Waterh.*) — *Splendide æneus; thorace fascia transversa; elytris seriatim punctatis; fasciis duabus (in medio interruptis), maculisque tribus ad apicem, ornatis; his fasciis maculisque e squamis viridibus effectis.* — *WATERH. Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 55. — *Transact. of the Ent. Soc. of Lond.* Vol. III. P. IV. p. 317. 11. — *P. Ins. Philippines.*

12. *P. STRIATUS.* (*Waterh.*) — *Ater; elytris profunde punctato-striatis; capite macula inter oculos; thorace supra tri-maculato; elytris duodecim-maculatis; maculis aureis; illis elytrorum ad basin quatuor, et ad apicem quatuor elongatis, ad medium quatuor, scilicet duabus externis rotundatis, et duabus dorsalibus transversis.* — WATERH. *Proced. of the Ent. Soc.* 1841. p. 25. 11. — *Trans. Vol. III. P. IV. p. 317. 12.* — *P. Ins. Philippines.*
13. *P. ROSEOMACULATUS.* (*Waterh.*) — *Niger; elytris distincte punctato-striatis; capite macula inter oculos; thorace supra tri-maculato; elytris undecim-maculatis; his maculis roseis, plerisque oblongis; macula una suturali obcordata.* — WATERH. *Proced. of the Ent. Soc.* 1841. p. 25-12. — *Transact. Act. Vol. III. P. IV. p. 318-13.* — *P. Ins. Philippines.*
- \* 14. *P. JUGIFER.* (*Waterhouse.*) — *Sub-ovatus, ater, nitidus; capite macula frontali et alia utrinque sub oculos læte aureo-squamosis; thorace obsolete punctulato, læte cupreo-squamoso, plaga magna apicali et utrinque alia basali denudatis; elytris læte cupreo-squamosis, evidenter sat crebre punctato-striatis, plaga magna, rotundata, basali, fascia transversa, communi pone medium, posterius dentata, sutura postice apiceque denudatis.*  
*Pachyrhynchus id.* WATERHOUSE, *Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 25. 13. — *Transact. of the Entom. Soc. of London. Vol. III. P. IV. p. 319. 14.*  
 — *rhodopterus.* CHEVROLAT. *Revue Cuvier.* 1841. p. 224. 17.  
 — *Sommeri.* SCHH. in litt.  
*Patria:* Insulæ Philippines. DD. WESTERMANN, WALTON et SOMMER. Mus. SCHH.

Magnitudo et statura *Pachyrhynchi ardentis.* Caput rotundatum, modice convexum, obsolete sat crebre punctulatum, atrum, subnitidum, inter oculos macula oblonga, et infra oculos utrinque macula alia etiam oblonga, læte cupreo-squamosis; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, parum arcuatum, obsolete punctulatum, supra basi quadrangulariter impressum, atrum, parum nitidum, lateribus et subtus parce squamulosum et setulosum. Antennæ breves, sat validæ, nigræ, parce cinereo-pilosæ; clava ovata, fusco-pubescente. Thorax ovatus, antice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus antè medium rotundato-ampliatus, basi

etiam sub-truncatus, reflexo-marginatus, supra convexus, obsolete punctulatus, ater, sub-nitidus, læte cupreo-squamosus, plaga apicali transversa maculaque utrinque magna basali, denudatis, insignitus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi paulo latiora, lateribus mox pone basin ad medium rotundato-ampliata, pone medium apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace plus duplo longiora, supra valde convexa, fornicata, mediocriter punctato-striata, punctis striarum crebris, interstitiis planis, obsolete coriaceis; atra, sub-nitida, læte cupreo-squamosa, macula magna, rotunda, pone scutellum, fascia transversa, communi, posterius dentata, sutura postice apiceque ipso denudatis. Corpus subtus obsolete punctulatum, atrum, parum nitidum, pectore abdominisque basi læte cupreo-maculatis. Pedes elongati, validi, atri, nitidi; femoribus clavatis, apicem versus læte cupreo-annulatis; tibiis sub-compressis, apicem versus nonnihil inflexis, intus subtiliter crenulatis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BEN.

15. *P. PHALERATUS.* (*Waterh.*) — *Ater; linea transversa apud thoracis medium, ad utrumque latus in duos ramulos divisa, spatium inæquale circumdantes; pone transversum linea centrali longitudinali; elytris linea media transversa, lineis duabus ad basin longitudinalibus, et pone transversam tribus longitudinalibus; his sic et marginibus externis et basalibus aureo-viridibus.* — WATERH. *Transact. of the Ent. Soc. of Lond.* Vol. III. P. IV. p. 320. 15. — *P. Ins. Philippines.*

16. *P. DECUSSATUS.* (*Waterh.*) — *Ater; linea transversa apud thoracis medium, et pone hanc lineis tribus longitudinalibus, nec non margine externo aureo-viridibus; elytris linea centrali transversa, lineis quatuor ad basin longitudinalibus, et pone transversam lineis duabus longitudinalibus, his lineam parvulam incurvam lateralem emittentibus, lineis omnibus sic et marginibus elytrorum splendide aureo-viridibus.* — WATERH. *Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 24. 8. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 321. 16. — *P. Ins. Philippines.*

17. *P. MULTIPUNCTATUS.* (*Waterh.*) — *Ater; capite maculis tribus, earum una inter-oculari, una utrinque sub-oculari; thorace nitido, dorso bi-notato, ad latera lineis duabus; elytris punctis plurimis ornatis; his lineis punctisque viridibus.* — WATERH. *Proced. of the*

- Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 25. 15. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 322. 18. — *P. Ins. Philippines.*
18. *P. RETICULATUS.* (*Waterh.*) — *Niger; capite lineis tribus longitudinalibus notato; thorace elytrisque lineis aureo-viridibus vel cupreis, areas polygonas circumdantibus, reticulate ornatis.* — *Waterh. Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 25. 14. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 322. 19. — *P. Ins. Philippines.*
19. *P. RUGICOLLIS.* (*Waterh.*) — *Ater; thorace distincte rugoso-punctato, punctis squamis viridibus ornatis; elytris rufo-piceis vel piceis, leviter punctato-striatis, et ad apicem quasi squamis viridibus pulverulentis.* — *Waterh. Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 26. 20. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 323. 21. — *P. Ins. Philippines.*
- \* 20. *P. MONILIFERUS.* (*Eschscholtz.*) — *Ovatus, ater, subtus viridimaculatus; capitis linea, thoracis cruce, elytris linea transversa, maculari, media, linea angulata baseos arcuque apicis cum linea media connexo, viridi-adamantinis; thorace angustiore, obsolete punctato; elytris crebre alutaceis.* — *BHN.*  
*Waterh. Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 25. 17. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 323. 21.  
*Hujus operis* V. II. p. 823. 1. — *P. Ins. Manilla.*
21. *P. CHLOROLINEATUS.* (*Waterh.*) — *Ater; thorace in medio linea transversa, et pone hanc linea longitudinali; elytris linea transversa centrali, lineis duabus longitudinalibus, et linea marginali, his viridibus, nonnunquam splendide aureo-vel cupreo-viridibus.* — *Waterh. Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 25. 18. — *Transact.* Vol. III. P. IV. p. 323. 22. — *P. Ins. Philippines.*
- \* 22. *P. ORBIFER.* (*Waterhouse.*) — *Ovatus, ater, sub-nitidus, subtus læte cœruleo-virescenti-squamosus; capite macula parva frontali et alia utrinque majori infra-oculari, læte virescenti-squamosis; thorace ovato, obsolete punctulato, læte virescenti-squamoso, antice plaga transversa maculisque duabus magnis basalibus, denudatis, albo-marginatis; elytris evidenter remote striato-punctatis, læte cœruleo-virescenti-squamosis, maculis sex rotundatis, albo-marginatis apiceque denudatis.*

*Pachyrhynchus* id. *Waterhouse. Proced. of the Ent. Soc. of*



Lond. 1841, p. 25. — *Transact. of the Entom. Soc. of Lond.* III. IV. p. 313. 23.

*Pachyrhynchus fimbriatus*. CHEVROLAT. *Rev. Cuvier*. 1841. p. 224. 16. teste MANNERHEIM.

— *Erichsoni*, SCHH. in litt.

\* VAR.  $\beta$ . Ater, sub-nitidus, signaturis denudatis tantum maculis parvis, viridi-squamosis inclusis.

\* VAR.  $\gamma$  ut  $\alpha$ , sed thorace elytrisque parce cœruleo-virescenti-squamosis.

\* VAR.  $\delta$  ut var.  $\beta$ , sed signaturis thoracis elytrorumque obsoletis.

*Patria*: Insulæ Philippines. DD. SOMMER, WALTON et MÉNÉTRIÉS. Mus. SCHH.

Magnitudo *Pachyrhynchi moniliferi*. Caput rotundatum, convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, atrum, sub-nitidum, inter oculos macula oblonga, et infra oculos utrinque alia etiam oblonga, læte cœruleo-virescenti-squamosis; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite vix longius sed nonnihil angustius, crassum, parum arcuatum, supra basin quadranguliter impressum, obsolete sat crebre apicem versus evidenter punctulatum, atrum, sub-nitidum, lateribus et subtus squamosum et parce setulosum. Antennæ breves, sat validæ, nigræ, parce pilosæ; clava parva, ovata, acuminata, fusco-pubescente. Thorax sub-ovatus, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus rotundato-ampliatus, basi leviter emarginatus, reflexo-marginatus, supra modice convexus, obsolete punctulatus, ater, læte cœruleo-virescenti-squamosus, plaga apicali, transversa, macula utrinque basali magna, denudatis, albo-marginatis, insignitis. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, antice thoracis basi paulo latiora, sed mox pone basin ad medium valde rotundato-ampliata, dein apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace fere triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, evidenter sub-remote striato-punctata, interstitiis planis, obsolete coriaceis; atra, sub-nitida, squamulis læte cœruleo-virescentibus tecta, maculis sex magnis, rotundis, tribus ante et totidem pone medium, mediis majoribus, communibus, apiceque triangulariter denudatis, his signaturis albo-marginatis. Corpus subtus atrum, obsolete punctulatum, pectore ventrisque basi læte cœru-

leo-virescenti-maculatis. Pedes elongati, validi, atri, nitidi; femoribus clavatis, muticis, subtus ante apicem læte viridi-argenteo-squamosis; tibiis sub-compressis, anterioribus apicem versus nonnihil inflexis; tarsis dilatatis, subtus umbrino-spongiosis.

BHN.

23. P. CHEVROLATI. (*Eydoux et Souleyet.*) — *Revue Cuvérienne.* 1839. p. 266. *ibidem* 1841. p. 226.

24. P. BIPLAGIATUS. (*Guérin.*) — *Revue Cuvier.* 1841. p. 216.

25. P. PRETIOSUS. (*Chevrolat.*) — *Viridi-adamantinus*; rostro et capite obsolete punctatis, nigro-nitidis, lineola viridi infra oculos; elytris punctato-striatis, inter strias sub-costatis, fasciis duabus ad suturam ampliatis et rotundatis apiceque nigris; femoribus annulis duobus viridibus. — CHEVROLAT, *Revue Cuvérienne.* 1841. p. 225. 18.

\* 26. P. FAHRÆI. (*Schh.*) — Sub-ovatus, ater, subtus viridi-argenteo-maculatus; thorace angustiore, obsolete rugoso-punctato, cruce viridi-argenteo-squamosa ornato; elytris subtiliter remote striato-punctatis, interstitiis planis, subtilissime alutaceis, fascia sat lata, transversa, media, macula basali arcuque apicis latiori, libero, viridi-argenteo, squamosis.

*Pachyrhynchus gemmans.* CHEVROLAT, GUÉRIN, *Revue Cuvier.* 1841. p. 225. 20.

\* VAR. β. Fascia media elytrorum bis-interrupta, quasi e maculis tribus formata.

\* VAR. γ. Fascia media elytrorum medio interrupta, e maculis duabus formata, interiore majore.

\* VAR. δ. Signaturis thoracis elytrorumque obsoletis, angustis, cæcio-squamosis.

*Patria*: Insulæ Philippinæ. DD. WALTON et SOMMER. MUS. SCHH.

Magnitudo et statura *Pachyrhynchi moniliferi*; elytris remote subtiliter striato-punctatis, signaturis elytrorum latioribus, arcu postico libero, cum fascia media non connexo, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, convexum, subtiliter sub-remote punctulatum, atrum, sub-nitidum, infra oculos parce viridi-argenteo-squamosum; oculi laterales, rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite vix longius sed illo nonnihil angustius, crassum, parum arcuatum, extrorsum nonnihil ampliatur, supra planum, basi

late et profunde impressum ibique medio tenuiter canaliculatum, obsolete sub-remote punctulatum, atrum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ breves, crassæ, nigræ, parce fusco-pilosæ; clava ovata, acuminata, fusco-holosericea. Thorax latitudine postica longior, apice oblique truncatus, intra apicem leviter constrictus, antice posticeque angustatus, lateribus ante medium in mare magis, in femina modice rotundato-ampliat; postice truncatus, sub-reflexo-marginatus, supra convexus, obsolete sub-remote rugosus, ater, sub-nitidus, linea transversa in thoracis medium et pone hanc linea longitudinali, margine apicali vittisque duabus infra-lateralibus viridi-argenteo-squamosis. Scutellum haud conspicuum. Elytra ovata, antice conjunctim sub-truncata, thoracis basi paulo latiora, mox pone basin subito valde rotundato-ampliata, a medio apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim obtuse acuminata, thorace plus duplo longiora, supra valde convexa, fornicata, subtiliter striato-punctata, punctis striarum sub-remotis, interstitiis planis, subtiliter confertim alutaceis; atra, sub-nitida, macula transversa basali, fascia lata transversa, in medio arcuque apicali libero, dense viridi-argenteo-squamosis. Corpus subtus obsolete punctulatum, atrum, parum nitidum, pectore abdominisque basi viridi-argenteo-maculatis. Pedes elongati, validi, atri, nitidi, subtiliter punctulati; femoribus clavatis, muticis, subtus apicem versus viridi-argenteo-squamosis; tibiis sub-compressis, anticis apicem versus inflexis, omnibus intus obsolete denticulatis. — BHN.

\* 27. P. SCINTILLANS. (Chevrolat.) — *Aureus vel squamulis adamantinis tectus; rostro et capite punctatis, nigris, nitidis; elytris punctato-striatis, cum fascia antica, marginem haud attingente, in dorso ampliata et rotundata; tribus maculis rotundatis ultra medium, transversim positis, apice nigris, nitidis; femoribus annulis duobus viridibus.* — CHEVROLAT, *Revue Cuvier*. 1841. p. 225. 19.

28. P. GLOBULIPENNIS. (Chevrolat.) — *Niger, nitidus; rostro et capite vix punctatis; thorace fascia lata vittaque postica chryseis; elytris aureis, tumidis, brevibus, globosis, sat confertim punctato-striatis, fasciis duabus latis, conformatis ex maculis tribus adnexis et rotundatis, sutura et apice nigris; femoribus annulis duobus viridibus.* — CHEVROLAT, *Revue Cuvier*. 1841. p. 225. 21.

\* 29. P. ARDENS. (Chevrolat.) — *Sub-ovatus, ater, subtus aureo-maculatus; capite maculis tribus, una intra-oculari parva, et alia*

*sub-oculari majore, aureo-squamosis; rostro basi impressa, tenuiter canaliculato; thorace ovato, viridi-aureo-squamoso, plaga transversa, apicali maculisque duabus basalibus, magnis, oblongo-quadratis, denudatis; elytris subtilissime striato-punctatis, plaga basali, fascia lata media, communi, anteriùs sinuata, arcuque postico lato, omnibus ad marginem lateralem connexis, viridi-aureo-squamosis, decoratis.*

*Pachyrhynchus id.* CHEVROLAT, *Revue Cuvier.* 1841. p. 225. 22.

— *Bohemani.* SCHH. in litt.

\* VAR.  $\beta$ . Macula frontali deficiente, signaturis aureis thoracis angustioribus, parcius squamosis.

\* VAR.  $\gamma$ . Thorace elytrisque viridi-argenteo-squamosis; thorace maculis ut in  $\alpha$  denudatis; elytris plagis duabus magnis, suturalibus, una ante et altera pone medium, singulo duabus disci apiceque denudatis.

*Patria:* Insulæ Philippines. DD. WESTERMANN, SOMMER et WALTON. Mus. SCHH.

Magnitudo et fere statura *Pachyrhynchi moniliferi*. Caput rotundatum, supra modice convexum, obsolete sub-remote punctulatum, atrum, nitidum, inter oculos macula parva, rotunda, et infra oculos alia oblonga, aureo-squamosis, ornatum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, validum, paulo arcuatum, basi late quadrangulater impressum, ibique tenuiter canaliculatum, obsolete punctulatum, atrum, nitidum, lateribus et subtus parce squamulosum et pallido-setulosum. Antennæ breves, crassæ, nigræ, parce pilosæ; clava ovata, sub-acuminata, fusco-holosericea. Thorax ovatus, latitudine postica paulo longior, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus rotundato-ampliatus, basi leviter emarginatus, tenue reflexo-marginatus, supra convexus, subtilissime punctulatus, ater, nitidus, viridi-aureo-squamosus, antice plaga transversa, posterius interdum emarginata, macula utrinque basali, transversim locata, oblongo-quadrata, denudatis, insignitus. Scutellum haud conspicuum. Elytra ovata, antice conjunctim sub-truncata, thoracis basi haud latiora, mox pone basin ultra medium rotundato-ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, subtiliter striato-punctata, interstitiis planis, subtilissime alutaceis; atra, sub-nitida,

basi plaga lata, transversa, ad suturam triangulariter emarginata, fascia media lata, communi, antrorsum sinuata arcuque postico lato, ad marginem lateralem connexis, viridi-aureo-squamosis, ornata. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, pectore abdominisque basi aureo-maculatis. Pedes elongati, validi, atri, nitidi; femoribus clavatis, basi apiceque subtus parce aureo-squamosis; tibiis sub-compressis, anterioribus apice nonnihil inflexis, ntus obsolete crenulatis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 30. P. MANDARINUS. (Chevrolat.) — *Sub-ovatus, ater, nitidus, subtus læte viridi-argenteo-variegatus; fronte rostroque basi vitta, thoraceque angusto, sub-lævi, fascia transversa media, pone hanc linea longitudinali margineque apicali læte viridi-argenteo-squamosis; elytris evidenter striato-punctatis, interstitiis subtilissime alutaceis, basi margine laterali, vitta longitudinali disci, connexis, fasciæque media communi, transversa, læte viridi-argenteo-squamosis.*

*Pachyrhynchus id.* CHEVROLAT, *Rev. Cuvier*. 1841. p. 226. 23.

*Pachyrhinus concinnus.* WATERH. *Proced. of the Ent. Soc. of Lond.* 1841. p. 55. — *Transact. of the Ent. Soc. of London.* 1843. Vol. III. IV. p. 322. 17. forte?

*Patria*: Insulæ Philippines. Dom. Com. CUMMING. A Dom. Com. MANNERHEIM missus. MUS. SCHH.

*Pachyrhyncho gemmanti* nonnihil longior et angustior. Caput rotundatum, convexum, subtiliter sub-remote punctulatum, atrum, sub-nitidum, inter oculos vitta media in rostro continuata, læte viridi-argenteo-squamosa decoratum, subtus similiter squamosum; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite vix longius, sed illo nonnihil angustius, crassum, parum arcuatum, basi læte quadrangulariter impressum, ibique tenuiter canaliculatum, subtiliter obsolete punctulatum, atrum, sub-nitidum, lateribus et subtus læte viridi-argenteo-squamosum et fusco-pubes-cens. Antennæ breves, crassæ, nigrae, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, fusco-holosericea. Thorax latitudine postica longior, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus ante medium rotundato-ampliatis; basi truncatus, tenue reflexo-marginatus, supra modice convexus, sub-lævis, ater, nitidus, margine apicali fascia transversa media, et pone hanc linea longitudinali, et subtus læte viridi-argenteo-squamosis. Scutellum

*minutissimum*, sub-triangulare, atrum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi haud latiora, mox pone basin modice rotundato-ampliata, a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse acuminata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, fornicata, evidenter sub-remote striato-punctata, interstitiis planis, subtilissime alutaceis; atra, nitida, basi, margine laterali, vitta longitudinali disci, connexis, fasciaque media transversa, communi, læte viridi-argenteo-squamosis. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, sub-nitidum, pectore ventrisque basi viridi-argenteo-variegatis. Pedes elongati, validi, nigri, nitidi; femoribus clavatis, anticis apicem versus viridi-argenteo-annulatis; tibiis sub-compressis, apicem versus nonnihil inflexis, intus obsolete denticulatis. — **BHN.**

31. *P. CIRCULIFERUS.* (Chevrolat.) — *Niger, nitidus; elytris globosis, transversim rugosis, confertim punctato-striatis, circulis quinque tenuibus 2, 3 adornatis (uno infra basin, tribus medianis), lituraque circumflexa apicali, viridibus.* — CHEVROLAT, *Revue Cuvier.* 1841. p. 226. 24.

32. *P. ALBOGUTTATUS.* (Chevrolat.) — *Niger, nitidus; thorace et capite vix punctatis, striga frontali; elytris punctato-striatis cum circiter 28 guttulis albis 3, 4, 4, 3, transversim positis.* — CHEVROLAT, *Revue Cuvier.* 1841. p. 226. 25.

\* 33. *P. WALTONI.* (Schh.) — *Oblongo-ovatus, ater, sub-nitidus; fronte rostroque basi medio viridi-argenteo-squamosis, rostro basi striga transversa insculpto, leviter impresso; thorace amplo, mediocriter crebre rugoso-punctato, lateribus valde rotundato-ampliato, macula utrinque dorsali margine apicali, et subtus viridi-argenteo-squamoso; elytris mediocriter striato-punctatis, arcu basali, margine, fascia media interius interrupta, altera pone medium maculaque apicali viridi-argenteo-squamosis.*

\* **VAR. β.** Maculis dorsalibus thoracis majoribus, transversis, elytrorum fasciis abbreviatis, vitta suturali a medio usque ad apicem continuata, viridi-argenteo-squamosis.

*Patria:* Insulæ Philippines. **DOM. WALTON. MUS. SCHH.**

Præcedentibus minor, præsertim angustior; thorace amplo, utrinque valde rotundato-ampliato, supra confertim mediocriter rugoso-punctato, ab illis mox distinctus. Caput rotundatum, supra convexum, obsolete punctulatum, atrum, sub-nitidum;

fronte tenuiter canaliculata, squamulis viridi-argenteis adspersa; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite vix longius sed nonnihil angustius, crassum, parum arcuatum, sat crebre evidenter punctulatum, medio longitudinaliter leviter impressum, atrum, sub-nitidum, subtus parce setulosum. Antennæ subtenuæ, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava parva, oblonga, acuminata, fusco-pubescente. Thorax amplus, latitudine media brevior, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus ante medium valde rotundato-ampliat; postice subtruncatus, tenue reflexo-marginatus, supra convexus, mediocriter confertim rugoso-punctatus, ater, sub-nitidus, margine apicali subtus et macula parva utrinque dorsali, viridi-argenteo-squamosis. Scutellum nullum. Elytra antice truncata, tenue reflexo-marginata, thoracis basi parum latiora, pone basin ad medium modice rotundato-ampliata, dein apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace dimidio longiora, supra convexa, fornicata, mediocriter sat crebre punctato-striata, interstitiis sub-planis, lævibus; atra, sub-nitida, arcu basali, fascia media interius interrupta alteraque pone medium latiori, omnibus ad marginem lateralem connexis, maculaque rotunda, apicali, viridi-argenteo-squamosis. Corpus subtus obsolete punctulatum, atrum, parum nitidum, immaculatum. Pedes elongati, atri, nitidi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis subcompressis, anticis apicem versus inflexis, intus obsolete denticulatis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 114. — APOCYRTUS. *Erichson.* — *H. op.* V. p. 823.

♂♀ 1-2. A. CONICUS. (*Schl.*) — *Sub-ovatus, nigro-piceus, sub-opacus, glaber; pedibus rufo-ferrugineis, geniculis tarsisque infuscat, fronte rostroque basi canaliculatis; thorace modice convexo, confertim rugoso, lateribus parum rotundato; elytris ultra medium valde ampliatis, confertim mediocriter punctato-striatis, transversim rugulosis.*

*Mas*: minor, angustior; elytris ultra medium minus ampliatis, supra modice convexus.

*Femina*: major; elytris ultra medium valde ampliatis, supra fere planis.

*Patria*: Insulæ Philippines. DD. WALTON et MÉNÉTRIÉS. Mus. SCHH.

*Magnitudo Otiorhynchi tenebricosi*, sed variat etiam dimidio minor, brevior, latior, parum convexus. Caput mediocre, supra parum convexum, postice vix, inter oculos sat crebre punctulatum, ibique canaliculatum, nigro-piceum, sub-opacum, glabrum; oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri; rostrum capite vix longius, sed illo nonnihil angustius, validum, sub-rectum, supra planum, evidenter confertim punctulatum, basi striga transversa insculptum, medio canaliculatum, colore capitis. Antennæ sub-tenues, piceæ, basi interdum ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata. Thorax latitudine postica fere brevior, apice oblique truncatus, antierius nonnihil angustior, lateribus paulo rotundato-ampliatus, basi sub-truncatus, tenue marginatus, supra paulo convexus, confertim rugosus, nigro-piceus, sub-opacus, glaber. Scutellum nullum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi haud latiora, a basi ultra medium valde oblique ampliata, ibique rotundata, dein apicem versus citius angustata, apice ipso conjunctim obtuse acuminata, thorace plus duplo longiora, supra in mare modice convexa, in femina sub-plana, postice abrupte declivia, mediocriter crebre punctato-striata, transversim rugosa, nigro-picea, sub-opaca, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigro-piceum, sub-nitidum, glabrum. Pedes longiusculi, robusti, rufo-ferruginei, sub-nitidi; geniculis tarsisque infuscatis. — BHN.

\* 1-2. A. SUBFASCIATUS. (Schh.) — *Oblongus, ater, sub-nitidus; femoribus rufo-ferrugineis, fronte canaliculata, rostro confertim punctato; thorace ovato, convexo, confertim granulato, medio tenuiter canaliculato, parce cæcio-squamoso; elytris confertim punctato-striatis, transversim ruguloso-granulatis, cæcio-squamosis, fasciis duabus transversis, una mox pone basin et altera in medio denudatis.*

\* VAR. β. Pedibus totis nigris; thorace dorso parce margine apicali et subtus dense læte viridi-argenteo-squamoso; elytris læte viridi-argenteo-squamosis, fasciis duabus latioribus, denudatis.

*Patria*: Insulæ Philippines. DD. SOMMER, MÉNÉTRIÉS et WALTON-Mus. SCHH.

*Apocyrto profano* magnitudine et statura sub-similis, aliter coloratus. Caput mediocre, crassum, supra paulo convexum, vix punctatum, nigrum, sub-nitidum, inter oculos tenuiter canaliculatum, ibique parce cæcio-squamosum; oculi sub-rotundati, pa-



rum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis, sed illo nonnihil angustius, crassum, sub-teres, rectum, crebre rugosopunctatum, basi striga transversa insculptum, nigrum, sub-nitidum, vix squamosum, subtus parce setosum. Antennæ sub-tenues, piceæ, basi ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblonga, sub-acuminata, dense cinereo-pubescente. Thorax ovatus, latitudine postica vix longior, apice oblique truncatus, intra apicem linea transversa impressus, lateribus æqualiter rotundatus, basi truncatus et marginatus, supra convexus, pulvinatus, granulis crebris, nitidis dense obsitus, medio tenuiter canaliculatus, niger, squamulis cæsiis minus dense adpersus. Scutellum nullum. Elytra sub-ovata, basi truncata, reflexo-marginata, antice thoracis basi haud latiora, lateribus modice ampliata, ibique thoracis medio parum latiora, apice angustata et conjunctim rotundata, supra valde convexa, thorace fere duplo longiora, parum profunde punctato-striata, granulis minutis, inordinatis minus crebre adpersa; nigra, cæsiio-squamosa, fasciis duabus transversis, una pone basin et altera in medio, maculaque interdum apicali denudatis. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, parum nitidum, pectore abdominisque basi læte viridi-maculatis. Pedes elongati, validiusculi, breviter parceque albo-pilosi; femoribus valde clavatis, rufo-ferrugineis, apice infuscatis; tibiis sub-teretibus, rectis, nigris, anterioribus intus denticulatis; tarsis modice dilatatis, nigris, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 2. A. PROFANUS. (Eschscholtz.) — *H. op.* V. p. 825. 2.

\* VAR.  $\gamma$ . Undique squamulis læte virescentibus sat dense obsitus, pedibus piceis. — BHN.

4-5. A. ERICHSONII. (Chevrolat.) — *Niger, nitidus; capite in fronte sulcato et smaragdino, clava postica dimidia antennarum fusca; thorace punctis excavatis, transversim globoso, antice posticeque recto cum margine antico et laterali infra, notulisque duabus smaragdinis; elytris sensim attenuatis et conjunctim obtusis apice, vage et sat crebre punctatis, cum lunula humerali et apicali, fere circularibus, notulaque in medio pone suturam, smaragdinis; corpore infra parce piloso.*—CHEVROLAT, *Revue Cuvier*. 1841. p. 226. 26. — P. Ins. Manilla.

\* 5. A. IMMERITUS. (Schh.) — *Oblongus, niger, sub-opacus, squamulis læte viridibus parce adpersus; fronte rostroque confertim*

*rugoso-punctulatis, illo leviter impresso; thorace convexo, confertim granulato, lateribus rotundato-ampliato; elytris oblongo-ovatis, convexis, thorace angustioribus, crebre granulatis, pedibus nigro-vicis.*

*Patria* : Insulæ Philippines. Dom. WALTON. Mus. SCHH.

*Apocyrtro profano* vix latior, sed dimidio longior; elytris thorace angustioribus, subtiliter granulatis, ab illo differre videtur. Caput mediocre, crassum, supra parum convexum, postice sub-læve, inter oculos planum, crebre ruguloso-punctatum, nigrum, sub-opacum, supra vix subtus parce læte viridi-squamosum; oculi sub-rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis, sed illo nonnihil angustius, crassum, sub-teres, rectum, confertim rugoso-punctatum, medio longitudinaliter leviter impressum, basi striga transversa insculptum; totum nigrum, sub-opacum. Antennæ sub-tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax ovatus, latitudine postica vix longior, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus valde æqualiter rotundatus, basi truncatus et marginatus, supra convexus, granulis nitidis crebre obsitus; niger, opacus, squamulis læte viridibus parce adpersus. Scutellum nullum. Elytra oblongo-ovata, antice conjunctim truncata, reflexo-marginata, thoracis basi non latiora, lateribus ad medium nonnihil ampliata, ibique thoracis medio angustiora, apice angustata et conjunctim rotundata, thorace dimidio longiora, supra valde convexa, granulis minutis, inordinatis minus crebre adpersa; nigra, sub-opaca, squamulis minutis, orbiculatis, viridibus adpersa. Corpus subtus sub-læve, pectoris lateribus parce viridi-squamosis. Pedes elongati, validiusculi, nigro-picei, nitidi, breviter parceque albo-pilosi; femoribus valde clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, anterioribus apicem versus inflexis, spinulis remotis, brevissimis intus armatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 6. A. DERASUS. (Schh.) — *Oblongus, ater, parum nitidus, glaber; fronte sub-remote punctulata, canaliculata, rostro crebrius punctato, medio sulcato; thorace amplo, utrinque valde ampliato, supra confertim granulato: elytris thorace multo angustioribus, vage sat crebre punctulatis.*

*Patria* : Manilla. Dom. WESTERMANN. Mus. SCHH.

*Apocyrtus immerito proximus* et illo magnitudine æqualis; thorace utrinque magis rotundato-ampliato, elytris sat crebre vage punctulatis ut et squamulis omnino destitutus, ab illo bene distinctus. Caput mediocre, crassum, supra modice convexum, postice sub-læve, inter oculos minus crebre punctulatum, tenuiter canaliculatum, atrum, parum nitidum, glabrum; oculi subrotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, sub-teres, rectum, confertim punctulatum, basi linea transversa insculptum, medio distincte sulcatum, colore capitis. Antennæ tenues, nigræ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax amplus, latitudine media brevior, apice oblique truncatus, intra apicem linea transversa impressus, antice posticeque angustatus, lateribus valde rotundato-ampliatum, postice leviter emarginatus vel sub-truncatus, supra valde convexus, granulis nitidis crebre obsitus; ater, sub-opacus, glaber. Scutellum nullum. Elytra oblongo-ovata, antice truncata, reflexo-marginata, thoracis basi nonnihil angustiora, lateribus parum ampliata, apice angustata et conjunctim acute rotundata, thorace dimidio longiora, supra convexa, postice declivia, vage sat crebre punctata, atra, parum nitida, glabra. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, parum nitidum. Pedes elongati, validiusculi, atque, sub-nitidi, breviter parceque albo-pilosi; femoribus valde clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, anterioribus apicem versus inflexis, spinulis nonnullis brevissimis intus armatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 7. *A. NANUS.* (Schh.) — *Oblongus, niger, squamulis læte viridibus sat dense obsitus; pedibus ferrugineis, rostro sulcato; thorace ovato, crebre granulato, lateribus modice rotundato-ampliato; elytris confertim granulatis.*

*Patria:* Insulæ Philippines. Dom. WALTON. Mus. SCHH.

Statura *Apocyrti profani*, sed duplo minor; elytris evidenter granulatis, ab illo mox distinctus. Caput mediocre, crassum, supra paulo convexum, confertim punctulatum, nigrum, sub-opacum, squamulis læte viridibus adpersum; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis sed illo nonnihil angustius, crassum, sub-teres, rectum, subtiliter crebre ruguloso-punctatum, medio leviter sulcatum, basi striga transversa insculptum, nigrum, sub-opacum, sat crebre læte viridi-squamo-

sum. Antennæ tenues, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax ovatus, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, intra apicem linea transversa inpressus, lateribus modice æqualiter rotundato-ampliatum, basi truncatus, reflexo-marginatus, supra convexus, granulis crebris, nitidis adpersus; totus niger, squamulis parvis, rotundis, læte viridibus sat dense obsitus. Scutellum nullum. Elytra subovata, antice truncata, reflexo-marginata, thoracis basi non latiora, lateribus ad medium modice ampliata, ibique thoracis medio haud latiora, apice angustata et conjunctim acute rotundata, thorace dimidio longiora, supra valde convexa, evidenter confertim inordinate granulata, nigra, parum nitida, squamulis minutis, orbiculatis, læte viridibus sat dense obsita. Corpus subtus sublæve, nigrum, squamulis læte virescentibus parce adpersum. Pedes elongati, validi, rufo-ferruginei, breviter albo-pilosi; femoribus valde clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, rectis, anticis apicem versus nonnihil inflexis, obsolete denticulatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 122. — DERACANTHUS. Nobis. — H. op. V. p. 843.

\* 1-2. D. MUCIDUS. (Schh.) — *Breviter ovatus, niger, squamositate cretacea supra dense, subtus parce obsitus; fronte depressa; thorace transverso, obsolete rugoso, utrinque spina valida, reclinata instructo, dorso medio late impresso; elytris obsolete punctato-striatis.*

*Patria*: Mongolia. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

Statura et summa similitudo *Deracanthi hololeuci*, dimidio fere major; thorace rugoso, dorso late impresso, elytris obsolete punctato-striatis, ab illo distinctus. Caput breve, latum, parum convexus, obsolete crebre punctulatum, nigrum, supra parce subtus dense cretaceo-squamosum; fronte depressa, superciliis nonnihil elevatis; oculi ovati, parum convexi, nigri; rostrum longitudine capitis et illo nonnihil angustius, valde crassum, angulatum, sub-rectum, supra planum, basi fovea impressum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, supra parce lateribus et subtus dense cretaceo-squamosum. Antennæ breves, minus tenues, nigrae, parce cretaceo-squamosæ; clava parva, acuminata, fusco-pubescente. Thorax brevis, transversus, anterieus angustior, apice late emarginatus, margine elevato, calloso; lateribus obliquis, postice in spinam nonnihil reclinatam excurrentibus; basi

*truncatus*, supra parum convexus, inæqualis, parum profunde rugoso-punctatus, dorso late longitudinaliter impressus, niger, dorso parce lateribus dense cretaceo-squamosus. Scutellum subtriangulare, punctulatum, nigrum, anne detritum? Elytra antice sub-truncata, pone basin subito ampliata, humeris rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace vix triplo longiora, supra in dorso antico fere plana, postice sub-retusa, obsolete striato-punctata, nigra, dense cretaceo-squamosa, pone scutellum nonnihil denudata, forte detrita? Corpus subtus obsolete punctatum, nigrum, squamositate ochracea parce variegatum. Pedes longiusculi, validi, nigri, cretaceo-squamulosi; femoribus clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, anterioribus apicem versus inflexis, extus carinatis, ante apicem dente gemino armatis; tarsis angustis, subtus fusco-setosis. — BHN.

GENUS 126. — STROPHOSOMUS. Billberg. — *H. op.* V. p. 868.

\* 25-26. S. HIRTUS. (Schh.) — *Sub-ovatus*, niger, dense fusco-squamulosus, albo-setosus; antennis pedibusque ferrugineis, rostro leviter canaliculato; thorace basi apiceque obsolete constricto, lateribus modice ampliato; elytris sub-ovatis, hispidis, sulcatis, sulcis obsolete punctatis.

*Patria* : Gallia ad Paris. A Dom. Aubé ad describendum missus. Anglia. Dom. WALTON.

*Om. hirsutulo* proximus, illo nonnihil longior, angustior, minus convexus, squamositate densa, fusca obsitus; rostro canaliculato, thorace longiore, utrinque magis rotundato, elytris sulcatis et in sulcis obsolete punctatis, ab illo mox dignoscitur. Caput mediocre, crassum, supra paulo convexum, punctulatum, nigrum, dense fusco-squamosum et parce setulosum; oculi parvi, rotundati, modice prominuli, brunnei; rostrum longitudine capitis sed illo nonnihil angustius, crassum, supra planum, medio leviter canaliculatum, colore, punctura et indumento capitis. Antennæ sub-tenuis, obscure ferrugineæ, parce pubescentes. Thorax latitudine media nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, intra apicem et basin obsolete constrictus, lateribus modice rotundato-ampliatus, postice tenue reflexo-marginatus, supra paulo convexus, confertim subtiliter punctulatus, niger, dense fusco-squamosus, parce breviter setulosus. Scutellum vix conspicuum. Elytra sub-ovata, antice truncata, thoracis basi latiora,

humeris rotundatis, non elevatis; lateribus modice rotundato-ampliata, apicem versus angustata, apice conjunctim sub-acuminata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, modice declivia, sat profunde sulcata, in sulcis obsolete punctata, interstitiis planis, singulo serie e setis erectis, pallidis muricato; nigra, squamulis fuscis dense vestita. Corpus subtus obsolete punctulatum, ferrugineum, parce fusco-squamulosum. Pedes breves, validi, ferruginei, parce griseo-pubescentes; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice intus breviter uncinatis. — BHN.

\* 25-26. S. SETULOSUS. (Schh.) — *Ovatus, convexus, rufo-piceus, squamulis griseis vestitus; antennis pedibusque dilutius ferrugineis, rostro supra profunde foveolato; thorace angustiori, lateribus minus ampliato, intra apicem obsolete constricto, supra bi-impreso; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis convexis, albo-setulosis.*

*Patria*: Geneva. A Dom. CHÉVRIER donatus. Mus. SCHH.

Magnitudo et fere statura *Trachyphloeæ squamulati*, aliter coloratus; rostro profunde foveolato, thorace angustiore, elytrorum interstitiis convexioribus, setulis tenuioribus obsitis. Caput breve, latum, crassum, alutaceum, piceum, dense griseo-squamosum; oculi parvi, rotundati, prominuli, nigri; rostrum longitudine capitis, sed illo nonnihil angustius, crassum, angulatum, supra foveola sat profunda insculptum, colore et indumento simili ac in capite. Antennæ in medio rostri insertæ, sub-tenuæ, ferrugineæ, parce setosæ; scapo apicem versus modice clavato. Thorax latitudine media nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, intra apicem transversim leviter coarctatus, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi tenue reflexo-marginatus, supra paulo convexus, confertim subtiliter punctulatus, bi-impessus, piceus, squamulis griseis sat dense vestitus. Scutellum vix conspicuum. Elytra antice conjunctim truncata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris rotundatis, non elevatis; lateribus ampliata, inflexa, apice conjunctim sub-acuminata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, postice declivia, regulariter evidenter punctato-striata, interstitiis convexis; picea, griseo-squamosa, dorso denudata, detrita certe, setulis tenuioribus et longioribus, albis parce seriatim obsita. Corpus subtus subtilissime punctulatum, ferrugineum, nitidum, pectore griseo-squamuloso. Pedes breviusculi, validi, dilutius ferruginei; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis apice non denticulatis. — BHN.

GENUS 131. — BLOSyrus. *Nobis.* — *H. op.* V. p. 906.

- \* 2. B. HERTHUS. (*Herbst.*) — *Ovatus, niger, sub-opacus, squamulis cinereis inæqualiter adpersus; fronte tri-, rostro bi-canaliculato; thorace lateribus modice rotundato, sub-remote tuberculato; elytris profunde crebre punctato-striatis, interstitiis angustis, convexis, granulatis.*

*Hujus operis* I. p. 552. 3. et V. p. 907. 2.

*Patria* : Assam. Dom. WESTERMANN. Mus. SCHH.

Magnitudo *Otiiorhynchi nigritee*. Caput breve, latum, crassum, supra fere planum, obsolete punctulatum, nigrum, sub-opacum, parce cinereo-squamulosum; fronte sub-elevata, longitudinaliter profunde tri-sulcata; oculi parvi, rotundati, valde prominuli, nigri; rostrum capite non longius et illo paulo angustius, incisuræ profunda a fronte distinctum, crassum, supra planum, profunde bi-sulcatum, punctulatum, nigrum, cinereo-squamulosum, supra os excisum et reflexo-marginatum. Antennæ breves, sub-tenuæ, nigræ, parce pilosæ; clava parva, ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, anterieus angustior, lateribus pone apicem modice rotundato-ampliatis; supra convexus, tuberculis sat crebris, nitidis obsitus; niger, sub-opacus, parce cinereo-squamulosus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra globosa, antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi paulo latiora, sed mox pone basin valde rotundato-ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra valde convexa, postice declivia, profunde et crebre punctato-striata, interstitiis angustis, convexis, seriaticim crebre granulatis; tota nigra, sub-opaca, squamulis cinereis inæqualiter adpersa. Corpus subtus subtiliter sat crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, pectore cinereo-squamoso. Pedes validi, nigri, cinereo-squamulosi, setulis pallidis adpersi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, basi tenuioribus, anticis parum incurvis; tarsis modice dilatatis, subtus griæo-spongiosis. — BHN.

- 4-5. B. CARINATUS. (*Schh.*) — *Ovatus, niger, sub-opacus, parcissime cinereo-squamosus; fronte tri-canaliculata, rostro inæquali, rude rugoso; thorace antice posticeque angustato, lateribus medio sub-angulariter ampliato, supra crebre rude rugoso, tenuiter carinato;*

*elytris mediocriter punctato-striatis, sutura interstitiisque alternis carinatis, pone humeros obtuse bi-tuberculatis.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Statura fere Blosyri Herthi et illo parum major.* Caput breve, latum, crassum, supra parum convexum, nigrum, sub-opacum, læve; fronte elevata, profunde tri-caniculata; interstitiis canaliculis elevatis, nitidis; oculi parvi, rotundati, valde prominuli, nigri; rostrum capite non longius et parum angustius, crassum, fere rectum, supra incisura profunda a fronte distinctum, planum, profunde rugosum, supra os excisum et reflexo-marginatum; totum nigrum, parum nitidum, glabrum. Antennæ breves, sub-tenuës, obscure ferrugineæ, parce pilosæ; clava parva, ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine media brevior, basi apiceque truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus medio sub-angulariter ampliatis; supra modice convexus, sat crebre rude rugoso-punctatus, dorso carinula tenui, postice abbreviata instructus, niger, sub-opacus, squamulis cinereis parcissime adpersus. Scutellum haud conspicuum. Elytra sub-globosa, antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi paulo latiora, humeris obliquis, tuberculis duobus brevibus instructis; pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse acuminata, thorace vix triplo longiora, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis cum sutura elevatis, carinatis; nigra, sub-opaca, squamulis cinereis parcissime adpersa. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, nigrum, sat dense cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, validi, nigri, parce cinereo-squamulosi et setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, rectis; tarsis brevibus, modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BAN.

\* 7. *B. INEQUALIS.* (Guérin.) — *Ovatus, niger, dense griseo-squamosus; fronte plana, rugosa, superciliis elevatis; rostro medio carinato, utrinque rugoso; thorace transverso, rude rugoso, dorso carinato, antèrius nonnihil angustato, lateribus parum ampliato; elytris sat rude punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis, posterius tuberculatis.*

*Patria* : Pondichery, Indiæ orientalis. Dom. COM. MANNERHEIM. DD. GUÉRIN et CHEYBOLAT. Mus. SCHH.

*Cneorhino geminato nonnihil major.* Caput breve, latum,



*crassum, longitudinaliter remote rugosum, nigrum, opacum, dense griseo-squamosum; fronte supra oculos elevata; oculi parvi, rotundati, valde prominuli, nigri, nitidi; rostrum capite vix longius et angustius, crassum, sub-rectum, supra planum, medio tenuiter carinatum, utrinque rugosum, supra os exeisum et reflexo-marginatum, colore et indumento capitis. Antennæ breves, minus tenues, nigro-piceæ, griseo-squamulosæ, parce setulosæ; elava parva, ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica brevior, apice truncatus, intra apicem striga transversa, tenui insculptus, anterius nonnihil angustior, lateribus in medio nonnihil angulariter ampliatis; basi sub-rotundatus, supra paulo convexus, rude rugosus, medio longitudinaliter tenuè carinatus, niger, sub-opacus, dense griseo-squamosus. Scutellum parvum, haud conspicuum. Elytra breviter ovata, antice conjunctim emarginata, thoracis basi paulo latiora, sed mox pone basin oblique ampliata, pone humeros tuberculo parvo, obtuso instructa, a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse acuminata, thorace triplo fere longiora, supra convexa, postice declivia, sat profunde punctato-striata, interstitiis alternis sub-planis, alternis cum sutura elevatis, posterius tuberculis nonnullis instructis; nigra, dense griseo-squamosa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, opacum, griseo-squamosum. Pedes mediocres, validi, nigri, griseo-squamulosi, parce breviterque albo-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, sub-rectis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.*

\* 8. B. SPONGIFER. (Schh.) — *Ovatus, niger, dense griseo-squamosus; fronte plana, longitudinaliter rugosa, superciliis elevatis; rostro basi linea transversa insculpto, medio tenuiter carinato, utrinque rugoso; thorace transverso, obsolete rugoso, postice tuberculo parvo instructo; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis elevatis, dorso et posterius tuberculatis.*

*Patria: Montes Neelgherienses, Indiæ orientalis, altitud. 8000 ped. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.*

Statura et summa similitudo *Blosyri inæqualis*, nonnihil minor; rostro basi striga profunda insculpto, thorace obsolete rugoso-punctato, basi tuberculo parvo instructo, interstitiis alternis dorso etiam tuberculatis, ab illo differre videtur. Caput breve, latum, crassum, supra parum convexus; fronte plana, longitudinaliter

*rugosa*, supra oculos utrinque elevata; totum nigrum, dense griseo-squamosum; oculi parvi, rotundati, prominuli, nigri, nitidi; rostrum longitudine et fere latitudine capitis, crassum, sub-rectum, supra planum, basi striga transversa a fronte disjunctum, medio leviter carinatum, utrinque rugosum, supra os excisum et reflexo-marginatum, nigrum, dense griseo-squamosum. Antennæ breves, sub-tenuæ, nigræ, parce griseo-squamosæ et setulosæ; clava parva, ovata, acuminata, fusco-pubescente. Thorax transversus, apice truncatus, intra apicem striga transversa insculptus, anterius nonnihil angustior, lateribus modice rotundato-ampliat; basi sub-rotundatus, supra modice convexus, obsolete rugosus, basi ante scutellum tuberculo parvo, sub-obtuso instructus, niger, dense griseo-squamosus. Scutellum parvum, haud conspicuum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi haud latiora, sed mox pone basin oblique ampliata, pone humeros tuberculo obtuso instructa; lateribus dein recta, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, sat profunde punctato-striata, interstitiis alternis sub-planis, alternis elevatis, sub-costatis, dorso et postice remote obtuse tuberculatis; nigra, squamulis densis, griseis tecta. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, griseo-squamosum. Pedes mediocres, validi, nigri, griseo-squamulosi, parce breviterque albo-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 133. — SCIAPHILUS. *Nobis*. — *H. op.* V. p. 912.

11-12. S. AUROSUS. (*Germar.*) — *Oblongus, niger, impubis, viridissquamulosus; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis; thorace confertim alutaceo, utrinque parum rotundato, modice convexo; elytris ovatis, convexis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, levibus.*

*Sciaphilus id.* DOM. GERMAR in litteris.

*Patria*: Sicilia. A DOM. GERMAR ad describendum missus.

Parvus. *Phyllobio viridicollis* nonnihil minor, in elytris magis convexus. Caput majusculum, quadrangulum, crassum, convexum, confertim punctulatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis viridi-argenteis supra oculos densius adpersum; oculi laterales, semi-globosi, nigro-brunnei; rostrum capite nonnihil brevius et

angustius, crassum, rectum, supra planum, nigrum, punctulatum, viridi-argenteo-squamulosum, apicem versus supra tenuissime canaliculatum. Antennæ ultra thoracis basin attingentes, crassæ, ferrugineæ, albido-pubescentes; clava ovata, dilutiore. Thorax latitudine media brevior, basi apiceque truncatus, lateribus parum ampliatus, supra paulo convexus, intra basin et apicem vix impressus, confertim subtiliter punctulatus, niger, sub-nitidus, in dorso parcius, lateribus densius viridi-argenteo-squamulosus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, viridi-squamulosum. Elytra ovata, antice truncata, thoracis basi multo latiora, humeris fere rectangularis; lateribus ad medium nonnihil ampliata, dein angustata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, subtiliter regulariter punctato-striata, interstitiis planis, lævibus; nigra, nitida, squamulis parvis, rotundatis, viridi-argenteis sat dense obsita. Corpus subtus punctulatum, nigrum, parce viridi-squamulosum. Pedes longiusculi, validi; femoribus crasse clavatis, nigris, viridi-squamulosis; tibiis tarsisque ferrugineis, pube albida adpersis.

BHN.

GENUS 138. — COLECERUS. *Nobis.* — *H. sp. V. p. 927.*

- \* 2. *C. VARIEGATUS.* (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, niger, cinereo-squamulosus; rostro sulcato; thorace transverso, anterieus angustato, lateribus sensim ampliato, dorso brunneo-bi-vittato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, coriaceis, brunneo-variegatis.*

*Patria* : Oaxaca, Mexico. *Dom.* SOMMER. *Mus.* SCHH.

*Strophosomo hispido* magnitudine æqualis. Caput mediocre, crassum, supra modice convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, dense læte brunneo-circa oculos et subtus cinereo-squamulosum; oculi parvi, rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, rectum, sub-teres, supra medio profunde sulcatum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, cinereo-squamulosum, subtus parce pallido-setulosum. Antennæ breves, minus tenues, nigrae, parce pilosæ; clava parva, ovata, acuminata, fusco-pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice late emarginatus, lobis ocularibus productis, obtuse rotundatis; anterieus angustior, lateribus obliquis, versus basin sensim ampliatis; postice profunde bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter confertim punctulatus, niger, dense cinereo-

squamosus, dorso vittis duabus, anterieus attenuatis maculaque obsoleta laterali, læte brunneis, decoratus. Scutellum breve, latum, dense cinereo-squamosum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basi paulo latiora; humeris sub-elevatis, oblique angulatis; lateribus non amplata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace triplo longiora, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-planis, subtilissime coriaceis; nigra, dense cinereo-squamosa, maculis hinc inde in fasciis confluentibus, brunneis variegata. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigram, dense sordide cretaceo-squamosum. Pedes mediocres, validi, nigri, sordide cretaceo-squamosi, parce breviterque albo-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis.

BHN.

GENUS 138-139. — POROPHORUS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ breviusculæ, minus tenues; articulis 1, 2 longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, sub-turbinatis; clava ovata.

Rostrum breviusculum, capite angustius, basi leviter transverse impressum.

Oculi rotundati, sub-depressi.

Thorax sub-transversus, basi truncatus, lateribus vix rotundatus, anterieus paulo angustior, utrinque pone oculos lobatus.

Elytra ovata, convexa.

Tarsi sub-angustati, parce setosi, subtus haud spongiosi.

DESCRIPTIO. — *Corpus* sub-ovatum, convexum, dense squamosum, apterum; minusculæ magnitudinis. — *Antennæ* versus apicem rostri insertæ, ad thoracis medium vix pertingentes, minus tenues, parce setosæ, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculos vix attingente, recto, clavato, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> longiusculis, sub-obconicis, 4-8 brevibus, sub-turbinatis, æqualibus, perparum coarctatis; clava minuscula, ovata, acuminata, distincte 4-articulata. — *Rostrum* longitudine capitis eoque manifeste angustius, deflexum, æquilatum, supra planum, apice paulo emarginatum; scrobe juxta canthum oculi inferum desinente, curvata, profunda. — *Oculi* mediocres, laterales, rotundati, sub-depressi. — *Thorax* latitudine baseos nonnihil brevior, basi truncatus, lateribus ultra medium sub-rectis; dein rotundatus, anterieus angustior, apice

supra et infra late sed leviter introrsum emarginatus, utrinque pone oculos lobatus, supra modice convexus. — *Scutellum nullum.* — *Elytra* oblongo-ovata, basi truncata, humeris rotundatis; supra convexa, postice (tuberculata) declivia, abdomen arcute includentia. — *Pedes* mediocres, mutici, sub-æquales; femoribus clavatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis parum latis, subtus haud spongiosis, setosis, articulo ultimo clavato, bi-unguiculato.

A  $\pi\acute{\omega}\rho\omicron\varsigma$ , callus, tophus;  $\varphi\omicron\rho\omicron\varsigma$ , ferens.

Typus. — *Porophorus odiosus*; e Capite Bonæ Spei.

Obs. — Quoad habitum quidem *Strophosomo* generi quodammodo sub-simile est hoc genus, sed thorax pone oculos lobatus, etc.

\* I. P. ODIOSUS. (Schh.) — *Sub-ovatus, niger, dense griseo-squamosus; rostro basi transversim impresso, supra obsolete rugoso; thorace subtiliter rugoso, intra apicem late impresso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis convexis, rugulosis, dorso postico obtuse tuberculatis.*

*Patria*: Caput Bonæ Spei. DD. GERMAR et CHEVROLAT. MUS. SCHH.

*Strophosomo Coryli* vix longior, sed dimidio angustior. Caput breve, crassum, supra modice convexum, subtiliter crebre rugulosum, nigrum, dense griseo-squamosum; oculi mediocres, parum convexi, nigri; rostrum capite nonnihil longius et manifeste angustius, crassum, sub-teres, parum arcuatum, basi transversim impressum, obsolete rugulosum, nigrum, dense griseo-squamosum. Antennæ minus elongatæ, sub-tenuis, nigræ, griseo-squamosæ; clava parva, ovata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica brevior, apice late emarginatus, pone oculos nonnihil productus, obtuse rotundatus, anterieus angustior, intra apicem late sed parum profunde impressus, mox pone stricturam nonnihil rotundato-ampliatus, basi truncatus, supra paulo convexus, obsolete rugoso-punctatus, niger, dense griseo-squamosus. *Scutellum nullum.* *Elytra* antice conjunctim truncata, thoracis basi paulo latiora, humeris obliquis, non elevatis; lateribus pone humeros haud ampliata, a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, thorace triplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis convexis; dorso postico obtuse remote tubercu-

*lata*, sutura ibique elevata; nigra, squamositate densa, grisea tecta. Corpus subtus obsolete punctulatum, cinereo-squamosum, parce breviterque albo-setulosum. Pedes mediocres, validi, picei, cinereo-squamulosi et breviter setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus setosis. — BHN.

GENUS 138-139 bis. — EREPSIMUS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ mediocres, sub-tenuæ; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, sub-obconicis, reliquis sub-rotundatis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum breviusculum, capite multo angustius, basi transverse impressum, apice triangulariter emarginatum, margine elevato.

Oculi rotundati, depressi.

Thorax sub-oblongus, basi truncatus, lateribus æqualiter paulo rotundato-ampliatus, pone oculos lobatus.

Elytra breviter ovata, supra valde convexa.

DESCRIPTIO. — *Corpus* breve, convexum, squamosum (parce setosum), apterum; minimæ magnitudinis. — Antennæ thoracis basi fere attingentes, versus apicem rostri insertæ, sub-tenuæ, parce pilosæ, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1° oculos vix superante, basi tenui, extrorsum modice incrassato, 2° et 3° longiusculis, sub-obconicis, 4-8 sub-rotundatis, æqualibus, omnibus paulo distantibus; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* capite paulo longius, validum, deflexum, basi per strigam transversam, sub-arcuatam a capite fere distinctum, supra sub-planum, supra os triangulariter emarginatum, marginibus elevatis; scrobe lineari, curvata, in basi rostri subtus cum opposita connexa. — *Oculi* laterales, mediocres, rotundati, depressi. — *Thorax* latitudine paulo longior, basi truncatus, lateribus æqualiter nonnihil rotundato-ampliatus, antè vix angustior, apice supra in medio perparum rotundato-productus, utrinque leviter emarginatus, pone oculos lobatus, subtus profunde late emarginatus, supra convexus. — *Scutellum* haud observandum. — *Elytra* basi truncata, thorace non latiora, angulis humeralibus rotundatis; lateribus ultra medium rotundata, medio latiora, apice conjunctim rotundata, supra valde convexa. — *Pedes* mediocres, validiusculi, longitudine sub-

æquales; femoribus in medio valde incrassatis, muticis; tibiis teretibus, sub-rectis, apice vix unguiculatis; tarsis tibiis dimidio brevioribus, articulis duobus basalibus angustatis, 3<sup>o</sup> latiore, bi-lobo, subtus vix spongioso, ultimo clavato, bi-unguiculato.

Ab ἐρείψιμος, **caducus**, ruinosus.

TYPUS. — **Erepsimus setiferus**; e Brasilia.

Obs. — Generi *Sciaphilo* quoad habitum simile est hoc genus.

\* 1. **E. SETIFERUS.** (Schh.) — *Sub-ovatus, convexus, niger, cinereo-squamosus, setis longis, erectis muricatis; antennis testaceis, rostro brevi, lineari, basi transversim impresso; thorace oblongo, evidenter crebre rugoso-punctato, lateribus parum rotundato, intra apicem constricto; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis convexis, basi macula obsoleta et medio fascia transversa obscuriore insignitis.*

*Patria*: Brasilia. Dom. WESTERMANN. Mus. SCHH.

Parvus. *Strophosomo squamulato* magnitudine fere æqualis. Caput mediocre, crassum, supra parum convexum, subtiliter punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamosum, parce setulosum, inter oculos tenuiter canaliculatum; oculi parvi, rotundati, depressi, nigri; rostrum capite parum longius sed dimidio angustius, crassum, sub-teres, æquilatum, rectum, basi striga transversa, profunda a fronte disjunctum, subtiliter punctulatum, colore et indumento capitis. Antennæ sub-tenuis, testaceæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore. Thorax oblongus, antice late emarginatus, pone oculos obtuse lobatus, anterie nonnihil angustior, intra apicem late sed minus profunde impressus, lateribus parum rotundatus, basi truncatus, supra modice convexus, crebre sat profunde rugoso-punctatus, niger, dense griseo-squamosus et setulosus. Scutellum haud observandum. Elytra ovata, antice conjunctim truncata, thoracis basi haud latiora, mox pone basin ultra medium rotundato-ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, mediocriter punctato-striata, interstitiis convexis, nigra, cinereo-squamosa et dense setulosa, macula basali obsoleta et fascia media parum conspicua, obscurioribus, insignita. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamosum. Pedes mediocres, picei, cinereo-squamulosi et setulosi; femoribus mo-

dice clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, rectis, cum tarsis dilatatoribus. — BHN.

GENUS 142. — PIAZOMIAS. Nobis. — H. op. V. p. 936. 142.

\* 0. P. GLOBULICOLLIS. (Faldermann.) — *Elongatus, niger, squamulis læte viridi-argenteis inæqualiter dense adpersus; rostro canaliculato; thorace magno, rotundato, globoso, confertissime granulato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis sub-planis, subtiliter coriaceis, lateribus densius squamulosis.*

*Naupactus id.* Huj. op. VI. p. 109. 140.

*Patria:* Mongolia. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

*Brachydero incano* ♂ magnitudine æqualis. Caput mediocre, crassum, supra parum convexum, postice obsoletius, anterius evidenter crebre ruguloso-punctatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis læte viridi-argenteis supra parce, subtus dense obsitum; oculi rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, æquilatum, parum arcuatum, supra planum, subtiliter confertim rugoso-punctatum, medio canaliculatum, nigrum, squamulis læte viridi-argenteis adpersum. Antennæ ad thoracis medium pertingentes, minus tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, dense fusco-pubescente. Thorax rotundatus, latitudine postica vix longior, basi apiceque truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus valde æqualiter rotundato-ampliatus, supra convexus, subtiliter confertissime granulatus, niger, sub-nitidus, squamulis læte viridi-argenteis sat dense adpersus. Scutellum haud conspicuum. Elytra oblonga, antice conjunctim truncata, reflexo-marginata, thoracis basi haud latiora, lateribus pone basin ad medium parum ampliata, dein apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, parum profunde punctato-striata, interstitiis sub-planis, subtiliter crebre coriaceis; nigra, parum nitida, squamulis læte viridi-argenteis minus dense ad latera densioribus adpersa. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis viridi-argenteis sat crebre adpersum. Pedes mediocres, nigri, parce læte viridi-argenteo-squamulosi, antici validiores; femoribus ejusdem paris valde clavatis; tibiis intus denticulatis; tarsis omnibus modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 2. P. SCHRENCHII. (Mannerheim.) — *Oblongus, niger, squamulis læte virescentibus dense tectus; fronte rostroque convexis, confer-*



*tim punctulatis, illa utrinque basi obsolete carinata; thorace posterius angustiore, supra parum convexo, sat crebre ruguloso; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis, subtilissime coriaceis.*

*Patria* : Steppis Kirgisiis. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

Magnitudo *Eusomi ovuli*. *Piazom. virescenti* vix latior, sed dimidio longior; capite rostroque convexis, non canaliculatis, thorace remotius rugoso, elytris subtiliter punctato-striatis, ut et colore indumenti, ab illo abunde differt. Caput breve, latum, crassum, supra valde convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis læte virescentibus sat dense obsitum; oculi laterales, parvi, sub-ovati, modice prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, parum arcuatum, supra modice convexum, subtiliter crebre punctulatum, utrinque tenuiter carinatum, nigrum, sub-nitidum, supra parcius, lateribus et subtus densius læte virescenti-squamosum. Antennæ breves, minus tenues, nigrae, virescenti-squamosæ et parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, atra. Thorax latitudine media brevior, apice truncatus, intra apicem striga tenui, transversa insculptus, anterie nonnihil, posterius magis angustatus, lateribus sub-rectis; basi etiam truncatus, tenue marginatus, supra parum convexus, evidenter sat crebre rugosus, niger, squamulis læte virescentibus dense tectus. Scutellum haud observandum. Elytra oblonga, antice conjunctim truncata, thoracis basi non latiora, lateribus pone basin ultra medium nonnihil ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso singulatim ad suturam breviter mucronata, supra convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis; nigra, squamulis læte virescentibus dense tecta. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, nigrum, dense læte virescenti-squamosum. Pedes mediocres, nigri, similiter squamosi, antici nonnihil longiores et validiores; femoribus ejusdem paris magis clavatis; tibiis omnibus æretibus, intus setulosis; tarsis parum dilatatis, subtus fusco-pongiosis. — BHN.

GENUS 143-144. — GEOTRAGUS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ mediocres, sub-tenues; scapo oculos attingente, clavato; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, reliquis brevibus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum breve, æquilatum, supra planum, depressum, in medio tenue canaliculatum.

Oculi sub-hemisphærici.

Thorax oblongus, basi apiceque sub-truncatus, lateribus æqualiter rotundato-amplius.

Elytra elongata, ovalia, basi truncata, apicem versus attenuata, supra versus apicem callosa.

Pedes longiusculi, sub-tenuis, antici nonnihil longiores.

DESCRIPTIO. — *Corpus* elongatum, sub-ovatum, convexum, squamosum, inæquale, apterum; mediocris magnitudinis. — *Antennæ* thoracis medium non superantes, versus apicem rostri insertæ, sub-tenuis, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1° oculos attingente, clavato, 2° et 3° longiusculis, 4-8 brevibus, omnibus sub-obconicis, ultimo paulo crassiore, parce setosis; clava oblongo-ovata, acuminata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* breve, sub-deflexum, capite contiguum, sub-lineare, supra planum, depressum, in medio linea tenui, longitudinali impressum, apice rotundato-emarginatum; scrobe lineari, curvata, infra oculos desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, valde prominuli. — *Thorax* latitudine baseos dimidio longior, antice supra truncatus, infra pone gulam late leviter emarginatus, lateribus æqualiter rotundato-amplius, postice truncatus, supra modice convexus. — *Scutellum* haud distinctum. — *Elytra* antice thoracis parte postica non latiora illoque fere triplo longiora, oblongo-ovalia, basi truncata, intra basin sub-constricta, lateribus æqualiter rotundato-amplius, apicem versus sensim attenuata, apice ipso singulatim sub-acuminata, supra modice convexa, dorsi disco depressa, utrinque versus apicem callosa. — *Pedes* longiusculi, sub-tenuis, antici paulo longiores; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis apice paulo curvatis, apice ipso ungulo parvo armatis, intus crenulatis; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulo ultimo longo, clavato, bi-unguiculato.

A γῆ, terra; ἦρας, hircus.

TYPIUS. — *Geotragus Himalayanus*.

Obs. — Hocce genus quodammodo *Cyclomo* generi paulo est simile.

\* 1. G. HIMALAYANUS, (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, læte brunneo-squamosus; antennis ferrugineis, rostro canaliculato; thorace*

*oblongo, sat crebre rugoso-granulato, basi canaliculato, lateribus modice rotundato; elytris dorso fusco-variegatis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, secundo magis elevato, medio sub-tuberculato, pone medium in interstitio quarto tuberculo validiori instructo.*

*Patria: Himalaya. DOM. WESTERMANN. Mus. SCHH.*

*Brachytero incano* magnitudine æqualis. Caput mediocre, crassum, supra modice convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, parum nitidum, parcissime squamulosum; oculi rotundati, valde prominuli, nigri; rostrum capite vix longius, sed angustius, crassum, fere rectum, æquilatum, supra depressum, longitudinaliter aciculatum, medio tenuiter canaliculatum, nigrum, supra parce lateribus et subtus densius brunneo-squamosum. Antennæ breves, sub-tenues, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore, cinereo-pubescente. Thorax oblongus, latitudine postica dimidio longior, basi apiceque truncatus, anterieus nonnihil angustior, intra apicem striga transversa insculptus, lateribus perparum rotundato-ampliatis; postice tenuiter marginatus, supra modice convexus, sat crebre rugoso-granulatus, basi tenuiter canaliculatus, niger, dorso parcius lateribus et subtus dense brunneo-squamosus. Scutellum parvum, haud conspicuum. Elytra antice truncata, mox intra basin leviter constricta, lateribus æqualiter rotundato-ampliata, apicem versus sensim angustata, apice ipso singulatim acuminata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, dorso antico depressa, postice declivia, sat profunde punctato-striata, interstitiis convexis, secundo magis elevato, pone medium tuberculo oblongo, obtuso instructo, quarto apicem propius tuberculo validiori armato; nigra, dense læte brunneo-squamosa, dorso antice nonnihil fusco-variegata. Corpus subtus obsolete sat crebre punctulatum, nigrum, dense griseo-squamosum. Pedes longiusculi, sub-tenues, nigri, griseo-squamosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis apice paulo curvatis, intus crenulatis; tarsis modice dilatatis, subtus fusco-spongiosis. — BHN.

GENUS 159. — DEREODUS. *Nobis.* — *H. op.* VI. I. p. 211.

2. *D. ALBOSCUTELLATUS.* (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, niger, parum nitidus, supra parcius subtus dense cinereo-squamosus; fronte rostroque canaliculatis, subtiliter confertim coriaceis; thorace coriaceo,*

*transversim remote rugoso, medio canaliculato, dorso albo-tri-vittato, scutello albo-squamoso; elytris antice posticeque angustatis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis convexis, subtiliter coriaceis, apice conjunctim acuminatis.*

*Patria* : Loanda, Africae meridio-occidentalis. Mus. Dom. SOMMER.

*Dereodo denticolli* vix latior sed nonnihil longior; capite rostroque subtiliter punctulatis, thorace convexo, coriaceo, medio tantum canaliculato, elytris antrorsum angustatis, apice magis acuminatis, minus profunde punctato-striatis, ut et scutello albo-squamoso, ab illo abunde differt. Caput breve, crassum, supra modice convexum, subtiliter crebre coriaceum, nigrum, subnitidum, supra parcius circa oculos densius albo-squamosum; fronte canalicula profunda, versus apicem rostri continuata in-sculpta; oculi parvi, rotundati, convexi, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, sub-rectum, supra planum, subtiliter crebre coriaceum, apice triangulariter emarginatum, ciliatum, colore et indumento capitatis. Antennae breves, sat validae, nigrae, cinereo-squamulosae et pilosae; clava oblonga, acuminata, fusco-pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica nonnihil brevior, apice late emarginatus, lobis infra-ocularibus elongatis, acutis; intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis, versus basin sensim ampliatis; postice truncatus, tenue marginatus, supra modice convexus, subtiliter crebre coriaceus, transversim remote rugosus, medio canalicula antice posticeque nonnihil abbreviata in-sculptus; niger, parce cinereo-squamulosus, vittis tribus, media obsoleta, e squamis albidis ornatus. Scutellum mediocre, apice rotundatum, dense albo-squamosum. Elytra antice conjunctim truncata, thoracis basi angustiora, pone basin ultra medium sensim rotundato-ampliata, dein apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim acuminata, thorace vix triplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, subtiliter crebre coriaceis; nigra, parum nitida, tenuiter cinereo-squamulosa. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, nigrum, cinereo-squamosum, abdomine vitta media maculisque lateralibus obsoletis, fusco-brunneis insignito. Pedes mediocres, validi, nigri, cinereo-squamulosi et pilosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis nonnihil inflexis, intus obsolete crenulatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BAN.

GENUS 167. — BRACHYASPISTES. *Nobis.* — *H. op.* VI. I. p. 249.

♂♀ 2. *B. ACUTIPENNIS.* (*Guérin*) — *Oblongo-ovatus, niger, opacus, supra parce lateribus et subtus dense silaceo-squamosus; capite rostroque confertim punctulatis, hoc supra impresso, canaliculato; thorace ovato, confertim subtiliter granulato, lateribus æqualiter modice rotundato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, coriaceis, apice ipso singulatim acuminatis, breviter mucronatis.*

*Mas*: minor, angustior; elytris thorace paulo latioribus.

*Femina*: major, latior; elytris thorace fere duplo latioribus.

*Astycus id.* GUÉRIN. *Rev. Zool. Cuvier.*

*Patria*: Neelgheries, Indiæ orientalis. DD. GUÉRIN et CHEVROLAT. Mus. SCHH.

Longitudo *Sitonis grisei*, nonnihil tamen latior. Caput breve, crassum, supra modice convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, minus dense silaceo-squamosum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, æquilatum, supra planum, medio impressum, ibique canaliculatum, punctura, colore et indumento capitis. Antennæ mediocres, sub-tenuis, nigræ, parce cinereo-pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica non longior, apice oblique truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus modice æqualiter rotundatus, basi exacte truncatus, tenuiter reflexo-marginatus, supra convexus, confertim subtiliter granulatus, niger, sub-opacus, dorso parce lateribus et subtus dense silaceo-squamosus. Scutellum parvum, rotundatum, silaceo-squamosum. Elytra antice truncata, reflexo-marginata, thoracis basi non latiora, mox pone basin sub-constricta, dein lateribus ad medium, in mare parum, in femina magis, ampliata; apicem versus attenuata, apice ipso singulatim acuminata, breviter mucronata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, confertim coriaceis; nigra, sub-opaca, dorso parcius lateribus dense silaceo-squamosa. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, squamulis silaceis, metallico-nitentibus tectum. Pedes mediocres, validi, nigri, parcius silaceo-squamulosi et breviter setulosi; femoribus modice, anticis magis incrassatis; tibiis teretibus, anticis apicem versus inflexis, intus denticulatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 3. *B. PEROTETI*. (Chevrolat.) — *Oblongus, niger, subtus sulphureo-squamosus; capite rostroque convexus, subtilissime punctulatis, illo basi canalicula brevi insculpto; thorace subtiliter crebre coriaceo, dorso sub-denudato, lateribus sulphureo-squamoso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, coriaceis, sutura a basi ultra medium albo-, vitta media disci lateribusque sulphureo-squamosis.*

*Patria*: Neelgheries, Indiæ orientalis. DOM. CHEVROLAT. MUS. SCHH.

*Sitoni griseo* magnitudine æqualis. Caput breve, crassum, supra convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, fere glabrum, subtus sulphureo-squamosum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, lineare, parum arcuatum, supra modice convexum, subtiliter apicem versus evidenter crebre punctulatum, medio canalicula brevissima, tenui insculptum; nigrum, nitidum, subtus parce sulphureo-squamosum et pallido-setulosum. Antennæ mediocres, sub-tenues, nigro-piceæ, parce cinereo-pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique, basi exacte truncatus, antice posticeque nonnihil angustatus, lateribus modice æqualiter rotundatus, postice reflexo-marginatus, supra modice convexus, confertim coriaceus, niger, sub-opacus, dorso plaga magna, sub-cruciformi, fere denudata insignitus, lateribus sulphureo-squamosus. Elytra antice truncata, reflexo-marginata, thoracis basi haud latiora, mox pone basin sub-constricta, lateribus ad medium nonnihil rotundato-ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso dehiscencia, singulatim breviter mucronata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, confertim coriaceis; nigra, sub-opaca, sutura a basi ultra medium albo-, vitta longitudinali disci lateribusque sulphureo-squamosis. Corpus subtus subtiliter coriaceum, nigrum, sulphureo-squamosum. Pedes mediocres, nigri, læte viridi-argenteo-squamulosi et pallido-pubescentes; femoribus anticis valde reliquis paulo incrassatis; tibiis primi paris apicem versus inflexis, intus denticulatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

\* 4. *B. PRASINUS*. (Guérin.) — *Oblongo-ovatus, niger, squamulis læte viridibus tectus; capite convexo, subtiliter confertim punctulato,*

rostro medio impresso, ibique breviter canaliculato; thorace confertim coriaceo, lateribus et basi sulphureo-pollinoso; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis sub-planis, coriaceis, apice ipso dehiscentibus, singulatim breviter mucronatis, lateribus antice sulphureo-pollinosis.

*Astycus id.* GUÉRIN. *Rev. Zool. Cuvier.*

*Patria* : Neelgheries, Indiæ orientalis. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

Magnitudo fere *Tanymeci palliati*. Caput breve, crassum, convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, squamulis læte viridibus obsitum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite vix longius, sed illo nonnihil angustius, crassum, lineare, parum arcuatum, supra in medio foveola sat magna insculptum, ibique breviter canaliculatum; subtiliter crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, supra parcius, subtus densius viridi-squamosum. Antennæ mediocres, subtenuæ, parce squamulosæ et setulosæ; clava oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice oblique basi exacte truncatus, anterius nonnihil angustior, lateribus obliquis, parum rotundato-ampliatis; postice tenuiter reflexo-marginatus, supra modice convexus, confertim coriaceus, niger, squamulis læte viridibus dense tectus, lateribus basi-que anguste sulphureo-pollinosus. Scutellum parvum, rotundatum, læte viridi-squamosum. Elytra antice conjunctim sub-truncata, thoracis basi paulo latiora, mox pone basin leviter sub-constricta, lateribus ultra medium perparum ampliata, apicem versus angustata, apice ipso dehiscentia, singulatim breviter mucronata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis sub-planis, coriaceis; nigra, squamulis læte viridibus dense vestita, lateribus anterius flavo-pollinosa. Corpus subtus subtiliter crebre coriaceum, nigrum, læte viridi-squamosum. Pedes mediocres, nigri, similiter squamosi, parce breviterque albo-setulosi; femoribus clavatis, mediis tenuioribus; tibiis teretibus, anticis inflexis, intus denticulatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 173. — SIDERODACTYLUS. *Nob.* — *H. op.* VI. I. p. 283.

7. *S. MURINUS.* (*Schh.*) — *Oblongus, niger, cinereo-squamosus; fronte rostroque canaliculatis, illa bi-impressa, utrinque carinata; tho-*

*race confertim subtiliter granulato, tenuiter canaliculato, lateribus rotundato-ampliato, intra apicem constricto, utrinque vitta laterali dense albo-squamosa decorato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, dorso remote fusco-variegatis.*

*Patria*: Benguela, Africae. Mus. Dom. SOMMER.

*Sitoni 8-punctato* magnitudine aequalis. Caput breve, crassum, supra parum convexum, obsolete punctulatum, nigrum, nitidum, parce subtus dense cinereo-squamosum, medio canalicula tenui, fere ad apicem rostri continuata, insculptum; oculi rotundati, modice prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, porrectum, lineare, supra planum, longitudinaliter leviter bi-impressum, utrinque in margine leviter carinatum, subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, supra parce lateribus et subtus densius cinereo-squamosum. Antennae breves, sub-tenuis, ferrugineae, parce pilosae; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore. Thorax latitudine postica paulo brevior, apice oblique truncatus, intra apicem sub-constrictus, lateribus in medio aequaliter rotundato-amplius, basi leviter bi-sinuatus, reflexo-marginatus, supra modice convexus, subtiliter crebre granulatus, medio tenuiter canaliculatus; niger, squamulis cinereis sat dense adpersus, vitta infra-laterali e squamulis densioribus, albidis insignitus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, parce squamosum. Elytra antice conjunctim sub-truncata, thoracis basi latiora, humeris sub-elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse acuminata, thorace fere triplo longiora, supra paulo convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis parum convexis; nigra, squamulis cinereis obsita, dorso sub-remote fusco-variegata. Corpus subtus subtiliter coriaceum, nigrum, sub-opacum, tenuiter cinereo-squamulosum. Pedes nigri, cinereo-squamulosi; femoribus anticis magnis, crassis; tibiis ejusdem paris elongatis, arcuatis, interne evidenter denticulatis. — BEN.

GENUS 175. — HADROMERUS. *Nob.* — *H. op.* VI. I. p. 290.

\* 5-6. *H. GEMMIFER.* (*Reiche.*) — *Oblongus, niger, sub-nitidus, squamulis viridi-nitidis sat dense obsitus; fronte canaliculata, rostro basi transversim impresso; thorace obtuse sub-remote granulato, utrinque magis rotundato; elytris subtiliter striatis, interstitiis sub-planis, rugulis parum elevatis, denudatis, crebris obsitis; femoribus anticis crassis; tibiis incurvis, denticulatis.*



*Patria* : Venezuela. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

Statura fere *Hadromeri Dejeanii*, dimidio fere major; fronte canaliculata, rostro transversim basi impresso, thorace utrinque magis rotundato, obtuse granulato, elytris subtiliter punctato-striatis, plagis parvis, crebris, sub-denudatis adpersis, ab illo abunde distinctus. Caput sub-quadratum, crassum, supra modice convexum, subtiliter crebre coriaceum, nigrum, sub-nitidum, squamulis viridi-nitidis sat crebre adpersum; fronte canalicula tenui insculpta; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite non longius, sed illo nonnihil angustius, crassum, sub-rectum, lineare, supra planum, basi late sed parum profunde transversim impressum, subtiliter crebre punctulatum, colore et indumento capitis. Antennæ mediocres, sub-tenues, ferruginæ, parce pilosæ; clava oblonga, acuminata, obscuriori. Thorax latitudine postica parum brevior, basi apiceque truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus valde rotundato-ampliatus, postice reflexo-marginatus, supra modice convexus, sub-remote obtuse granulatus, niger, squamulis viridi-nitidis sat dense adpersus. Scutellum parvum, sub-triangularare, dense læte viridi-squamosum. Elytra antice sub-truncata, thoracis basi duplo fere latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus ultra medium perparum ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, ad suturam singulatim breviter mucronata, thorace plus triplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, sutura ibique elevata; subtiliter punctato-striata, nigra, squamulis viridi-nitentibus adpersa, plagis parvis, crebris, sub-elevatis, denudatis insignita. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis viridi-nitentibus adpersum. Pedes nigri, parce viridi-squamulosi et pallido-pubescentes; femoribus anticis valde clavatis, muticis; tibiis ejusdem paris inflexis, intus remote denticulatis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 181. — EUGNATHUS. Nob. — *H. op.* VI. I. p. 304.

\* 1-2. E. SQUAMIFER. (Schh.) — *Sub-ovatus, niger, supra silaceo, subtus cinereo-squamosus; rostro basi canaliculato; thorace latiori, confertim evidenter rugoso-punctato, vitta utrinque dorsali parce squamosa ornato; elytris mediocriter remote punctato-striatis, interstitiis sub-planis, confertim coriaceis.*

*Patria* : Insula Cuba. Dom. WESTERMANN. Mus. SCHH.

*Statura Eugnathi viridani*, nonnihil major; colore indumenti, fronte non canaliculata, thorace latiore, evidenter rugoso-punctato, interstitiis elytrorum confertim coriaceis, ab illo differt. Caput majusculum, crassum, supra modice convexum, crebre punctulatum, nigrum, sat crebre silaceo-squamosum; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite paulo longius et angustius, crassum, lineare, rectum, subtiliter confertim punctulatum, supra planum, a basi ultra medium tenuiter canaliculatum, nigrum, nitidum, supra parcius, lateribus et subtus densius silaceo-squamosum. Antennæ breves, sub-tenuæ, nigræ, parce pilosæ; clava parva, oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica haud brevior, apice oblique truncatus, intra apicem striga transversa utrinque impressus, antice posticeque angustatus, lateribus modice æqualiter rotundato-ampliatum, basi leviter emarginatus, reflexo-marginatus, supra convexus, confertim evidenter rugoso-punctatus, niger, silaceo-squamosus, vittis duabus dorsalibus, parce squamosis decoratus. Scutellum parvum, rotundatum, similiter squamulosum. Elytra antice singulatim perparum rotundato-producta, thoracis basi fere duplo latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus ultra medium perparum ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, supra convexa, postice declivia, mediocriter sub-remote punctato-striata, interstitiis sub-planis, confertim coriaceis; nigra, squamulis silaceis sat dense obsita. Corpus subtus nigrum, dense cinereo-albido-squamosum. Pedes mediocres, nigri, sub-argenteo-squamulosi; femoribus anticis nonnihil validioribus, omnibus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus læte brunneo-spongiosis.

BHN.

GENUS 186-187. — PERIORGES. *Nobis*.

*Character generis*. — Antennæ breviusculæ, minus tenues; articulis funiculi omnibus breviusculis, sub-turbinatis, sub-æqualibus; clava ovata.

Rostrum breve, crassum, in medio alte carinatum, carina supra os bifida; apice ipso profunde triangulariter emarginatum.

Oculi sub-ovati, parum convexi, majusculi.

Thorax sub-linearis, apicem versus paulo angustior, basi bisinuatus, apice late emarginatus, pone oculos lobatus.

Scutellum rotundatum, sub-transversum.

*Elytra* ovata, basi leviter bi-sinuata, humeris obtuse rotundata.

*Pedes* mediocres, sub-æquales.

DESCRIPTIO. — *Corpus* ovatum, supra modice convexum, dense squamosum, alatum; minoris magnitudinis. — *Antennæ* rostro capiteque paulo longiores, infra medium rostri insertæ, sub-tenuis, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1<sup>o</sup> oculos pertingente, clavato, 2-8 breviusculis, sub-turbinatis, illo perparum longiore, reliquis æqualibus; clava ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* longitudine capitis eoque parum angustius, deflexum, supra modice convexum, in medio carinatum, carina valde elevata, apicem versus bifida instructum, apice ipso profunde triangulariter emarginatum, ciliatum; scrobe lineari, subito subtus flexa, in medio rostri subtus cum opposita conjuncta. — *Oculi* laterales, sub-ovati, nonnihil convexi, sed haud prominuli, majusculi. — *Thorax* latitudine vix longior, lateribus basi sub-rectus, anterie nonnihil angustior, basi modice bi-sinuatus, apice supra et infra late emarginatus, pone oculos lobis eximie instructus, supra modice convexus. — *Scutellum* mediocre, rotundatum, sub-transversum. — *Elytra* thoracis basi duplo latiora et fere quadruplo longiora, sub-ovata, humeris obtuse angulatis; apice conjunctim rotundata, supra modice convexa. — *Pedes* mediocres, validi, æquales; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, bi-unguiculato.

A περιοργης, iratus.

TYPIUS. — *Periorges subsignatus*; e Brasilia interiore.

Genus quoad habitum generi *Promecopo* proximum.

\* 1. P. SUBSIGNATUS. (Schh.) — *Sub-ovatus, niger, supra cervino-, subtus viridi-argenteo-, pedibus basi exceptis, aureo-squamosus; rostro medio acute carinato; thorace sub-cylindrico, antice parum angustato, confertim punctulato, basi tenuiter canaliculato ibique utrinque fusco-maculato; elytris mediocriter punctato-striatis, vitta magna dorsali, communi, medio sinuato-emarginata, umbrina, atro-variegata decoratis.*

*Patria*: Brasilia interior. Dom. SOMMER. Mus. SCHH.

Magnitudo *Phytonomi suspiciosi*. Caput breve, crassum, parum convexum, confertim transversim strigosum, nigro-piceum, pos-

tice *denudatum*, inter oculos *cervino-squamosum*; oculi sub-ovati, parum convexi, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, paulo arcuatum, *lineare*, punctulatum, in medio alte carinatum, carinula supra os *bifida*; apice triangulariter emarginatum, ciliatum, *nigrum*, *cervino-squamosum*. Antennæ *breves*, sub-tenués, *cervino-squamosæ*; clava *ovata*, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica *nonnihil* brevior, apice late emarginatus, lobis ocularibus valde productis; anterior nonnihil angustior, lateribus dein sub-rectis; basi bi-sinuatus, subtiliter crebre punctulatus, a basi ultra medium tenuiter canaliculatus, niger, dense *cervino-squamosus*, basi utrinque macula fusca insignitus. Scutellum breve, apice rotundatum, dense læte *cervino-squamosum*. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basi duplo latiora, humeris vix elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace fere quadruplo longiora, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis parum convexis; nigra, *cervino-squamosa*, dorso antico plaga magna, communi, medio utrinque sinuato-emarginata, umbrina, parce atro-variegata insignita. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, dense viridi-argenteo-squamosum. Pedes mediocres, validi, sub-aureo-squamosi; femoribus a basi ultra medium viridi-argenteo-squamosis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 190-191. — CATAMONUS. *Nobis*.

*Character generis*. — Antennæ longiusculæ, sub-tenués; articulis tribus basalibus funiculi longiusculis, 2<sup>o</sup> nonnihil longiore, reliquis brevioribus, omnibus sub-obconicis; clava oblongo-ovalis, acuminata.

Rostrum breviusculum, validum, sub-angulatum, supra tricarinarum, extrorsum perparum incrassatum.

Oculi rotundati, valde convexi.

Thorax transversus, basi bi-sinuatus, lateribus posticis parum rotundatis; anterior subito angustior, apice oblique truncatus.

Elytra oblongo-ovata, antice singulatim rotundato-producta, apice conjunctim sub-rotundata.

DESCRIPTIO. — Corpus oblongo-ovatum, supra modice convexum, squamosum, alatum; majusculæ magnitudinis. — *Antennæ* thoracis basin sub-attingentes, versus apicem rostri sitæ,

sub-tenues, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1° oculos sub-superrante, recto, clavato, 2-4 longiusculis, tertio cæteris paulo longiore, 5-8 multo brevioribus, obconicis; clava oblongo-ovalis, distincte 4-articulata. — *Caput* sub-depressum, canaliculatum. — *Rostrum* capite duplo longius illoque basi fere dimidio angustius, validum, antrorsum sensim perparum incrassatum, supra tri-carinatum, apice profunde triangulariter emarginatum, parum deflexum; scrobe lineari, basi profunda, dein vadosa, parum curvata, ad angulum inferum oculi protensa. — *Oculi* laterales, rotundati, valde convexi. — *Thorax* latitudine baseos multo brevior, basi profunde bi-sinuatus, angulis posticis acutis; lateribus basi parum rotundatus, versus apicem cito angustior, antice oblique truncatus, supra paulo convexus, canaliculatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* antice thoracis basi sesqui-latiora illoque quadruplo longiora, oblongo-ovata, basi singulatim acute rotundato-producta, vel fere conjunctim tri-sinuata, humeris obtuse angulatis; apice ipso conjunctim sub-rotundata, supra modice convexa, dorsi disco sub-depressa, postice declivia, versus apicem haud callosa. — *Pedes* mediocres, longitudine sub-æquales, validiusculi, mutici; femoribus clavatis; tibiis teretibus, rectis, apice haud unguiculatis; tarsis mediocribus, subtus spongiosis, articulo ultimo valido, clavato, sulcato, unguiculis parvis.

A *καταμονος*, permanens, perdurans.

TYPUS. — *Catamonus melancholicus*; e Capite Bonæ Spei.

Obs. — Generi *Tropirhino* valde affine.

\* I. C. MELANCHOLICUS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, sub-nitidus, squamulis albidis inæqualiter adpersus; fronte canaliculata, rostro tri-carinato; thorace transverso, anterieus subito angustato, supra parum convexo, confertim ruguloso-punctato, canaliculato, scutello albo-squamoso; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, subtilissime coriaceis.*

*Patria*: Caput Bonæ Spei. DOM. DRÈGE. MUS. SCHH.

Magnitudo *Prepodis scalaris*. Caput parvum, sub-quadratum, supra parum convexum, subtiliter crebre granulatum, medio canaliculatum, nigrum, squamulis albidis sat dense obsitum; oculi rotundati, valde convexi, brunnei; rostrum capite dimidio longius et nonnihil angustius, crassum, paulo arcuatum, incrassatum et ampliatur, supra sub-planum, confertim punctulatum, tri-carinatum, apice triangulariter emarginatum, nigrum, sat

dense albo-squamosum. Antennæ longiusculæ, sub-tenuës, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata. Thorax transversus, latitudine postica multo brevior, apice oblique truncatus, antè subito angustior, lateribus pone medium rotundato-ampliatis; basi profunde bi-sinuatus, crebre minus profunde rugoso-punctatus, medio canaliculatus, niger, parum nitidus, squamulis albidis sat dense adpersus. Scutellum parvum, triangulare, dense albo-squamosum. Elytra antice singulatim acute rotundato-producta, thoracis basi dimidio latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, thorace quadruplo longiora, supra convexa, postice declivia, pone scutellum leviter impressa, sat profunde punctato-striata, interstitiis convexis, subtiliter coriaceis; nigra, sub-nitida, dorso parce lateribus dense inæqualiter albo-squamosa. Corpus subtus subtiliter confertim coriaceum, inæqualiter minus dense albo-squamosum. Pedes mediocres, nigri, squamulis albidis pubeque pallida parce adpersi; femoribus modice clavatis, muticis, subtiliter crebre punctulatis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS. 193. — LACHNOPUS. Nob. — *H. op.* VI. I. p. 380.

♂ 3-4. L. ARGUS. (Reiche.) — Oblongo-ellipticus, niger, subtus argenteo-maculatus; pedibus rufo-ferrugineis; thorace convexo, rufo-ferrugineo, confertim subtiliter ruguloso-punctato, dorso breviter canaliculato, maculis quatuor argenteo-squamosis, duabus apicalibus et duabus basalibus, ornato; elytris parum profunde punctato-striatis, transversim obsolete rugosis, maculis numerosis, impressis margineque laterali medio argenteo-squamosis.

*Ptilopus id.* — *Revue Cuvier.* 1840. p. 275.

— GUÉRIN. *Magaz. de Zool.* Tab. fig.

*Patria:* Cuba. Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

Magnitudo *Diaprepis Spengleri*. Caput oblongum, supra modice convexum, subtiliter confertim ruguloso-punctatum, nigropiceum, sub-nitidum, linea supra-oculari et subtus argenteo-squamosis; fronte puncto profundiori insculpta; oculi rotundati, convexi, nigri; rostrum capite angustius et dimidio longius, validum, parum arcuatum, confertim ruguloso-punctatum, apicem versus leviter impressum, utrinque ad latera canaliculatum et in

*canalicula argenteo-squamosum; nigrum, sub-nitidum, subtus argenteo-squamosum. Antennæ longiusculæ, minus tenues, nigrae, cinereo-pilosæ; clava oblonga, acuminata, fusco-pubescente. Thorax amplus, latitudine postica brevior, apice truncatus, antice subito angustatus, lateribus pone apicem valde rotundato-amplius, basi leviter bi-sinuatus, tenue marginatus, supra valde convexus, subtiliter confertim ruguloso-punctatus, dorso canalicula tenui, brevi insculptus, rufo-ferrugineus, maculis quatuor dorsalibus, duabus apicalibus approximatis, duabus basalibus magis discretis, vittaque lata, infra-laterali, argenteo-squamosis. Scutellum mediocre, apice rotundatum, nigrum. Elytra antice singulatim perparum rotundato-producta, thoracis basi nonnihil latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus pone humeros apicem versus sensim angustata, apice ipso singulatim acuminata, breviter mucronata, thorace fere triplo longiora, supra convexa, postice declivia, parum profunde punctato-striata, transversim obsolete rugulosa, singulo maculis numerosis, majoribus et minoribus, rotundis et nonnullis ovatis, impressis, vittaque marginali, antice posticeque abbreviata, argenteo-squamosis, decorato. Corpus subtus sub-remote granulatum, nigro-piceum, remote argenteo-maculatum. Pedes elongati, validi, rufo-ferruginei, geniculis infuscatis; femoribus remote punctulatis, muticis; tibiis teretibus, intus albo-pubescentibus, anterioribus apicem versus inflexis, denticulatis; tarsis elongatis, dilatatis, fuscis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.*

GENUS 211. — CLEONUS. *Nobis.* — *H. op.* VI. II. p. 1.

\* 6-7. C. SAMSONOVII. (*Gebler.*)—*Oblongus, niger, tomento denso, depresso, niveo subtus tectus, supra plagiatis variegatus; rostro obtuse carinato, capite pone oculos non constricto; thorace disperse tuberculato, dorso antico sub-carinato; elytris basi conjunctim emarginatis, fortius disperse hinc inde crebrius tuberculatis, niveo-variegatis; corpore subtus nigro-punctato.*

*Patria*: Desertum Kirguisæ. Dom. COM. MANNERHEIM et Dom. BARTELS. Mus. SCHH.

Statura et summa similitudo *Cleoni Cenchri* var.  $\beta$ , sed dimidio major; elytris hinc inde crebrius tuberculatis, basi conjunctim leviter emarginatis, corpore subtus nigro-punctato, ab illo fere unice distinctus. Caput breve, crassum, supra convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, tomento sat dense niveo tec-

tum; fronte inter oculos foveola parva, rotunda impressa; oculi perpendiculares, oblongi, depressi, nigri; rostrum capite dimidio longius et paulo angustius, crassum, angulatum, rectum, supra bi-sulcatum, carina interjacentē alte elevata, lata, obtusa, punctulata, nuda, nigra, sulcis et lateribus dense niveo-tomentosis. Antennæ breves, validæ, nigrae, tomento cinereo-albido vestitæ; clava elongata, acuminata. Thorax latitudine baseos nonnihil longior, antè paulo angustior, apice leviter emarginatus, intra apicem obsolete constrictus, lateribus pone stricturam sub-rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra convexus, pulvinatus, in medio obsolete canaliculatus, cum carinula parva, elevata in medio canaliculæ; vix punctatus, sed tuberculis numerosis, obtusis inæqualiter parce obsitus; niger, tomento niveo, inæqualiter ad latera magis condensato, vestitus. Scutellum triangulare, albo-tomentosum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi paulo latiora, humeris sub-rectangulatis; pone basin et ultra medium perparum ampliata, posterius angustata, apice ipso singulatim sub-rotundata, thorace fere triplo longiora, supra modice convexa, in disco antico obsolete remote punctato-striata, tuberculis numerosis, inæqualibus, sat elevatis, hinc inde densioribus, nigris absque ordine adspersa; nigra, tomento niveo plagiatis vestita. Corpus subtus nigrum, punctulatum, tomento denso, depresso, niveo tectum, punctis nudis, nigris, nitidis irroratum. Pedes breviusculi, validi, nigri, tomento denso, niveo undique vestiti. — BEN.

\* 10-11. C. IBEX. (Schh.) — *Oblongus, niger, dense læte ochraceo-tomentosus; rostro bi-sulcato, medio carinato; thorace remotius verrucoso, dorso canaliculato, medio carinato, vitta utrinque laterali flexuosa, albo-tomentosa insignito; elytris tenuiter confertim striato-punctatis, interstitiis antè remote granulatis, ventre nigro-punctato.*

*Patria*: Insula Rhodus. DOM. HEDENBORG. Mus. Reg. Holm.

Affinis *Cleoni Hedenborgi*, sed dimidio minor, præsertim angustior; colore indumento alio, thorace remotius verrucoso, elytris antè evidenter granulatis, ab illo differre videtur. Caput breve, modice convexus, creberrime punctulatum, tomento læte ochraceo sat dense obsitum; oculi perpendiculares, oblongi, depressi, nigri; rostrum capite fere duplo longius et nonnihil angustius, robustum, sub-teres, parum arcuatum, supra in medio longitudinaliter costatum, sulco utrinque profundo, a fronte fere



ad os producto, externe carinula sat arguta terminato; nigrum, rugoso-punctatum, in cavitatibus dense alibi tenuiter ochraceo-tomentosum. Antennæ breves, validæ, nigrae, ochraceo-pubescentes; clava parum inæressata, acuminata. Thorax sub-conicus, latitudine baseos fere longior, apice sub-truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus sub-obliquis, parum ampliatis; basi bi-sinuatus, supra modice convexus, verrucis vel tuberculis lævibus, nitidis, quam in *Cleono Hedenborgi* nonnihil crebrius ob-situs, medio longitudinaliter parum profunde canaliculatus, interjacente carinula abbreviata sat distincta; totus niger, ochraceo-tomentosus, vitta laterali e lineis duabus flexuosis, in medio sub-connexis, lætius tomentosus. Scutellum parvum, oblongo-triangulare, apice acuminatum, tomento ochraceo tectum. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, thoracis basi haud latiora, humeris sub-angulatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, tenuiter striato-punctata, punctis confertissimis, versus basin rugulis transversis, evidentioribus interjectis, interstitiis posterioribus planis, alutaceis; nigra, tomento ochraceo dense tecta. Corpus subtus concolor, dense ochraceo-tomentosum, abdomine in medio punctis numerosis, denudatis, nitidis adperso. Pedes validiusculi, similiter tomentosi; tarsis elongatis, subtus griseo-spongiosis. — ВНН.

\* 43-44. C. FASCICULARIS. (Gebler.) — *Oblongo-ovatus, niger, tomento cinereo-albido inæqualiter obsitus; fronte plana, rude minus crebre rugoso-punctata, rostro bi-sulcato, medio argute carinato; thorace confertim rugoso-punctato, basi ante scutellum foveolato, utrinque lineis duabus arcuatis, albo-tomentosis ornato; elytris mediocrè punctato-striatis, interstitiis alternis elevatis, costatis, setis albis fasciculatis, dorso plaga communi, parcius squamosa insignitis.*

*Hujus operis VI. II. p. 52. 86.*

*Patria: Sibiria occidentalis. DOM. GEBLER. MUS. SCHH.*

Habitus et magnitudo *Cleoni tricarinati*. Caput mediocre, crassum, nigrum, posterius convexum, ibique macula cinereo-tomentosa insignitum; fronte plana, sub-remote rugoso-punctata; oculi perpendiculares, oblongi, depressi, nigri; rostrum capite dimidio angustius et paulo longius, crassum, parum arcuatum, a basi fere ad apicem utrinque longitudinaliter impressum, medio argute carinatum, rugoso-punctatum, nigrum, tomento cinereo

obsitum. Antennæ breves, sat validæ, nigræ, cinereo-pubescentes; clava parum incrassata, acuminata. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, antice paulo angustior, apice leviter emarginatus, intra apicem obsolete constrictus, lateribus pone stricturam rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra paulo convexus, confertim sat profunde rugoso-punctatus, basi ante scutellum foveola oblonga insculptus; niger, parce tomentosus, utrinque lineis duabus arcuatis, dense albo-tomentosis decoratus. Scutellum subtriangulare, cinereo-tomentosum. Elytra antice singulatim obtuse rotundata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obliquis; pone humeros ultra medium nonnihil ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, ante apicem callosa, medio-criter punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis elevatis, sub-costatis, setis albis, fasciculatis obsita; nigra, inæqualiter sat dense cinereo-tomentosa, dorso antico plaga communi, utrinque ramulos binos emittente, parce squamosa insignita. Corpus subtus nigrum, subtiliter crebre coriaceum, tomento cinereo-albido tectum, abdomine punctis parvis, denudatis, nigris concinne notato. Pedes longiusculi, validi, tomento cinereo-albido obsiti; tarsis elongatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

\* 51. C. TABIDUS. *Olivieri*. — *H. op.* VII. II. p. 32.

\* VAR.  $\beta$ . Nonnihil major, sordide cretaceo-tomentosus; elytris fasciis duabus brevibus, obliquis, brunneis. — BHN.

*Patria* : Insula Rhodus. DOM. HEDENBORG. MUS. SCHH.

\* 141. C. SALEBROSICOLLIS. *Schh.* — *H. op.* VII. II. p. 90.

\* VAR.  $\beta$ . Tomento læte ochraceo tectus; elytris dorso oblique brunneo-variegatis.

*Patria* : Dauria. DOM. SEDAHOFF. MUS. SCHH.

GENUS 228. — STRANGALIODES. *Nob.* — *H. op.* VI. II. p. 219.

\* 2. S. AUREOSQUAMOSUS. (*Reiche.*) — *Oblongo-ovatus*, niger, squamulis viridi-nitidis dense adpersus; pedibus ferrugineis; fronte canaliculata, rostro apicem versus longitudinaliter impresso; thorace crebre rugoso-punctato, dorso late sulcato, utrinque arcuatim leviter impresso; elytris sub-remote profunde punctato-striatis, transversim rugosis, dorso postico 8-tuberculatis.

*Anchonus id.* DOM. REICHE in litt.

*Patria* : Chili. DOM. COM. MANNERHELM. MUS. SCHH.

*Strangaliode albosquamoso* parum minor; colore indumenti, pedibus ferrugineis, elytris dorso postico tuberculatis, ab illo facile dignoscitur. Caput mediocre, crassum, convexum, sat crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis læte viridi-argenteis adpersum; fronte canalicula tenui, brevi insculpta; oculi sub-rotundati, parum prominuli, nigri; rostrum capite dimidio longius et angustius, validum, sub-teres, fere rectum, apicem versus nonnihil incrassatum, supra sub-planum, a medio apicem versus triangulariter parum profunde impressum, confertim ruguloso-punctatum, colore et indumento capitis. Antennæ sat longæ, sub-tenues, nigræ, cinereo-pubescentes; clava ovata, acuminata, fusco-holosericea. Thorax latitudine media parum brevior, apice late emarginatus, lobis ocularibus productis, rotundatis; posterius nonnihil angustior, lateribus mox pone apicem modice rotundato-ampliat; basi truncatus, supra modice convexus, crebre minus profunde rugoso-punctatus, dorso late longitudinaliter sulcatus et utrinque linea abbreviata, parum profunda insculptus; niger, sub-nitidus, squamulis viridi-nitentibus adpersus. Scutellum minutissimum, rotundatum, concolor. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris sub-angulatis, lateraliter nonnihil extensis; lateribus paulo rotundato-ampliata, a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace plus duplo longiora, supra modice convexa, postice declivia, sub-remote profunde punctato-striata, transversim rugulosa, singulo in dorso postico tuberculis quatuor instructo, anteriore reliquis minore, magis obtuso; nigra, sub-nitida, squamulis parvis, rotundis, viridi-argenteis, nitidis sat crebre adpersa. Corpus subtus crebre punctulatum, nigrum, squamulis viridi-argenteis adpersum. Pedes longiusculi, validi, rufo-ferruginei, parce sub-argenteo-squamulosi et pallido-pubescentes; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis obscurioribus, dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 250. — HYLOBIUS. *Nobis.* — *H. op.* VI. II. p. 297.

\* 2-3. *H. ALBOSPARSUS.* (*Mannerheim.*) — *Oblongo-ovatus, niger, sub-opacus, tenuiter inæqualiter cinereo-tomentosus; rostro rugoso-punctato, carinato; thorace inæquali sat crebre granulato, dorso sub-impresso, carinato, utrinque albo-vittato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis alternis sub-planis remote,*

*alternis elevatioribus crebre granulatis, maculis parvis, numerosis, albo-tomentosis insignitis, abdomine bifariam albo-maculato.*

*Patria* : Indega Bay Fretum Behring vel Irkutsch? Dom. Com. MANNERHEIM. Mus. SCHH.

Magnitudo *Hylobii Abietis*. Caput mediocre, crassum, convexum, subtiliter crebre rugoso-granulatum, nigrum, tenuiter cinereo-tomentosum; fronte canalicula brevi insculpta; oculi sub-ovati, parum prominuli, nigri; rostrum longitudine thoracis, sat validum, teres, paulo arcuatum, confertim rugoso-punctatum, medio evidentem et utrinque obsolete carinatum, nigrum, tomento depresso, tenui, cinereo adpersum. Antennæ sat validæ, nigræ, parce pilosæ; clava oblonga, parum acuminata. Thorax latitudine postica brevior, apice truncatus, antè nonnihil angustior, lateribus paulo rotundato-ampliatus, postice leviter bisinuatus, tenuè reflexo-marginatus, supra nonnihil convexus, inæqualis, sat crebre granulatus, dorso late parum profunde impressus, medio carinula modice elevata instructus; niger, subopacus, tomento tenui, cinereo adpersus, utrinque linea angusta, densius albo-tomentosa decoratus. Scutellum parvum, sub-triangularè, concolor. Elytra antè conjunctim sub-truncata, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtuse sub-angulatis; pone humeros ad medium paulo rotundato-ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, singulatim brevissime mucronata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, sub-remote parum profunde punctato-striata, interstitiis alternis planis remote, alternis elevatioribus crebre granulatis; nigra, subopaca, tenuiter cinereo-tomentosa, maculis parvis, oblongis e tomento albido dense adpersa. Corpus subtus sat crebre granulatum, nigrum, tenuiter cinereo-tomentosum, abdomine bifariam albo-maculato. Pedes mediocres, validi, nigri, cinereo-tomentosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 267-268. — TERAPOPUS. *Nobis*.

*Character generis*. — Antennæ mediocres, sub-tenuës; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus elongatis, obconicis, 1<sup>o</sup> quam 2<sup>o</sup> duplo longiore et crassiore, reliquis rotundatis; clava ovalis.

Rostrum longiusculum, sub-teres, arcuatum, inflexum.

Thorax sub-conicus, basi profundissime bi-sinuatus, antè sensim multo angustior, apice valde productus, supra planus.

Elytra oblonga, basi profunde bi-sinuata, supra convexa, valde inæqualia, apice declivia.

Pedes robusti, compressi, contracti; tarsi minus lati.

DESCRIPTIO. — *Corpus* durum, ellipticum, convexum, squamosum, valde inæquale, apterum; minusculæ magnitudinis. — *Antennæ* capite rostroque paulo longiores, prope apicem rostri insertæ, sub-tenuis, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1° oculos sub-attingente, 2° elongato, crassiusculo, obconico, 3° brevior, tenuiore, etiam obconico, 3-8 rotundatis, ultimo latiore, clavæ adnexo; clava oblonga, ovalis, 4-articulata, articulis sat distinctis. — *Rostrum* capite duplo longius, validum, sub-teres, apicem versus paulo attenuatum, arcuatum, inflexum; scrobe profunda, subtus in basi rostri cum opposita coeunte. — *Oculi* laterales, demissi, sub-rotundati, depressi. — *Thorax* latitudine postica vix longior, basi in lobis tribus productus, lateribus obliquis, vix rotundatis; antè multo angustior, apice valde productus (toto margine calloso), supra deplanatus; lateribus pone oculos lobatus, infra pro receptione rostri profunde excavatus, canali argute marginato, in pectore haud continuato. — *Scutellum* caret. — *Elytra* thoracis basi parum latiora eoque fere triplo longiora, sub-ovata, fere æquilata, basi profunde tri-sinuata, thoracis emarginaturas implentia, lateribus basi rectis; pone medium ad apicem rotundata, margine laterali inflexo; abdominis latera involventia, apice conjunctim rotundata, anum occultantia, supra modice convexa, postice declivia. — *Pedes* longitudine æquales, robusti, contracti; femoribus clavatis, sub-compressis, muticis; tibiis latis, etiam compressis, apice unguatis; tarsis breviusculis, minus latis, subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, bi-unguiculato

A *τετραπυπος*, monstrosus ad aspectu.

TYPEUS. — *Terapopus Hottentottus*.

\* 1. T. HOTTENTOTTUS. (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, dense ochraceo-squamosus; rostro medio canaliculato; thorace amplo, sub-conico, supra plano, apice valde producto, margine toto obtuso, calloso; elytris rude, crebre, minus regulariter punctato-striatis, dorso multi tuberculatis; femoribus umbrino-annulatis.*

*Patria*: Caput Bonæ Spei. Dom. DRÈGE. Mus. SCHH.

*Thylaciti piloso* magnitudine æqualis. Caput breve, retractum, supra parum convexum, punctulatum, nigrum, dense ochraceo-squamosum; oculi demissi, sub-rotundati, depressi, brunnei; rostrum capite duplo longius et dimidio angustius, validum, subteres, arcuatum, apicem versus paulo attenuatum, punctulatum, medio canaliculatum, colore et indumento capitis. Antennæ mediocres, sub-tenuis, nigro-piceæ, parce pilosæ; clava ovalis, acuminata. Thorax latitudine postica vix longior, antè valde angustatus, apice supra valde productus, utrinque emarginatus, lobis ocularibus modice prominulis, obtusis; lateribus obliquis; supra depressus, margine toto laterali sub-elevato, obtuse alte calloso; basi profundissime bi-sinuatus, in lobis tribus productis; rugoso-punctatus, niger, squamositate densa, ochracea tectus. Scutellum nullum. Elytra antice profunde tri-sinuata, emarginaturas thoracis implentia, illo haud latiora, lateribus non ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim rotundata, margine laterali inflexo; abdominis latera includentia, thorace duplo longiora, supra convexa, postice declivia, profunde minus regulariter punctato-striata, dorso tuberculis validis, sub-acutis, setiferis, in seriebus tribus dispositis, instructa; nigra, dense ochraceo-squamosa. Corpus subtus concolor, similiter squamosum. Pedes breves, robusti, contracti, nigri, ochraceo-squamulosi; femoribus latis, umbrino-annulatis, subtus setosis; tibiis brevibus, compressis, basi nonnihil tenuioribus; tarsis angustis, subtus fusco-setosis. — BHN.

GENUS 270. — RHYTIRHINUS. Nob. — *H. op.* VI. II. p. 421.

\* 21. *R. ANGUSTICOLLIS.* (Schh.) — *Oblongo-ovatus, niger, sub-opacus, indumento fusco obsitus, setulis pallidis parce adpersus; fronte rostroque planis; thorace brevi, angustiore, lateribus recto; elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis alternis granulatis, ante apicem callo magno instructis.*

*Patria* : Dauria. DOM. SEDAKOFF. MUS. SCHH.

*Rhytirhino impressicollis* magnitudine et statura sub-similis. Caput breve, crassum, supra parum convexum, obsolete ruguloso-punctatum, nigrum, opacum, indumento fusco obsitum; vertice cinereo-squamoso; fronte plana, utrinque supra oculos sub-elevata; oculi parvi, ovati, depressi, nigri; rostrum capite vix longius sed dimidio angustius, crassiusculum, modice arcuatum, supra

planum, confertim ruguloso-punctatum, colore et indumento capitis. Antennæ breves, sub-tenuæ; nigrae, parce pilosæ; clava sat magna, ovata, acuminata. Thorax transversus, latitudine postica multo brevior, apice late et profunde emarginatus, lobis ocularibus productis, obtuse rotundatis; antè angustior, mox pone apicem rotundato-ampliatus, dein lateribus fere rectis; basi bi-sinuatus, supra parum convexus, dorso leviter impressus, obsolete rugoso-punctatus, niger, indumento fusco dense tectus. Scutellum nullum. Elytra oblongo-sub-quadrata, antice singulatim nonnihil rotundato-producta, thoracis basi duplo latiora, humeris non elevatis, obtuse angulatis; lateribus vix ampliata, pone medium apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace quadruplo longiora, supra in dorso paulo convexa, postice declivia, obsolete punctato-striata, interstitiis alternis granulatis; ante apicem tuberculo sat valido instructa; nigra, opaca, indumento fusco dense obsita, setulis raris, pallidis adpersa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, indumento griseo obsitum. Pedes breves, sat validi, nigri, fuscosquamosi, parce breviterque albo-setulosi; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus griseo-setosis. — ВНН.

(DIVISIO PIIYLLOBIDES.) — GENUS 279-280. — BRACHYSTYLUS.

*Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ breviusculæ, minus tenues; scapo oculos vix superante, crassiusculo, extrorsum sensim incrassato; articulis duobus basalibus funiculi brevissime obconicis, reliquis brevioribus, omnibus turbinatis; clava ovata, acuminata.

Rostrum breve, supra canaliculatum, apice profunde rotundato-emarginatum.

Oculi laterales, rotundati, modice convexi.

Thorax oblongus, sub-conicus, antrorsum sensim nonnihil angustior, basi modice bi-sinuatus, apice truncatus.

Elytra oblonga, sub-ovata, basi singulatim rotundata, humeris obtuse angulatis; apice conjunctim acuminata.

DESCRIPTIO. — *Corpus* oblongo-ovatum, modice convexum, squamosum, alatum; minoris magnitudinis. — *Antennæ* thoracis medium non superantes, in medio rostri sitæ, minus tenues, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1° oculorum marginem superiorem attingente, crassiusculo, sub-clavato, 2° et 3° brevissime

sub-obconicis, reliquis brevioribus, tenuioribus, ultimis perparum latioribus, omnibus turbinatis. — *Rostrum* longitudine capitis eoque contiguum, sub-porrectum, supra in medio linea longitudinali impressum, apice profunde rotundato-emarginatum; scrobe cito curvata, ante oculum abbreviata. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine paulo longior, sub-conicus, basi modice bi-sinuatus, lateribus obliquis; antrorsum nonnihil angustior, apice truncatus, supra paulo convexus. — *Scutellum* mediocre, transversum, sub-quadratum. — *Elytra* antice thoracis basi dimidio latiora eoque triplo longiora, basi singulatim nonnihil rotundata, humeris obtuse angulatis; oblongo-ovata, infra medium ad apicem sensim attenuata, apice ipso conjunctum acuminata, supra modice convexa. — *Pedes* mediocres, sub-æquales, validi; femoribus nonnihil clavatis, muticis; tibiis sub-teretibus, rectis, apice truncatis, anticis apice unco horizontali, acuto intus instructis; tarsis mediocribus, subtus spongiosis; articulo ultimo clavato, bi-unguiculato.

A βραχύς, brevis, στίλος, scapus.

Typus. — *Brachystylus acutus*; e Civitatibus s. d. liberis Amer. bor.

Obs. — Generi *Phyllobio* haud dissimile est.

\* I. B. ACUTUS. (Say.) — *Oblongo-ovatus, niger, fusco-umbrino-squamosus; rostro brevi, cum fronte canaliculato; thorace sub-conico, sat crebre rugoso-punctato, vitta media obsoleta, obscuriore insignito; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, coriaceis, medio fascia lata, transversa apiceque pallidius squamosis, pone medium plaga transversa, ad latera dilatata, fusca decoratis.*

*Chlorophanus id.* SAY. *Descript. of Curc. of North. Amer.* p. 7.  
SAY. *Journ.* p. 310. Teste DOM. HARRIS.

*Patria* : Alabama, Americæ borealis. DOM. HARRIS. Mus. SCHN.

Magnitudo *Phyllobii vespertini*. Caput breve, crassum, supra parum convexum, obsolete punctulatum, fusco-umbrino-squamosum; fronte canalicula, usque ad apicem rostri continuata, insculpta; oculi rotundati, modice convexi, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, paulo arcuatum, supra planum, confertim punctulatum, apice rotundato-emarginatum, pallido-ciliatum, nigrum, dense fusco-umbrino-squamosum. Antennæ breves, sat validæ, nigrae, parce squamosæ; clava ovata,



acuminata, obscuriore. Thorax sub-conicus, latitudine postica nonnihil longior, apice truncatus, anterie nonnihil angustior, lateribus obliquis, versus basin paulo ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, supra convexus, sat crebre rugoso-punctatus, niger, dense fusco-umbrino-squamosus, medio vitta obsoleta, obscuriore insignitus. Scutellum mediocre, transversum, sub-quadratum, concolor. Elytra antice singulatim paulo rotundato-producta, thoracis basi fere duplo latiora, humeris oblique angulatis, non elevatis; lateribus haud ampliata, pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim acuminata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, subtilissime coriaceis; nigra, basi fusco-umbrino-squamosa, ante medium fascia transversa communi, pallidius squamosa, et pone illam plaga magna, ad latera dilatata, fusco-apiceque ipso pallidius squamosa, setulis brevissimis, pallidis seriatim adpersa. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamulosum breviterque setulosum. Pedes mediocres, validi, nigri, fusco-squamosi, parce breviterque setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 291. — EPISOMUS. *Nobis.* — *H. op.* VII. I. p. 88.

\* 4-5. E. GUTTATUS. (*Schh.*) — *Sub-ovatus, niger, squamositate fusco-brunnea sat dense obsitus; rostro rugoso-punctato, impresso, cum fronte canaliculato, apice triangulariter emarginato, utrinque acute producto; thorace sub-cylindrico, confertim sat rude rugoso, dorso canaliculato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, singulo maculis tribus, parvis, albidis insignito, apice obtuse breviter mucronatis.*

*Patria*: Assam, Indiæ orientalis. *Dom.* WESTERMANN. *Mus.* SCHH.

Magnitudo *Otiorynchi planati*, magis convexus. Caput breve, latum, crassum, supra parum convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigrum, fusco-brunneo-squamosum; oculi parvi, rotundati, convexi, nigri; rostrum capite dimidio longius et parum angustius, valde crassum, paulo arcuatum, rugoso-punctatum, supra longitudinaliter sat profunde impressum, medio canalicula usque in fronte extensa insculptum, apice ipso triangulariter emarginatum, ibique utrinque acute productum; nigrum, dense fusco-brunneo-squamosum. Antennæ breves, validæ, nigrae, fusco-squamosæ et parce pubescentes; clava parum increas-

sata, oblonga, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica vix longior, sub-cylindricus, basi apiceque truncatus, lateribus in medio perparum ampliatus, longe intra apicem striga tenui, transversa insculptus, supra convexus, confertim rude rugosus, dorso medio canaliculatus, niger, squamositate fusco-brunnea sat dense obsitus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, nigrum. Elytra antice truncata, thoracis basi haud latiora, sed mox pone basin rotundato-ampliata, a medio apicem versus angustata, apice ipso sub-acuminata, singulatim breviter obtuse mucronata, thorace plus triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis; nigra, fusco-brunneo-squamosa, singulo maculis tribus, parvis, albidis, una longe ante medium in interstitio quarto, et duabus mox pone medium in interstitiis 2° et 6°, insignito. Corpus subtus vix punctatum, nigrum, fusco-brunneo-squamosum. Pedes elongati, validi, nigri, fusco-squamulosi, parce breviterque pallido-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis apicem versus parum inflexis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 302. — LALAGETES. Nobis.—*H. op.* VII. I. p. 125.

1-2. L. SETOSUS. (Schh.)—*Breviter ovatus, piceus, squamulis cinereis dense tectus, longe setosus; antennis pedibusque testaceis, rostro basi striga tenui impresso; thorace brevi, transverso, anterieus angustato; elytris breviter ovatis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, sub-lævibus.*

*Patria* : Terra Boschiesman. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Omiadi seminulo* magnitudine æqualis. Caput breve, crassum, supra parum convexum, punctulatum, squamulis densis, cinereis setisque longis, erectis, concoloribus obsitum; oculi parvi, modice convexi, nigri; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, basi striga transversa a capite distinctum, supra planum, punctulatum, piceum, indumento capitis. Antennæ longitudine dimidii corporis, sub-tenues, testaceæ, parce pilosæ; clava parva, oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica duplo brevior, apice truncatus, anterieus angustior, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam versus basin ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, supra paulo convexus, confertim subtiliter punctulatus, piceus, dense cinereo-squamosus et setis lon-

gis, erectis, concoloribus obsitis. Scutellum vix conspicuum. Elytra breviter ovata, antice singulatim leviter rotundata, thoracis basi latiora, mox pone basin rotundato-ampliata, pone medium apicem versus citius angustata, conjunctim obtuse rotundata, thorace quadruplo longiora, supra in dorso modice convexa, postice declivia, subtiliter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, lævibus; picea, squamulis densis, cinereis setisque longis, erectis, concoloribus obsita. Corpus subtus punctulatum, cinereo-squamosum. Pedes mediocres, validi, testacei, squamulis cinereo-albidis adpersi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis angustis, subtus brunneo-spongiosis.—BHN.

1-2. L. VARIEGATUS. (Schh.)—*Breviter ovatus, ferrugineus, dense cinereo-albido-squamosus; antennis pedibusque dilutioribus, rostro medio impresso, striga transversa, tenui insculpto; thorace brevi, transverso, antè multo angustiori, lateribus obliquo; elytris breviter ovatis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, setulis brevibus, crassis, albis seriatim obsitis, dorso obsolete fusco-variegatis.*

*Patria* : Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Magnitudo, statura et similitudo *Laldgetis setosi*; rostro impresso, thorace antè magis angustato, elytrorum interstitiis setulis tantum brevibus, crassis, albis obsitis, ab illo bene distinctus. Caput breve, crassum, supra parum convexum, subtiliter crebre punctulatum, ferrugineum, squamulis densis, cinereo-albidis tectum; oculi parvi, rotundati, modice convexi, glauci; rostrum capite parum longius et angustius, crassum, sub-rectum, basi striga tenui, transversa insculptum, medio longitudinaliter impressum, subtiliter punctulatum, colore et indumento capitis. Antennæ longitudine dimidii corporis, sub-tenues, testaceæ, parce albo-squamulosæ et setosæ; clava parva, oblongo-ovata, acuminata. Thorax latitudine postica duplo brevior, apice truncatus, intra apicem leviter constrictus, antè subito valde angustatus, lateribus obliquis; basi obsolete bi-sinuatus, supra parum convexus, subtiliter crebre rugoso-granulatus, ferrugineus, squamulis densis, cinereo-albidis vestitus, setisque brevibus, concoloribus adpersus. Scutellum haud conspicuum. Elytra breviter ovata, antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi dimidio latiora, mox pone basin rotundato-ampliata, pone medium apicem versus angustata, lateribus inflexa, apice ipso conjunctim acute rotundata, thorace quadruplo longiora, supra convexa, postice

declivia, subtiliter evidenter punctato-striata, interstitiis parum convexis, subtiliter coriaceis; ferruginea, dense cinereo-albido-squamosa, dorso obsolete fusco-variegata, setulis brevissimis, crassis, albis seriatim adspersa. Corpus sub<sup>tus</sup> obsolete punctulatum, ferrugineum, cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, validi, rufo-ferrugini, cinereo-squamulosi, parce breviterque albo-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis tereibus, rectis; tarsis angustis, sub<sup>tus</sup> brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 319. — SCIOBIUS. *Nobis.* — *H. op.* VII. I. p. 192.

\* 4-5. S. WAHLBERGI. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus, niger, supra parce inæqualiter sub<sup>tus</sup> dense flavo-virescenti-squamosus; rostro tenuiter carinato, basi striga transversa insculpto; thorace transverso, sat crebre granulato, vittis tribus sub-impressis, dense flavo-virescenti-squamosis, insignito; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis dorsalibus et disci elevatis, carinatis, sutura, vitta longitudinali disci lateribusque densius flavo-virescenti-squamosis.*  
*Patria:* Port Natal. DOM. J. WAHLBERG. *Mus. Reg. Holm.*

*Otiorhyncho Mastice* parum longior et angustior. Caput mediocre, crassum, supra modice convexum, subtiliter sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, supra parce ad oculos et sub<sup>tus</sup> dense læte viridi-argenteo-squamosum; oculi sub-ovati, parum prominuli, nigri; rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, modice arcuatum, supra planum, longitudinaliter leviter impressum, confertim punctulatum, medio evidenter utrinque obsoletius carinatum, nigrum, sub-nitidum, squamulis læte viridi-argenteis supra parcius, sub<sup>tus</sup> densius adpersum. Antennæ longæ, sub-tenuæ, nigræ, parce læte viridi-squamosæ; clava elongata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica brevior, basi apiceque truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus modice æqualiter rotundato-amplius, supra convexus, sat crebre granulatus, parce læte flavo-viridi-squamosus, vittis tribus sub-impressis, lævibus lateribusque dense viridi-flavescenti-squamosis. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, thoracis basi paulo latiora, mox pone basin rotundato-ampliata, a medio apicem versus angustata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, thorace fere quadruplo longiora, supra convexa, postice declivia, parum profunde punctato-striata, interstitiis 1, 2, 3 et 6 totis, quartoque et septimo basi, quinto apice elevatis, carinatis, sub-denudatis, breviter albo-setulosis,

sutura, vitta disci longitudinali lateribusque dense flava-virescenti-squamosis. Corpus subtus subtilissime crebre punctulatum, nigrum, læte viridi-argenteo-squamosum. Pedes longiusculi, validi, nigri, læte viridi-argenteo-squamosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis; tarsis dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BEN.

GENUS 344. — LIXUS. Fabricius. — *H. op.* VII. I. p. 418.

174-5. L. PORICOLLIS. (Eschscholtz.) — *Oblongus, niger, pube grisea dense obtectus; rostro brevior, recto, carinato; thorace antice parum angustiore, dorso punctis nigris, remotis, variolosis impresso, basi foveolato, longitudinaliter anguste carinato, utrinque nigro-lineato; elytris subtiliter punctato-striatis, apice singulatim sub-acuminatis, fusco-tri-lineatis; femoribus muticis.* — MANNERH. *Beitr. z. Käfer. Faun. d. Aleuth. Ins.* p. 119. 245.

DEJEAN, *Catal. ed. 3.* p. 295.

*Patria* : N. California.

174-5. L. MODESTUS. (Dejean.) — *Elongatus, niger, griseo-pubescentis; rostro crassiusculo, modice arcuato; thorace conico, brevior, dorso longitudinaliter excavato; elytris striato-punctatis, dense cinereo-squamulosis, maculis minutis, albescens remote adpersis, apice singulatim sub-acuminatis; femoribus muticis.* — MANNERH. *Beitr. z. Käf. Faun. d. Aleuth. Ins.* p. 119. 246.

DEJEAN, *Catal. ed. 3.* p. 296.

*Lixus adpersus.* ESCHSCHOLTZ in litteris.

*Patria* : N. California.

176-7. L. SERIGATUS. (Schh.) — *Oblongus, niger, tomento sulphureo obsitus; rostro thorace brevior, valido, modice arcuato; thorace sub-conico, intra apicem constricto, dorso subtiliter sub-remote granulato, obsolete canaliculato, lateribus vitta media ampliata, albo-tomentosa decorato; elytris basi et supra humeros impressis, sub-remote striato-punctatis, plaga magna, dorsali, parcius squamosa insignitis, apice singulatim obtuse rotundatis; femoribus dente parvo armatis.*

*Patria* : Port Natal. DOM. J. WAHLBERG. *Mus. Reg. Holm.*

*Lixus Sturmii* magnitudine fere æqualis. Caput rotundatum, crassum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, to-

mento dense sulphureo obsitum; oculi oblongi, perpendiculares, nigri, sub-nitidi; rostrum capite duplo longius et dimidio angustius, crassum, teres, modice arcuatum, subtiliter crebre punctulatum, colore et indumento capitis. Antennæ breves, validæ, nigrae, læte sulphureo-pollinosæ et setulosæ; clava magna, oblonga, acuminata. Thorax sub-conicus, apice late sed parum profunde emarginatus, lobis ocularibus modice prominulis, sub-obtusis; intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam sub-obliquis vel basin versus sensim perparum angustatis; basi bisinuatus, supra convexus, sat crebre subtiliter granulatus, dorso obsolete canaliculatus; niger, tomento sulphureo obsitus, utrinque ad latera vitta medio introrsum ampliata, densius albo-tomentosa insignitus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice singulatim obtuse rotundata, thoracis basi paulo latiora, humeris obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice ipso singulatim obtuse rotundata, thorace triplo longiora, supra convexa, postice modice declivia, pone scutellum latius et supra humeros profundius impressa, sub-remote parum profunde striato-punctata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis; nigra, sulphureo-pollinosa et tomentosa, dorso plaga magna, parcius tomentosa, obscuriore insignita. Corpus subtus obsolete crebre punctulatum, nigrum, læte sulphureo-tomentosum. Pedes mediocres, validi, nigri, læte sulphureo-tomentosi; femoribus modice clavatis, anticis subtus acutius posterioribus breviter obtuse dentatis; tibiis sub-teretibus, fere rectis, basi tenuioribus; tarsis dilatatis, subtus læte brunneo-spongiosis. — BIN.

176-7. L. WAHLBERGI. (Schh) — *Oblongus, niger, tomento brunneo et sulphureo tectus et variegatus; rostro thorace brevior, valido, sub-recto; thorace sub-conico, inæquali, confertim parum profunde rugoso-punctato, dorso postico obsolete canaliculato, vitta utrinque laterali, antice ampliata, albo-tomentosa insignito; elytris pone scutellum et supra humeros impressis, parum profunde punctato-striatis, antè transversim rugulosis, apice singulatim sub-acuminatis, plaga transversa disci obscuriori decoratis; femoribus breviter dentatis.*

*Patria* : Port Natal. DOM. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

Longitudo *Lixi impressi*, sed multo latior. Caput rotundatum, convexum, subtilissime crebre coriaceum, nigrum, tomento sulphureo postice parce antè crebre obsitum; fronte foveola parva insculpta; oculi oblongi, perpendiculares, sub-depressi, nigri; ros-

trum thorace nonnihil brevius, crassum, teres, sub-rectum, subtiliter confertim coriaceum, nigrum, cinereo-tomentosum et sulphureo-pollinosum. Antennæ breves, crassæ, nigrae, cinereo-tomentosæ; clava oblonga, acuminata. Thorax sub-conicus, apice late emarginatus, lobis ocularibus parum prominulis, obtuse rotundatis; intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam sub-obliquis, versus basin sensim ampliatis; basi sat profunde bisinuatus, supra convexus, inæqualis, crebre parum profunde rugoso-punctatus, dorso basi obsolete canaliculatus; niger, supra fusco-brunneo-tomentosus et pollinosus, utrinque vitta antice introrsum valde dilatata, albo-tomentosa decoratus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basi nonnihil latiora, humeris obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice ipso nonnihil dehiscencia, singulatim sub-acuminata, thorace plus triplo longiora, supra convexa, postice parum declivia, pone scutellum et supra humeros impressa, parum profunde punctato-striata, interstitiis antrorsum transversim rugulosis; nigra, sulphureo-tomentosa et pollinosa, medio plaga magna, transversa, communi, umbrino-pollinosa insignita. Corpus subtus obsolete punctulatum, nigrum, sulphureo-tomentosum. Pedes mediocres, validi, nigri, similiter tomentosi; femoribus modice clavatis, omnibus subtus dente brevi, sub-obtuso instructis; tibiis teretibus, sub-rectis, anticis intus nonnihil ampliatis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

178-9. L. CALLOSUS. (Schh.) — *Oblongus, niger, inæqualiter cinereo-tomentosus; rostro thorace brevior, valido, parum arcuato; thorace antè angustato, lateribus sub-recto, supra confertim granulato, lateribus vitta medio introrsum ampliata, dense albo-tomentosa decorato; elytris tenuiter punctato-striatis, pone scutellum et supra humeros leviter impressis, singulo basi tuberculo obtuso instructo, apice conjunctim rotundatis; femoribus obtuse dentatis; tibiis anticis intus in medio dentatis.*

*Patria*: Port Natal. Dom. J. WAHLBERG. Mus. Reg. Holm.

*Lia* discolori affinis, sed dimidio major; thorace longiore, confertim granulato, distincte canaliculato, tibiis anticis intus dentatis, elytris basi callo obtuso instructis, ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, crassum, convexum, subtiliter crebre coriaceum, nigrum, sub-opacum, parce cinereo-tomentosum; fronte canalicula brevi insculpta; oculi oblongi, sub-depressi, nigri;

rostrum capite dimidio longius et angustius, crassum, teres, parum arcuatum, subtiliter crebre coriaceum, interdum medio tenuiter canaliculatum, nigrum, tenuissime cinereo-tomentosum. Antennæ breves, validæ, nigræ, parce cinereo-tomentosæ. Thorax latitudine postica longior, apice utrinque emarginatus, supra in medio modice rotundato-productus, lobis ocularibus obtusis, parum prominulis; intra apicem utrinque late constrictus, lateribus pone stricturam fere rectis; basi profunde bi-sinuatus, tenuiter reflexo-marginatus, supra convexus, crebre subtiliter granulatus, dorso longitudinaliter canaliculatus, parcissime cinereo-tomentosus, vitta utrinque laterali, medio introrsum ampliata, dense albo-tomentosa, remote granulata decoratus. Scutellum nullum. Elytra antice singulatim obtuse rotundato-producta, thoracis basi paulo latiora, humeris obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, pone scutellum et supra humeros leviter impressa, tenuiter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis, singulo basi tuberculo parvo, obtuso instructo; ante apicem non callosa, nigra, tomento cinereo sat dense inæqualiter obsita. Corpus subtus subtilissime coriaceum, nigrum, cinereo-tomentosum, interdum flavo-pollinosum. Pedes mediocres, validi, cinereo-tomentosi; femoribus modice clavatis, subtus dente brevi, obsoleto armatis; tibiis teretibus, anticis intus in medio dente obtuso instructis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 348. — LARINUS. Schupp. — H. op. VII. II. p. 4.

\* 13-14. L. HEDENBORGI. (Schh.) — *Ovatus, niger, subtus dense albido-supra cinereo-tomentosus; rostro basi bi-caniculato; thorace confertim rugoso-punctato, obsolete canaliculato, vitta lata laterali, antice angustata, albo-tomentosa decorato; elytris evidenter punctato-striatis, maculis inæqualibus albo-tomentosis, duplici serie ornatis.*

*Patria* : Insula Rhodus. DOM. HEDENBORG. Mus. Reg. Holm.

Statura et similitudo *Larini maculati*, sed duplo minor, angustior; rostro basi longius impresso, elytris profundius punctato-striatis, ut et colore indumenti, ab illo diversus. Caput mediocre, crassum, sat crebre subtiliter punctulatum, nigrum, tomento cinereo-albido dense tectum; oculi perpendiculares, valde elon-



gati, angusti, depressi, nigri; rostrum capite dimidio longius et angustius, crassum, teres, fere rectum, supra ad basin bi-canalliculatum, subtiliter confertim rugulosum, nigrum, cinereo-albido-tomentosum. Antennæ breves, crassæ, nigrae, dense cinereo-pubescentes; clava ovata, valde acuta. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, anterieus dimidio angustior, apice leviter emarginatus, sub-tubulatus, lateribus obliquis, basin versus fere rectis; postice profunde bi-sinuatus, lobo medio rotundato; supra transversim modice convexus, in medio obsolete canaliculatus, confertim rugoso-punctatus, niger, parce cinereo-tomentosus, vitta laterali, lata, medio introrsum ampliata, anterieus angustata, et in medio linea angusta, dense albo-tomentosis, ornatus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, parce cinereo-tomentosum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basi latiora, pone basin oblique ampliata, humeris sub-elevatis; lateribus ultra medium sensim perparum dein citius angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, evidenter striata vel sub-sulcata, sulcis anterieus distincte, posterieus obsolete punctatis, interstitiis planis, ruguloso-alutaceis; nigra, cinereo-tomentosa; in singulo elytro series duæ e maculis valde inæqualibus, albo-tomentosis, una marginalis, altera versus suturam. Corpus subtile obsolete punctulatum, nigrum, dense sordide albo-tomentosum. Pedes longiusculi, validi, nigri, dense albo-tomentosi. — BEN.

GENUS 351. — HEILIPUS. Germ. — *H. op.* VII. II. p. 24.

93-94. *H. SCROBICULATUS* (1). (*Mannerheim.*) — Oblongus, ater, opacus, squalidus, undique inæqualis, scrobiculatus et verrucosus; antennis tarsisque piceis; fronte foveola impressa, rostro pariter arcuato; thorace latitudine longiore, lateribus rotundatis, crenatis, dorso carinato; elytris granulis minutis adpersis, verrucis majoribus hinc inde immixtis. — MANNERHEIM, *Beitr. z. Käfer Fauna d. Aleuth. Ins.* p. 220. 247. — P. N. California.

95-96. *H. LAURI*. (*Sundevall.*) — Oblongo-ovatus, piceus, sub-nitidus, setulis parvis, depressis, cinereis parce adpersus; rostro thorace duplo longiore, sat valido, modice arcuato; thorace conico, sub-remote rugoso-punctato; elytris mediocriter punctato-striatis, transversim rugosis, fasciis duabus macularibus, læte cervino-squamosis, una mox ante et altera longe pone medium, decoratis.

(1) Mihi invisus. — An hujus generis?

*Patria* : Mexico. A Dom. WAHL in fructu *Lauri drymifoliae*, ubi metamorphosin subjicit, lectus, et a Dom. SUNDEVALL donatus. Mus. Reg. Holm.

Magnitudo *Hylobii Abietis*, sed minus convexus. Caput medio-cre, rotundatum, convexum, crassum, sub-remote sat profunde punctatum, rufo-piceum, nitidum, parce pallido-squamosum; oculo ovati, modice prominuli, nigri; rostrum thorace duplo longius, teres, sat validum, modice arcuatum, basi evidenter extrorsum subtiliter punctulatum, inter antennis obsolete canaliculatum, rufo-piceum, nitidum, setulis brevibus, depressis, pallidis adpersum. Antennae in medio rostri insertae, minus tenues, nigro-piceae, parce pilosae; clava ovata, sub-acuminata, fusco-holosericea. Thorax angustus, conicus, latitudine postica paulo brevior, apice utrinque emarginatus, supra modice rotundato-productus, lobis ocularibus nonnihil prominulis, obtuse rotundatis, lateribus obliquis; basi profunde bi-sinuatus, supra convexus, sub-remote rugoso-punctatus, nigro-piceus, nitidus, setulis parvis, depressis, albidis parce adpersus. Scutellum medio-cre, sub-triangulari, piceum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basi multo latiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus apicem versus sensim perparum angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, mediocriter punctato-striata, transversim rugosa, picea, sub-nitida, setulis parvis, depressis, albidis parce adpersa; singulo fasciis duabus transversis, e maculis pluribus constitutis, laete cervino-squamosis, una mox ante et altera longe pone medium, decorato. Corpus subtus subtiliter remote punctulatum, ferrugineum, nitidum, parce inaequaliter albo-setulosum. Pedes mediocres, ferruginei, parce albo-setulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente sub-acuto armatis; tibiis sub-compressis, basi inflexis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 361. — AORUS. *Nobis*. — *H. op.* VII. II. p. 132.

2. A. FERRUGINEUS. (*Schh.*) — *Elongatus, dilute ferrugineus, nitidus, glaber; capite subtilissime punctulato, rostro arcuato; thorace supra parum convexo, dorso antico subtilissime, postice lateribusque evidenter crebrius punctulato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, convexis, laevibus; femoribus apice infuscatis.*

*Patria* : Java. Mus. Dom. WESTERMANN.

*Statura Aori spadicei, sed duplo major. Caput rotundatum, convexum, obsolete punctulatum, dilute ferrugineum, nitidum, glabrum; fronte foveola parva insculpta; oculi ovati, depressi, nigri; rostrum longitudine thoracis, validiusculum, valde arcuatum, teres, subtilissime punctulatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum. Antennæ breviusculæ, ferruginæ; clava parva, ovata, dense cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica vix brevior; apice leviter emarginatus, anterieus subito angustatus, intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam rotundato-ampliatis, dein sub-rectis; basi leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, postice lateribusque evidenter, dorso obsolete remotius punctulatus; dilute ferrugineus, nitidus, glaber, medio vitta angusta, obsolete, antice posticeque abbreviata, nigra. Scutellum parvum, triangulare, ferrugineum, læve. Elytra antice vix emarginata, thoracis basi paulo latiora, humeris non elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, pone medium apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim truncata, thorace triplo longiora, supra paulo convexa, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, convexis, lævibus, primo apice elevato; tota dilute ferruginea, nitida, glabra. Corpus subtus ferrugineum, nitidum, glabrum, pectore abdomineque basi evidenter punctulatum, dein sub-læve. Pedes mediocres, validi, rufo-ferruginei; femoribus clavatis, muticis, apice ipso infuscatis; tibiis sub-compressis, intus ante medium nonnihil ampliatis, intus remote denticulatis et ciliatis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.*

GENUS 375-376. — AOPLOCNEMIS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ longiusculæ, sub-tenues, versus apicem rostri sitæ; articulis tribus basalibus funiculi elongatis, reliquis brevibus, omnibus sub-obconicis; clava ovalis, acuminata.

Rostrum longum, validiusculum, teres, lineare, modice arcuatum.

Oculi laterales, rotundati, sub-depressi.

Thorax breviter sub-ovatus, basi truncatus, pone oculos perparum lobatus.

Elytra oblongo-ovata, humeris obtuse angulatis.

Pedes longiusculi, minus validi, omnino mutici.

DESCRIPTIO. — *Corpus oblongum, modice convexum, parce squamosum, alatum; minusculæ magnitudinis. — Antennæ prope*

apicem rostri insertæ, thoracis basin attingentes, sub-tenués, fractæ, 12-articulatæ: articulo 1º oculos pertingente, clavato, 2-8 obconicis, tribus primis longioribus, reliquis brevioribus, sub-æqualibus; clava ovata, acuminata, majuscula, 4-articulata, articulis ægre discernendis. — *Rostrum* longitudine fere thoracis, vix æquidiusculum, lineare, teres, modice arcuatum; scrobe lineari, sub-rotundata, flexa, in medio rostri subtus connivente. — *Oculi* laterales, rotundati, parum convexi, majusculi. — *Thorax* latitudine basi parum longior, basi truncatus, tenuè elevato-marginatus, lateribus modice rotundato-ampliatus, antè parum angustior, apice supra nonnihil rotundato-productus, utrinque leviter emarginatus, pone oculos sub-lobatus, supra modice convexus. — *Scutellum* im parvum, rotundatum. — *Elytra* antice thoracis basi vix dimidio latiora, illoque triplo longiora, oblongo-ovata, humeris obtuse angulatis; apice ipso conjunctim rotundata, supra paulo convexa, versus apicem haud callosa. — *Pedes* longiusculi, longitudine sub-æquales, minus validi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, sub-rectis, intra basin perparum incrassatis, apice muticis; tarsis validis, articulis 1-3 sub-æqualibus, subtus spongiosis, ultimo clavato, bi-unguiculato.

A *ἀσπλος*, inermis; *κνημη*, tibia.

Typus. — *Aoplocnemis rufipes*; e Nova Hollandia.

Obs. — Respectu habitus fere cum *Eurhinis* hocce genus convenit.

\* 1. A. RUFIPES. (Schh.) — *Oblongus, piceus, supra parce, subtus densius albo-squamosus; rostro, antennis pedibusque dilutius rufo-ferrugineis, rostro longo, striolato-rugoso, apicem versus arcuato; thorace confertim rugoso-granulato; elytris obscure ferrugineis, mediocriter crebre punctato-striatis, interstitiis convexis, antè rugulosis, vitta disci margineque laterali posterius densius albo-squamosis.*

*Patria*: Nova Hollandia. Dom. HOPE. Mus. SCHH.

*Eurhino Æthiopi* sub-similis, nonnihil minor, præsertim angustior. Caput rotundatum, crassum, convexum, nigro-piccum, parum nitidum, sub-glabrum, subtiliter crebre rugoso-granulatum; oculi rotundati, sub-depressi, nigri; rostrum longitudine capitæ cum thorace, sat validum, teres, a basi ultra medium parum dein magis arcuatum, crebre rugoso-striolatum, dilutius

rufo-ferrugineum, sub-nitidam, glabrum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, sub-tenues, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, nigra, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil longior, apice utrinque leviter emarginatus, supra parum rotundato-productus, lobis ocularibus sub-prominulis, obtusis; antè angustior, lateribus modice æqualiter rotundato-ampliatum, basi truncatum, tenue reflexo-marginatum, supra modice convexus, confertim subtiliter granulatus, nigro-piceus, sub-nitidus, basi maculis tribus parvis, albo-squamosis ornatus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum. Elytra antè conjunctim truncata, thoracis basi dimidio latiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus pone medium apicem versus angustata, apice ipso conjunctim sub-rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, sat profunde crebre punctato-striata, interstitiis convexis, antè transversim rugulosis; obscure ferruginea, sub-nitida, vitta disci antè abbreviata margineque laterali postè albo-squamosis. Corpus subtus subtiliter crebre punctulatum, piceum, densius albo-squamosum. Pedes longiusculi, minus validi, dilutius rufo-ferruginei, nitidi, parce albo-pubescentes; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, sub-rectis, anticis apicem versus nonnihil inflexis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — ВЪН.

GENUS 436. — OMORPHORUS. *Nobis.* — *H. op.* VII. II. p. 368.

1. O. INDISPOSITUS. (*Schh.*) — *Breviter ovatus, nigro-æneus, sub-nitidus, supra parce subtus densius cinereo-tomentosus; antennis femorumque basi rufo-testaceis; vertice foveolato, fronte rostroque canaliculatis; thorace sub-conico, confertim subtiliter punctulato, basi tenuiter canaliculato, dorso obtuse bi-tuberculato; elytris valde convexis, rude punctato-striatis, transversim rugulosis, singulo basi ad suturam impresso.*

*Patria:* Benguela, Africae. Mus. Dom. SOMMER.

Magnitudo *Cioni Scrophulariæ*. Caput mediocre, crassum, supra modice convexum, subtiliter confertim punctulatum, nigro-æneum, parum nitidum, tenuiter cinereo-tomentosum; vertice foveolato; fronte sub-elevata, canaliculata; oculi ovati, parum prominuli, nigro-brunnei; rostrum capite nonnihil longius et dimidio angustius, validum, teres, rectum, supra confertim punctulatum, medio tenuiter canaliculatum, colore et indumento capitis. Antennæ breves, ferrugineæ, parce pilosæ; clava magna,

ovata, acuminata, obscuriore, dense pubescente. Thorax sub-conicus, latitudine postica brevior, apice oblique truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis; basi bi-sinuatus, supra modice convexus, subtiliter crebre punctulatus, basi tenuiter canaliculatus, dorso medio tuberculis duobus obtusis, transversim locatis instructus; nigro-æneus, sub-nitidus, tenuiter cinereo-tomentosus. Scutellum sat magnum, oblongo-triangulare, subtiliter crebre punctulatum, nigro-æneum, cinereo-tomentosum. Elytra ampla, breviter ovata, antice singulatim sinuata, thoracis basi fere duplo latiora, humeris alte elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apicem versus angustata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, thorace fere triplo longiora, supra valde convexa, fornicata, pone scutellum in tuberculum oblongum elevata, tum basi impressa, sat crebre rude punctato-striata, anterius transversim rugosa; nigro-ænea, nitida, parce cinereo-tomentosa. Corpus subtus obsolete crebre punctulatum, nigrum, dense cinereo-tomentosum. Pedes mediocres, sat validi, nigri, cinereo-tomentosi; femoribus modice clavatis, muticis, basi rufo-ferrugineis; tibiis sub-teretibus, rectis; tarsis modice dilatatis, subtus griseo-spongiosis. — BHN.

GENUS 468. — ALCIDES. Dalman. — *H. op.* VIII. I. p. 46.

1-2. A. BURMEISTERI. (Schh.) — *Oblongus, niger, nitidus, subtus cinereo-squamosus; rostro capite cum thorace nonnihil longiore, valido, parum arcuato, subtilissime remote punctulato; thorace mediocriter sat crebre punctato, maculis duabus lateralibus, magnis, cinereo-squamosis decorato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, lævibus, fasciis duabus latis apiceque cinereo-squamosis.*

*Patria* : Manilla. Mus. DOM. SOMMER.

Magnitudo *Polydercis zonati*. Caput breve, rotundatum, convexum, subtiliter crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum; fronte impressa, puncto profundiori insculpta; oculi ovati, sub-depressi, nigri; rostrum capite cum thorace nonnihil longius, validum, teres, parum arcuatum, subtilissime sub-remote punctulatum, inter oculos canalicula brevissima insculptum, totum nigrum, nitidum, glabrum. Antennæ ad thoracis medium pertingentes, minus tenues, nigrae, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine postica nonnihil brevior, apice truncatus, anterius angus-

tior, intra apicem late constrictus, sub-tubulatus, lateribus pone stricturam valde rotundato-ampliatis, dein sub-rectis; basi profunde bi-sinuatus, supra convexus, mediocriter crebre punctulatus, niger, nitidus, in utroque latere maculis duabus, magnis, una basali oblongo-quadrata, altera apicali sub-ovata, dense cinereo-squamosis, ornatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, nitidum, læve. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basi haud latiora, lateribus non ampliata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace plus duplo longiora, supra convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, lævibus; nigra, nitida, non procul a basi fascia lata, sub-obliqua, ad scutellum excurrente, pone medium altera etiam sub-obliqua, communibus, arcuque apicali, dense cinereo-squamosis, decorata. Corpus subtus subtiliter punctulatum, nigrum, dense cinereo-squamosum. Pedes elongati, validi, nigri, nitidi, antichi validiores et robustiores; femoribus clavatis, subtus versus apicem dente valido instructis, dein extrorsum crenulatis; tibiis anterioribus inflexis; primi paris intus in medio angulariter ampliatis; tarsis modice dilatatis, subtus brunneo-spongiosis. — BHN.

GENUS 506. — CRATOSOMUS. *Nob.* — *H. op.* VIII. I. p. 293.

41-42. C. GERMARI. (*Schh.*) — *Oblongo-ovatus*, niger, supra dense cinereo-tomentosus; rostro valido, arcuato, sub-remote punctato, inter antennas breviter bi-caniculato; thorace sub-conico, dorso postico obsolete carinato; elytris mediocriter punctato-sulcatis, interstitiis planis, maculis decem atro-tomentosis insignitis, humeris lateraliter protensis, acutis, apice ipso dehiscentibus, singulatim mucrone longo, acuto instructis.

*Cratosomus Schoenherri.* DOM. GERMAR in litteris.

*Patria* : Columbia. DOM. GERMAR.

Femina nobis tantum cognita. Magnitudo *Cratosomi lentiginosi*. Caput rotundatum, convexum, sat crebre punctulatum, nigrum, sub-nitidum, parce cinereo-pubescent, vertice obsolete canaliculato; fronte foveola parva insculpta; oculi laterales, rotundati, convexi, nigri; rostrum longitudine thoracis cum capite, validum, arcuatum, versus apicem deplanatum, undique disperse subtiliter punctulatum, inter antennas breviter bi-caniculatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Thorax breviter sub-conicus, apice leviter emarginatus, anterieus angustior, intra apicem

*obsolete constrictus, lateribus sub-obliquis, versus basin ampliatis; postice bi-sinuatus, lobo medio sub-emarginato; supra modice convexus, subtilissime crebre punctulatus, dorso postico obsolete carinatus; niger, tomento brevi, depresso, cinereo dense obsitus. Scutellum oblongo-ovatum, nigrum, cinereo-tomentosum. Elytra antice singulatim perparum rotundato-producta, thoracis basi dimidio latiora, humeris lateraliter valde extensis, acutis; lateribus pone humeros usque ad apicem sensim angustata, apice ipso dehiscencia, singulatim in mucronem longum, acutum excurrentia, thorace plus triplo longiora, supra convexa, postice modice declivia, mediocriter punctato-sulcata, interstitiis planis; nigra, tomento brevi, depresso, cinereo dense tecta; singulo maculis quinque atro-tomentosis decorato, duabus basi, una scutellum propius rotunda, altera in ipso humero oblongo-ovata, binis fere in medio, interiore majore, exteriori minore, rotundis, quintaque apicali. Corpus subtus parce punctulatum, nigrum, nitidum, lateribus tenuiter cinereo-tomentosum. Pedes longiusculi, sat validi, nigri, nitidi, parce albo-setulosi; femoribus vix clavatis, remote punctulatis, subtus versus apicem dente acuto armatis; tibiis sub-compressis, basi perparum arcuatis; tarsis dilatatis, subtus brunneo-spongiosis.*

*Obs.* — Mas a femina differt: rostro cornubus duobus validis, antrorsum arcuatis. Teste Dom. GERMAR. BHN.

GENUS 553. — CONOTRACHELUS. *Latreille.* — *H. op.* VIII. II. p.

68-69. C. MACULIPES. (*Schh.*) — *Sub-ovatus, niger, sub-nitidus, inæqualiter griseo-squamosus; antennis versus apicem rostri insertis, rostro longiore, sub-tenui, arcuato, basi sulcato; thorace angusto, confertim subtiliter ruguloso-punctato; elytris sub-triangularibus, punctato-striatis, costis tribus argute elevatis, interruptis instructis; femoribus extus albo-maculatis, subtus acute dentatis.*

*Patria:* Villa Alta, Mexico. Dom. SOMMER. Mus. SCHH.

Statura et affinitas *Conotracheli abruptecostati* et *C. rugicollis*; ab utroque thorace subtiliter confertim ruguloso-punctato, elytrorum costis magis elevatis, femoribus albo-maculatis, facile distinctus. Caput parvum, rotundatum, sat crebre punctulatum, nigrum, nitidum, glabrum; oculi demissi, oblongi, infra caput fere coniventes, parum prominuli, nigri; rostrum thorace cum capite longius, teres, sub-tenuè, arcuatum, a basi ultra medium sulcatum, sulcis sat profunde punctatis; versus apicem subtiliter tan-



tum punctulatum, nigrum, sub-nitidum, fere glabrum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, tenues, piceæ, parce pilosæ; clava ovata, acuminata, fusco-pubescente. Thorax angustus, latitudine postica haud longior, apice supra rotundato-productus, anterius subito angustatus, lateribus pone medium sub-rectis; basi bi-sinuatus, supra parum convexus, subtiliter confertim ruguloso-punctatus, niger, opacus, dorso denudatus, lateribus griseo-squamulosus. Scutellum rotundatum, sub-elevatum, nigrum, fere denudatum. Elytra sub-triangularia, antice tri-sinuata, thoracis basi duplo latiora, humeris lateraliter nonnihil extensis, obtuse angulatis; lateribus inflexa, a basi apicem versus sensim angustata, apice ipso conjunctim rotundata, thorace triplo longiora, supra modice convexa, minus profunde striato-punctata, interstitiis alternis fere planis, alternis argute costatis, costis interruptis; nigra, sub-nitida, sat dense griseo-squamulosa. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, glabrum, pectore profunde, ventre obsolete punctulatis. Pedes elongati, obsolete punctati, nigro-picei, parce albo-setulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente valido, acuto armatis, extus apicem propius macula e squamulis densis, albidis insignitis; tibiis sub-compressis, basi nonnihil arcuatis; tarsis elongatis, ferrugineis, subtus griseo-spongiosis. — ВНХ.

GENUS 564-565. — PELTOPHORUS. *Nobis.*

*Character generis.* — Antennæ mediocres, sub-tenues, ante medium rostri insertæ; scapo breviusculo, clavato; articulis tribus basalibus funiculi longiusculis, obconicis, sub-æqualibus, reliquis brevibus, sub-rotundatis; clava parva, ob-ovata.

Rostrum longiusculum, validum, basi carinatum, apicem versus paulo complanatum, modice arcuatum.

Oculi ovati, modice convexi, sub-contigui, majusculi.

Thorax sub-conicus, basi bi-sinuatus, intra apicem leviter coarctatus.

Scutellum majusculum, transverse quadratum.

Elytra oblongo-sub-quadrata, basi apiceque singulatim rotundata, abdomine breviora.

Pygidium nudum, semi-rotundatum, supra carinatum.

Pedes longiusculi, validiusculi, sub-æquales.

DESCRIPTIO. — *Corpus* sub-ovale, nonnihil convexum, squamosum, alatum; mediocris magnitudinis. — *Antennæ* ante medium rostri insertæ, longitudine capitis rostrique, sub-tenues, fractæ, 12-

articulatæ : articulo 1° clavato, oculos haud attingente; funiculo 7-articulato : articulis tribus basalibus longiusculis, obconicis, sub-æqualibus, 4-7 brevibus, sub-rotundatis, ultimis gradatim perparum latoribus; clava parva, obovata, 4-articulata. — *Rostrum* capite dimidio longius, validum, basi supra sub-carinatum, apicem versus paulo complanatum, modice arcuatum. — *Caput* exsertum, fere horizontale, convexum. — *Oculi* majusculi, ovati, modice convexi, in fronte sub-coadunati. — *Thorax* latitudine baseos vix brevior, antice fere dimidio angustior, sub-conicus, basi leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, intra apicem leviter coarctatus; canalis inferus in pectore haud protensus, lateribus argute marginatus. — *Scutellum* majusculum, transverse quadratum, apice truncatum. — *Elytra* thoracis basi paulo latiora illoque plus duplo longiora, thoracis basi arcte applicata, sub-lineararia, humeris obtuse rotundatis; apice distincte singulatim rotundata, abdomine breviora, supra parum convexa. — *Pygidium* apertum; perpendiculare, apice semi-rotundatum, supra carinatum. — *Pedes* longiusculi, validi, sub-æquales; femoribus clavatis, subtus dentatis; tibiis paulo compressis, basi nonnihil curvatis, apice extus unco valido instructis; tarsi mediocres, articulo penultimo latiore, bi-lobo, subtus spongioso, ultimo clavato, bi-unguiculato.

A *πελοπόρος*, peltatus.

ΤΥΠΟΣ. — *Peltophorus polymitus*; e Mexico.

Obs. — Generi *Zygopi* sub-simile est hoc genus.

1. P. POLYMITUS. (Schh.) — *Sub-ovalis, niger, supra cervino-variegatus, subtus albo-squamosus; antennis ferrugineis, rostro subtiliter punctulato, basi sub-carinato; thorace sub-conico, confertim ruguloso-punctato, dorso anguste leviter carinato, lateribus albo-squamoso; elytris tenuiter striatis, interstitiis alternis carinatis, granulatis; femoribus posticis albo-squamosis, apicem versus atromaculatis.*

*Patria*: Villa Alta, Mexico. Dom. SOMMER. Mus. SCHH.

Magnitudo *Piazuri succivi*. Caput mediocre, rotundatum, convexum, nigrum, albo-squamosum; oculi magni, ovati, modice convexi, in fronte sub-contigui, nigri; rostrum thorace nonnihil brevius, validum, modice arcuatum, apicem versus nonnihil complanatum, subtiliter punctulatum, basi breviter carinatum, evidenter crebrius punctatum, nigrum, nitidum, glabrum. An-

tennæ sub-tenues, obscure ferrugineæ; clava parva, obovata, atra. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior, apice leviter emarginatus, anterieus angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice leviter bi-sinuatus, supra modice convexus, crebre ruguloso-punctatus, dorso leviter anguste carinatus, niger, sub-nitidus, dorso parce cervino-variegatus, lateribus et subtus dense albo-squamosus. Scutellum majusculum, transverso-quadratum, apice truncatum, nigrum, haud squamosum. Elytra oblongo-quadrata, antice singulatim parum obtuse rotundata, thorace dimidio latiora, humeris haud elevatis, obtuse rotundatis; lateribus non ampliata, apice ipso iterum singulatim obtuse rotundata, thorace vix duplo longiora, supra parum convexa, tenuiter striata, interstitiis alternis planis, sub-lævibus, alternis carinatis, granulatis; nigra, atro-holosericea, remote cervino-maculata vel variegata. Pygidium apice semi-rotundatum, punctatum, medio argute carinatum, apice silaceo-squamosum. Corpus subtus confertim parum profunde punctatum, nigrum, opacum, albo-squamosum, segmentis ultimis abdominis utrinque sub-denudatis. Pedes longiusculi, validi, punctati, nigri, parce albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, subtus dente acuto armatis; posticis extus dense albo-squamosis, apicem versus atro-maculatis; tibiis sub-compressis, apicem versus nonnihil ampliatis. — BEN.

GENUS 566. — PIAZURUS. *Nobis.* — *H. op.* VIII. II. p.

12-13. P. NOTABILIS. (Schh.) — *Ellipticus, niger, squamositate cinerea parce obsitus; rostro longiori, basi striolato, rugoso, obsolete carinato; thorace latiore, trigono, subtiliter coriaceo, medio carinula tenui, abbreviata instructo, dorso vitta atra insignito; elytris minus convexis, remote mediocriter punctato-striatis, dorso parce atro-variegatis, apice singulatim emarginatis, utrinque breviter mucronatis.*

*Patria* : Villa Alta, Mexico. DOM. SOMMER. MUS. SCHH.

Statura et similitudo *Piazuri taciturni*, illo nonnihil major; thorace basi non impresso, dorso atro-vittato, elytris apice singulatim emarginatis, utrinque breviter mucronatis, ab illo differt. Caput magnum, globosum, confertim subtiliter punctulatum, nigrum, sub-opacum, squamulis albidis, parce circa oculos densioribus obsitum; oculi maximi, sub-rotundati, in fronte valde approxi-

mati, nigri; rostrum capite cum thorace longius, validum, arcuatum, inflexum, basi striolato-rugosum, medio leviter carinatum, parce albido-squamulosum, dein extrorsum subtiliter punctulatum, nitidum, glabrum, totum nigrum. Antennæ subtenuæ, ferrugineæ, parce pilosæ; clava oblongo-ovata, acuminata, obscuriore, densius pubescente. Thorax sub-triangularis, latitudine postica brevior, apice utrinque leviter emarginatus, intra apicem parum profunde constrictus, lateribus obliquis, versus basin ampliatis; postice sat profunde bi-sinuatus, supra magis convexus, subtiliter confertim coriaceus, dorso carinula brevi, tenui, antice posticeque abbreviata, instructus; niger, parce cinereo-squamulosus, vitta media inæquali, lateribusque atro-squamosis. Scutellum sub-cordiforme, punctulatum, nigrum, opacum, parce cinereo-squamulosum. Elytra antice leviter trisinuata, thoracis basi dimidio latiora, humeris vix elevatis, lateraliter nonnihil extensis, obtuse rotundatis; lateribus pone medium sensim angustata, apice ipso singulatim emarginata, utrinque breviter mucronata, thorace fere triplo longiora, supra in dorso parum convexa, sub-remote evidenter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, confertim coriaceis; nigra, sub-opaca, parce cinereo-squamulosa, dorso remote atro-variegata. Pygidium parvum, apice acuminatum. Corpus subtus subtiliter coriaceum, nigrum, parum nitidum, squamulis cinereis adpersum. Pedes validi, obsolete punctulati, nigri, parce cinereo-squamulosi; femoribus omnibus, præsertim posticis, clavatis, subtus dente valido, acuto armatis; tibiis sub-rectis; tarsis angustis, obscure ferrugineis. — BHN.

---

INDEX ALPHABETICUS  
IN  
SYNONYMIÆ INSECTORUM  
TOMUM OCTAVUM,  
GENERA ET SPECIES  
CURCULIONIDUM.

OBSERVATIONES.

Nomina generum litteris grandioribus;

Nomina specierum litteris minoribus;

Et systematica in hoc indice asterisco (\*) notata sunt, ut melius a synonymicis distinguantur.

Numerus primus ordinem generis;

Numerus autem secundus ordinem speciei cujusque suo in genere indicat.

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| * ACALLES. <i>g.</i> 543.           | * Fallax. <i>g.</i> 543. 35.       |
| * Abstersus. <i>g.</i> 543. 26.     | * Fasciculatus. <i>g.</i> 543. 12. |
| Angulicollis. <i>g.</i> 542. 12.    | * Frivulus. <i>g.</i> 543. 9.      |
| * Apicalis. <i>g.</i> 543. 2.       | Ganglionicus. <i>g.</i> 542. 11.   |
| * Argillosus. <i>g.</i> 543. 3.     | * Grandicollis. <i>g.</i> 543. 6.  |
| * Aubei. <i>g.</i> 543. 18.         | * Granellus. <i>g.</i> 543. 8.     |
| Bullatus. <i>g.</i> 542. 13.        | Granulifer. <i>g.</i> 542. 6.      |
| * Camelus. <i>g.</i> 543. 24.       | * Hypocrita. <i>g.</i> 543. 19.    |
| * Cicatricosus. <i>g.</i> 543. 7.   | Immansuetus. <i>g.</i> 543. 38.    |
| * Clavatus. <i>g.</i> 543. 36.      | Laticollis. <i>g.</i> 542. 14.     |
| Cunctus. <i>g.</i> 543. 21.         | * Lemur. <i>g.</i> 543. 22.        |
| * Denticollis. <i>g.</i> 543. 15.   | * Luridus. <i>g.</i> 543. 38.      |
| * Diocletianus. <i>g.</i> 543. 16.  | Magnicollis. <i>g.</i> 542. 15.    |
| * Dromedarius. <i>g.</i> 543. 11.   | * Menetriesi. <i>g.</i> 543. 39.   |
| * Echinatus. <i>g.</i> 543. 31.     | * Misellus. <i>g.</i> 543. 32.     |
| * Errans. <i>g.</i> 543. 20.        | * Navieresi. <i>g.</i> 543. 27.    |
| * Extensithorax. <i>g.</i> 543. 12. | Nocturnus. <i>g.</i> 543. 29.      |

- Nodulosus. g. 542. 10.*  
*\* Obesus. g. 543. 4.*  
*\* Parvulus. g. 543. 33.*  
*\* Pertusus. g. 543. 37.*  
*Picrostris. g. 543. 32.*  
*\* Ptinoides. g. 543. 29. 30. 32.*  
*\* Pyrenæus. g. 543. 13.*  
*\* Quercus. g. 543. 23.*  
*Roboris. g. 543. 26.*  
*\* Rolleti. g. 543. 1.*  
*\* Rubetra. g. 543. 14.*  
*\* Rufrostris. g. 543. 25.*  
*\* Rusticanus. g. 543. 5.*  
*Squalidus. g. 542. 5.*  
*Subfasciatus. g. 542. 16.*  
*\* Sulcatus. g. 543. 34.*  
*\* Teter. g. 543. 17.*  
*Tripartitus. g. 546. 1.*  
*\* Turbatus. g. 543. 30.*  
*Uræus. g. 542. 5.*  
*\* Variegatus. g. 543. 28. 32.*  
*Wolfii. g. 543. 18.*  
*\* ACANTHARINUS. g. 612.*  
*\* Dregei. g. 612. 1.*  
*\* ACENTRUS. g. 556.*  
*\* Histrio. g. 556. 1.*  
*\* ÆDEMONUS. g. 523.*  
*\* Eminentepunctatus. g. 523. 2.*  
*\* Erichsonii. g. 523. 1.*  
*\* ALCIDES. g. 468.*  
*\* Alboguttatus. g. 468. 12.*  
*\* Albolineatus. g. 468. 15.*  
*\* Angulus. g. 468. 3.*  
*\* Arcuatus. g. 468. 25.*  
*\* Armiger. g. 468. 6.*  
*\* Australis. g. 468. 19.*  
*\* Brevisrostris. g. 468. 33.*  
*\* Bubo. g. 468. 13.*  
*\* Burmeisteri. Mant. g. 468. 1-2.*  
*\* Chiliarcus. g. 468. 2.*  
*\* Dealbatus. g. 468. 20.*  
*\* Dentipes. g. 468. 22.*  
*\* Elegans. g. 468. 9.*  
*Excavatus. g. 468. 21.*  
*\* Exilis. g. 468. 16.*  
*\* Fabricii. g. 468. 37.*  
*\* Fallax. g. 468. 34.*  
*\* Fasciculatus. g. 468. 17.*  
*\* Gibbus. g. 468. 21.*  
*\* Hæmopterus. g. 468. 39.*  
*\* Hypocrita. g. 468. 4.*  
*\* Interruptus. g. 468. 36.*  
*\* Karelinii. g. 468. 38.*  
*\* Lacunosus. g. 468. 5.*  
*\* Laniger. g. 468. 10.*  
*\* Leopardus. g. 468. 12.*  
*\* Leucospilus. g. 468. 41.*  
*Luctuosus. g. 468. 9.*  
*Nero. g. 468. 7.*  
*Notatus. g. 468. 9.*  
*\* Paykulli. g. 468. 29.*  
*\* Pauper. g. 468. 32.*  
*\* Pectoralis. g. 468. 26.*  
*\* Pictus. g. 468. 30.*  
*\* Præustus. g. 468. 1.*  
*Raptorius. g. 468. 7.*  
*\* Reticulatus. g. 468. 7.*  
*\* Rufus. g. 468. 18.*  
*\* Senex. g. 468. 35.*  
*\* Signatus. g. 468. 24.*  
*\* Signifer. g. 468. 11.*  
*\* Simulatus. g. 468. 28.*  
*\* Sparsus. g. 468. 14.*  
*\* Subfasciatus. g. 468. 40*  
*\* Sulcatus. g. 468. 23.*  
*\* Trilobus. g. 468. 31.*  
*\* Waltoni. g. 468. 27.*  
*\* Westermanni. g. 468. 8.*  
*\* AMERHINUS. g. 459.*  
*\* Bohemani. g. 459. 8.*  
*\* Dufresnii. g. 459. 1.*  
*\* Fabraei. g. 459. 5.*  
*\* Figuratus. g. 459. 7.*  
*\* Olivieri. g. 459. 3.*  
*\* Pavo. g. 459. 4.*  
*\* Sarcinatus. g. 459. 9.*  
*\* Schoenherri. g. 459. 6.*  
*\* Unca. g. 459. 2.*  
*\* AMORBAIUS. g. 591.*  
*\* Infestus. g. 591. 1.*

- \* AMORPHOCERUS. *g.* 620.
- \* Rufipes. *g.* 620. 1.
- \* Setosus. *g.* 620. 4.
- \* Talpa. *g.* 620. 3.
- \* Zamia. *g.* 620. 2.
- \* ANALCIS. *g.* 531.
- \* Æneus. *g.* 531. 1.
- \* ANALOTES.
- \* Discoideus. *Mant. g.* 23. 1. ♀.
- \* AONYCHUS. *g.* 530.
- \* Hopei. *g.* 530. 1.
- \* AOPLOCNEMIS. *Mant. g.* 375-376.
- \* Rufipes. *Mant. g.* 375-376. 1.
- \* AORUS.
- \* Ferrugineus. *Mant. g.* 361. 2.
- \* APION.
- \* Cuprescens. *Mant. g.* 60. 33-34.
- \* Fasciculatum. *Mant. g.* 60. 15-16.
- \* Troglodytes. *Mant. g.* 60. 33-34.
- \* APOCYRTUS.
- \* Conicus. *Mant. g.* 114. 1-2.
- \* Derasus. *Mant. g.* 114. 6.
- \* Immeritus. *Mant. g.* 114. 5.
- \* Nanus. *Mant. g.* 114. 7.
- Profanus. *var. β et γ. Mant. g.* 114. 2.
- \* Subfasciatus. *Mant. g.* 114. 1-2.
- \* APODERUS.
- \* Assamensis. *Mant. g.* 43. 7-8.
- \* Echinatus. *var. β. Mant. g.* 43. 24.
- \* Horridus. *Mant. g.* 43. 27-28.
- \* Nigripennis. *Mant. g.* 43. 16.
- \* Ruficollis. *Mant. g.* 43. 19.
- \* Westermanni. *Mant. g.* 43. 8-9.
- \* APOSTASIMERIDES. *Div. II.*
- \* APOSTASIMERUS. *Gen.* 488.
- \* Serrirostris. *g.* 483. 1.
- \* APOTOMORHINUS. *g.* 492.
- \* Cribratus. *g.* 492. 2.
- \* Submaculatus. *g.* 492. 1.
- \* ARACHNOBAS. *g.* 571.
- \* Gazella. *g.* 571. 2.
- \* Striga. *g.* 571. 1.
- ARACHNOPUS.
- Striga. *g.* 571. 1.
- \* ARRHENODES.
- \* Miles. *Mant. g.* 65. 26-27.
- \* ARTHROSTENUS. *g.* 562.
- \* Cinereus. *g.* 562. 3.
- \* Fullo. *g.* 562. 1.
- \* Spadiceus. *g.* 562. 2.
- ASTYCUS.
- Acutipennis. *Mant. g.* 167. 2.
- Prasinus. *Mant. g.* 167. 4.
- \* ATERPUS. *Mant. g.*
- \* Rubens. *Mant. g.*
- \* ATHROTOMUS. *g.* 464.
- \* Depressus. *g.* 464. 1.
- \* ATTELABUS. *Mant. g.* 44.
- \* Cyaneus. *Mant. g.* 44. 1-2.
- \* Discolor. *var. β. Mant. g.* 44. 6.
- \* Morio. *Mant. g.* 44. 18-19.
- Quadripustulatus. *g.* 469. 8.
- \* Rudis. *Mant. g.* 44. 16-17.
- \* Similis. *Mant. g.* 44. 1-2.
- \* Spiculatus. *Mant. g.* 44. 5-6.
- \* Variabilis. *var. ε. Mant. g.* 44. 25.
- \* AXINOPHORUS. *g.* 623.
- \* Gages. *g.* 623. 1.
- \* BAGOUS. *g.* 563.
- \* Argillaceus. *g.* 563. 6.

- \* *Bi-impressus*. *g.* 563. 15.
- \* *Binodosus*. *g.* 563. 2.
- \* *Binodulus*. *g.* 563. 2.
- \* *Brevis*. *g.* 563. 20.
- \* *Chorinæus*. *g.* 563. 16.
- \* *Claudicans*. *g.* 563. 19.
- \* *Cœnosus*. *g.* 563. 8.
- \* *Cnemerythrus*. *g.* 563. 257.
- \* *Convexicollis*. *g.* 563. 26.
- \* *Curtus*. *g.* 563. 21.
- \* *Diglyptus*. *g.* 563. 22.
- \* *Elegans*. *g.* 563. 1.
- \* *Encaustus*. *g.* 563. 11.
- \* *Frit*. *g.* 563. 17.
- \* *Hæmatopus*. *g.* 563. 9.
- \* *Inceratus*. *g.* 563. 10.
- \* *Inquinamentus*. *g.* 563. 30.
- \* *Limosus*. *g.* 563. 12.
- \* *Longulus*. *g.* 563. 27.
- \* *Lutosus*. *g.* 563. 28.
- \* *Lutulentus*. *g.* 563. 29.
- \* *Lutulosus*. *g.* 563. 23.
- \* *Mammilatus*. *g.* 563. 3.
- \* *Mandanus*. *g.* 563. 18.
- \* *Nodulosus*. *g.* 563. 4.
- \* *Petro*. *g.* 563. 14.
- \* *Puncticollis*. *g.* 563. 31.
- \* *Pyrhocnemis*. *g.* 563. 5.
- \* *Rotundicollis*. *g.* 563. 7.
- \* *Subcarinatus*. *g.* 563. 13.
- \* *Tempestivus*. *g.* 563. 24.
- \* *Tibialis*. *g.* 563. 34.
- \* *Tophyosus*. *g.* 563. 33.
- \* *Validitarsus*. *g.* 563. 32.

\* **BARIDIDES.**— Divisio II.

Subdivisio II.

\* **BARIDIUS.** Gen. 487.

- \* *Abrotani*. *g.* 487. 131.
- \* *Abruptelineatus*. *gen.* 487. 40.
- \* *Aciculaticollis*. *g.* 487. 32.
- \* *Acutipennis*. *g.* 487. 171.
- \* *Æreus*. *g.* 487. 58.
- \* *Affaber*. *g.* 487. 36.
- \* *Albosignatus*. *g.* 487. 44.
- \* *Amœnulus*. *g.* 487. 36.

- \* *Analís*. *g.* 487. 108
- \* *Antiquus*. *g.* 487. 86.
- \* *Anthracinus*. *g.* 487. 168.
- \* *Apicalis*. *g.* 487. 170.
- \* *Armatus*. *g.* 487. 75.
- \* *Armeniacæ*. *g.* 487. 135.
- \* *Artemisiæ*. *g.* 487. 90.
- \* *Atramentarius*. *g.* 487. 105.
- \* *Atricolor*. *g.* 487. 91.
- \* *Atrocœruleus*. *g.* 487. 53.
- \* *Auricomus*. *g.* 487. 156.
- \* *Aurosignatus*. *g.* 487. 34.
- \* *Australis*. *g.* 487. 159.
- \* *Axillaris*. *g.* 487. 89.
- \* *Azureus*. *g.* 487. 51.
- \* *Badius*. *g.* 487. 61.
- \* *Bardus*. *g.* 487. 72.
- \* *Bicolor*. *g.* 487. 22.
- \* *Bipartitus*. *g.* 487. 21.
- \* *Caffer*. *g.* 487. 92.
- \* *Caldarius*. *g.* 487. 59.
- \* *Carbonarius*. *g.* 487. 69.
- \* *Carnifex*. *g.* 487. 15.
- \* *Catenulatus*. *g.* 487. 6.
- \* *Chalybæus*. *g.* 487. 30.
- \* *Chloris*. *g.* 487. 127.
- \* *Chlorizans*. *g.* 487. 128.
- \* *Chlorodius*. *g.* 487. 127.
- \* *Cinnabarinus*. *g.* 487. 16.
- \* *Cliens*. *g.* 487. 20.
- \* *Cœrulescens*. *g.* 487. 126. 104.
- \* *Cœruleus*. *g.* 487. 12.
- \* *Collaris*. *g.* 487. 46.
- \* *Coloratus*. *g.* 487. 114.
- \* *Concinnus*. *g.* 487. 132.
- \* *Confertus*. *g.* 487. 149.
- \* *Convexicollis*. *g.* 487. 94.
- \* *Coracinus*. *g.* 487. 76.
- \* *Corruscus*. *g.* 487. 57.
- \* *Crenatus*. *g.* 487. 77.
- \* *Cribrosicollis*. *g.* 487. 4.
- \* *Crocopelmus*. *g.* 487. 155.
- \* *Cupreus*. *g.* 487. 141.
- \* *Cuprirostris*. *g.* 487. 120.
- \* *Curtulus*. *g.* 487. 74.
- \* *Curtus*. *g.* 475. 1.
- \* *Curvirostris*. *g.* 475. 74.



- \* *Cyaneus. g. 487. 52.*
- \* *Depilis. g. 487. 78.*
- \* *Discolor. g. 487. 116.*
- \* *Dorsalis. g. 487. 28.*
- \* *Duplicatus. g. 487. 67.*
- \* *Eryophorus. g. 487. 25.*
- \* *Erythropus. g. 487. 151.*
- \* *Exaratus. g. 487. 18.*
- \* *Famulus. g. 487. 137.*
- \* *Flavicornis. g. 487. 145.*
- \* *Glabratus. g. 487. 162.*
- \* *Humeralis. g. 487. 174.*
- \* *Janthinus. g. 487. 125.*
- \* *Ignavus. g. 487. 49.*
- \* *Impeditus. g. 487. 164.*
- \* *Impolitus. g. 487. 87.*
- \* *Impressifrons. g. 487. 9.*
- \* *Inops. g. 487. 160.*
- \* *Irroratus. g. 487. 42.*
- \* *Interpunctatus. g. 487. 3.*
- \* *Interruptus. g. 487. 41.*
- \* *Interstitialis. g. 487. 81.*
- \* *Lætus. g. 487. 35.*
- \* *Latus. g. 487. 23.*
- \* *Lepidii. g. 487. 129.*
- \* *Liratus. g. 487. 169.*
- \* *Lituratus. g. 487. 142.*
- \* *Lividipes. g. 487. 56.*
- \* *Longulus. g. 487. 118.*
- \* *Loricatus. g. 487. 144.*
- \* *Luczotii. g. 487. 70.*
- \* *Marginicollis. g. 487. 117.*
- \* *Melanarius. g. 487. 166.*
- \* *Melanocephalus. g. 487. 14.*
- \* *Melas. g. 487. 119.*
- \* *Memnonius. g. 487. 68.*
- \* *Metallescens. g. 487. 7.*
- \* *Metallicus. g. 487. 2.*
- \* *Modicus. g. 487. 148.*
- \* *Monstrosus. g. 487. 8.*
- \* *Morio. g. 487. 154.*
- \* *Mutilus. g. 487. 83.*
- \* *Nanus. g. 487. 48.*
- \* *Neelgheriensis. g. 487. 37.*
- \* *Nigellus. g. 487. 173.*
- \* *Nigrinus. g. 487. 95.*
- \* *Nigritarsis. g. 487. 102.*
- \* *Nigrocephalus. g. 487. 146.*
- \* *Nitens. g. 487. 66.*
- \* *Nitescens. g. 487. 55.*
- \* *Nitidus. g. 487. 161.*
- \* *Notatus. g. 487. 163.*
- \* *Obcruis. g. 487. 140.*
- \* *Obumbratus. g. 487. 73.*
- \* *Opacus. g. 487. 62.*
- \* *Ovalis. g. 487. 85.*
- \* *Pallidicornis. g. 487. 115.*
- \* *Parallelus. g. 487. 10.*
- \* *Parellinus. g. 487. 11.*
- \* *Pauper. g. 487. 88.*
- \* *Parvulus. g. 487. 114.*
- \* *Pelliceus. g. 487. 112.*
- \* *Penicillatus. g. 487. 45.*
- \* *Picitarsis. g. 487. 101.*
- \* *Plicatus. g. 487. 172.*
- \* *Prasinus. g. 487. 122.*
- \* *Pullus. g. 487. 106.*
- \* *Punctatus. g. 487. 130.*
- \* *Puncticollis. g. 487. 98.*
- \* *Pusio. g. 487. 153.*
- \* *Pyritosus. g. 487. 161.*
- \* *Quadraticollis. g. 487. 100.*
- \* *Quadrinaculatus. g. 487. 33.*
- \* *Quadrisignatus. g. 487. 31.*
- \* *Rubinus. g. 504. 2.*
- \* *Rudis. g. 487. 29.*
- \* *Ruficollis. g. 487. 19.*
- \* *Rufipennis. g. 487. 13.*
- \* *Rufipes. g. 487. 113.*
- \* *Rufus. g. 487. 134.*
- \* *Rugatus. g. 487. 143.*
- \* *Saba. g. 487. 71.*
- \* *Scolopaceus. g. 487. 114.*
- \* *Scolopax. g. 487. 109.*
- \* *Scrobicollis. g. 487. 5.*
- \* *Scotinus. g. 487. 93.*
- \* *Scutellumalbum. g. 490. 68.*
- \* *Sellatus. g. 490. 27.*
- \* *Semistriatus. g. 487. 103.*
- \* *Senescens. g. 487. 50.*
- \* *Seriepunctatus. g. 487. 110.*
- \* *Siculus. g. 487. 121.*
- \* *Signatus. g. 487. 139.*
- \* *Spadiceus. g. 487. 60.*

- \* *Spoliatus*. *g.* 487. 99.
- \* *Squamifer*. *g.* 487. 17.
- \* *Squamosus*. *g.* 487. 138.
- \* *Squamulosus*. *g.* 487. 24.
- \* *Squarrosus*. *g.* 487. 150.
- \* *Subnitidus*. *g.* 487. 97.
- \* *Subscabrosus*. *g.* 487. 79.
- \* *Subsignatus*. *g.* 487. 43.
- \* *Sulcatus*. *g.* 487. 65.
- \* *Sutura-alba*. *g.* 487. 157.
- \* *T.-Album*. *g.* 487. 152.
- \* *Tenuicollis*. *g.* 487. 165.
- \* *Temerarius*. *g.* 487. 111.
- \* *Teter*. *g.* 487. 63.
- \* *Tibialis*. *g.* 487. 167.
- \* *Tigrinus*. *g.* 487. 39.
- \* *Tombacinus*. *g.* 487. 54.
- \* *Torquatus*. *g.* 487. 38.
- \* *T.-Signum*. *g.* 487. 96.
- \* *Uncinatus*. *g.* 487. 82.
- \* *Undatus*. *g.* 487. 80.
- \* *Wahlbergi*. *g.* 487. 26.
- \* *Vecors*. *g.* 487. 84.
- \* *Vestitus*. *g.* 487. 147.
- \* *Viduatus*. *g.* 487. 47.
- \* *Virgatus*. *g.* 487. 158.
- \* *Villæ*. *g.* 487. 133.
- \* *Violaceus*. *g.* 487. 123.
- \* *Viridanus*. *g.* 487. 1.
- \* *Vivax*. *g.* 487. 107.

## BARIS.

- Carnifex*. *g.* 487. 15.
- Elephas*. *g.* 490. 5.
- Impunctatus*. *g.* 487. 104.
- Inanis*. *g.* 485. 12.
- Metallicus*. *g.* 487. 2.
- Migrator*. *g.* 485. 6.
- Olfersi*. *g.* 490. 5.
- Picicornis*. *g.* 487. 131.
- Pyritosa*. *g.* 487. 161.
- Ruficollis*. *g.* 487. 19.
- Unca*. *g.* 487. 41.

\*BARYCERUS. *g.* 488.

- \* *Collaris*. *g.* 488. 1.

\*BELOPOEUS. *g.* 616.

- \* *Carmelitus*. *g.* 616. 1.

## \*BLOSYPHUS.

- \* *Carinatus*. *Mant. g.* 131. 4-5.
- \* *Herthus*. *Mant. g.* 131. 2.
- \* *Inæqualis*. *Mant. g.* 131. 7.
- \* *Spongifer*. *Mant. g.* 131. 8.
- \* **BOTHROBATYS**. *g.* 527.

- \* *Laticollis*. *g.* 527. 1.

## \*BRACHYASPISTES.

- \* *Acutipennis*. *Mant. g.* 167. 2.
- \* *Perroleti*. *Mant. g.* 167. 3.
- \* *Prasinus*. *Mant. g.* 167. 4.

## \*BRACHYCERUS.

- \* *Bufo*. *Mant. g.* 93. 2-3.

\*BRACHYCNEMIS. *g.* 454.

- \* *Quadrisingatus*. *g.* 454. 1.

## BRACHYRHINUS.

- \* *Pallidus*. *Add. n.* 55.

\*BRACHYSTYLUS. *Mant. g.*  
279-280.

- \* *Acutus*. *Mant. g.* 279-280. 1.

## \*BRACHYTARSUS.

- \* *Areolatus*. *Mant. g.* 11. 2-3.

\*BROTHEUS. *Add.*

- \* *Porcatus*. *Add. n.* 162.

## CALANDRA.

- Atrata*. *g.* 617. 45.
- Brunnipennis*. *g.* 617. 99.
- Carbonaria*. *g.* 490. 22.
- Carmelita*. *g.* 616. 1.
- Compressirostris*. *g.* 617. 92.
- Cruciata*. *Add. n.* 52.
- Ensirostris*. *g.* 617. 20.  $\beta$ .
- Ferruginea*. *g.* 598. 9. *var. c.*
- Germarii*. *g.* 598. 4.
- Granaria*. *g.* 618. 10.
- Guttata*. *g.* 617. 59.
- Hoepfneri*. *g.* 617. 10.

- Lateralis. g. 609. 7.*  
*Liturata. g. 487. 142.*  
*Ochreata. g. 619-620. 4.*  
*Planicollis. g. 465. 1.*  
*Quadrípustulata. g. 485. 2.*  
*Sericans. g. 617. 5.*  
*Sexmaculata. g. 617. 5.*  
*Sommeri. g. 607. 1.*  
*Striata. g. 617. 74.*  
*Suffusa. g. 617. 23.*  
 \* *CALLINOTUS. g. 457.*  
*Obliquus. g. 457. 1.*  
 \* *Sahlbergi. g. 457. 1.*  
 \* *Zetterstedtii. g. 457. 2.*  
 \* *CAMPTORHINUS. g. 513.*  
*Brullei. g. 513. 3.*  
*Dorsalis. g. 513. 7.*  
*Ephippiger. g. 513. 4.*  
*Pilipes. g. 513. 1.*  
*Porcatus. g. 513. 2.*  
*Setiferus. g. 513. 6.*  
*Statua. g. 513. 5.*  
*Tibialis. g. 513. 2.*  
*Tubulatus. g. 513. 8.*  
 CAMPTORHYNCHUS.  
*Fluctuarius. g. 504. 2.*  
 \* *CAMPYLOSCELIDES. Divisio I.*  
 (Sectio III.)  
 \* *CAMPYLOSCELUS. Gen. 590.*  
*Westermanni. g. 590. 1.*  
 \* *CATAMONUS. Mant. g. 190-*  
 191.  
 \* *Melancholicus. Mant. g. 190-*  
 191. 1.  
 \* *CATAPYCŒNUS. g. 508.*  
 \* *Granulosus. g. 508. 1.*  
 \* *Nodulosus. g. 508. 2.*  
 \* *CATAPYGES. g. 619.*  
 \* *Albostriatus. g. 619. 1.*  
 CATASARCUS.  
 \* *Rugulosus. Mant. g. 109. 3-4.*
- \* *CATOLETHRUS. g. 626.*  
 \* *Fallax. g. 626. 2.*  
 \* *Longulus. g. 626. 1.*  
 \* *Nasalis. g. 626. 3.*  
 \* *Rufus. g. 626. 4.*  
 \* *CELETES. g. 479.*  
 \* *Binotatus. g. 479. 1.*  
 \* *CENTRINUS. g. 490.*  
 \* *Acerbus. g. 490. 14.*  
 \* *Adustus. g. 490. 113.*  
 \* *Ærumnosus. g. 490. 129.*  
 \* *Affaber. g. 490. 50.*  
 \* *Afflictus. g. 490. 13.*  
 \* *Albopictus. g. 490. 69.*  
 \* *Angulus. g. 490. 108.*  
 \* *Antiquus. g. 490. 83.*  
 \* *Apicipennis. g. 490. 40.*  
 \* *Arnoldi. g. 490. 116.*  
 \* *Asphaltinus. g. 490. 46.*  
 \* *Assentator. g. 490. 87.*  
 \* *Ater. g. 490. 131.*  
 \* *Aurichalceus. g. 490. 136.*  
 \* *Auritarsis. g. 490. 25.*  
*Axillaris. g. 94. var. 7.*  
 \* *Bicolor. g. 490. 84.*  
 \* *Bicoloratus. g. 490. 53.*  
 \* *Bicuspis. g. 490. 1.*  
 \* *Bifrons. g. 490. 60.*  
 \* *Bigrammicus. g. 490. 20.*  
 \* *Bilineatus. g. 490. 21.*  
 \* *Brunnicollis. g. 490. 117.*  
 \* *Calamitosus. g. 490. 127.*  
 \* *Capreolus. g. 490. 47.*  
 \* *Carbonarius. g. 490. 22. 26.*  
 \* *Carnifex. g. 490. 114. 84.*  
 \* *Cemas. g. 490. 55.*  
 \* *Cestrotus. g. 490. 106.*  
 \* *Christophori. g. 490. 105.*  
*Chrysographus. g. 490. 3.*  
 \* *Cœruleus. g. 490. 82.*  
 \* *Collaris. g. 490. 88.*  
 \* *Conformis. g. 490. 29.*  
 \* *Confusus. g. 490. 61.*  
 \* *Conicollis. g. 490. 43.*

- \* *Corinthius. g.* 490. 133.  
 \* *Croceosignatus. g.* 490. 52.  
 \* *Cupratus. g.* 490. 135.  
 \* *Curvirostris. g.* 490. 3.  
 \* *Cyanipes. g.* 490. 81.  
 \* *Decoratus. g.* 490. 63.  
 \* *Dispilus. g.* 490. 26.  
 \* *Distinctus. g.* 490. 6.  
 \* *Ebeninus. g.* 490. 33.  
   *Equestris. g.* 490. 7.  
 \* *Falcatus. g.* 490. 125.  
 \* *Fallax. g.* 490. 92.  
 \* *Figuratus. g.* 490. 57.  
 \* *Flaveolus. g.* 490. 76.  
 \* *Flavicornis. g.* 490. 130.  
 \* *Furvus. g.* 490. 35.  
 \* *Germari. g.* 490. 2.  
 \* *Gibbistrostris. g.* 490. 16.  
 \* *Globus. g.* 490. 124.  
 \* *Grammicus. g.* 490. 27.  
 \* *Holosericeus. g.* 490. 64.  
 \* *Inquinatus. g.* 490. 110.  
   *Interstitialis. g.* 493. 8.  
 \* *Larvatus. g.* 490. 66.  
 \* *Leachii. g.* 490. 111.  
 \* *Lentiginosus. g.* 490. 74.  
 \* *Lineicollis. g.* 490. 75.  
 \* *Lineatosignatus. g.* 490. 24.  
 \* *Lucens. g.* 490. 134.  
 \* *Lugubris. g.* 490. 132.  
 \* *Luteolus. g.* 490. 72.  
 \* *Luteus. g.* 490. 77.  
 \* *Maurus. g.* 490. 37.  
 \* *Meigenii. g.* 490. 112.  
 \* *Mexicanus. g.* 490. 123.  
   *Micans. g.* 490. 134.  
 \* *Modestus. g.* 490. 98.  
 \* *Morio. g.* 490. 121.  
 \* *Multicolor. g.* 490. 109.  
 \* *Normalis. g.* 490. 18.  
 \* *Oblongus. g.* 490. 48.  
 \* *Obniger. g.* 490. 45.  
 \* *Obsidianus. g.* 490. 41.  
 \* *Ocellatus. g.* 490. 19.  
 \* *Ochraceus. g.* 490. 103.  
 \* *Olfersii. g.* 490. 5.  
   *Olivaceus. g.* 490. 73.
- \* *Ollula. g.* 490. 89.  
 \* *Pallidicollis. g.* 490. 119.  
 \* *Pallidesignatus. g.* 490. 85.  
 \* *Parallelus. g.* 490. 4.  
 \* *Parellinus. g.* 490. 80.  
 \* *Pauperatus. g.* 490. 71.  
 \* *Pectoralis. g.* 490. 104.  
 \* *Perscillus. g.* 490. 70.  
 \* *Pexus. g.* 490. 51.  
 \* *Pictus. g.* 490. 54.  
 \* *Picumnus. g.* 490. 73.  
 \* *Pilosus. g.* 490. 93.  
 \* *Pistor. g.* 490. 65.  
 \* *Podagricus. g.* 490. 32.  
   *Politus. g.* 493. 8.  
 \* *Posticus. g.* 490. 17.  
 \* *Pugnax. g.* 490. 59.  
 \* *Pullus. g.* 490. 91.  
 \* *Pumilus. g.* 490. 99.  
 \* *Punctatissimus. g.* 490. 39.  
 \* *Puncticollis. g.* 490. 38.  
 \* *Quadraticollis. g.* 490. 49.  
 \* *Quadriguttatus. g.* 490. 15.  
 \* *Quadrivittatus. g.* 490. 58.  
 \* *Rasilis. g.* 490. 120.  
 \* *Rubiginosus. g.* 490. 36.  
 \* *Ruficollis. g.* 490. 118.  
 \* *Ruficornis. g.* 490. 31.  
 \* *Rufipes. g.* 490. 12.  
 \* *Sanguinicollis. g.* 490. 115.  
 \* *Scapularis. g.* 490. 86.  
 \* *Scapulosus. g.* 490. 107.  
 \* *Sciolus. g.* 490. 95.  
 \* *Scutellum-album. g.* 490. 68.  
 \* *Senilis. g.* 490. 62.  
 \* *Siccus. g.* 490. 34.  
 \* *Signatus. g.* 490. 11.  
 \* *Sommeri. g.* 490. 8.  
 \* *Spadiceus. g.* 490. 102.  
 \* *Sparsus. g.* 490. 97.  
 \* *Speculifer. g.* 490. 13.  
 \* *Spiculator. g.* 490. 137.  
 \* *Squamipes. g.* 490. 28.  
 \* *Subarmatus. g.* 490. 126.  
 \* *Subcinctus. g.* 490. 56.  
 \* *Subnotatus. g.* 490. 100.  
 \* *Sulcatus. g.* 490. 128.

- \* *Superbifictus*. *g.* 490. 42.  
 \* *Suspensus*. *g.* 490. 44.  
   *Sutura-alba*. *g.* 487. 157.  
 \* *Suturalis*. *g.* 490. 10.  
 \* *Tardigradus*. *g.* 490. 122.  
 \* *Tonsilis*. *g.* 490. 67.  
 \* *Torquatus*. *g.* 490. 101.  
 \* *Transverse-impressus*. *g.* 490. 96.  
 \* *Trigrammicus*. *g.* 490. 9.  
   *Trochilus*. *g.* 572. 4.  
 \* *Tumidus*. *g.* 490. 79.  
   *Uncirostris*. *g.* 490. 94. *var.* *γ*.  
 \* *Varicolor*. *g.* 490. 78.  
 \* *Vestitus*. *g.* 490. 94.  
 \* *Westwoodii*. *g.* 490. 7.
- CEOCEPHALUS.
- \* 6-7. *Scrobicollis*. *Mant.* *g.* 74. 6-7.  
   \* **CERCIDOCERUS**. *g.* 609.
- \* *Bimaculatus*. *g.* 609. 2.  
 \* *Bipunctatus*. *g.* 609. 1.  
 \* *Erythrocerus*. *g.* 609. 5.  
 \* *Fabricator*. *g.* 609. 3.  
 \* *Fabrilis*. *g.* 609. 4.  
 \* *Lateralis*. *g.* 609. 7.  
 \* *Nigrolateralis*. *g.* 609. 6.  
   *Securiferus*. *g.* 609. 6.
- \* **CEUTHORHYNCHUS**. *g.* 577.
- \* *Abbreviatus*. *g.* 577. 65.  
 \* *Abruptestriatus*. *g.* 577. 82.  
 \* *Achilleæ*. *g.* 577. 42.  
   *Ægrotus*. *g.* 577. 15.  
 \* *Æneicollis*. *g.* 577. 136.  
 \* *Alboscutellatus*. *g.* 577. 8.  
 \* *Albosetosus*. *g.* 577. 47.  
 \* *Albosignatus*. *g.* 577. 76.  
 \* *Albovittatus*. *g.* 577. 3.  
 \* *Andreae*. *g.* 577. 70.  
 \* *Angulosus*. *g.* 577. 117.  
 \* *Angustulus*. *g.* 577. 44.  
 \* *Apicalis*. *g.* 577. 29.  
 \* *Arator*. *g.* 577. 9.  
 \* *Arquata*. *g.* 577. 95.
- \* *Asperifoliarum*. *g.* 577. 78.  
 \* *Assimilis*. *g.* 577. 11.  
 \* *Asperulus*. *g.* 577. 32.  
 \* *Atomus*. *g.* 577. 24.  
 \* *Atratulus*. *g.* 577. 25.  
 \* *Aubei*. *g.* 577. 68.  
 \* *Austerus*. *g.* 577. 12.  
 \* *Axillaris*. *g.* 577. 136. *g.* 493. 5.  
 \* *Biguttatus*. *g.* 577. 112.  
 \* *Borraginis*. *g.* 577. 63.  
   *Caliginosus*. *g.* 577. 116.  
 \* *Camelinæ*. *g.* 577. 164.  
 \* *Campestris*. *g.* 577. 85.  
 \* *Carinatus*. *g.* 577. 144.  
 \* *Carinifrons*. *g.* 577. 60.  
   *Cestrotus*. *g.* 490. 106.  
 \* *Chalybæus*. *g.* 577. 145.  
 \* *Chrysanthemi*. *g.* 577. 88.  
   *Cinereus*. *g.* 577. 9.  
 \* *Coarctatus*. *g.* 577. 162.  
 \* *Cochleariæ*. *g.* 577. 27.  
 \* *Cœrulescens*. *g.* 577. 22.  
 \* *Concinnus*. *g.* 577. 94.  
   *Congener*. *g.* 577. 78.  
 \* *Consputus*. *g.* 577. 15.  
 \* *Constrictus*. *g.* 577. 38.  
 \* *Contractus*. *g.* 577. 23.  
 \* *Convexicollis*. *g.* 577. 40.  
 \* *Crucifer*. *g.* 577. 67.  
 \* *Cyanipennis*. *g.* 577. 141.  
 \* *Decoratus*. *g.* 577. 86.  
 \* *Denticulatus*. *g.* 577. 109.  
 \* *Depressicollis*. *g.* 577. 16.  
 \* *Dubitabilis*. *g.* 577. 166.  
 \* *Echii*. *g.* 577. 56.  
   *Epilobii*. *g.* 536. 8.  
 \* *Ericæ*. *g.* 577. 46.  
 \* *Erysimi*. *g.* 577. 21.  
   *Erythrorhynchus*. *g.* 577. 41.  
 \* *Fæculentus*. *g.* 577. 120.  
 \* *Fallax*. *g.* 577. 39.  
 \* *Fatidicus*. *g.* 577. 66.  
 \* *Figuratus*. *g.* 577. 89.  
 \* *Floralis*. *g.* 577. 36.  
 \* *Fossarum*. *g.* 577. 53.  
 \* *Gallicus*. *g.* 577. 91.  
 \* *Glabrirostris*. *g.* 577. 131.

- \* *Glaucinus*. *g.* 577. 57.  
 \* *Glaucus*. *g.* 577. 45.  
 \* *Hedenborgi*. *g.* 577. 114.  
 \* *Hepaticus*. *g.* 577. 14.  
 \* *Hirtulus*. *g.* 577. 146.  
 \* *Horridus*. *g.* 577. 59.  
 \* *Humeralis*. *g.* 577. 118.  
 \* *Ignitus*. *g.* 577. 140.  
 \* *Inaffectatus*. *g.* 577. 130.  
 \* *Interstinctus*. *g.* 577. 159.  
 \* *Lepidus*. *g.* 577. 79.  
   *Leucomelas*. *g.* 577. 73.  
 \* *Lineatus*. *g.* 577. 64.  
 \* *Litura*. *g.* 577. 73.  
 \* *Lycopi*. *g.* 577. 98.  
 \* *Macula-alba*. *p.* 577. 4.  
 \* *Marginatus*. *g.* 577. 104.  
 \* *Melanarius*. *g.* 577. 12.  
 \* *Melancholicus*. *g.* 577. 77.  
 \* *Melanocyanus*. *g.* 577. 139.  
 \* *Melanostictus*. *g.* 577. 96.  
 \* *Mendosus*. *g.* 577. 92.  
 \* *Minutus*. *g.* 577. 54.  
 \* *Misellus*. *g.* 577. 134.  
 \* *Mœstus*. *g.* 577. 156.  
 \* *Molitor*. *g.* 577. 87.  
   *Monostigma*. *g.* 577. 36.  
 \* *Murinus*. *g.* 577. 103.  
 \* *Nanus*. *g.* 577. 43.  
 \* *Napi*. *g.* 577. 129.  
 \* *Neutralis*. *g.* 577. 133.  
 \* *Nigrirostris*. *g.* 577. 110.  
 \* *Nodicollis*. *g.* 577. 19.  
 \* *Nubeculosus*. *g.* 577. 167.  
 \* *Nubilosus*. *g.* 577. 158.  
 \* *Obsoletus*. *g.* 577. 119.  
 \* *Obscurecyaneus*. *g.* 577. 138.  
 \* *Obtusicollis*. *g.* 577. 135.  
 \* *Occultus*. *g.* 577. 93.  
   *Ornatus*. *g.* 577. 70.  
   *Ovalis*. *g.* 577. 73.  
   *Pallidedactylus*. *g.* 577. 100.  
 \* *Peregrinus*. *g.* 577. 71.  
 \* *Perturbatus*. *g.* 577. 99.  
   *Phœorhynchus*. *g.* 577. 41.  
 \* *Picitarsis*. *g.* 577. 121.  
 \* *Pilosellus*. *g.* 577. 107.  
 \* *Polliger*. *g.* 577. 48.  
 \* *Pollinarius*. *g.* 577. 116.  
 \* *Posthumus*. *g.* 577. 35.  
 \* *Pruni*. *g.* 577. 113.  
 \* *Pubicollis*. *g.* 577. 164.  
 \* *Pultarius*. *g.* 577. 55.  
 \* *Pulvinatus*. *g.* 577. 37.  
 \* *Pumilio*. *g.* 577. 31.  
 \* *Punctiger*. *g.* 577. 105.  
 \* *Puncticollis*. *g.* 577. 128.  
 \* *Pyrrorhynchus*. *g.* 577. 41.  
 \* *Quadridentis*. *g.* 577. 100.  
 \* *Querceti*. *g.* 577. 28.  
 \* *Quercicola*. *g.* 577. 108.  
 \* *Quercus*. *g.* 536. 1.  
 \* *Radula*. *g.* 577. 58.  
 \* *Rapæ*. *g.* 577. 125.  
 \* *Raphani*. *g.* 577. 62.  
 \* *Resedæ*. *g.* 577. 101.  
 \* *Rhusii*. *g.* 577. 149.  
 \* *Rimulosus*. *g.* 577. 155.  
 \* *Rinicæ*. *g.* 577. 150.  
 \* *Roberti*. *g.* 577. 127.  
 \* *Rubescens*. *g.* 577. 17.  
 \* *Rubicundulus*. *g.* 577. 102.  
 \* *Rubidus*. *g.* 577. 18.  
   *Ruficrus*. *g.* 577. *var.*  $\gamma$ .  
   *Rufitarsis*. *g.* 577. 106. 126.  
 \* *Rugulosus*. *g.* 577. 90.  
 \* *Rusticus*. *g.* 577. 115.  
 \* *Sahlbergi*. *g.* 577. 84.  
 \* *Scapularis*. *g.* 577. 137.  
 \* *Septentrionalis*. *g.* 577. 33.  
 \* *Seriatus*. *g.* 577. 7.  
 \* *Setiferus*. *g.* 577. 147.  
 \* *Setosus*. *g.* 577. 26.  
 \* *Sextuberculatus*. *g.* 577. 2.  
 \* *Signatellus*. *g.* 577. 165.  
 \* *Signatus*. *g.* 577. 83.  
   *Sii*. *g.* 577. 30.  
   *Smaragdinus*. *g.* 577. 21. *var.*  $\beta$ .  
 \* *Sophiæ*. *g.* 577. 132.  
 \* *Sphæriion*. *g.* 577. 49.  
 \* *Squamiger*. *g.* 577. 148.  
 \* *Stevenii*. *g.* 577. 8.  
 \* *Subsultans*. *g.* 577. 20.  
 \* *Sulcicollis*. *g.* 577. 123.

- Sulculus. g. 577. 36.*  
*\*Suturalis. g. 577. 6.*  
*\*Suturellus. g. 577. 143.*  
*\*Syrites. g. 577. 10.*  
*\*T-Album. g. 577. 69.*  
*\*Tarsalis. g. 577. 142.*  
*\*Terminatus. g. 577. 30.*  
*\*Tibialis. g. 577. 122.*  
*\*Topiarius. g. 577. 1.*  
*\*Triangulum. g. 577. 97.*  
*\*Trimaculatus. g. 577. 74.*  
*\*Trisignatus. g. 577. 75.*  
*\*Troglydytes. g. 577. 151.*  
*\*Tuber. g. 577. 52.*  
     *Typhæ. g. 577. 36.*  
*\*Uliginosus. g. 577. 80.*  
*\*Umbellæ. g. 577. 51.*  
*\*Uniformis. g. 577. 160.*  
*\*Uniguttatus. g. 577. 154.*  
*\*Ureus. g. 577. 152.*  
*\*Uroteucus. g. 577. 72.*  
*\*Urticæ. g. 577. 81.*  
*\*Validirostris. g. 577. 153.*  
*\*Variegatus. g. 577. 50.*  
*\*Verrucatus. g. 577. 111.*  
*\*Viduatus. g. 577. 61.*  
*\*Vilis. g. 577. 161.*  
*\*Virgatus. g. 577. 157.*  
     *Viridanus. g. 577. 140.*  
*\*Waltoni. g. 577. 126.*  
*\*Zimmermannii. g. 577. 34.*

**CHÆTECTETORUS. g. 526.**

- \*Bifasciatus. g. 526. 1.*  
*\*Setosus. g. 526. 2.*

**\*CHALCODERMUS. g. 552.**

- \*Æneus. g. 552. 11.*  
*\*Angulicollis. g. 552. 12.*  
*\*Armipes. g. 552. 2.*  
*\*Calidus. g. 552. 1.*  
*\*Ebeninus. g. 552. 14.*  
*\*Longirostris. g. 552. 4.*  
*\*Metallinus. g. 552. 13.*  
     *Nigroæneus. g. 552. 12.*  
*\*Plicaticollis. g. 552. 6.*  
*\*Pruinosus. g. 552. 3.*

- \*Roricatus. g. 552. 7.*  
*\*Rubronotatus. g. 552. 10.*  
*\*Serripes. g. 552. 8.*  
*\*Spinifer. g. 552. 9.*  
*\*Tombacinus. g. 552. 5.*

**CHLOROPHANUS.**

*Acutus. Mant. g. 279-280. 1.*

**\*CHOLIDES. Subdivisio I.**  
(Divisio II.)

**\*CHOLUS. gen. 451.**

- \*Albicinctus. g. 451. 3*  
*\*Annulatus. g. 451. 19. 20. var. z.*  
*\*Atropunctellus. g. 451. 30.*  
*\*Basalis. g. 451. 11.*  
*\*Besckei. g. 451. 31.*  
*\*Boisduvali. g. 451. 23.*  
*\*Cinctus. g. 451. 2.*  
*\*Dealbatus. g. 451. 15.*  
*\*Faldermanni. g. 451. 21.*  
*\*Flavescens. g. 451. 26.*  
*\*Flavofasciatus. g. 451. 17.*  
*\*Geometricus. g. 451. 1.*  
*\*Gladiator. g. 451. 16.*  
*\*Guerini. g. 451. 24.*  
*\*Inornatus. g. 451. 10.*  
*\*Kunzei. g. 451. 22.*  
*\*Languidus. g. 451. 25.*  
*\*Lateralis. g. 451. 12.*  
*\*Laticollis. g. 451. 9.*  
*\*Lepidotus. g. 451. 32.*  
*\*Miliaris. g. 451. 5.*  
*\*Niveopunctatus. g. 451. 8.*  
*\*Nyblæi. g. 451. 21.*  
*\*Parcus. g. 451. 7.*  
*\*Pistor. g. 451. 29.*  
     *Quadrisingnatus. g. 454. 1.*  
*\*Rana. g. 451. 28.*  
*\*Rhomboidalis. g. 451. 4.*  
*\*Silaceoguttatus. g. 451. 18.*  
*\*Squamosus. g. 451. 33.*  
*\*Sulphuratus. g. 451. 37.*  
*\*Tetricus. g. 451. 13.*  
*\*Undulatus. g. 451. 6.*  
*\*Urbanus. g. 451. 14.*

## \* CIONIDES. Div. IV.

\* CIONUS. *g.* 586.

- \* Albidus. *g.* 586. 17.
- \* Angulicollis. *g.* 586. 18.
- \* Blattariæ. *g.* 586. 11.
- \* Clairvillei. *g.* 586. 8.
- \* Decorus. *g.* 586. 20.
- \* Fraxini. *g.* 586. 23.
- \* Gebleri. *g.* 586. 7.
- \* Histrio. *g.* 586. 22.
- \* Hortulanus. *g.* 586. 6.
- \* Luctuosus. *g.* 586. 13.
- \* Meticulosus. *g.* 586. 15.
- \* Mixtus. *g.* 586. 26.
- Mœstus. g.* 577. 156.
- \* Notatus. *g.* 586. 16.
- \* Nubilosus. *g.* 586. 21.
- \* Olens. *g.* 586. 10.
- \* Olivieri. *g.* 586. 3.
- Pallidus. g.* 589. 14.
- \* Pulchellus. *g.* 586. 24.
- \* Pulvereus. *g.* 586. 12.
- \* Scrophulariæ. *g.* 586. 1.
- \* Simplex. *g.* 586. 9.
- \* Solani. *g.* 586. 25.
- \* Thapsus. *g.* 586. 4.
- \* Trinotatus. *g.* 586. 27.
- \* Tristis. *g.* 586. 14.
- \* Ungulatus. *g.* 586. 5.
- \* Verbasci. *g.* 586. 2.
- \* Virgatus. *g.* 586. 19.

## \* CLEONUS.

- \* Fascicularis. *Mant. g.* 211. 86.
- \* Ibex. *Mant. g.* 211. 10-11.
- \* Salebroscicollis. *var. β. Mant. g.* 211. 141.
- \* Samsonovii. *Mant. g.* 211. 6-7.
- \* Tabidus. *var. β. Mant. g.* 211. 51.

\* CLEOGONUS. *g.* 572.

- \* Conicollis. *g.* 572. 2.
- Cribrarius. g.* 533. 7.
- Notatus. g.* 533. 2.
- \* Nucula. *g.* 572. 3.

- \* Rubetra. *g.* 572. 1.
- \* Rubricollis. *g.* 572. 5.
- \* Trochilus. *g.* 572. 4.
- Viduus. g.* 533. 2.

\* CNEMARGUS. *g.* 516.

- \* Chamæleon. *g.* 516. 1.

\* CNEMECOELUS. *g.* 534.

- \* Puncticollis. *g.* 534. 1.

\* COELIODES. *g.* 536.

- \* Acephalus. *g.* 536. 10.
- Affinis. g.* 577. 123.
- \* Asperatus. *g.* 536. 31.
- \* Canaliculatus. *g.* 536. 16.
- \* Celastri. *g.* 536. 19.
- \* Cristatus. *g.* 536. 17.
- \* Curtus. *g.* 536. 7.
- \* Didymus. *g.* 536. 25.
- \* Echinatus. *g.* 536. 32.
- \* Epilobii. *g.* 536. 8.
- \* Fallax. *g.* 536. 29.
- \* Flavicaudis. *g.* 536. 24.
- \* Fuliginosus. *g.* 536. 14.
- \* Ganglionus. *g.* 536. 6.
- \* Geranii. *g.* 536. 28.
- \* Granulicollis. *g.* 536. 34.
- \* Guttula. *g.* 536. 13.
- \* Hæmorrhoidalis. *g.* 536. 33.
- \* Lamii. *g.* 536. 26.
- \* Leprosus. *g.* 536. 11.
- \* Mannerheimi. *g.* 536. 21.
- \* Punctulum. *g.* 536. 27.
- \* Quercus. *g.* 536. 1.
- \* Quinquetuberculatus. *g.* 536. 20.
- \* Riguus. *g.* 536. 12.
- \* Rubicundus. *g.* 536. 4.
- \* Rubricus. *g.* 536. 3.
- Ruficornis. g.* 536. 14.
- Rufirostris. g.* 536. 2. *var. β.*
- \* Schüppeli. *g.* 536. 22.
- \* Serietuberculatus. *g.* 536. 18.
- \* Subrufus. *g.* 536. 23.
- \* Subulirostris. *g.* 536. 9.
- \* Umbraculus. *g.* 536. 5.



\* *Umbrinus. g. 536. 15.*

\* *COELOGASTER. g. 579.*

\* *Zimmermanni. g. 579. 1.*

\* *COELOSTERNUS. g. 520.*

\* *Alternans. g. 520. 30.*

\* *Amitinus. g. 520. 21.*

*Anxius. g. 560. 1.*

\* *Aspericollis. g. 520. 23.*

\* *Aspernabilis. g. 520. 43.*

\* *Aspis. g. 520. 26.*

\* *Atropos. g. 520. 16.*

\* *Audax. g. 520. 27.*

\* *Biangularis. g. 520. 37.*

\* *Carinatus. g. 520. 11.*

\* *Cinereus. g. 520. 38.*

\* *Compennis. g. 520. 1.*

\* *Conspicuus. g. 520. 5.*

*Consputus. g. 520. 18.*

\* *Costellus. g. 520. 19.*

\* *Cristatus. g. 520. 7.*

\* *Curtus. g. 520. 13.*

\* *Cylindricornis. g. 520. 6.*

\* *Delumbis. g. 520. 32.*

*Dentipes. g. 521. 2.*

\* *Dorsalis. g. 520. 22.*

\* *Ellipticus. g. 520. 42.*

\* *Exornatus. g. 520. 24.*

\* *Flavescens. g. 520. 33.*

\* *Glabrirostris. g. 520. 20.*

\* *Guadulpensis. g. 520. 12.*

\* *Hæmorrhoes. g. 520. 36.*

\* *Humerifer. g. 520. 46.*

*Joculatorius. g. 522. 2.*

*Inæqualis. g. 560. 2.*

\* *Longipennis. g. 520. 44.*

\* *Longiusculus. g. 520. 34.*

\* *Loripes. g. 520. 3.*

\* *Maculipes. g. 520. 8.*

\* *Nubilosus. g. 520. 40.*

\* *Occatus. g. 520. 9.*

\* *Oscitans. g. 520. 31.*

\* *Phœnicurus. g. 520. 29.*

\* *Picus. g. 520. 17.*

\* *Polycoccus. g. 520. 45.*

\* *Pullatus. g. 520. 14.*

*Raptorius. g. 520. 2.*

\* *Rudis. g. 520. 4.*

\* *Rugicollis. g. 520. 28.*

\* *Scrobicollis. g. 520. 39.*

\* *Sentus. g. 520. 25.*

\* *Signatus. g. 520. 41.*

\* *Solentus. g. 520. 2.*

*Subundatus. g. 514. 6.*

*Sulcatulus. g. 520. 35.*

\* *Sulcatus. g. 520. 35.*

\* *Tardipes. g. 520. 15.*

\* *Tessellatus. g. 520. 10.*

\* *COLECERUS.*

\* *Variegatus. Mant. g. 138. 2.*

\* *COLLABISMUS. g. 537.*

\* *Clitellæ. g. 537. 1.*

\* *Cluniferus. g. 537. 5.*

\* *Notulatus. g. 537. 3.*

\* *Sellatus. g. 537. 2.*

\* *Subnotatus. g. 537. 4.*

*COLOBODES.*

*Billbergi. g. 561. 7.*

\* *COLOMERUS. g. 503.*

\* *Ebeninus. g. 503. 2.*

\* *Lugubris. g. 503. 1.*

\* *CONOCEPHALUS. g. 604.*

\* *Guerini. g. 604. 3.*

\* *Gyllenhalii. g. 604. 1.*

\* *Limbatus. g. 604. 2.*

\* *CONOPHORIDES. Divisio III.*

\* *CONOPHORUS. g. 585.*

\* *Albidus. g. 585. 1.*

\* *CONOTRACHELUS. g. 553.*

\* *Abdominalis. g. 553. 72.*

\* *Abruptecostatus. g. 553. 69.*

\* *Acutecostatus. g. 553. 15.*

\* *Affinīs. g. 553. 41.*

\* *Alatus. g. 553. 91.*

\* *Amabilis. g. 553. 58.*

\* *Anaglypticus. g. 553. 43.*

\* *Apicalis. g. 553. 101.*

\* *Aratus. g. 553. 34.*

- \* *Argula. g. 553. 26.*
- \* *Bicristatus. g. 553. 99.*
- \* *Bidentatus. g. 553. 71.*
- \* *Bifasciculatus. g. 553. 67.*
- \* *Brevis. g. 553. 82.*
- \* *Carinicollis. g. 553. 65.*
- \* *Cinctipes. g. 553. 50.*
- \* *Cœlebs. g. 553. 36.*
- \* *Coluber. g. 553. 105.*
- \* *Concentrinus. g. 553. 104.*
- \* *Confinis. g. 553. 42.*
- \* *Corallifer. g. 553. 62.*
- \* *Costalis. g. 553. 89.*
- \* *Costiferus. g. 553. 97.*
- \* *Costirostris. g. 553. 18.*
- \* *Cribricollis. g. 553. 85.*
- \* *Cristatus. g. 553. 73.*
- \* *Curvirostris. g. 553. 20.*
- \* *Degluptus. g. 553. 75.*
- \* *Demens. g. 553. 52.*
- \* *Dentiferus. g. 553. 60.*
- \* *Deustus. g. 553. 54.*
- \* *Diaconitus. g. 553. 5.*
- \* *Difficilis. g. 553. 64.*
- \* *Distinctus. g. 553. 17.*
- \* *Elegans. g. 553. 40.*
- \* *Elevatus. g. 553. 37.*
- \* *Fasciatus. g. 553. 6.*
- \* *Filirostris. g. 553. 2.*
- \* *Funestus. g. 553. 14.*
- \* *Gemellatus. g. 553. 100.*
- \* *Grammicollis. g. 553. 46.*
- \* *Hopei. g. 553. 27.*
- \* *Horrens. g. 553. 80.*
- \* *Humeralis. g. 553. 31.*
- \* *Humerosus. g. 553. 47.*
- \* *Inconcinus. g. 553. 35.*
- \* *Infector. g. 553. 84.*
- \* *Intermedius. g. 553. 28.*
- \* *Intricatus. g. 553. 56.*
- \* *Lassatus. g. 553. 51.*
- \* *Lassulus. g. 553. 32.*
- \* *Lautus. g. 553. 30.*
- \* *Lemniscatus. g. 553. 83.*
- \* *Leucophæatus. g. 553. 39.*
- \* *Leucostictus. g. 553. 93.*
- \* *Loripes. g. 553. 66.*
- \* *Maceritiæ. g. 553. 21.*
- \* *Maculipes. Mant. g. 553. 68-69.*
- \* *Mamillatus. g. 553. 1.*
- \* *Mœstus. g. 553. 8.*
- \* *Mucidus. g. 553. 78.*
- \* *Multituberculatus. g. 553. 49.*
- \* *Murcius. g. 553. 9.*
- \* *Nigrita. g. 553. 12.*
- \* *Obliquus. g. 553. 61.*
- \* *Pavidus. g. 553. 4.*
- \* *Perdix. g. 553. 16.*
- \* *Petrosus. g. 553. 68.*
- \* *Pilosellus. g. 553. 87.*
- \* *Porcatirostris. g. 553. 102.*
- \* *Porculeti. g. 553. 11.*
- \* *Posticatus. g. 553. 22.*
- \* *Præustus. g. 553. 57.*
- \* *Puncticollis. g. 553. 23.*
- \* *Quadrinotatus. g. 553. 29.*
- \* *Repens. g. 553. 63.*
- \* *Retensus. g. 553. 59.*
- \* *Rhinoceros. g. 553. 82.*
- \* *Rubicundulus. g. 553. 86.*
- \* *Rubiginosus. g. 553. 48.*
- \* *Rufirostris. g. 553. 74.*
- \* *Rugicollis. g. 553. 70.*
- \* *Saxosus. g. 553. 79.*
- \* *Scapularis. g. 553. 44.*
- \* *Scirrhusus. g. 553. 77.*
- \* *Scopulosus. g. 553. 7.*
- \* *Semicostatus. g. 553. 34.*
- \* *Serpentinus. g. 553. 55.*
- \* *Setosus. g. 553. 95.*
- \* *Similis. g. 553. 38.*
- \* *Sobrinus. g. 553. 98.*
- \* *Spectabilis. g. 553. 10.*
- \* *Squalidus. g. 553. 24.*
- \* *Stigmaticollis. g. 553. 53.*
- \* *Subabruptus. g. 553. 103.*
- \* *Subfasciatus. g. 553. 25.*
- \* *Subtilis. g. 553. 19.*
- \* *Sylvius. g. 553. 88.*
- \* *Tagax. g. 553. 90.*
- \* *Tenuirostris. g. 553. 3.*
- \* *Tomentosus. g. 553. 23.*
- \* *Torosus. g. 553. 81.*

- \* *Tricostatus*. *g.* 553. 13.
- \* *Trigonus*. *g.* 553. 45.
- \* *Verticalis*. *g.* 553. 96.
- \* *Vesculus*. *g.* 553. 76.

\* *COPTURUS*. *g.* 565.

- \* *Affaber*. *g.* 565. 32.
- \* *Armatus*. *g.* 565. 7.
- Auritus*. *g.* 565. 25.
- \* *Avicularis*. *g.* 565. 28.
- \* *Besckei*. *g.* 565. 16.
- \* *Carinatus*. *g.* 565. 31.
- \* *Concinnus*. *g.* 565. 10.
- \* *Condecoratus*. *g.* 565. 6.
- \* *Confinis*. *g.* 565. 22.
- \* *Costatus*. *g.* 565. 30.
- \* *Deplanus*. *g.* 565. 2.
- \* *Figuratus*. *g.* 565. 5.
- \* *Furfuraceus*. *g.* 565. 9.
- \* *Guttula-alba*. *g.* 565. 19.
- \* *Infirmus*. *g.* 565. 25.
- \* *Lamella*. *g.* 565. 27.
- \* *Laterensis*. *g.* 565. 8.
- \* *Lebasii*. *g.* 565. 24.
- \* *Ludiosus*. *g.* 565. 11.
- \* *Maculatus*. *g.* 565. 12.
- \* *Megerlei*. *g.* 565. 13.
- \* *Oculatus*. *g.* 565. 37.
- \* *Operculatus*. *g.* 565. 35.
- \* *Papaveratus*. *g.* 565. 3.
- \* *Perturbatus*. *g.* 565. 18.
- \* *Pipa*. *g.* 565. 29.
- \* *Quercus*. *g.* 565. 36.
- \* *Regalis*. *Mant.* *g.* 565. 17-18.
- \* *Rorulentus*. *g.* 565. 20.
- \* *Roseosignatus*. *g.* 565. 15.
- \* *Rubicollis*. *g.* 565. 14.
- \* *Sannio*. *g.* 565. 17.
- \* *Satyrus*. *g.* 565. 4.
- Senilis*. *g.* 565. 25.
- \* *Solieri*. *g.* 565. 34.
- \* *Subulipennis*. *g.* 565. 1.
- \* *Subundatus*. *g.* 565. 20.
- \* *Troglodytes*. *g.* 565. 26.
- \* *Ulula*. *g.* 565. 33.
- \* *Vestitus*. *g.* 565. 21.

\* *CORYNEPHORUS*. *g.* 522.

- \* *Joculatorius*. *g.* 522. 2.
  - \* *V-nigrum*. *g.* 522. 1.
- \* *CORRYSOPUS*. *g.* 529.
- \* *Hexasticus*. *g.* 529. 1.
- \* *COSSONIDES*. *Divisio* III.
- \* *COSSONUS*. *g.* 621.
- \* *Abscissus*. *g.* 621. 49.
  - \* *Affaber*. *g.* 621. 52.
  - \* *Africanus*. *g.* 621. 44.
  - \* *Ambiguus*. *g.* 621. 23.
  - Attenuatus*. *g.* 625. 1.
  - Calandroides*. *g.* 623. 2.
  - \* *Canaliculatus*. *g.* 621. 34.
  - \* *Castaneipennis*. *g.* 621. 16.
  - \* *Concinnus*. *g.* 621. 13.
  - \* *Conicirostris*. *g.* 621. 55.
  - \* *Convexicollis*. *g.* 621. 27.
  - \* *Convexiusculus*. *g.* 621. 14.
  - \* *Corticalis*. *g.* 621. 21.
  - \* *Corticola*. *g.* 621. 12.
  - \* *Cubæ*. *g.* 621. 54.
  - \* *Cylindricus*. *g.* 621. 4.
  - \* *Deceptor*. *g.* 621. 42.
  - \* *Deplanatus*. *g.* 621. 19.
  - \* *Depressicollis*. *g.* 621. 11.
  - \* *Depressus*. *g.* 621. 53.
  - \* *Elongatus*. *g.* 621. 33.
  - \* *Ephippiger*. *g.* 621. 15.
  - \* *Exaratus*. *g.* 621. 28.
  - \* *Ferrugineus*. *g.* 621. 2.
  - \* *Fossatus*. *g.* 621. 31.
  - \* *Foveatus*. *g.* 621. 37.
  - \* *Glabricollis*. *g.* 621. 46.
  - \* *Guildingii*. *g.* 621. 25.
  - \* *Impressifrons*. *a.* 621. 8.
  - \* *Impressus*. *g.* 621. 30.
  - \* *Latithorax*. *g.* 621. 36.
  - \* *Latus*. *g.* 621. 51.
  - \* *Lebasii*. *g.* 621. 40.
  - \* *Ligniperdus*. *g.* 621. 39.
  - \* *Linearis*. *g.* 621. 1.
  - \* *Marginalis*. *g.* 621. 32.
  - \* *Multiforus*. *g.* 621. 7.

- \*Perfidiosus. *g.* 621. 26.  
 \*Piniphilus. *g.* 621. 9.  
 \*Platalea. *g.* 621. 3.  
 \*Politus. *g.* 621. 47.  
 \*Puncticollis. *g.* 621. 10.  
 \*Punctifrons. *g.* 621. 38.  
 \*Pyrostris. *g.* 621. 24.  
 \*Rufus. *g.* 621. 17.  
 \*Scrobiculatostratus. *g.* 621. 22.  
 \*Semirufus. *g.* 621. 18.  
 \*Spathula. *g.* 621. 48.  
 \*Squama. *g.* 621. 35.  
 \*Subarcatus. *g.* 621. 5.  
 \*Subcostatus. *g.* 621. 29.  
 \*Sulcirostris. *g.* 621. 20.  
 \*Suturalis. *g.* 621. 45.  
   Tardi. *g.* 623. 1.  
 \*Tenellus. *g.* 621. 56.  
 \*Thoracicus. *g.* 621. 43.  
 \*Torridus. *g.* 621. 50.  
 \*Vulneratus. *g.* 621. 41.  
 \*Xylophilus. *g.* 621. 6.  
   \*CRASPEDOTUS. *g.* 475.  
 \*Pullus. *g.* 475. 1.  
   \*CRATOPARIS.  
 \*Ceroderes. *Mant. g.* 28. 11-12.  
 \*Figuratus. *Mant. g.* 28. 20.  
   \*CRATOSOMUS. *g.* 506.  
 \*Auritus. *g.* 506. 16.  
 \*Bispinosus. *g.* 506. 28.  
 \*Bombina. *g.* 506. 42.  
 \*Bos. *g.* 506. 12.  
 \*Cornutus. *g.* 506. 15.  
 \*Delirus. *g.* 506. 8.  
 \*Dentatus. *g.* 506. 25.  
 \*Dubius. *g.* 506. 34.  
 \*Dumosus. *g.* 506. 24.  
 \*Echinatus. *g.* 506. 33.  
 \*Exsculptus. *g.* 506. 31.  
 \*Fabricii. *g.* 506. 20.  
 \*Germari. *Mant. g.* 506. 41-42.  
 \*Gyllenhalii. *g.* 506. 13.  
 \*Impluviatus. *g.* 506. 3.  
 \*Kirbyi. *g.* 506. 41.  
 \*Lacrimans. *g.* 506. 26.  
 \*Lentiginosus. *g.* 506. 11.  
 \*Lucifugus. *g.* 506. 37.  
 \*Maleficus. *g.* 506. 29.  
   Mannerheimi. *g.* 506. 14.  
 \*Melancholicus. *g.* 506. 9.  
 \*Multipunctatus. *g.* 506. 7.  
 \*Nodieri. *g.* 506. 6.  
   Pardalinus. *g.* 506. 2.  
 \*Pastillarius. *g.* 506. 35.  
   Phaleratus. *g.* 506. 39.  
   Pollinosus. *g.* 506. 11.  
 \*Porriginosus. *g.* 506. 14.  
 \*Pterygomalis. *g.* 506. 39.  
 \*Punctulatus. *g.* 506. 5, et 5.  
   *var. γ.*  
 \*Roddami. *g.* 506. 10.  
 \*Reidi. *g.* 506. 2.  
 \*Scaber. *g.* 506. 22.  
 \*Scabricollis. *g.* 506. 36.  
 \*Schoenherri. *g.* 506. 23.  
   *g.* 506. 41-42.  
 \*Scorpio. *g.* 506. 18.  
 \*Stellio. *g.* 506. 27.  
 \*Sticticus. *g.* 506. 4.  
 \*Subangulatus. *g.* 506. 32.  
   Superbus. *g.* 506. 1.  
 \*Taurus. *g.* 506. 19.  
   Tuberculatus. *g.* 506. 38.  
 \*Undibundus. *g.* 506. 38.  
 \*Vaginalis. *g.* 506. 21.  
 \*Varicolor. *g.* 506. 17.  
 \*Vespertilius. *g.* 506. 30.  
   \*CREPIDOTUS. *g.* 611.  
 \*Audouini. *g.* 611. 1.  
 \*Variolosus. *g.* 611. 2.  
 \*CRYPTORHYNCHIDES. Sub-  
   divisio II. (Divisio II.)  
 \*CRYPTORHYNCHUS. Gen.  
   511.  
 \*Affaber. *g.* 511. 38.  
 \*Albifrons. *g.* 511. 83.  
 \*Albipes. *g.* 511. 75.

- \* *Albocaudatus*. *g.* 511. 31.  
 \* *Amictus*. *g.* 511. 63.  
*Amœnus*. *g.* 511. 71. *var.*  $\beta$ .  
 \* *Ampliocollis*. *g.* 511. 93.  
 \* *Anceps*. *g.* 511. 33.  
*Antiquus*. *g.* 547. 2.  
 \* *Apicalis*. *g.* 584-585. 10.  
 \* *Apicatus*. *g.* 511. 108.  
 \* *Apiculatus*. *g.* 511. 100.  
*Aratus*. *g.* 553. 34.  
 \* *Armipes*. *g.* 511. 79.  
 \* *Asper*. *g.* 511. 109.  
 \* *Aspericollis*. *g.* 511. 158.  
 \* *Atropos*. *g.* 511. 117.  
 \* *Austerus*. *g.* 511. 64.  
 \* *Australis*. *g.* 584-585. 8.  
 \* *Aversandus*. *g.* 511. 74.  
 \* *Balteatus*. *g.* 511. 122.  
*Biangularis*. *g.* 520. 37.  
 \* *Binotatus*. *g.* 511. 37.  
 \* *Bistrigirostris*. *g.* 511. 23.  
 \* *Bohemani*. *g.* 511. 5.  
 \* *Bonsdorffi*. *g.* 511. 6.  
 \* *Brevis*. *g.* 511. 82.  
 \* *Calcaratus*. *g.* 511. 65.  
 \* *Carinellus*. *g.* 511. 128.  
 \* *Carosus*. *g.* 584-585. 7.  
 \* *Castigatus*. *g.* 511. 129.  
 \* *Caudex*. *g.* 511. 47.  
 \* *Cavernosus*. *g.* 511. 27.  
 \* *Cinctellus*. *g.* 511. 160.  
 \* *Cingulum*. *g.* 511. 155.  
 \* *Circulus*. *g.* 511. 9.  
 \* *Clitellarius*. *g.* 511. 37.  
 \* *Cœcus*. *g.* 511. 80.  
 \* *Conicollis*. *g.* 511. 111.  
*Conifer*. *g.* 547. 1.  
*Cordifer*. *g.* 511. 17.  
 \* *Corticalis*. *g.* 511. 70.  
 \* *Consobrinus*. *g.* 511. 58.  
 \* *Cristatus*. *g.* 511. 110.  
*Crudus*. *g.* 520. 42.  
 \* *Cubæ*. *g.* 511. 123.  
 \* *Cucullatus*. *g.* 511. 81.  
 \* *Cylindraceus*. *g.* 511. 116.  
 \* *Cynicus*. *g.* 511. 44.  
 \* *Definitus*. *g.* 511. 19.  
*Degluptus*. *g.* 553. 75.  
 \* *Delirus*. *g.* 511. 3.  
 \* *Delumbatus*. *g.* 511. 140.  
 \* *Difficilis*. *g.* 511. 147.  
 \* *Dimidiatus*. *g.* 511. 141.  
 \* *Discicollis*. *g.* 511. 88.  
 \* *Divergens*. *g.* 511. 132.  
 \* *Diversus*. *g.* 511. 131.  
 \* *Doisalis*. *g.* 511. 85.  
 \* *Duplicatus*. *g.* 511. 77.  
*Echinatus*. *g.* 543. 31.  
*Ellicitus*. *g.* 520. 42.  
 \* *Ephippiatus*. *g.* 543. 13.  
 \* *Ephippiger*. *g.* 584-585. 6.  
 \* *Erinaceus*. *g.* 511. 35.  
 \* *Fasciculifer*. *g.* 511. 103.  
 \* *Fasciculosus*. *g.* 511. 36.  
 \* *Ferratus*. *g.* 511. 130.  
 \* *Fictus*. *g.* 511. 4.  
*Flavescens*. *g.* 520. 33.  
 \* *Flavoscutellatus*. *g.* 511. 34.  
 \* *Foveatus*. *g.* 511. 54.  
 \* *Foveolatus*. *g.* 511. 124.  
 \* *Frigidus*. *g.* 511. 94.  
 \* *Frontalis*. *g.* 511. 98.  
 \* *Funebri*. *g.* 511. 16.  
 \* *Gauspatus*. *g.* 511. 62.  
 \* *Gelasimus*. *g.* 511. 22.  
 \* *Geminatus*. *g.* 511. 127.  
 \* *Geminus*. *g.* 511. 159.  
*Germari*. *g.* 507. 1.  
 \* *Granosus*. *g.* 511. 142.  
 \* *Guadulpensis*. *g.* 511. 150.  
 \* *Guttifer*. *g.* 511. 49.  
 \* *Hispidus*. *g.* 511. 133.  
 \* *Histioides*. *g.* 511: 78. et *g.* 556. 1.  
*Hæmorrhoeus*. *g.* 511. 36.  
 \* *Horridus*. *g.* 511. 104.  
 \* *Humeralis*. *g.* 511. 52.  
 \* *Illex*. *g.* 511. 96.  
 \* *Illotus*. *g.* 511. 40.  
 \* *Impexus*. *g.* 511. 48.  
 \* *Impuratus*. *g.* 511. 55.  
 \* *Indecorus*. *g.* 511. 107.  
 \* *Ineptus*. *g.* 511. 59.  
 \* *Infarctus*. *g.* 511. 26.  
 \* *Informis*. *g.* 542. 2.

- \*Inglorius. *g.* 511. 45.  
 \*Insanius. *g.* 511. 18.  
 \*Insularis. *g.* 511. 60.  
 \*Kunzei. *g.* 511. 146.  
 \*Lapathi. *g.* 511. 29.  
   Lateralis. *g.* 540. 6.  
 \*Lemniscatus. *g.* 511. 11.  
   Lemur. *g.* 543. 22.  
 \*Lepidotus. *g.* 511. 53.  
 \*Leucocephalus. *g.* 511. 84.  
 \*Leucomelas. *g.* 511. 145.  
 \*Levipidus. *g.* 511. 61.  
   Lineatocollis. *g.* 551. 5.  
 \*Liratus. *g.* 511. 68.  
 \*Lirinus. *g.* 511. 12.  
 \*Lithodermus. *g.* 584-585. 5.  
 \*Luctuosus. *g.* 511. 137.  
 \*Mangiferæ. *g.* 511. 51.  
 \*Miniatus. *g.* 511. 89.  
   Misellus. *g.* 511. 137. var.  $\beta$ .  
 \*Mæstus. *g.* 511. 32.  
 \*Monachus. *g.* 518. 1.  
 \*Morio. *g.* 511. 21.  
 \*Muriceus. *g.* 511. 135.  
 \*Mutabilis. *g.* 511. 2.  
 \*Nebulosus. *g.* 511. 76.  
 \*Niveifrons. *g.* 511. 152.  
 \*Nubifer. *g.* 511. 39.  
 \*Nudirostris. *g.* 511. 113.  
 \*Obliquefasciatus. *g.* 511. 138.  
 \*Oblongus. *g.* 511. 43.  
 \*Ochraceus. *g.* 511. 43.  
 \*Ochroleucus. *g.* 511. 148.  
 \*Orthomasticus. *g.* 511. 156.  
 \*Otiosus. *g.* 511. 56.  
 \*Palpebra. *g.* 511. 121.  
 \*Pavefactus. *g.* 511. 101.  
 \*Perforatus. *g.* 511. 24.  
 \*Perinsignis. *g.* 511. 115.  
 \*Pertusus. *g.* 511. 118.  
 \*Pilosellus. *g.* 511. 125.  
 \*Plagiatus. *g.* 511. 87.  
 \*Plagifer. *g.* 511. 15.  
 \*Podagrosus. *g.* 511. 7.  
 \*Porifer. *g.* 511. 115.  
 \*Porosus. *g.* 511. 25.  
 \*Posticus. *g.* 511. 28.  
 \*Postularius. *g.* 511. 66.  
 \*Postumus. *g.* 511. 42.  
 \*Pudens. *g.* 511. 90.  
 \*Pumilus. *g.* 511. 91.  
 \*Pusio. *g.* 511. 10.  
 \*Quadrivittatus. *g.* 511. 71.  
 \*Querulus. *g.* 511. 69.  
 \*Ravus. *g.* 511. 136.  
 \*Reichel. *g.* 511. 1.  
 \*Retusus. *g.* 511. 105.  
   Rigidus. *g.* 511. 108.  
 \*Rotundicollis. *g.* 511. 82.  
   Rubetra. *g.* 543. 14.  
 \*Rudis. *g.* 511. 141.  
 \*Scapularis. *g.* 511. 57.  
 \*Sceleratus. *g.* 511. 20.  
   Semicostatus. *g.* 553. 33.  
 \*Septemtuberculatus. *g.* 511.  
   106.  
 \*Serijs. *g.* 511. 67.  
 \*Setiferus. *g.* 511. 134.  
 \*Setiger. *g.* 511. 139.  
 \*Sexlineatus. *g.* 511. 72.  
 \*Sextuberculatus. *g.* 511. 99.  
   Signatus. *g.* 520. 41.  
 \*Signifer. *g.* 511. 153.  
 \*Simulatus. *g.* 511. 143.  
   Soleatus. *g.* 520. 2.  
 \*Sordidulus. *g.* 511. 41.  
 \*Sparsipes. *g.* 511. 154.  
 \*Stigma. *g.* 511. 8.  
 \*Stipator. *g.* 511. 157.  
 \*Strangulatus. *g.* 511. 14.  
 \*Strictus. *g.* 511. 114.  
 \*Stultus. *g.* 511. 149.  
 \*Subnotatus. *g.* 511. 119.  
   Succosus. *g.* 547. 3.  
 \*Teter. *g.* 584-585. 9.  
 \*Tirunculus. *g.* 511. 30.  
 \*Torpescus. *g.* 511. 144.  
   Triangularis. *g.* 515. 10.  
 \*Tribulosus. *g.* 511. 102.  
 \*Turpiculus. *g.* 511. 73.  
 \*Umbrosus. *g.* 511. 95.  
 \*Unicolor. *g.* 511. 126.  
 \*Vacillatus. *g.* 511. 50.  
 \*Verruca. *g.* 511. 46.

\* *Vestitus*. *g.* 511. 120.

\* *Ypsilon*. *g.* 511. 86.

### CURCULIO.

*Abdominalis*. *g.* 474. 3.

\* *Acanthoides*. *Add.* n. 69.

\* *Acephalus*. *Add.* n. 166.

\* *Adpersus*. *Add.* n. 46.

*Ælothorax*. *Add.* n. 69.

\* *Africanus*. *Add.* n. 64.

\* *Alauda*. *Add.* n. 102.

*Albator*. *Add.* n. 48.

\* *Alneti*. *Add.* n. 202.

*Annulatus*. *g.* 451. 19.

\* *Annuliger*. *Add.* n. 124.

\* *Apterus*. *Add.* n. 205.

\* *Arboreti*. *Add.* n. 56.

\* *Armatus*. *Add.* n. 228.

*Artemisiæ*. *g.* 487. 90. 104.

\* *Arvensis*. *Add.* n. 102.

\* *Atomarius*. *Add.* n. 135. 129.

\* *Attelaboides*. *Add.* n. 57.

\* *Aurifer*. *Add.* n. 229.

\* *Austriacus*. *Add.* n. 205.

\* *Badensis*. *Add.* n. 1.

\* *Barbatus*. *Add.* n. 193.

\* *Bicolor*. *Add.* n. 103.

\* *Bicornis*. *Add.* n. 28.

*Bidens*. *Add.* n. 16.

*Biguttatus*. *Add.* n. 5.

*Bilineatus*. *Add.* n. 6.

\* *Bohemicus*. *Add.* n. 193.

\* *Bovinus*. *Add.* n. 226.

\* *Brevirostris*. *Add.* n. 197.

*Brunneus*. *Add.* n. 33.

\* *Brunnipes*. *Add.* n. 188.

\* *C-Album*. *Add.* n. 219.

\* *Calidus*. *Add.* n. 85.

\* *Calvus*. *Add.* n. 224.

\* *Carinatus*. *Add.* n. 144.

\* *Cariosus*. *Add.* n. 184. et n. 208.

*Carniolicus*. *Add.* n. 210.

\* *Centaureæ*. *Add.* n. 217.

*Chloris*. *g.* 487. 125.

\* *Chloroticus*. *Add.* n. 71.

\* *Chrysopterus*. *Add.* n. 209.

\* *Chrysostictus*. *Add.* n. 160.

\* *Cinereus*. *Add.* n. 143.

\* *Clavipes*. *Add.* n. 152.

\* *Clavatus*. *Add.* n. 185.

*Cnemerythrus*. *g.* 563. 25.

*Cœrulescens*. *g.* 487. 126.

\* *Comus*. *Add.* n. 95.

\* *Conspersus*. *Add.* n. 115.

*Convexus*. *g.* 968. 21.

\* *Coracinus*. *Add.* n. 149.

\* *Coronatus*. *Add.* n. 17.

\* *Corvinus*. *Add.* n. 189.

\* *Crassicornis*. *Add.* n. 75.

*Crassipes*. *Add.* n. 32.

\* *Crassirostris*. *Add.* n. 145.

*Crassus*. *g.* 5-8. 6.

\* *Crenulatus*. *Add.* n. 132.

\* *Cretura*. *Add.* n. 101.

\* *Crinitus*. *Add.* n. 137.

\* *Crobylus*. *Add.* n. 97.

*Cruciatius*. *Add.* n. 58.

*Curvirostris*. *Add.* n. 11.

\* *Cyaneus*. *Add.* n. 232.

*Danicus*. *Add.* n. 180.

\* *Danubialis*. *Add.* n. 201.

\* *Dentatus*. *Add.* n. 141.

\* *Denticornis*. *Add.* n. 54.

\* *Diadema*. *Add.* n. 42.

\* *Difformis*. *Add.* n. 78.

\* *Dispar*. *Add.* n. 40.

\* *Ducalis*. *Add.* n. 43.

*Elongatus*. *Add.* n. 34.

\* *Eremita*. *Add.* n. 106.

\* *Erraticus*. *Add.* n. 216.

\* *Erythropus*. *Add.* n. 131.

*Exclamationis*. *Add.* n. 14.

*Exesus*. *Add.* n. 184.

\* *Exoletus*. *Add.* n. 153.

\* *Exoticus*. *Add.* n. 127.

\* *Faber*. *Add.* n. 194.

*Fascialis*. *Add.* n. 119.

\* *Fasciatus*. *Add.* n. 174. \* n. 211.

\* *Flavescens*. *Add.* n. 38.

\* *Formicarius*. *Add.* n. 87.

\* *Foveolatus*. *Add.* n. 133.

\* *Fulgens*. *Add.* n. 65.

- Fuscus. Add. n. 122.*  
*Geoffroæi. Add. n. 200.*  
*Gibbus. g. 468. 21.*  
*\* Glabratus. Add. n. 134.*  
*\* Glaucinus. Add. n. 172.*  
*Glaucus. Add. n. 172.*  
*\* Globularis. Add. n. 72.*  
*\* Granulatus. Add. n. 80.*  
*\* Granulosus. Add. n. 157.*  
*Gravis. Add. n. 26.*  
*\* Grus. Add. n. 92.*  
*Guttatus. Add. n. 19.*  
*\* Hæmorrhoeus. Add. n. 161 et  
n. 27.*  
*Hæmorrhoidalis. Add. n. 27.*  
*\* Hæruatopus. Add. n. 138.*  
*\* Hornus. Add. n. 86.*  
*\* Hostilis. Add. n. 96.*  
*Humilis. Add. n. 200.*  
*Hystrix. g. 461. 11.*  
*\* Iberis. Add. n. 82.*  
*\* Incineratus. Add. n. 146.*  
*\* Iners. Add. n. 214.*  
*\* Infidus. Add. n. 218. \* n. 195.*  
*\* Infuscatus. Add. n. 151.*  
*\* Interruptus. Add. n. 41.*  
*\* Irrisus. Add. n. 98.*  
*\* Lanatus. Add. n. 43.*  
*\* Lathamii. Add. n. 191.*  
*\* Latirostris. Add. n. 177 et n. 73.*  
*\* Latro. Add. n. 203.*  
*\* Leprosus. Add. n. 77. \* n.  
158.*  
*Lignarius. g. 625. 20.*  
*\* Limosus. Add. n. 198.*  
*Lineola. Add. n. 30.*  
*\* Longicornis. Add. n. 175.*  
*\* Longimanus. Add. n. 233.*  
*\* Lutosus. Add. n. 156.*  
*\* Macellarius. Add. n. 88.*  
*\* Maculosus. Add. n. 178.*  
*\* Mandulus. Add. n. 94.*  
*\* Mannus. Add. n. 100.*  
*\* Marginellus. Add. n. 48.*  
*\* Maurus. Add. n. 171.*  
*Mendicus. Add. n. 3.*  
*\* Modestus. Add. n. 37 et \* n. 200.*
- \* Moratus. Add. n. 35.*  
*Murex. Add. n. 112.*  
*\* Muricatus. Add. n. 112 et \* n.  
142.*  
*\* Murinus. Add. n. 121.*  
*\* Nævius. Add. n. 148.*  
*\* Nemoreus. Add. n. 220.*  
*\* Nigellus. Add. n. 93.*  
*\* Nigrifrons. Add. n. 192.*  
*\* Nitidulus. Add. n. 200.*  
*\* Nomus. Add. n. 221.*  
*\* Normatus. Add. n. 94.*  
*\* Nubilus. Add. n. 154.*  
*\* Obtensus. g. 584-585. n. 4.*  
*\* Obtusus. Add. n. 231.*  
*\* Ocellatus. Add. n. 104.*  
*\* Olivieri. Add. n. 83.*  
*\* Opacus. Add. n. 176.*  
*Oryzæ. g. 618. 13.*  
*\* Pallidus. Add. n. 55.*  
*\* Parallelus. Add. n. 230.*  
*\* Pedestris. Add. n. 89.*  
*\* Pedicularius. Add. n. 84.*  
*\* Pericarpus. Add. n. 187.*  
*\* Perspicax. Add. n. 69.*  
*Picatus. Add. n. 215.*  
*\* Piceus. Add. n. 215.*  
*Picicornis. g. 487. 131.*  
*Pictus. g. 468. 30.*  
*\* Piger. Add. n. 213.*  
*\* Pilicornis. Add. n. 114.*  
*\* Pilifer. Add. n. 129.*  
*\* Pinguis. Add. n. 52.*  
*\* Piniperda. Add. n. 73.*  
*\* Piricola. Add. n. 105.*  
*\* Plebeius. Add. n. 227.*  
*\* Porcatus. Add. n. 162. — \* n.  
234.*  
*\* Porculus. Add. n. 139.*  
*\* Præcox. Add. n. 212.*  
*\* Psittacus. Add. n. 67.*  
*Ptinoides. g. 543. 29.*  
*\* Punctatus. Add. n. 180. — \* n.  
210.*  
*Punctulatus. Add. n. 4.*  
*\* Pupillator. Add. n. 21*  
*Pupillatus. Add. n. 21.*



- Pyricola. Add. n. 105.*  
*Pyrrorhynchus. g. 577. 41.*  
 \* *Quadrilis. Add. n. 118.*  
*Quadrillus. Add. n. 125.*  
*Quadripustulatus. Add. n. 29.*  
*Quercinus. Add. n. 209.*  
 \* *Quercus. Add. n. 209.*  
 \* *Resinosus. Add. n. 163.*  
 \* *Reticulatus. Add. n. 139. —*  
*g. 468. 7.*  
 \* *Rhei. Add. n. 81.*  
 \* *Robiniae. Add. n. 68.*  
 \* *Rosarum. Add. n. 107.*  
 \* *Rufimanus. Add. n. 165.*  
 \* *Rugatus. Add. n. 150.*  
 \* *Rugosus. Add. n. 136.*  
 \* *Sabulosus. Add. n. 70.*  
 \* *Salicinus. Add. n. 204.*  
 \* *Scalaris. Add. n. 113.*  
 \* *Scutellatus. Add. n. 122.*  
 \* *Segetis. Add. n. 186.*  
 \* *Senilis. Add. n. 225.*  
 \* *Sericeus. Add. n. 120.*  
 \* *Setosus. Add. n. 168.*  
 \* *Servus. Add. n. 36.*  
 \* *Silenus. Add. n. 66.*  
 \* *Spinifex. Add. n. 116.*  
*Spinipes. Add. n. 18.*  
*Squalidus. Add. n. 25.*  
 \* *Squamifer. Add. n. 181.*  
 \* *Stellifer. Add. n. 119.*  
 \* *Sticticus. Add. n. 47.*  
 \* *Striatirostris. Add. n. 164.*  
 \* *Striatus. Add. n. 44. — \* n.*  
*179 et n. 2.*  
 \* *Strigosus. Add. n. 167.*  
 \* *Strumosus. Add. n. 76.*  
*Stupidus. Add. n. 24.*  
 \* *Subclavatus. Add. n. 170.*  
 \* *Subfasciatus. Add. n. 140.*  
 \* *Subglobosus. Add. n. 169.*  
*Succinctus. Add. n. 48.*  
 \* *Sulcatus. Add. n. 117. — \* n.*  
*159. — \* n. 207.*  
 \* *Suturalis. Add. n. 130.*  
 \* *Tardus. Add. n. 173.*  
 \* *Tenebricosus. Add. n. 155.*
- Tessellatus. Add. n. 7.*  
*Tragiae. Add. n. 10.*  
 \* *Tricolor. Add. n. 223.*  
 \* *Tridens. Add. n. 53.*  
*Trifasciatus. Add. n. 20.*  
 \* *Trigidus. Add. n. 79.*  
*Trilineatus. Add. n. 179.*  
 \* *Tuberculatus. Add. n. 50. —*  
*\* n. 183.*  
*Typhæ. g. 577. 36.*  
 \* *Undatus. Add. n. 128.*  
 \* *Undulatus. Add. n. 91. — n.*  
*128.*  
 \* *Unifasciatus. Add. n. 13.*  
 \* *Vanellus. Add. n. 90.*  
*Varians. Add. n. 126.*  
*Varicosus. g. 506. 17.*  
 \* *Varius. Add. n. 126. — \* n.*  
*147.*  
 \* *Velox. Add. n. 45.*  
 \* *Verruca. Add. n. 51.*  
*Versicolor. Add. n. 103.*  
 \* *Viator. Add. n. 196.*  
*Villosulus. Add. n. 211.*  
*Villosus. Add. n. 120.*  
 \* *Virgo. Add. n. 123.*  
 \* *Viridipennis. Add. n. 190.*  
 \* *Vitulus. Add. n. 49.*  
 \* *Zoilus. Add. n. 222.*
- \* **CYAMOBOLUS. g. 514.**  
 \* *Charpentieri. g. 514. 4.*  
 \* *De Haanii. g. 514. 2.*  
 \* *Fallenii. g. 514. 1.*  
 \* *Marci. g. 514. 5.*  
 \* *Sturmi. g. 514. 3.*  
 \* *Subundatus. g. 514. 6.*  
 \* **CYLINDROCERUS. g. 493.**  
 \* *Axillaris. g. 493. 5.*  
 \* *Azureus. g. 493. 4.*  
 \* *Comma. g. 493. 1.*  
 \* *Crocopelmus. g. 493. 2.*  
 \* *Cyaneus. g. 493. 7.*  
*Flabellitarsis. g. 495. 1.*  
 \* *Imus. g. 493. 3.*  
*Maculatus. g. 494. 1.*  
 \* *Politus. g. 493. 8.*

- Signum. g. 493. 1.*  
 \* *Smaragdinus. g. 493. 6.*  
 \* **CYLINDROCORYNUS. g. 521.**  
 \* *Dentipes. g. 521. 2.*  
 \* *Imaginaris. g. 521. 1.*  
**CYPHORHYNCHUS.**  
*Rhinoceros. g. 553. 92.*  
*Scirrhusus. g. 553. 77.*  
*Singularis. g. 478. 1.*  
**CYRTOMON.**  
*Camelus. g. 505. 1.*  
 \* **CYRTOTRACHELUS. g. 601.**  
 \* *Dux. g. 601. 1.*  
 \* *Lar. g. 601. 3.*  
 \* *Longipes. g. 601. 2.*  
 \* *DACTYLOCREPIS. g. 495.*  
 \* *Flabellitarsis. g. 495. 1.*  
 \* **DERACANTHUS.**  
 \* *Mucidus. Mant. g. 122. 1-2.*  
 \* **DERELOMUS. g. 477.**  
 \* *Avicularis. g. 477. 10.*  
 \* *Chamæropis. g. 477. 1.*  
 \* *Costalis. g. 477. 4.*  
 \* *Ephippiger. g. 477. 5.*  
 \* *Languidus. g. 477. 3.*  
 \* *Pallidus. g. 477. 8.*  
 \* *Plagiatus. g. 477. 7.*  
 \* *Signatus. g. 477. 6.*  
 \* *Subcostatus. g. 477. 2.*  
 \* *Suturalis. g. 477. 9.*  
 \* **DEREODUS.**  
 \* *AlboscuteUatus. Mant. g. 159. 2.*  
 \* **DESMIDOPHORUS. g. 549.**  
 \* *Aureolus. g. 549. 3.*  
 \* *Cumingii. g. 549. 2.*  
 \* *Confucii. g. 549. 4.*  
 \* *Hebes. g. 549. 1.*  
 \* *Imhoffii. g. 549. 5.*  
 \* *Penicillatus. g. 549. 7.*  
 \* *Senex. g. 549. 6.*

**DESMOSOMUS.**

- Longipes. g. 453. 1.*  
 \* **DEUTEROCRATES. Mant. g. 14-15.**  
 \* *Nebulosus. Mant. g. 14-15. 1.*  
 \* **DIAPHANOPS. Mant. g. 3-4.**  
 \* *Westermanni. Mant. g. 3-4. n. 1.*  
 \* **DIONYCHUS. g. 455.**  
 \* *Alboguttatus. g. 455. 3.*  
 \* *Margineguttatus. g. 455. 4.*  
*Miliaris. g. 451. 5.*  
 \* *Mutabilis. g. 455. 6.*  
*Niveopunctatus. g. 451. 8.*  
*Hystrix. g. 461. 11.*  
 \* *Parallelogrammus. g. 455. 1.*  
*Sparsus. g. 451. 11.*  
 \* *Squamulosus. g. 455. 2.*  
*Undulatus. g. 451. 6.*  
 \* *Variabilis. g. 455. 5.*  
 \* **DIORYMERUS. g. 502.**  
*Altus. g. 502. 7. var. β.*  
 \* *Anceps. g. 502. 23.*  
 \* *Angulicollis. g. 502. 7.*  
 \* *Auritus. g. 502. 1.*  
 \* *Carbonarius. g. 502. 10.*  
 \* *Cardinatus. g. 502. 28.*  
 \* *Castaneus. g. 502. 15.*  
 \* *Dimidiatus. g. 502. 16.*  
 \* *Fallax. g. 502. 9.*  
*Fractipes. g. 490. 124.*  
 \* *Gibberosus. g. 502. 6.*  
 \* *Gibbicollis. g. 502. 3.*  
 \* *Glabricollis. g. 502. 20.*  
 \* *Granatus. g. 502. 13.*  
 \* *Granulifer. g. 502. 11.*  
 \* *Hypocrita. g. 502. 24.*  
 \* *Impunctatus. g. 502. 29.*  
 \* *Insolens. g. 502. 32.*  
 \* *Intermedius. g. 502. 21.*  
 \* *Lancifer. g. 502. 5.*  
 \* *Liratus. g. 502. 22.*

- \* *Melanomus*. *g.* 490. 105.  
 \* *Minutus*. *g.* 502. 19.  
 \* *Monoceros*. *g.* 502. 2.  
 \* *Pradierii*. *g.* 502. 4.  
 \* *Pulvinatus*. *g.* 502. 8.  
 \* *Pyropus*. *g.* 502. 14.  
 \* *Radius*. *g.* 502. 27.  
 \* *Repens*. *g.* 502. 25.  
 \* *Scutellifer*. *g.* 502. 17.  
 \* *Sicarius*. *g.* 502. 31.  
 \* *Substriatus*. *g.* 502. 30.  
 \* *Tibialis*. *g.* 502. 12.  
 \* *Troglodytes*. *g.* 502. 18.  
 \* *Vanus*. *g.* 502. 26.  
 \* **DRYOPHTHORIDES**. Div. IV.  
   \* **DRYOPHTHORUS**. *g.* 631.  
     \* *Bituberculatus*. *g.* 631. 3.  
     \* *Corticalis*. *g.* 631. 2.  
     \* *Excavatus*. *g.* 631. 4.  
     \* *Lymexylon*. *g.* 631. 1.  
   \* **ENTELES**. *g.* 517.  
     \* *Vigorsii*. *g.* 517. 1.  
   \* **EPIPEDORHINUS**. *g.* 509.  
     \* *Chevrolati*. *g.* 509. 1.  
   \* **EPIPHYLAX**. *g.* 592.  
     \* *Binodulus*. *g.* 592. 2.  
     \* *Ephippiger*. *g.* 592. 1.  
   \* **EPISOMUS**.  
     \* *Guttatus*. *Mant.* *g.* 291. 4-5.  
     \* **EPISUS**.  
     \* *Truncatus*. *Mant.* *g.* 91. 5-6.  
   \* **EREPSIMUS**. *Mant.* *g.* 138-139.  
   \* *Setiferus*. *Mant.* *g.* 138-139. 1.  
   \* **ERIRHINUS**.  
     \* *Nigrita*. *g.* 553. 12.  
     \* *Picipes*. *g.* 553. 13.  
   \* **EUDERES**. *g.* 558.  
   \* *Lineicollis*. *g.* 558. 1.  
   \* **EUERGES**. *g.* 481.  
   \* *Faldermanni*. *g.* 481. 1.

- \* **EUGNAMPTUS**.  
   \* *Flavinosus*. *Mant.* *g.* 48. 4.  
   \* **EUGNATHUS**.  
   \* *Squamifer*. *Mant.* *g.* 181. 1-2.  
   \* **EUGNORISTUS**. *g.* 608.  
   \* *Monachus*. *g.* 608. 1.  
   \* **EUMYCTERUS**. *g.* 628.  
   \* *Albosquamulatus*. *g.* 628. 1.  
   \* **EURHINUS**. *g.* 504.  
   \* *Æneus*. *g.* 504. 8.  
   \* *Auratus*. *g.* 504. 8.  
   \* *Auritus*. *g.* 504. 8.  
   \* *Cupratus*. *g.* 504. 2.  
   \* *Cyaneus*. *g.* 504. 1.  
   \* *Festivus*. *g.* 504. 4.  
   \* *Flatuarius*. *g.* 504. 6.  
   \* *Magnificus*. *g.* 504. 3.  
   \* *Thalassinus*. *g.* 504. 7.  
   \* *Viridis*. *g.* 504. 5.  
   \* **EURHYNCHUS**.  
   \* *Muricatus*. *Mant.* *g.* 56. 3.  
   \* **EUSCEPES**. *g.* 546.  
   \* *Porcellus*. *g.* 546. 1.  
   \* **EUTOXUS**. *g.* 484.  
   \* *Reflexus*. *g.* 484. 1.  
   \* **EUTHYRHINUS**. *g.* 518.  
   \* *Meditabundus*. *g.* 518. 1.  
   \* **GASTEROCERCUS**. *g.* 525.  
     \* *Albifrons*. *g.* 511. 152.  
     \* *Asper*. *g.* 525. 8.  
     \* *Bifasciatus*. *g.* 526. 1.  
     \* *Depressirostris*. *g.* 525. 1.  
     \* *Dubitabilis*. *g.* 525. 9.  
     \* *Horridus*. *g.* 525. 4.  
     \* *Lateralis*. *g.* 525. 11.  
     \* *Latirostris*. *g.* 525. 6.  
     \* *Melancholicus*. *g.* 525. 5.  
     \* *Petulans*. *g.* 525. 2.  
     \* *Plumipes*. *g.* 525. 12.  
     \* *Propugnator*. *g.* 525. 7.  
     \* *Scabrirostris*. *g.* 525. 3.

\*Semicircularis. *g.* 525. 13.  
Setosus. *g.* 526. 2.

\*Stratum. *g.* 525. 10.

\*GEOTRAGUS. *Mant. g.* 143-144.

\*Himalayanus. *Mant. g.* 143-144. 1.

### GORGUS.

Hoplites. *g.* 506. 26.

### GLYPHIDERES.

Variegatus. *g.* 574. 3.

### GUIOPERUS.

Griseus. *g.* 532. 1.

\*GYMNETRON. *g.* 587.

\*Amictus. *g.* 587. 32.

\*Antirrhini. *g.* 587. 26.

\*Asellus. *g.* 587. 21.

\*Beccabungæ. *g.* 587. 6.

\*Bicolor. *g.* 587. 2.

\*Bipartitus. *g.* 587. 10.

\*Caffer. *g.* 587. 14.

\*Campanulæ. *g.* 587. 46.

\*Collinus. *g.* 587. 28.

\*Comosus. *g.* 587. 20.

\*Concinnus. *g.* 587. 7.

\*Cylindrirostris. *g.* 587. 35.

\*Distinctus. *g.* 587. 47.

\*Eous. *g.* 587. 19.

\*Eversmanni. *g.* 587. 30.

\*Fuscescens. *g.* 587. 25.

\*Graminis. *g.* 587. 43.

\*Hirsutus. *g.* 87. 39.

\*Ictericus. *g.* 587. 8.

Intaminatus. *g.* 587. 12.

\*Labilis. *g.* 587. 9.

\*Linariæ. *g.* 587. 40.

\*Longirostris. *g.* 587. 41.

\*Melanarius. *g.* 587. 12.

\*Melas. *g.* 587. 3.

\*Micros. *g.* 587. 50.

\*Nasutus. *g.* 587. 22.

\*Netus. *g.* 587. 21.

\*Noctis. *g.* 587. 27.

\*Pascuorum. *g.* 587. 1.

Pelliceus. *g.* 587. 29.

\*Perparvulus. *g.* 587. 13.

\*Pilosus. *g.* 587. 31.

\*Plagiatus. *g.* 587. 23.

\*Plagiellus. *g.* 587. 24.

\*Plantarum. *g.* 587. 45.

\*Plebejus. *g.* 587. 44.

Polonicus. *g.* 587. 21.

\*Rostellum. *g.* 587. 11.

\*Rotundicollis. *g.* 587. 16.

\*Seriepilosus. *g.* 587. 49.

\*Signatus. *g.* 587. 17.

\*Spilotus. *g.* 587. 38.

\*Stimulosus. *g.* 587. 15.

\*Suturalis. *g.* 587. 42.

\*Teter. *g.* 587. 18.

\*Thapsicola. *g.* 587. 36.

\*Trigonalis. *g.* 587. 37.

\*Trivialis. *g.* 587. 48.

\*Verbasci. *g.* 587. 34.

\*Veronicæ. *g.* 587. 5.

\*Vestitus. *g.* 587. 33.

\*Villosulus. *g.* 587. 4.

### \*GYMNOGNATHUS.

\*Menetriesi. *Mant. g.* 24. 2-3.

### \*HADROMERUS.

\*Gemmifer. *Mant. g.* 175. 5-6.

### \*HAPLONYX. *g.* 466.

\*Fasciculatus. *g.* 466. 2.

\*Hopei. *g.* 466. 3.

\*Kirbyi. *g.* 466. 4.

\*Spencei. *g.* 466. 1.

### \*HARPACTERUS. *g.* 594.

\*Ebeninus. *g.* 594. 1.

\*Quadrisingnatus. *g.* 594. 2.

### \*HEILIPUS.

\*Lauri. *Mant. g.* 351. 95-96.

Roeseli. *g.* 550. 4.

\*Scrobiculatus. *Mant. g.* 351.

93-94.

### \*HETEROPUS. *g.* 549.

\*Africanus. *g.* 549. 1.

### \*HIPPORHINUS.

\*Wahlbergi. *Mant. g.* 101. 3-4.

- \* **HOMALOCERUS.**  
 \* *Acuminatus. Mant. g. 54. 3.*  
 \* **HOMALONOTUS. g. 461.**  
 \* *Colossus. g. 461. 9.*  
 \* *Conspergatus. g. 461. 5.*  
 \* *Coriaceus. g. 461. 10.*  
 \* *Cyanicollis. g. 461. 8.*  
 \* *Deplanatus. g. 461. 6.*  
 \* *Humeralis. g. 461. 3.*  
 \* *Hystrix. g. 461. 11.*  
 \* *Jamaicensis. g. 461. 1.*  
 \* *Platynotus. g. 461. 4.*  
 \* *Porosus. g. 461. 7.*  
*Squamulosus. g. 455. 2.*  
 \* *Validus. g. 461. 2.*  
 \* **HYLOBIUS.**  
 \* *Albisparsus. Mant. g. 250. 2-3.*  
 \* **ISCHNOCERUS.**  
 \* *Fasciculatus. Mant. g. 19. 3.*  
 \* *Mustellinus. Mant. g. 19. 1-2.*  
 \* **ISORHYNCHUS. g. 482.**  
 \* *Pudicus. g. 482. 1.*  
 \* **ITHYPORUS. g. 561.**  
 \* *Albescens. g. 561. 4.*  
 \* *Albosignum. g. 561. 10.*  
 \* *Billbergi. g. 561. 7.*  
 \* *Capensis. g. 561. 1.*  
 \* *Cerapterus. g. 561. 9.*  
 \* *Fasciatus. g. 561. 6.*  
 \* *Inquinatus. g. 561. 8.*  
 \* *Labrami. g. 561. 5.*  
 \* *Madagascariensis. g. 561. 3.*  
 \* *Odiosus. g. 561. 11.*  
 \* *Senegalensis. g. 561. 2.*  
 \* **LACHNOPUS.**  
 \* *Argus. g. 193. 3-4.*  
 \* **LÆMOSACCUS. g. 469.**  
 \* *Affaber. g. 469. 1.*  
 \* *Australis. g. 469. 9.*  
 \* *Chevolati. g. 469. 10.*  
 \* *Germari. g. 469. 3.*  
 \* *Plagiatus. g. 469. 6.*  
 \* *Pustulatus. g. 469. 7.*  
 \* *4-pustulatus. g. 469. 8.*  
 \* *Rufus. g. 469. 5.*
- \* *Subsignatus. g. 469. 4.*  
 \* *Trucidatus. g. 469. 2.*  
 \* **LALAGETES.**  
 \* *Setosus. Mant. g. 302. 1-2.*  
 \* *Variegatus. Mant. g. 302. 1-2.*  
 \* **LARINUS.**  
 \* *Hedenborgi. Mant. g. 348.*  
 13-14.  
*Ocelliger. g. 457. 1.*  
 \* **LECHRIOPS. g. 528.**  
 \* *Sciurus. g. 528. 1.*  
**LEIOMERUS.**  
*Glabrirostris. g. 520. 20.*  
 \* **LEMBODES. g. 548.**  
 \* *Solitarius. g. 548. 1.*  
 \* **LEPTOSCHOINUS. g. 494.**  
 \* *Maculatus. g. 494. 1.*  
 \* **LITOMERUS. g. 453.**  
 \* *Lineatus. g. 453. 1.*  
*Rana. g. 451. 28.*  
*Zonatus. g. 452. 1.*  
 \* **LITORHYNCHUS. g. 602.**  
 \* *Westermanni. g. 602. 1.*  
 \* **LITURGUS. g. 473.**  
 \* *Irrasus. g. 473. 1.*  
**LIXUS.**  
*Atriplicis. g. 487. 152.*  
 \* *Brunneus. Add. n. 33.*  
 \* *Callosus. Mant. g. 344. 178-179.*  
 \* *Clavipes. Add. n. 31.*  
 \* *Crassipes. Add. n. 32.*  
*Elegans. g. 563. 1.*  
 \* *Elongatus. Add. n. 34.*  
 \* *Lincola. Add. n. 30.*  
 \* *Modestus. Mant. g. 344. 174-175.*  
 \* *Palumbus. Add. n. 62.*  
 \* *Poricollis. Mant. g. 344. 174-171.*  
 \* *4-pustulatus. Add. n. 29.*  
*Reticulatus. g. 468. 7.*  
 \* *Seriatus. Mant. g. 344. 176-177.*

\* *Wahlbergi*. *Mant. g.* 344.  
176-177.

\* *LOBODERES. g.* 501.

\* *Citriventris. g.* 501. 1.

\* *Flavicornis. g.* 501. 2.

\* *LOBOPS. g.* 567.

\* *Setosus. g.* 567. 1.

\* *LOBOTRACHELUS. g.* 576.

\* *Conicollis. g.* 576. 2.

\* *Egenus. g.* 576. 3.

\* *Histrio. g.* 576. 8.

\* *Ineptus. g.* 576. 5.

\* *Litigiosus. g.* 576. 4.

\* *Pusus. g.* 576. 6.

\* *Subsignatus. g.* 576. 7.

\* *Vestitus. g.* 576. 1.

*LOPHODERES.*

*Singularis. g.* 478. 1.

*LOPHOTUS.*

*Excavatus. Add. n.* 49.

\* *LYMANTES. g.* 629.

\* *Scabricollis. g.* 629. 1.

\* *LYPRUS. g.* 582.

\* *Cylindrus. g.* 582. 1.

\* *LYTERIUS. g.* 474.

\* *Abdominalis. g.* 474. 3.

\* *Instabilis. g.* 474. 4.

\* *Melas. g.* 474. 3.

\* *Musculus. g.* 474. 1.

\* *MACROCHEIRUS. g.* 600.

\* *Prætor. g.* 600. 1.

\* *MACROMERUS. g.* 515.

*Aquilinus. g.* 515. 9.

\* *Aquilus. g.* 515. 9.

\* *Chimaridis. g.* 515. 1.

\* *Clavipes. g.* 515. 3.

*Costicollis. g.* 511. 156.

\* *Crinitarsis. g.* 515. 2.

\* *Grallipes. g.* 515. 6.

\* *Innoxius. g.* 515. 8.

\* *Leuconotus. g.* 515. 5.

\* *L'Herminieri. g.* 515. 4.

\* *Stigmaticus. g.* 515. 7.

\* *Triangularis. g.* 515. 10.

\* *MADOPTERUS. g.* 472.

\* *Cylindricus. g.* 472. 2.

\* *Talpa. g.* 472. 1.

\* *MÆMACTES. g.* 535.

\* *Ruficornis. g.* 535. 1.

\* *MAGDALIS. g.* 485.

\* *Binotatus. g.* 485. 8.

\* *Biplagiatus. g.* 485. 1.

\* *Bistrigellus. g.* 485. 9.

\* *Comma. g.* 485. 10.

\* *Corvinus. g.* 485. 3.

\* *Distigma. g.* 485. 7.

\* *Ebenus. g.* 485. 12.

\* *Laticollis. g.* 485. 13.

\* *Migrator. g.* 485. 6.

*Morosus. g.* 489. 1.

\* *4-pustulatus. g.* 485. 2.

\* *Rectirostris. g.* 485. 5.

*Signatus. g.* 485. 6.

\* *Singularis. g.* 485. 14.

*Trucidatus. g.* 469. 2.

\* *Undulatus. g.* 485. 11.

\* *Vorticosus. g.* 485. 4.

\* *MARMOROPUS. g.* 539.

\* *Besseri. g.* 539. 1.

\* *MECINUS. g.* 588.

\* *Barbarus. g.* 588. 2.

\* *Circulatus. g.* 588. 7.

\* *Collaris. g.* 588. 5.

\* *Comosus. g.* 588. 8.

*Hæmorrhoidalis. g.* 588. 7.

\* *Janthinus. g.* 588. 6.

\* *Longiusculus. g.* 588. 3.

*Marginatus. g.* 588. 7.

\* *Pyrastrer. g.* 588. 1.

\* *Tenebriusculus. g.* 588. 4.

\* *MECOCORYNUS. g.* 519.

\* *Loripes. g.* 519. 1.

\* *Varipes. g.* 519. 2.

*Westermanni. g.* 519. 1.

\* *MECOPUS. g.* 570.

\* *Audineti. g.* 570. 1.

\* *Bispinosus. g.* 570. 2.

\* *Evolans. g.* 570. 7.

\* *Hopei. g.* 570. 4.

- \*Sphærops. *g.* 570. 5.  
 \*Trilineatus. *g.* 570. 3.  
 \*Vulneratus. *g.* 570. 6.  
   \*MECYSMODERES. *g.* 584.  
 \*Euglyptus. *g.* 584. 1.  
   \*MEGAPROCTUS. *g.* 615.  
 \*Acutus. *g.* 615. 1.  
 \*Exclamationis. *g.* 615. 2.  
 \*Funebris. *g.* 615. 3.  
   \*MEGOPS. *g.* 489.  
 \*Morosus. *g.* 489. 1.  
   MESITES. *g.* 623.  
 \*Cunipes. *g.* 623. 3.  
 \*Pallidipennis. *g.* 623. 2.  
 \*Tardii. *g.* 623. 1.  
   \*METADUPUS. *g.* 512.  
 \*Apicatus. *g.* 512. 2.  
 \*Nodatus. *g.* 512. 1.  
   MIARUS.  
 Nasturtii. *g.* 580. 3.  
   \*MICROXYLOBIUS. *g.* 630.  
 \*Westwoodii. *g.* 630. 1.  
   \*MITREPHORUS. *g.* 554.  
 \*Waterhousei. *g.* 554. 1.  
   \*MONONYCHUS. *g.* 538.  
 \*Ireos. *g.* 538. 1.  
 \*Pseudacori. *g.* 538. 3.  
 \*Salviæ. *g.* 538. 5.  
   Superciliaris. *g.* 538. 4.  
   Vittatus. *g.* 538. 6.  
 \*Vulpeculus. *g.* 538. 2.  
   \*NANOPHYES. *g.* 589.  
   \*Annulatus. *g.* 589. 3.  
   \*Armatus. *g.* 589. 2.  
   \*Brevis. *g.* 589. 9.  
   \*Chevrieri. *g.* 589. 6.  
   \*Globulus. *g.* 589. 8. 8.  
   \*Hemisphæricus. *g.* 589. 4.  
   \*Languidus. *g.* 589. 11.  
   \*Lythri. *g.* 589. 5.  
   \*Marmoratus. *g.* 589. 18.  
   \*Nitidulus. *g.* 589. 12.  
   \*Pallidulus. *g.* 589. 15.  
   \*Pallidus. *g.* 589. 14.  
   \*Posticus. *g.* 589. 16.  
   \*Sahlbergi. *g.* 589. 17.  
   \*Siculus. *g.* 589. 1.  
   \*Tamarisci. *g.* 589. 13.  
   \*Ulmi. *g.* 589. 10.  
   \*Wahlbergi. *g.* 589. 7.  
     \*NANUS. *g.* 476.  
   \*Punctellus. *g.* 476. 2.  
   \*Uniformis. *g.* 476. 1.  
   NEDYUS.  
   Litura. *g.* 577. 74.  
   Melanarius. *g.* 577. 13.  
   Quercicola. *g.* 577. 100.  
   Rugulosus. *g.* 577. 96.  
     \*NERTUS. *g.* 471.  
   \*Acuminatus. *g.* 471. 4.  
   \*Germari. *g.* 471. 3.  
   \*Mannerheimi. *g.* 471. 1.  
   \*Suturalis. *g.* 471. 2.  
     \*NETTARHINUS. *g.* 460.  
   \*Anthribiformis. *g.* 460. 1.  
   \*Bilobus. *g.* 460. 3.  
   \*Mannerheimi. *g.* 460. 2.  
     \*OCLADIUS. *g.* 574.  
   \*Asserculaticollis. *g.* 574. 7.  
   \*Baccicolor. *g.* 574. 10.  
   \*Costicollis. *g.* 574. 6.  
   \*Costiger. *g.* 574. 5.  
   \*Foveatus. *g.* 574. 12.  
   \*Glomeris. *g.* 574. 13.  
   \*Inæqualicollis. *g.* 574. 15.  
   \*Lacunatus. *g.* 574. 11.  
   \*Pertusus. *g.* 574. 2.  
   \*Salicorniæ. *g.* 574. 1.  
   \*Senilis. *g.* 574. 8.  
   \*Subcarinatus. *g.* 574. 9.  
   \*Subfasciatus. *g.* 574. 3.  
   \*Sulcipes. *g.* 574. 14.  
   \*Textilis. *g.* 574. 4.  
     \*ODONTOCORYNUS. *g.* 499.  
   \*Creperus. *g.* 499. 1.  
     \*OMATOLAMPES. *g.* 603.  
   \*Cuvieri. *g.* 603. 1.  
   \*Germari. *g.* 603. 3.

- \*Hæmorrhoidalis. *g.* 603. 2.  
 \* OMOPHORUS.  
 \*Indispositus. *Mant. g.* 436. 2.  
 \*ONCHOSCELIS. *g.* 507.  
 \*Rubiginosus. *g.* 507. 1.  
 \*OROBITIS. *g.* 573.  
 \*Cyaneus. *g.* 573. 1.  
 Fractipes. *g.* 490. 124.  
 Nucula. *g.* 572. 3.  
 Strigicollis. *g.* 551. 2.  
 Tamarisci. *g.* 589. 11.  
 ORTHOGNATHUS. *g.* 576.  
 Lividus. *g.* 596. 1.  
 \*PACHYONYX. *g.* 524.  
 \*Affaber. *g.* 524. 1.  
 PACHYRHINUS.  
 Rufescens. *g.* 578. 5.  
 \*PACHYRHYNCHUS. *Mant. g.*  
 113.  
 \*Alboguttatus. *Mant. g.* 113. 32.  
 \*Ardens. *Mant. g.* 113. 29.  
 \*Biplagiatus. *Mant. g.* 113. 24.  
 \*Chevrolati. *Mant. g.* 113. 23.  
 \*Chlorolineatus. *Mant. g.* 113.  
 21.  
 \*Circuliferus. *Mant. g.* 113. 31.  
 \*Cumingii. *Mant. g.* 113. 5.  
 \*Decussatus. *Mant. g.* 113. 16.  
 \*Elegans. *Mant. g.* 113. 6.  
 \*Erichsoni. *Mant. g.* 113. 9. 22.  
 \*Eschscholtzii. *Mant. g.* 113. 10.  
 \*Fahræi. *Mant. g.* 113. 26.  
 Fimbriatus. *Mant. g.* 113. 22.  
 Gemmans. *Mant. g.* 113. 26.  
 \*Gemmatus. *Mant. g.* 113. 3.  
 \*Globulipennis. *Mant. g.* 113.  
 28.  
 \*Jugifer. *Mant. g.* 113. 14.  
 \*Latifasciatus. *Mant. g.* 113. 11.  
 \*Mandarinus. *Mant. g.* 113. 30.  
 Mannerheimi. *Mant. g.* 113. 1.  
 \*Moniliferus. *Mant. g.* 113. 20.  
 \*Multipunctatus. *Mant. g.* 113.  
 17.  
 \*Orbifer. *Mant. g.* 113. 22.  
 \*Perpulcher. *Mant. g.* 113. 4.  
 \*Phaleratus. *Mant. g.* 113. 15.  
 \*Pretiosus. *Mant. g.* 113. 25.  
 \*Reticulatus. *Mant. g.* 113. 18.  
 \*Rhodopterus. *Mant. g.* 113. 14.  
 \*Roseomaculatus. *Mant. g.* 113.  
 13.  
 \*Rufopunctatus. *Mant. g.* 113. 2.  
 \*Rugicollis. *Mant. g.* 113. 19.  
 \*Schoenherri. *Mant. g.* 113. 8.  
 \*Scintillans. *Mant. g.* 113. 27.  
 Sommeri. *Mant. g.* 113. 14.  
 \*Speciosus. *Mant. g.* 113. 7.  
 \*Striatus. *Mant. g.* 113. 12.  
 \*Waltoni. *Mant. g.* 113. 33.  
 \*Venustus. *Mant. g.* 113. 1.  
 \*PANTOTELES. *g.* 557.  
 \*Erythrorhynchus. *g.* 557. 1.  
 \*Tenuirostris. *g.* 557. 2.  
 \*PARALLELOSOMUS. *g.* 465.  
 \*Planicollis. *g.* 465. 1.  
 \*PELTOPHORUS. *Mant. g.* 564.  
 565.  
 \*Polymitus. *Mant. g.* 564-565. 1.  
 \*PEPIORGES. *Mant. g.* 186-187.  
 \*Subsignatus. *Mant. g.* 186-  
 187. 1.  
 \*PERIDERÆUS. *g.* 462.  
 \*Granellus. *g.* 462. 1.  
 \*PERIDINETUS. *g.* 555.  
 \*Irroratus. *g.* 555. 1.  
 \*Maculatus. *g.* 555. 4.  
 \*Sellatus. *g.* 555. 3.  
 \*Signatus. *g.* 555. 5.  
 \*Zinckenii. *g.* 555. 2.  
 \*PHACECORYNES. *g.* 607.  
 \*Sommeri. *g.* 607. 1.  
 \*PHACELOBARUS. *g.* 478.  
 \*Singularis. *g.* 478. 1.  
 \*PHÆNOMERUS. *g.* 480.  
 \*Sundevalli. *g.* 480. 1.  
 \*PHLOEOPHAGUS. *g.* 624.  
 \*Æneopiceus. *g.* 624. 5.  
 \*Ebeninus. *g.* 624. 2.



- \* Fallax. *g.* 624. 7.  
 \* Ferrugineus. *g.* 624. 3.  
 \* Hispidus. *g.* 624. 4.  
   Linearis. *g.* 624. 6.  
 \* Minimus. *g.* 624. 8.  
 \* Pallidus. *g.* 624. 12.  
 \* Scalptus. *g.* 624. 10.  
   Sculptus. *g.* 624. 10.  
 \* Silbermanni. *g.* 624. 1.  
 \* Spadix. *g.* 624. 9.  
 \* Turbatus. *g.* 624. 6.  
 \* Uncipes. *g.* 624. 11.  
   \* PHLOEOTRAGUS.  
 \* Imhoffi. *Mant. g.* 14. 5-6.  
   \* PHYSOMERUS. *g.* 477.  
 \* Calandroides. *g.* 477. 1.  
   PHYSTHORUS.  
   Boyeri. *g.* 540. 2.  
   Goureavi. *g.* 540. 5.  
   Lævirostris. *g.* 540. 4.  
   Lateralis. *g.* 540. 6.  
   Maillei. *g.* 540. 3.  
   PHYTOBIUS.  
   Rufescens. *g.* 578. 5.  
   PHYTONOMUS.  
   Mixtus. *g.* 586. 26.  
   \* PIAZOMIAS.  
 \* Globulicollis. *Mant. g.* 142. 0.  
 \* Schrenchii. *Mant. g.* 142. 2.  
   \* PIAZURUS. *g.* 566.  
   Bajulus. *g.* 566. 11.  
   Bidentatus. *g.* 566. 3.  
 \* Bispinosus. *g.* 566. 2.  
   Bistriatus. *g.* 566. 10.  
 \* Calcaratus. *g.* 566. 11.  
 \* Caprimulgus. *g.* 566. 31.  
 \* Cerastes. *g.* 566. 22.  
 \* Ciliatus. *g.* 566. 3.  
 \* Compactus. *g.* 566. 6.  
 \* Condylatus. *g.* 566. 30.  
   Contameliosus. *g.* 566. 20.  
   Costatopunctatus. *g.* 566. 16.  
 \* Defector. *g.* 566. 16.  
 \* Fraudulentus. *g.* 566. 23.  
 \* Imbellis. *g.* 566. 28.  
 \* Incommodus. *g.* 566. 7.  
 \* Maculipes. *g.* 566. 8.  
 \* Melanostictus. *g.* 566. 14.  
 \* Misumenus. *g.* 566. 25.  
 \* Mitis. *g.* 566. 24.  
 \* Notabilis. *Mant. g.* 566. 12.  
   13.  
 \* Obesus. *g.* 566. 15.  
 \* Ochrocephalus. *g.* 566. 17.  
 \* Operosus. *g.* 566. 4.  
 \* Ostracion. *g.* 566. 29.  
 \* Phlesus. *g.* 566. 1.  
 \* Pleuronectes. *g.* 566. 13.  
 \* Propinquus. *g.* 566. 5.  
 \* Rosenschoeldi. *g.* 566. 18.  
 \* Saginatus. *g.* 566. 9.  
 \* Stipitosus. *g.* 566. 20.  
 \* Subundatus. *g.* 566. 27.  
 \* Succivus. *g.* 566. 19.  
 \* Taciturnus. *g.* 566. 12.  
 \* Umbrinus. *g.* 566. 26.  
 \* Varius. *g.* 566. 21.  
 \* Versicolor. *g.* 566. 10.  
   \* PIEZOTRACHELUS.  
 \* Asphaltinus. *Mant. g.* 59. 5.  
 \* Fallax. *Mant. g.* 59. 6.  
 \* Pullus. *Mant. g.* 59. 3-4.  
   \* PINARUS. *g.* 569.  
 \* Apicatus. *g.* 569. 1.  
 \* PLATYONYX. *g.* 498.  
 \* Ornatus. *g.* 498. 1.  
   POECILMA.  
   Ciliatum. *g.* 566. 3.  
   Furfuraceum. *g.* 566. 9.  
   Hostia. *g.* 564. 2.  
   Jaspideum. *g.* 564. 20.  
   Stipitosum. *g.* 566. 20.  
   Versicolor. *g.* 566. 10.  
   \* POLYDERCES. *g.* 452.  
 \* Adpersus. *g.* 452. 2.  
 \* Annulatus. *g.* 451. 19.  
 \* Dealbatus. *g.* 451. 15.  
 \* Flavofasciatus. *g.* 451. 17.  
 \* Zonatus. *g.* 452. 1

- \*POLYPHRADES.  
 \*Paganus. *Mant. g.* 107. 1-2.  
 \*POOPHAGUS. *g.* 580.  
 \*Nasturtii. *g.* 580. 3.  
 \*Olivaceus. *g.* 580. 2.  
 \*Sisymbrii. *g.* 580. 1.  
 \*POROPHORUS. *Mant. g.* 138-139.  
 \*Odiosus. *Mant. g.* 138-139. 1.  
 \*POROPTERUS. *g.* 547.  
 \*Abstersus. *g.* 547. 4.  
 \*Antiquus. *g.* 547. 2.  
 \*Conifer. *g.* 547. 1.  
 \*Succosus. *g.* 547. 3.  
 \*PORTHETES. *g.* 622.  
 \*Zamiæ. *g.* 622. 1.  
 \*POTERIOPHORUS. *g.* 606.  
 \*Niveus. *g.* 606. 1.  
 \*Vittatus. *g.* 606. 2.  
 \*PROECES. *g.* 627.  
 \*Macer. *g.* 627. 2.  
 \*Nigrifrons. *g.* 627. 1.  
 \*PROTEPALUS. *g.* 510.  
 \*Stephensi. *g.* 510. 1.  
 \*PROTOCERIUS. *g.* 599.  
 \*Colossus. *g.* 599. 1.  
 \*Druryi. *g.* 599. 2.  
 \*Molossus. *g.* 599. 3.  
 \*PSEUDOMUS. *g.* 533.  
 \*Apiatus. *g.* 533. 1.  
 \*Cacuminatus. *g.* 533. 6.  
 \*Fistulosus. *g.* 533. 7.  
 \*Militaris. *g.* 533. 1.  
 \*Notatus. *g.* 533. 3.  
 \*Sedentarius. *g.* 533. 4.  
 \*Semieribratus. *g.* 533. 8.  
 \*Viduus. *g.* 533. 2.  
 PTILOPUS.  
 Argus. *Mant. g.* 193. 3-4.  
 \*PYCNOPIUS. *g.* 532.  
 \*Bufo. *g.* 532. 1.  
 \*PYLARUS. *g.* 467.  
 \*Designatus. *g.* 467. 1.
- \*PYROPUS. *g.* 486.  
 \*Sapphirinus. *g.* 486. 1.  
 \*RHINA. *g.* 593.  
 \*Affaber. *g.* 593. 4.  
 \*Afzelii. *g.* 593. 6.  
 \*Barhirostris. *g.* 593. 2.  
 \*Costalis. *g.* 593. 3.  
 \*Ebriosa. *g.* 593. 5.  
 \*Nigra. *g.* 593. 7.  
 \*Scrutator. *g.* 593. 5.  
 Lineola. *Add. n.* 30.  
 \*RHINASTUS. *g.* 450.  
 \*Pertusus. *g.* 450. 1.  
 \*Sternicornis. *g.* 450. 2.  
 \*RHINONCUS. *g.* 578.  
 \*Albicinctus. *g.* 578. 14.  
 \*Bruchoides. *g.* 578. 5.  
 \*Castor. *g.* 578. 1.  
 \*Denticollis. *g.* 578. 11.  
 \*Gramineus. *g.* 578. 8.  
 \*Granulipennis. *g.* 578. 3.  
 \*Grypus. *g.* 578. 15.  
 \*Guttalis. *g.* 578. 10.  
 \*Inconspetus. *g.* 578. 6.  
 \*Paganus. *g.* 578. 13.  
 \*Pericarpus. *g.* 578. 7.  
 \*Pyrrhopus. *g.* 578. 2.  
 \*Sparsesetosus. *g.* 578. 12.  
 \*Subfasciatus. *g.* 578. 9.  
 \*Sulcicollis. *g.* 578. 4.  
 \*RHYEPHANES. *g.* 540.  
 \*Cacicus. *g.* 540. 2.  
 \*Goureavi. *g.* 540. 5.  
 \*Incas. *g.* 540. 1.  
 \*Lævirostris. *g.* 540. 4.  
 \*Lateralis. *g.* 540. 6.  
 \*Maillei. *g.* 540. 3.  
 RHYNCHÆNUS.  
 Accipitrinus. *g.* 578. 6.  
 Æneus. *g.* 504. 8.  
 \*Alienatus. *Add. n.* 23.  
 Annulatus. *g.* 451. 19.  
 \*Bicornis. *Add. n.* 28.  
 \*Bidens. *Add. n.* 16.  
 \*Bigibber. *Add. n.* 61.  
 \*Biguttatus. *Add. n.* 5.

- \* *Bilineatus*. *Add.* n. 6.  
*Bilobus*. *g.* 460. 3.  
*Calcaratus*. *g.* 461. 2.  
*Campanulæ*. *g.* 587. 46.  
 \* *Canus*. *Add.* n. 109.  
*Castor*. *g.* 578. 1.  
*Chrysanthemi*. *g.* 577. 88.  
*Cinereus*. *g.* 577. 90.  
*Convexus*. *g.* 468. 12.  
 \* *Coronatus*. *Add.* n. 17.  
 \* *Cruciatu*. *Add.* n. 58.  
 \* *Curvirostris*. *Add.* n. 11.  
*Cyanipennis*. *g.* 577. 141.  
*Didymus*. *g.* 536. 25.  
*Diocletianus*. *g.* 543. 16.  
*Ebenus*. *g.* 485. 12.  
*Edaculus*. *g.* 490. 68.  
*Erysimi*. *g.* 577. 22.  
*Excavatus*. *g.* 468. 21.  
 \* *Exclamationis*. *Add.* n. 14.  
 \* *Fasciculatus*. *Add.* n. 8.  
*Fenestratus*. *g.* 468. 37.  
 \* *Fimbriatus*. *Add.* n. 110.  
*Globulus*. *g.* 583. 1.  
*Globus*. *g.* 490. 124.  
 \* *Gracilis*. *Add.* n. 60.  
*Graminis*. *g.* 587. 43.  
 \* *Granulatus*. *Add.* n. 9.  
 \* *Gravis*. *Add.* n. 26.  
 \* *Guttatus*. *Add.* n. 19.  
 \* *Hæmorrhoidalis*. *Add.* n. 27.  
*Hirtulus*. *g.* 577. 146.  
*Hystrix*. *g.* 461. 11.  
*Leopardus*. *g.* 468. 12.  
*Lineatocollis*. *g.* 551. 5.  
*Luridus*. *g.* 543. 38.  
*Lutosus*. *g.* 563. 28.  
*Lutulosus*. *g.* 563. 23.  
*Lythri*. *g.* 589. 5.  
*Melanostigma*. *g.* 577. 90.  
 \* *Mendicus*. *Add.* n. 3.  
 \* *Mixtus*. *Add.* n. 22.  
*Mæstus*. *g.* 577. 156.  
*Musculus*. *g.* 474. 1.  
*Nero*. *g.* 468. 7.  
*Pictus*. *g.* 468. 30.  
 \* *Pilosus*. *g.* 584-585. 2.  
*Ptinoides*. *g.* 543. 32.  
 \* *Pudicus*. *Add.* n. 15.  
*Punctiger*. *g.* 577. 105.  
 \* *Punctulatus*. *Add.* n. 4.  
 \* *Pupillator*. *Add.* n. 21.  
*Pupillatus*. *Add.* n. 21.  
*Quadridentis*. *g.* 577. 100.  
*Queroicola*. *g.* 577. 108.  
 \* *Quinetuberculatus*. *g.* 584-585. 1.  
 \* *Repandus*. *Add.* n. 59.  
*Rubicundus*. *g.* 536. 4.  
 \* *Rubromaculatus*. *Add.* n. 108.  
*Rugulosus*. *g.* 577. 90.  
*Scutellatus*. *g.* 577. 90.  
*Sisymbrii*. *g.* 580. 1.  
 \* *Spinipes*. *Add.* n. 18.  
 \* *Squalidus*. *Add.* n. 25.  
*Strepidus*. *Add.* n. 24.  
 \* *Striatus*. *Add.* n. 2.  
 \* *Stupidus*. *Add.* n. 24.  
*Subfasciatus*. *g.* 578. 9.  
*Sulcicollis*. *g.* 577. 123 et n. 125.  
*T-Album*. *g.* 487. 152.  
*Tereticollis*. *g.* 563. 15.  
 \* *Tessellatus*. *Add.* n. 7.  
*Torquatus*. *g.* 487. 38.  
 \* *Tragiæ*. *Add.* n. 10.  
 \* *Trifasciatus*. *Add.* n. 20.  
*Trochilus*. *g.* 572. 4.  
*Troglodytes*. *g.* 577. 151.  
*Unca*. *g.* 487. 41.  
 \* *Unifasciatus*. *Add.* n. 13.  
 \* *Vetus*. *Add.* n. 111.  
 \* *Zebra*. *g.* 584-585. 3.
- RHYNCHITES.**  
*Grandis*. *Mant.* *g.* 46. 1.  
 \* *Lævicollis*. *Mant.* *g.* 46. 44-45.  
 \* *Luridus*. *Mant.* *g.* 46. 42-43.  
 \* *Præustus*. *Mant.* *g.* 46. 42-43.  
*4-pustulatus*. *g.* 469. 8.  
 \* *Villosus*. *Mant.* *g.* 46. 45-46.
- RHYNCHOPHORIDES. Div. II.**  
**RHYNCHOPHORIDES. Incerti**  
*generis*. 619-620.  
 \* *Bifasciatus*. *g.* 619-620. 7.

- \* *Cruentatus*. *g.* 619-620. 2.  
 \* *Crustatus*. *g.* 619-620. 6.  
 \* *Fasciatus*. *g.* 619-620. 5.  
 \* *Indus*. *g.* 619-620. 1.  
 \* *Interstitialis*. *g.* 619-620. 13.  
 \* *Melanosomus*. *g.* 619-620. 4.  
 \* *Obscurus*. *g.* 619-620. 9.  
 \* *Ochreateus*. *g.* 619-620. 14.  
 \* *Paganus*. *g.* 619-620. 3.  
 \* *Præpotens*. *g.* 619-620. 12.  
 \* *Sanguinolentus*. *g.* 619-620. 4.  
 \* *Tasmanii*. *g.* 619-620. 8.  
 \* **RHYNCHOPHORUS**. *g.* 598.  
 \* *Barbirostris*. *g.* 598. 12.  
   *Basicorne*. *g.* 598. 11.  
 \* *Borassi*. *g.* 598. 1.  
   *Carbonarius*. *g.* 617. 26.  
   *Ferrugineus*. *g.* 598. 9,  $\beta$ ,  $\gamma$ .  
   *Gages*. *g.* 617. 42.  
 \* *Nitidipennis*. *g.* 598. 5.  
 \* *Noxius*. *g.* 598. 4.  
 \* *Palmarum*. *g.* 598. 3.  
 \* *Pascha*. *g.* 598. 10.  
 \* *Phœnicis*. *g.* 598. 8.  
 \* *Politus*. *g.* 598. 2.  
   *Reaumurii*. *g.* 598. 6.  
 \* *Rubiginosus*. *g.* 598. 7.  
 \* *Schach*. *g.* 598. 9.  
 \* *Serrirostris*. *g.* 598. 6.  
   *Vulneratus*. *g.* 598. 9, *var. e.*  
 \* *Zimmermannii*. *g.* 598. 11.  
   \* **RHYNCOLUS**. *g.* 625.  
   \* *Angustatus*. *g.* 625. 7.  
   \* *Brevis*. *g.* 625. 23.  
   \* *Brunneus*. *g.* 625. 9.  
   \* *Chloropus*. *g.* 625. 8.  
   \* *Corticalis*. *g.* 625. 29.  
   \* *Culinaris*. *g.* 625. 13.  
   \* *Cylindrirostris*. *g.* 625. 20.  
   \* *Cylindrus*. *g.* 625. 4.  
   \* *Elongatus*. *g.* 625. 10.  
   \* *Elumbis*. *g.* 625. 6.  
   \* *Encaustus*. *g.* 625. 2.  
   \* *Exiguus*. *g.* 625. 14.  
   \* *Filiformis*. *g.* 625. 3.  
   \* *Latinasus*. *g.* 625. 17.  
   \* *Lauri*. *g.* 625. 28.  
   \* *Linearis*. *g.* 625. 23.  
   \* *Nitidulus*. *g.* 625. 26.  
   \* *Oryzæ*. *g.* 625. 27.  
   \* *Plebejus*. *g.* 625. 18.  
   \* *Porcatus*. *g.* 625. 11.  
   \* *Præustus*. *g.* 625. 5.  
   \* *Procer*. *g.* 625. 1.  
   \* *Punctatulus*. *g.* 625. 22.  
   \* *Quercicolus*. *g.* 625. 12.  
   \* *Reflexus*. *g.* 625. 21.  
   \* *Submuricatus*. *g.* 625. 15.  
   \* *Teretirostris*. *g.* 625. 30.  
   \* *Trivialis*. *g.* 625. 19.  
   \* *Troglodytes*. *g.* 625. 24.  
   \* *Truncorum*. *g.* 625. 16. — *g.*  
     624. 5.  
 \* **RHYPAROPHILUS**. *Mant. g.*  
   107-108.  
 \* *Alternans*. *Mant. g.* 107-108. 1.  
   \* **RHYSSOMATUS**. *g.* 551.  
 \* *Aciculaticollis*. *g.* 551. 16.  
 \* *Bicoloratus*. *g.* 551. 6.  
 \* *Crispicollis*. *g.* 551. 17.  
 \* *Lineatocollis*. *g.* 551. 5.  
 \* *Marginatus*. *g.* 551. 14.  
 \* *Morio*. *g.* 551. 13.  
 \* *Nigerrimus*. *g.* 551. 17.  
 \* *Novalis*. *g.* 551. 3.  
 \* *Palmacollis*. *g.* 551. 4.  
 \* *Polycoccus*. *g.* 551. 12.  
 \* *Rufus*. *g.* 551. 9.  
 \* *Semicostatus*. *g.* 551. 10.  
 \* *Strangulatus*. *g.* 551. 15.  
 \* *Strigicollis*. *g.* 551. 2.  
 \* *Subcostatus*. *g.* 551. 8.  
 \* *Vehemens*. *g.* 551. 1.  
 \* *Viridipes*. *g.* 551. 11.  
   \* **RHYTIDOSOMUS**. *g.* 583.  
 \* *Globulus*. *g.* 583. 1.  
   \* **RHYTIRHINUS**.  
 \* *Angusticollis*. *Mant. g.* 270. 21.  
   \* **SCAMBUS**. *g.* 491.  
 \* *Echinatus*. *g.* 491. 2.

- \*Galeatus. *g.* 491. 3.  
 \*Setifer. *g.* 491. 1.  
   \*SCIAPHILUS.  
 \*Aurosus. *g.* 133. 11. 12.  
   \*SCIOBIUS.  
 \*Wahlbergi. *Mant. g.* 319. 4-5.  
   \*SCLEROPTERUS. *g.* 545.  
 \*Offensus. *g.* 545. 2.  
 \*Serratus. *g.* 545. 1.  
   \*SCLEROSOMUS. *g.* 456.  
 \*Coccus. *g.* 456. 1.  
 \*Granulosus. *g.* 456. 3.  
 \*Incommodus. *g.* 456. 2.  
   \*SCYPHOPHORUS. *g.* 610.  
 \*Acupunctatus. *g.* 610. 2.  
 \*Anthracinus. *g.* 610. 3.  
 \*Interstitialis. *g.* 610. 1.  
   \*SIDERODACTYLUS.  
 \*Murinus. *Mant. g.* 173. 7.  
   \*SIPALUS. *g.* 595.  
 \*Bracteolatus. *g.* 595. 14.  
 \*Burmeisteri. *g.* 595. 2.  
 \*Cylindræus. *g.* 595. 9.  
 \*Granulatus. *g.* 595. 3.  
 \*Guinensis. *g.* 595. 1.  
 \*Hypocrita. *g.* 595. 4.  
 \*Leprosus. *g.* 595. 15.  
 \*Memnonius. *g.* 595. 8.  
 \*Mendicus. *g.* 595. 6.  
 \*Misumenus. *g.* 595. 5.  
 \*Papulatus. *g.* 595. 11.  
 \*Porriginosus. *g.* 595. 16.  
 \*Rubetra. *g.* 595. 17.  
 \*Rugicollis. *g.* 595. 13.  
 \*Sphacellatus. *g.* 595. 12.  
 \*Striatus. *g.* 595. 7.  
 \*Subulatus. *g.* 595. 10.  
   \*SITOPHILUS. *g.* 618.  
 \*Exaratus. *g.* 618. 3.  
 \*Frumenti. *g.* 618. 15.  
 \*Granarius. *g.* 618. 10.  
 \*Incarnatus. *g.* 618. 1.  
 \*Linearis. *g.* 618. 12.  
 \*Mellerborgi. *g.* 618. 9.  
 \*Oryzæ. *g.* 618. 13.  
 \*4-notatus. *g.* 618. 16.  
 \*Remotepunctatus. *g.* 618. 11.  
 \*Rugosus. *g.* 618. 8.  
 \*Sculpturatus. *g.* 618. 7.  
 \*Setulosus. *g.* 618. 2.  
 \*Stigmaticollis. *g.* 618. 5.  
 \*Subfasciatus. *g.* 618. 4.  
 \*Subsignatus. *g.* 618. 6.  
 \*Taitensis. *g.* 618. 14.  
   \*SOLENOPUS. *g.* 458.  
 \*Cacicus. *g.* 458. 1.  
 \*Percheroni. *g.* 458. 3.  
 \*Sexmaculatus. *g.* 458. 4.  
 \*Spinicollis. *g.* 458. 2.  
   \*SPHADASMUS. *g.* 505.  
 \*Camelus. *g.* 505. 1.  
 \*Carinicollis. *g.* 505. 3.  
 \*Incallidus. *g.* 505. 4.  
 \*Setifer. *g.* 505. 2.  
   \*SPHENOCORYNUS. *g.* 614.  
 \*4-punctatus. *g.* 614. 1.  
   \*SPHENOGNATHUS. *g.* 596.  
 \*Lividus. *g.* 596. 1.  
   \*SPHENOPHORUS. *g.* 617.  
 \*Abbreviatus. *g.* 617. 66.  
 \*Adpersus. *g.* 617. 58.  
 \*Æqualis. *g.* 617. 81.  
 \*Albicollis. *g.* 617. 115.  
 \*Ambiguus. *g.* 617. 17.  
 \*Anceps. *g.* 617. 22.  
 \*Angustus. *g.* 617. 71.  
 \*Ardesius. *g.* 617. 116.  
 \*Atratus. *g.* 617. 45.  
 \*Austerus. *g.* 617. 46.  
 \*Bifasciatus. *g.* 617. 13.  
 \*Bisbispignatus. *g.* 617. 36.  
 \*Brunnipennis. *g.* 617. 99.  
 \*Brutus. *g.* 617. 91.  
 \*Callosus. *g.* 617. 82.  
 \*Canaliculatus. *g.* 617. 78.  
 \*Canalipes. *g.* 617. 62.  
 \*Carbonarius. *g.* 617. 26.  
 \*Carinicollis. *g.* 617. 9.  
 \*Cariosus. *g.* 617. 80.  
 \*Castaneipennis. *g.* 617. 64.

- \* *Cicatricosus*. *g.* 617. 118.  
 \* *Cicatripennis*. *g.* 617. 104.  
 \* *Cicatristriatus*. *g.* 617. 103.  
 \* *Cincticollis*. *g.* 617. 98.  
 \* *Cinctus*. *g.* 617. 51.  
 \* *Cœsifrons*. *g.* 617. 105.  
 \* *Compressirostris*. *g.* 617. 92.  
 \* *Confusus*. *g.* 617. 86.  
 \* *Contractus*. *g.* 617. 97.  
 \* *Crenatus*. *g.* 617. 2.  
 \* *Cultrirostris*. *g.* 617. 95.  
 \* *Decoratus*. *g.* 617. 16.  
 \* *Defrictus*. *g.* 617. 100.  
 \* *De Haanii*. *g.* 617. 7.  
 \* *Delumbatus*. *g.* 617. 39.  
 \* *Discolor*. *g.* 617. 56.  
 \* *Dispar*. *g.* 617. 20.  
 \* *Ensirostris*. *g.* 617. 20,  $\beta$ .  
   *Fahræi*. *g.* 617. 11.  
 \* *Fallax*. *g.* 617. 87.  
 \* *Ferrugineus*. *g.* 617. 6.  
   *Flexuosus*. *g.* 617. 79.  
 \* *Fossor*. *g.* 617. 37.  
 \* *Gagatinus*. *g.* 617. 96.  
 \* *Glabricollis*. *g.* 617. 42.  
 \* *Guttatus*. *g.* 617. 59.  
 \* *Hebetatus*. *g.* 617. 49.  
 \* *Hemipterus*. *g.* 617. 18.  
 \* *Ho'gbergii*. *g.* 617. 84.  
   *Hypocrita*. *g.* 617. 5.  
 \* *Immunis*. *g.* 617. 121.  
   *Implicatus*. *g.* 617. 29. *var. n.*  
 \* *Imus*. *g.* 617. 73.  
 \* *Inæqualis*. *g.* 617. 61.  
 \* *Incurrens*. *g.* 617. 102.  
 \* *Lateritius*. *g.* 617. 50.  
 \* *Larvalis*. *g.* 617. 79.  
   *Lebasii*. *g.* 617. 29. *var. z.*  
 \* *Leprosus*. *g.* 617. 63.  
 \* *Leucographus*. *g.* 617. 33.  
 \* *Liratus*. *g.* 617. 43.  
 \* *Longicollis*. *g.* 617. 113.  
 \* *Maculatus*. *g.* 617. 8.  
 \* *Maculifer*. *g.* 617. 52.  
 \* *Maurus*. *g.* 617. 41.  
 \* *Melancholicus*. *g.* 617. 47.  
 \* *Melanocardius*. *g.* 617. 54.  
 \* *Melanocephalus*. *g.* 617. 112.  
 \* *Memnonius*. *g.* 617. 72.  
 \* *Meridionalis*. *g.* 617. 70.  
 \* *Monilis*. *g.* 617. 89.  
 \* *Mutilatus*. *g.* 617. 69.  
 \* *Necydaloides*. *g.* 617. 111.  
 \* *Nigerrimus*. *g.* 617. 44.  
 \* *Nubilus*. *g.* 617. 76.  
 \* *Obsoletus*. *g.* 617. 23.  
 \* *Opacus*. *g.* 617. 68.  
 \* *Parumpunctatus*. *g.* 617. 67.  
 \* *Parvulus*. *g.* 617. 107.  
 \* *Perforatus*. *g.* 617. 12.  
 \* *Pertinax*. *g.* 617. 77.  
 \* *Piceus*. *g.* 617. 65.  
   *Placidus*. *g.* 617. 86,  $\beta$ .  
 \* *Planipennis*. *g.* 617. 40.  
 \* *Polygrammus*. *g.* 617. 48.  
 \* *Pulchellus*. *g.* 617. 28.  
 \* *Pumilus*. *g.* 617. 106.  
 \* *Punctatostriatus*. *g.* 617. 101.  
 \* *Pustulosus*. *g.* 617. 57.  
 \* *4-maculatus*. *g.* 617. 38.  
 \* *4-signatus*. *g.* 617. 35.  
 \* *4-vittatus*. *g.* 617. 108.  
 \* *Rectus*. *g.* 617. 120.  
 \* *Reticulaticollis*. *g.* 617. 90.  
 \* *Retusus*. *g.* 617. 93.  
 \* *Rimoratus*. *g.* 617. 21.  
 \* *Rusticus*. *g.* 617. 75.  
 \* *Sachari*. *g.* 617. 19.  
 \* *Sanguineus*. *g.* 617. 30.  
 \* *Saucius*. *g.* 617. 32.  
 \* *Sagi*. *g.* 617. 83.  
 \* *Schoenherri*. *g.* 617. 1.  
 \* *Senegalensis*. *g.* 617. 3.  
 \* *Sericans*. *g.* 617. 5.  
 \* *Sericeus*. *g.* 617. 25.  
 \* *Seriepunctatus*. *g.* 617. 94.  
 \* *Sierrakowskyi*. *g.* 617. 15.  
   *Signaticollis*. *g.* 617. 99,  $\beta$ .  
 \* *Sordidus*. *g.* 617. 60.  
 \* *Spadiceus*. *g.* 617. 34.  
 \* *Spinolæ*. *g.* 617. 10.  
 \* *Squamosus*. *g.* 617. 55.  
 \* *Stigmaticus*. *g.* 617. 53.  
 \* *Strangulatus*. *g.* 617. 109.

- \*Striatoforatus. *g.* 617. 4.  
 \*Striatus. *g.* 617. 74.  
 \*Subcarinatus. *g.* 617. 85.  
 \*Suturalis. *g.* 617. 31.  
 \*Terebrans. *g.* 617. 114.  
 \*Tetricus. *g.* 617. 82.  
 \*13-punctatus. *g.* 617. 27.  
 \*Truncatus. *g.* 617. 117.  
 \*Validirostris. *g.* 617. 14.  
 \*Variabilis. *g.* 617. 29.  
 \*Variegatus. *g.* 617. 24.  
 \*Venatus. *g.* 617. 119.  
 \*Zamiæ. *g.* 617. 110.  
 \*STRANGALIODES.  
 \*Aurosquamosus. *Mant. g.* 228.  
   2.  
 \*STROMBOSKERUS. *g.* 577.  
 \*Schüppeli. *g.* 597. 1.  
 \*STRONGYLOPTERUS. *g.* 559.  
 \*Dentipes. *g.* 559. 2.  
 \*Ovatus. *g.* 559. 1.  
 \*STRONGYLOTES. *g.* 470.  
 \*Brachialis. *g.* 470. 3.  
 \*Lemniscatus. *g.* 470. 1.  
 \*Squamans. *g.* 470. 2.  
 \*STROPHOSOMUS.  
 \*Hirtus. *Mant. g.* 126. 25-26.  
 \*Setulosus. *Mant. g.* 126. 25-26.  
 \*SYMPIEZOPUS. *g.* 575.  
 \*Aciculatus. *g.* 575. 1.  
 \*Cinctus. *g.* 575. 3.  
 \*Pauper. *g.* 575. 2.  
 \*TAPINOTUS. *g.* 581.  
 \*Sellatus. *g.* 581. 1.  
 \*TERAPOPOPUS. *Mant. g.* 267-  
   268.  
 \*Hottentottus. *Mant. g.*  
 THAMNOPHILUS.  
 Morosus. *g.* 489. 1.  
 Trucidatus. *g.* 469. 2.  
 \*TIMORUS. *g.* 568.  
 \*Suturalis. *g.* 568. 1.  
 \*TONEUTUS. *g.* 500.  
 \*Cucullus. *g.* 500. 1.  
 \*TRACHYMERUS. *g.* 496.  
 \*Croceoplagiatus. *g.* 496. 1.  
 \*TRAGOPUS. *g.* 544.  
 \*Asper. *g.* 544. 1.  
 \*Tuberosus. *g.* 544. 2.  
 \*TRAPHECORYNUS. *g.* 560.  
 \*Anxius. *g.* 560. 1.  
 \*Inæqualis. *g.* 560. 2.  
 TRICHOSOMUS.  
 Senex. *g.* 549. 6.  
 \*TRIGONOTARSUS. *g.* 605.  
 \*Calandroides. *g.* 605. 1.  
 \*TROPIDERES. *g.* 26.  
 \*Nasutulus. *Mant. g.* 26. 11-12.  
 \*TRYPETES. *g.* 463.  
 \*Guildini. *g.* 463. 2.  
 \*Rhinoïdes. *g.* 463. 1.  
 TYLODERES.  
 Porcellus. *g.* 546. 1.  
 \*TYLODES. *g.* 542.  
 \*Angulicollis. *g.* 542. 12.  
 \*Armadillo. *g.* 542. 2.  
 \*Armigerus. *g.* 542. 1.  
 \*Bullatus. *g.* 542. 13.  
 \*Ganglionicus. *g.* 542. 11.  
 Gayi. *g.* 540. 2.  
 \*Globosus. *g.* 542. 9.  
 \*Cranulatus. *g.* 542. 8.  
 \*Granulifer. *g.* 542. 6.  
 Humeralis. *g.* 540. 1.  
 \*Insubidus. *g.* 542. 3.  
 \*Laticollis. *g.* 542. 14.  
 \*Magnicollis. *g.* 542. 15.  
 \*Nodulosus. *g.* 542. 10.  
 Pæditus. *g.* 542. 3.  
 \*Rubetra. *g.* 542. 4.  
 Sellatus. *g.* 537. 2.  
 \*Subfasciatus. *g.* 542. 16.  
 \*Tuberculosus. *g.* 542. 7.  
 \*Uræus. *g.* 542. 5.

## TYLOMUS.

*Lineatocollis. g. 551. 5.*

\* *ULOSOMUS. g. 541.*

\* *Erinaceus. g. 541. 2.*

\* *Immundus. g. 541. 1.*

\* *Setosus. g. 541. 3.*

\* *ZYGOPS. g. 564.*

\* *Boisduvalii. g. 564. 30.*

\* *Buffo. g. 564. 6.*

\* *Cinctipes. g. 564. 11.*

\* *Disjunctus. g. 564. 7.*

*Furfuraceus. g. 565. 9.*

*Germari. g. 565. 2.*

\* *Hinnulus. g. 564. 26.*

\* *Histrio. g. 564. 13.*

\* *Hostia. g. 564. 2.*

\* *Jaspideus. g. 564. 20.*

\* *Ligatus. g. 564. 1.*

\* *Mexicanus. g. 564. 12.*

\* *Ochatinus. g. 564. 5.*

\* *Parvulus. g. 564. 19.*

\* *Pistor. g. 564. 15.*

\* *Pius. g. 564. 9.*

\* *Planulus. g. 564. 24.*

\* *Rubricollis. g. 564. 21.*

\* *Sanctus. g. 564. 3.*

\* *Scenicus. g. 564. 23.*

\* *Semialbus. g. 564. 28.*

\* *Signativentris. g. 564. 8.*

\* *Sobrinus. g. 564. 18.*

\* *Stigma. g. 564. 16.*

\* *Stigmaticus. g. 564. 25.*

\* *Strix. g. 564. 4.*

\* *Submaculatus. g. 564. 14.*

\* *Temporarius. g. 564. 22.*

\* *Tridentatus. g. 564. 27.*

\* *Vinulus. g. 564. 17.*

\* *Wiedii. g. 564. 10.*



# INDEX ALPHABETICUS

## GENERUM

# CURCULIONIDUM.



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Acalles</i>. <i>g.</i> 543.</li> <li>* <i>Acallopius</i>. <i>g.</i> 401.</li> <li>* <i>Acalyptus</i>. <i>g.</i> 419.</li> <li>* <i>Acantharinus</i>. <i>g.</i> 612.</li> <li>* <i>Acanthomerus</i>. <i>g.</i> 397.</li> <li>* <i>Acanthotrachelus</i>. <i>g.</i> 325.</li> <li>* <i>Acentrus</i>. <i>g.</i> 556.</li> <li>* <i>Aclees</i>. <i>g.</i> 352.</li> <li>* <i>Acorynus</i>. <i>g.</i> 20.</li> <li>* <i>Adelus</i>. <i>g.</i> 386.</li> <li>* <i>Adexius</i>. <i>g.</i> 256.</li> <li>* <i>Ædemonus</i>. <i>g.</i> 523.</li> <li>* <i>Ætherhinus</i>. <i>g.</i> 157.</li> <li>* <i>Agraphus</i>. <i>g.</i> 336.</li> <li>* <i>Alticopus</i>. <i>g.</i> 41.</li> <li>* <i>Alcides</i>. <i>g.</i> 468.</li> <li>* <i>Alophus</i>. <i>g.</i> 224.</li> <li>* <i>Amalactus</i>. <i>g.</i> 359.</li> <li>* <i>Amalus</i>. <i>g.</i> 412.</li> <li>* <i>Ambates</i>. <i>g.</i> 368.</li> <li>* <i>Amblyrhinus</i>. <i>g.</i> 287.</li> <li>* <i>Amerhinus</i>. <i>g.</i> 459.</li> <li>* <i>Amisallus</i>. <i>g.</i> 103.</li> <li>* <i>Amitrus</i>. <i>g.</i> 140.</li> <li>* <i>Amorbaius</i>. <i>g.</i> 591.</li> <li>* <i>Amorhocephalus</i>. <i>g.</i> 66.</li> <li>* <i>Amorphocerus</i>. <i>g.</i> 620.</li> <li>* <i>Amorphopus</i>. <i>g.</i> 84.</li> <li>* <i>Amphidees</i>. <i>g.</i> 236.</li> <li>* <i>Amphideritus</i>. <i>g.</i> 150.</li> <li>* <i>Amycterus</i>. <i>g.</i> 288.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Anacerastes</i>. LABR. et IMHOFF.<br/><i>nov. gen.</i> 38-39.</li> <li>* <i>Anæmerus</i>. <i>g.</i> 160.</li> <li>* <i>Analcis</i>. <i>g.</i> 531.</li> <li>* <i>Analotes</i>. <i>g.</i> 23.</li> <li>* <i>Anchonus</i>. <i>g.</i> 442.</li> <li>* <i>Anchylorhynchus</i>. <i>g.</i> 423</li> <li>* <i>Anisorhynchus</i>. <i>g.</i> 254.</li> <li>* <i>Anoplus</i>. <i>g.</i> 429.</li> <li>* <i>Anthobius</i>. <i>g.</i> 383.</li> <li>* <i>Anthonomus</i>. <i>g.</i> 394.</li> <li>* <i>Anthribus</i>. <i>g.</i> 32.</li> <li>* <i>Antlarhinus</i>. <i>g.</i> 87.</li> <li>* <i>Anypodactus</i>. <i>g.</i> 178.</li> <li>* <i>Aomus</i>. <i>g.</i> 310.</li> <li>* <i>Aonychus</i>. <i>g.</i> 530.</li> <li>* <i>Aoplocnemis</i>. <i>Mant. g.</i> 375-376.</li> <li>* <i>Aorus</i>. <i>g.</i> 361.</li> <li>* <i>Aphrastus</i>. <i>g.</i> 279.</li> <li>* <i>Apion</i>. <i>g.</i> 60.</li> <li>* <i>Apocyrtus</i>. <i>g.</i> 114.</li> <li>* <i>Apoderus</i>. <i>g.</i> 43.</li> <li>* <i>Aporhina</i>. <i>g.</i> 58.</li> <li>* <i>Apostacimerus</i>. <i>g.</i> 483.</li> <li>* <i>Apotamorhinus</i>. <i>g.</i> 492.</li> <li>* <i>Apotomoderes</i>. <i>g.</i> 195.</li> <li>* <i>Apotomus</i>. <i>g.</i> 195.</li> <li>* <i>Aprostoma</i>. GUÉRIN. <i>nov. gen.</i><br/>84-85.</li> <li>* <i>Aptolemus</i>. <i>g.</i> 275.</li> <li>* <i>Aracanthus</i>. <i>g.</i> 112.</li> </ul> |
|--|--|

- \* Arachnobas. *g.* 571.  
 \* Aræocerus. *g.* 40.  
 \* Arhines. *g.* 283.  
 \* Arrhenodes. *g.* 65.  
 \* Arthrostenus. *g.* 562.  
 \* Artipus. *g.* 170.  
 \* Astycus. *g.* 166.  
 \* Aterpus. *g.* 215.  
 \* Athrotomus. *g.* 464.  
 \* Atmetonychus. *g.* 161.  
 \* Attelabus. *g.* 44.  
 \* Aulacoderes. CHEVR. *nov. gen.*  
     83-84.  
 \* Auletes. *g.* 51.  
 \* Axinophorus. *g.* 613.  
 \* Bagous. *g.* 563.  
 \* Balanephagus. *g.* 427.  
 \* Balaninus. *g.* 408.  
 \* Baridius. *g.* 487.  
     Baris. *g.* 487.  
 \* Barycerus. *g.* 488.  
 \* Barynotus. *g.* 235.  
 \* Bastactes. *g.* 247.  
 \* Belopherus. *g.* 71.  
 \* Belopæus. *g.* 616.  
 \* Belorhynchus. *g.* 72.  
 \* Belus. *g.* 52.  
 \* Blaberus. *g.* 33.  
 \* Blosyrus. *g.* 131.  
 \* Borborecætes. *g.* 271.  
 \* Botanebius. *g.* 395.  
 \* Bothrobatus. *g.* 527.  
     Bothynoderes (olim). — Stirps  
     2a. *g.* 211.  
 \* Bothynorhynchus. *g.* 289.  
 \* Brachonyx. *g.* 387.  
 \* Brachyaspistes. *g.* 167.  
 \* Brachybamus. *g.* 380.  
 \* Brachycerus. *g.* 93.  
 \* Brachycnemis. *g.* 454.  
 \* Brachyderes. *g.* 141.  
 \* Brachypus. *g.* 346.  
 \* BRACHYRHYNCHI. LEGIO I.  
 \* Brachystylus. *Mant. g.* 279-280.  
 \* Brachytarsus. *g.* 11.  
 \* Bradybatus. *g.* 386.  
 \* Brenthus. *g.* 79.  
 \* Brotheus. *g.* 269.  
 \* Bruchus. *g.* 2.  
 \* Bustomus. *g.* 275.  
 \* Byrsopages. *g.* 225.  
 \* Byrsops. *g.* 265.  
     Calandra. *g.* 598.  
 \* Callinotus. *g.* 457.  
     Callizonus. *g.* 189.  
 \* Calodromus. *g.* 84.  
 \* Calyptops. *g.* 127.  
 \* Camarotus. *g.* 42.  
 \* Camptorhinus. *g.* 513.  
 \* Campyloscelus. *g.* 591.  
 \* Caranistes. *g.* 39.  
 \* Carpophagus. *g.* 1.  
     Carterus. *Grex* (olim).  
 \* Caryobori. *g.* 2. *Grex* 3.  
 \* Catachænus. *g.* 132.  
 \* Catalatus. *g.* 294.  
 \* Catamonus. *Mant. g.* 190-191.  
 \* Catapycnus. *g.* 508.  
 \* Catapyges. *g.* 619.  
 \* Catasarcus. *g.* 109.  
 \* Caterectus. *g.* 338.  
 \* Catergus. *g.* 337.  
 \* Cathormicerus. *g.* 300.  
 \* Catolethrus. *g.* 626.  
 \* Catoptes. *g.* 233.  
 \* Cetractes. *g.* 180.  
 \* Celetes. *g.* 479.  
 \* Celeuthetes. *g.* 328.  
 \* Centemeres. *g.* 421.  
 \* Centrinus. *g.* 490.  
 \* Ceocephalus. *g.* 74.  
 \* Cepurus. *g.* 251.  
 \* Cephalobarus. *g.* 75.  
 \* Cephalalges. *g.* 208.  
 \* Ceratopus. *g.* 353.  
 \* Cercidocerus. *g.* 609.  
 \* Cercopeius. *g.* 307.  
 \* Cerobatus. *g.* 67.  
 \* Ceuthorhynchus. *g.* 577.  
 \* Chætectetorus. *g.* 526.  
 \* Chalcodermes. *g.* 552.  
 \* Cherrus. *g.* 186.  
 \* Chilonus. *g.* 324.  
 \* Chirotenon. LABR. et IMM. nov.  
     *gen.* 19-20.  
 \* Chloebius. *g.* 343.

- \* Chlorophanus. *g.* 199.  
 \* Cholus. *g.* 451.  
 \* Choragus. *g.* 41.  
 \* Chrysolopus. *g.* 213.  
 \* Cionus. *g.* 586.  
 \* Cladeiterus. *g.* 309.  
 \* Cleogonus. *g.* 572.  
 \* Cleonus. *g.* 211.  
 \* Cloebius. *g.* 78.  
 \* Cnemargus. *g.* 516.  
 \* Cnemeccælus. *g.* 534.  
 \* Cnemidophorus. *g.* 366.  
 \* Cnemopactus. *g.* 411.  
 \* Cneorhinus. *g.* 125.  
 \* Cœliodes. *g.* 536.  
 \* Cœlogaster. *g.* 579.  
 \* Cœlosternus. *g.* 520.  
 \* Colabus. *g.* 365.  
 \* Colecerus. *g.* 138.  
 \* Coleomerus. *g.* 503.  
 \* Collabismus. *g.* 537.  
 Colobodes. *vide* Ithyporus. *g.* 561.  
 Compsus. *Grex* (olim).  
 \* Coniatus. *g.* 263.  
 \* Conocephalus. *g.* 604.  
 Conoderes. *vide* Conophorus.  
 \* Conophorus. *g.* 585.  
 \* Conorhinus. *g.* 420.  
 \* Conotrachelus. *g.* 553.  
 \* Copturus. *g.* 565.  
 \* Corrhæcerus. *g.* 36.  
 \* Corynophorus. *g.* 522.  
 \* Coryssomerus. *g.* 405.  
 Coryssopus. *Grex* (olim).  
 \* Cosmorhinus. *g.* 313.  
 \* Cossonus. *g.* 621.  
 \* Craspedotus. *g.* 475.  
 \* Cratoparis. *g.* 28.  
 \* Cratopus. *g.* 196.  
 \* Cratosomus. *g.* 506.  
 \* Crepidotus. *g.* 611.  
 Cryptops. *vide* Byræops.  
 \* Cryptorhynchus. *g.* 511.  
 \* Ctenomerus. *g.* 399.  
 \* Cyamobolus. *g.* 514.  
 \* Cybebus. *g.* 61.  
 \* Cycliscus. *g.* 316.  
 \* Cyclomus. *g.* 292.  
 \* Cycloteres. *g.* 440.  
 \* Cydianerus. *g.* 97.  
 \* Cylas. *g.* 89.  
 \* Cyliandrocerus. *g.* 493.  
 \* Cyliandrocorynus. *g.* 521.  
 \* Cyliandrorhinus. *g.* 259.  
 \* Cyphicerus. *g.* 285.  
 Cyphorhynchus (olim), *vide*  
 Conotrachelus.  
 \* Cyphus. *g.* 153.  
 Cyrtomon. *g.* 505.  
 \* Cyrtops. *g.* 136.  
 \* Cyrtotrachelus. *g.* 601.  
 \* Dactylocrepis. *g.* 495.  
 \* Decatophorus. LABR. et IMH.  
*nov. gen.* 16-17.  
 \* Dendropemon. *g.* 9.  
 \* Deracanthus. *g.* 122.  
 \* Derelomus. *g.* 477.  
 \* Dereodus. *g.* 159.  
 \* Dermatodes. *g.* 129.  
 \* Desmidophorus. *g.* 550.  
 \* Deuterocrates. LABR. et IMH.  
*Mant.* 16-17.  
 \* Diabathrarius. *g.* 207.  
 \* Diaphanops. *Mant.* *g.* 3-4.  
 \* Diaprepes. *g.* 188.  
 \* Diodyrhynchus. *g.* 50.  
 \* Dionychus. *g.* 455.  
 \* Dionymerus. *g.* 502.  
 \* Diurus. *g.* 73.  
 \* Dorosomus. *g.* 418.  
 \* Dorytomus. *g.* 374.  
 \* Dryophthorus. *g.* 631.  
 \* Ecelonerus. *g.* 10.  
 \* Echinocnemus. *g.* 416.  
 \* Elassonyx. *g.* 441.  
 \* Elleschus. *g.* 381.  
 \* Elliministes. *g.* 315.  
 \* Elythroxyton. *g.* 339.  
 \* Elytrurus. *g.* 326.  
 \* Embrites. *g.* 334.  
 \* Endæus. *g.* 432.  
 \* Enedreytes. *g.* 27.  
 \* Enteles. *g.* 517.  
 \* Entimus. *g.* 79.  
 \* Entyus. *g.* 200.

- \* Epagrius. *g.* 151.  
 \* Ephimerus. *g.* 422.  
 \* Epicærus. *g.* 244.  
 \* Epipedus. *g.* 274.  
   Epichthonius. *Grex* (olim).  
 \* Epipedorhinus. *g.* 509.  
 \* Epiphaneus. *g.* 323.  
 \* Epiphyllax. *g.* 592.  
 \* Epirrhynechus. *g.* 104.  
 \* Episomus. *g.* 291.  
 \* Episus. *g.* 91.  
 \* Eremnus. *g.* 320.  
 \* Erirhinus. *g.* 374.  
 \* Erepsimus. *Mant.* 138-139.  
 \* Erodiscus. *g.* 391.  
   Euanthes. *vide* Baridius.  
   Eublepharus. *vide* Lophotus.  
 \* Eucorynus. *g.* 12.  
 \* Euderes. *g.* 558.  
 \* Eudiagogus. *g.* 183.  
 \* Eudius. *g.* 202.  
 \* Euerges. *g.* 481.  
 \* Eugnamptus. *g.* 48.  
 \* Eugnathus. *g.* 181.  
 \* Eugnoristus. *g.* 608.  
 \* Eugonus. *g.* 13.  
 \* Eumycterus. *g.* 628.  
 \* Euops. *g.* 45.  
 \* Eupages. *g.* 267.  
   Euparius (olim). *g.* 28.  
 \* Eupholus. *g.* 226.  
 \* Eurhinus. *g.* 504.  
 \* Eurhynchus. *g.* 56.  
 \* Eurylobus. *g.* 221.  
 \* Eurymetopus. *g.* 148.  
 \* Euryssaces. *g.* 185.  
 \* Eussepes. *g.* 546.  
 \* Eusomus. *g.* 143.  
 \* Eustales. *g.* 191.  
 \* Eustylus. *g.* 280.  
 \* Eutecheus. *g.* 372.  
 \* Euthyrhinus. *g.* 518.  
 \* Eutoxus. *g.* 484.  
 \* Eutrachelus. *g.* 77.  
 \* Exophthalmus. *g.* 187.  
 \* Gasterocercus. *g.* 525.  
 \* Geonemus. *g.* 227.  
 \* Geotragus. *Mant.* *g.* 143-144.  
 \* Gonipterus. *g.* 206.  
   Graphorhinus. *g.* III. *vide* Epicærus.  
 \* Gronops. *g.* 217.  
 \* Grypidius. *g.* 395.  
 \* Gymnetron. *g.* 587.  
 \* Gymnognathus. *g.* 24.  
 \* Hadromerus. *g.* 175.  
 \* Hadropus. *g.* 154.  
 \* Hadrorhinus. *g.* 296.  
 \* Haplonyx. *g.* 466.  
 \* Haplopus. *g.* 209.  
 \* Harpacterus. *g.* 594.  
 \* Heilipus. *g.* 351.  
 \* Hephoboreus. *g.* 69.  
 \* Herpysticus. *g.* 139.  
 \* Heteropus. *g.* 549.  
 \* Hipporhinus. *g.* 101.  
 \* Holcorhinus. *g.* 317.  
 \* Holonychus. *g.* 117.  
 \* Homalocerus. *g.* 54.  
 \* Homalonotus. *g.* 461.  
 \* Homalorhinus. *g.* 123.  
 \* Hoplitopales. *g.* 402.  
   Hoploparochus. *g.* 349-350.  
     *vide* Acallopestes.  
   Hoploparoxus. *g.* 349-350.  
   Hydaticus. *g.* 428.  
 \* Hydronomus. *g.* 378.  
 \* Hylobius. *g.* 250.  
 \* Hyphantus. *g.* 346.  
 \* Hypocolobus. *g.* 272.  
 \* Hypomeces. *g.* 158.  
 \* Hypselus. *g.* 371.  
 \* Hypsomus. *g.* 447.  
 \* Hypsonotus. *g.* 219.  
 \* Ileonus. *g.* 347.  
 \* Ihipus. *g.* 358.  
   Isacantha. *g.* 52.  
 \* Ischnocerus. *g.* 19.  
 \* Ischnomerus. *g.* 82.  
 \* Ischnotrachelus. *g.* 174.  
 \* Isomerinthus. *g.* 327.  
 \* Isorhynchus. *g.* 482.  
 \* Ithycerus. *g.* 55.  
 \* Ithyporus. *g.* 561.  
 \* Laccoproctus. *g.* 369.  
   Lachnæus. *vide* Larinus.

- \* *Lachnopus*. *g.* 193.  
 \* *Læmosaccus*. *g.* 469.  
 \* *Lagopezus*. *g.* 18.  
   *Lagostomus*. *g.* 129.  
 \* *Lalagetes*. *g.* 302.  
 \* *Laparocerus*. *g.* 321.  
 \* *Larinus*. *g.* 348.  
   *Lasiopus*. *vide* *Hypsonotus*.  
 \* *Laiphronus*. *g.* 386.  
 \* *Lechriops*. *g.* 528.  
   *Leiopterus*. *vide* *Otidocephalus*.  
 \* *Leiosomus*. *g.* 255.  
 \* *Lembodes*. *g.* 548.  
   *Lepidophorus*. *vide* *Lophotus*.  
   *Leprosus*. *vide* *Astycus*.  
 \* *Leptops*. *g.* 229.  
 \* *Leptorhynchus*. *g.* 85.  
 \* *Leptoschoinus*. *g.* 494.  
   *Leptosomus*. *vide* *Rhadinosomus*.  
 \* *Lepyrus*. *g.* 248.  
 \* *Lignyodes*. *g.* 382.  
 \* *Limobius*. *nov. gen. vide* *Phytonomus dissimilis*.  
 \* *Lioplæus*. *g.* 232.  
 \* *Lissorhinus*. *g.* 168.  
 \* *Listroderes*. *g.* 222.  
 \* *Lithinus*. *g.* 231.  
 \* *Lithodus*. *g.* 264.  
 \* *Litocerus*. *g.* 16.  
 \* *Litomerus*. *g.* 453.  
 \* *Litorhynchus*. *g.* 602.  
 \* *Liturgus*. *g.* 473.  
 \* *Lixus*. *g.* 344.  
 \* *Lobetorus*. *g.* 308.  
 \* *Loboderes*. *g.* 501.  
 \* *Lobops*. *g.* 567.  
 \* *Lobotrachelus*. *g.* 576.  
 \* *Lonchophorus*. *g.* 409.  
 \* *Lophotus*. *g.* 216.  
 \* *Lordops*. *g.* 220.  
 \* *Lymantes*. *g.* 629.  
 \* *Lyprus*. *g.* 582.  
 \* *Lytorius*. *g.* 474.  
 \* *Macrocheirus*. *g.* 600.  
 \* *Macrocorynus*. *g.* 277.  
 \* *Macromerus*. *g.* 515.  
 \* *Macrops*. *g.* 284.  
 \* *Macropterus*. *g.* 197.  
 \* *Macrostylus*. *g.* 135.  
 \* *Macrotarsus*. *g.* 260.  
 \* *Madarus*. *g.* 485.  
 \* *Mæmactus*. *g.* 535.  
 \* *Madopterus*. *g.* 472.  
 \* *Magdalinus*. *g.* 364.  
 \* *Marmoropus*. *g.* 539.  
 \* *Mecinus*. *g.* 588.  
 \* *Mecocerus*. *g.* 15.  
 \* *Mecocorynus*. *g.* 519.  
 \* *Meconemus*. *LABR. et IMH. nov. gen.* 29-30.  
 \* *Mecopus*. *g.* 570.  
   \* *MECORHYNCHI*. *Leg. II.*  
 \* *Mecotarsus*. *g.* 17.  
 \* *Mecysmoderes*. *g.* 584.  
 \* *Megalometis*. *g.* 243.  
 \* *Megalostylus*. *g.* 149.  
 \* *Megaproctus*. *g.* 615.  
 \* *Megarhinus*. *g.* 407.  
   *Megaspistes*. *Grex (olim), vide* *Cleonus*.  
 \* *Megops*. *g.* 489.  
 \* *Menemachus*. *g.* 404.  
 \* *Merimnetes*. *g.* 330.  
 \* *Mesagroicus*. *g.* 172.  
 \* *Mesites*. *g.* 623.  
 \* *Mestorus*. *g.* 132.  
 \* *Metadopus*. *g.* 512.  
 \* *Metallites*. *g.* 204.  
 \* *Micotrogus*. *gen.* 413. *Grex 2<sup>o</sup>.*  
 \* *Microcerus*. *g.* 95.  
 \* *Micronyx*. *g.* 414.  
 \* *Microxylobius*. *g.* 630.  
 \* *Minyops*. *g.* 245.  
 \* *Mitrephorus*. *g.* 554.  
 \* *Molytes*. *g.* 252.  
 \* *Monius*. (*dele* *Panscopus*.) *g.* 431.  
 \* *Mononychus*. *g.* 538.  
 \* *Mylacus*. *g.* 304.  
 \* *Myllocerus*. *g.* 276.  
 \* *Myorhinus*. *g.* 449.  
 \* *Myrmacicellus*. *g.* 57.  
   *Nanodes*. *g.* 589.  
 \* *Nanophyes*. *g.* 589.  
 \* *Nanus*. *g.* 476.

- \*Nastus. *g.* 340.  
 \*Naupactus. *g.* 145.  
 \*Nemotrichus. *Dev. nov. gen. g.*  
   16-17.  
 \*Nerthops. *g.* 50.  
 \*Nertus. *g.* 471.  
 \*Nettarhinus. *g.* 460.  
 \*Notiodes. *g.* 379.  
   Notiophilus. *g.* 379.  
 \*Occytrachelus. *g.* 290.  
 \*Ocladius. *g.* 574.  
   Odontocnemis. *vide Deracanthus. g.* 122. *Stirps 2<sup>a</sup>.*  
 \*Odontocorynus. *g.* 499.  
 \*Odontomachus. *g.* 406.  
 \*Odontorhinus. *g.* 237.  
 \*Omias. *g.* 303.  
 \*Ommatolampus. *g.* 603.  
 \*Omophorus. *g.* 436.  
 \*Onchoscelis. *g.* 507.  
 \*Oncorhinus. *g.* 426.  
   Oosomus. *Grex (olim).*  
 \*Ophryastes. *g.* 110.  
 \*Ophthalmoborus. *g.* 383.  
 \*Orchestes. *g.* 438.  
 \*Orimus. *g.* 445.  
 \*Orobitis. *g.* 573.  
   Orthochætes. *g.* 443. *Grex 3.*  
   Orthognathus. *g.* 596.  
 \*Orthorhinus. *g.* 356.  
 \*Otidocephalus. *g.* 390.  
 \*Otiorrhynchus. *g.* 332.  
 \*Oxycorynus. *g.* 86.  
 \*Oxyderces. *g.* 156.  
 \*Oxyops. *g.* 205.  
 \*Oxyrhynchus. *g.* 92.  
 \*Pachnæus. *g.* 198.  
 \*Pacholenus. *g.* 345.  
 \*Pachycerus. *g.* 212.  
   Pachymeri. *Gen. 2. Grex 2<sup>a</sup>.*  
 \*Pachyonyx. *g.* 524.  
 \*Pachyrhynchus. *g.* 113.  
 \*Pachytrichus. *g.* 446.  
 \*Pandeleteius. *g.* 176.  
 \*Panscopus. *g.* 242. (431.)  
 \*Pantomerus. *g.* 144.  
 \*Pantopœus. *g.* 329.  
 \*Pantoplanes. *g.* 147.  
 \*Pantoteles. *g.* 557.  
 \*Parablops. *g.* 35.  
 \*Parallelosomus. *g.* 465.  
 \*Paramecopus. *g.* 362.  
   Pelocorhinus. *g.* 214. *vide Rhinaria.*  
 \*Peloropus. *g.* 402.  
 \*Peltophorus. *Mant. g.* 564-565.  
 \*Penestes. *g.* 377.  
 \*Pepiorges. *Mant. g.* 186-187.  
 \*Peribleptus. *g.* 389.  
 \*Perideræus. *g.* 462.  
 \*Peridinetus. *g.* 555.  
 \*Periorges. *g.* 268.  
 \*Perimachus. *g.* 11.  
 \*Peritelus. *g.* 306.  
 \*Perperus. *g.* 241.  
 \*Petalochilus. *g.* 425.  
 \*Phacecerus. *g.* 80.  
 \*Phacecorynes. *g.* 607.  
 \*Phacellobarius. *g.* 478.  
 \*Phacephorus. *g.* 164.  
 \*Phædropus. *g.* 100.  
 \*Phænithon. *g.* 37.  
 \*Phænomerus. *g.* 480.  
 \*Phaylomerinthus. *g.* 318.  
 \*Philernus. *g.* 415.  
 \*Phlæopemon. *g.* 8.  
 \*Phlæophagus. *g.* 624.  
 \*Phlæophilus. *g.* 21.  
 \*Phæotragus. *g.* 14.  
 \*Phlyctinus. *g.* 311.  
 \*Pholicodes. *g.* 322.  
 \*Phyllobius. *g.* 278.  
 \*Phyllotrox. *g.* 384.  
 \*Physomerus. *g.* 497.  
 \*Physothorus. *g.* 540.  
 \*Phytobius. *g.* 428.  
 \*Phytonomus. *g.* 261.  
 \*Phytophilus. *g.* 373.  
 \*Phytoscaphus. *g.* 342.  
 \*Phytotribus. *g.* 376.  
 \*Phyxelis. *g.* 301.  
 \*Piazomus. *g.* 142.  
 \*Piazorhinus. *g.* 433.  
 \*Piazurus. *g.* 566.  
 \*Piezocorynus. *g.* 34.  
 \*Piezoderes. *g.* 312.

- Piezonotus (olim), *vide* Isomerinthus.  
 \*Piezotrachelus. *g.* 59.  
 \*Pileophorus. *g.* 367.  
 \*Pinarus. *g.* 569.  
 \*Pissodes. *g.* 363.  
 \*Plastologus. *g.* 218.  
 \*Platyaspistes. *g.* 194.  
 \*Platycopes. *g.* 130.  
 \*Platymerus. *g.* 88.  
 \*Platyomus. *g.* 155.  
 \*Platyonyx. *g.* 498.  
 \*Platyrhinus. *g.* 29.  
 \*Platyfarsus. *g.* 134.  
 \*Platytrachelus. *g.* 286.  
 \*Plectrophorus. *g.* 146.  
 \*Plinthus. *g.* 257.  
 \*Polyclæus. *g.* 162.  
 \*Polycomus. *g.* 192.  
 \*Polycorynus. *g.* 38.  
 \*Polydachrys. *g.* 177.  
 \*Polyderces. *g.* 452.  
 \*Polydrosus. *g.* 203.  
 \*Polyphrades. *g.* 107.  
 \*Polyteles. *g.* 98.  
 \*Poophagus. *g.* 580.  
 \*Porophorus. *Mant. g.* 138-139.  
 \*Poropterus. *g.* 547.  
 \*Pororhynchus. *g.* 184.  
 \*Porpacus. *g.* 298.  
 \*Porthetes. *g.* 622.  
 \*Poteriophorus. *g.* 606.  
 \*Præpodes. *g.* 189.  
 \*Prionomerus. *g.* 396.  
 \*Prionopus. *g.* 398.  
 \*Pristimerus. *g.* 400.  
 \*Procas. *g.* 262.  
 \*Proeces. *g.* 627.  
 \*Proictes. *g.* 137.  
 \*Promecops. *g.* 186.  
 \*Prosayleus. *g.* 121.  
 \*Proscaplaladeres. *g.* 128.  
 \*Prospelatus. *g.* 165.  
 \*Prostomus. *g.* 118.  
 \*Protenomus. *g.* 169.  
 \*Protocerus. *g.* 599.  
 \*Protomantis. *g.* 94.  
 \*Protopalus. *g.* 510.  
 \*Prypnus. *g.* 230.  
 \*Psalidium. *g.* 115.  
 \*Pseudomus. *g.* 533.  
 \*Psomeles. *g.* 331.  
 \*Pteracanthus. *g.* 370.  
 \*Pterocolus. *g.* 47.  
 \*Pteroporus. *g.* 357.  
 Ptilopus. *g.* 193.  
 \*Ptochus. *g.* 297.  
 \*Ptychoderes. *g.* 7.  
 \*Pychnopus. *g.* 532.  
 Pycoderes. *Grex (olim).*  
 \*Pylarus. *g.* 467.  
 \*Pyrgops. *g.* 326-327.  
 \*Pyropus. *g.* 486.  
 \*Rhachiodes. *g.* 393.  
 \*Rhadinosomus. *g.* 210.  
 \*Rhamphus. *g.* 63.  
 \*Rhampyrhynchus. *g.* 70.  
 \*Rhigus. *g.* 96.  
 \*Rhina. *g.* 593.  
 \*Rhinaria. *g.* 437.  
 \*Rhinastus. *g.* 450.  
 \*Rhinocyllus. *g.* 349.  
 Rhinodes, *vide* Magdalinus.  
 \*Rhinomacer. *g.* 49.  
 \*Rhinoncus. *g.* 578.  
 \*Rhinotia. *g.* 53.  
 \*Rhyephenes. *g.* 540.  
 \*Rhynchites. *g.* 46.  
 \*Rhynchophorus. *g.* 598.  
 \*Rhyncolus. *g.* 625.  
 \*Rhyparophilus. *Mant. g.* 107-108.  
 \*Rhyparosomus. *g.* 223.  
 \*Rhyssocarpus. *g.* 120.  
 \*Rhyssomatus. *g.* 551.  
 \*Rhyticephalus. *g.* 76.  
 \*Rhytidophlæus. *g.* 246.  
 \*Rhytidosomus. *g.* 583.  
 \*Rhytirhinus. *g.* 270.  
 \*Scambus. *g.* 491.  
 \*Scaphophorus. *g.* 610.  
 \*Sciaphilus. *g.* 133.  
 \*Sciobius. *g.* 319.  
 \*Sclerococcus. *g.* 201.

- \* Sclerocomus. *g.* 456.  
 \* Scleropterus. *g.* 545.  
 \* Scotasmus. *g.* 258.  
 \* Scotæborus. *g.* 293.  
 \* Scytropus. *g.* 179.  
   Sibinia. *g.* 417.  
 \* Sibynes. *g.* 417.  
 \* Siderodactylus. *g.* 173.  
 \* Sintor. *g.* 5.  
 \* Sipalus. *g.* 595.  
 \* Siteytes. *g.* 335.  
   Sitona. *g.* 171.  
 \* Sitones. *g.* 171.  
 \* Sitophilus. *g.* 618.  
 \* Smicronyx. *g.* 414.  
 \* Solenopus. *g.* 458.  
   Solenosternus (olim), *vide* Baridius.  
 \* Somatodes. *g.* 105.  
 \* Spartecerus. *g.* 272.  
 \* Spermalogus. *g.* 424.  
 \* Spermophagus. *g.* 3.  
 \* Sphadasmus. *g.* 505.  
   Sphæromus. *g.* 328.  
 \* Sphenocorynes. *g.* 614.  
 \* Sphenognathus. *g.* 596.  
 \* Sphenophorus. *g.* 617.  
 \* Stenocerus. *g.* 22.  
 \* Stenocorynus. *g.* 168.  
   Stenopelmus. *lege* Monius. *g.* 431.  
 \* Stenotarsus. *g.* 102.  
 \* Steremnius. *g.* 355.  
 \* Sternechus. *g.* 434.  
 \* Stigmatrachelus. *g.* 152.  
 \* Stomodes. *g.* 308.  
 \* Storeus. *g.* 410.  
 \* Strangaliodes. *g.* 228.  
   Strenes. *g.* 444. *Grex* 2<sup>a</sup>.  
 \* Stromboscerus. *g.* 597.  
 \* Strongylopterus. *g.* 559.  
 \* Strongylotes. *g.* 470.  
 \* Strophosomus. *g.* 126.  
 \* Styliscus. *g.* 282.  
 \* Styphlus. *g.* 443.  
 \* Sympiezopus. *g.* 575.  
 \* Sympiezorhynchus. *g.* 314.  
 \* Synthocus. *g.* 266.  
 \* Systaltocerus. *DEJ. nov. gen.* 28-29.  
 \* Syzygops. *g.* 116.  
   Tachyerges. *g.* 438. *Grex* 2<sup>a</sup>.  
 \* Tachygonus. *g.* 64.  
 \* Tanaos. *g.* 62.  
 \* Tanymecus. *g.* 103.  
 \* Tanyrhynchus. *g.* 448.  
 \* Tanysphyrus. *g.* 249.  
 \* Taphroderes. *g.* 83.  
 \* Tapinotus. *g.* 581.  
 \* Technites. *g.* 439.  
 \* Teramocerus. *g.* 81.  
 \* Terapopus. *Mant. g.* 267-268.  
 \* Thamnobius. *g.* 430.  
   Thamnophilus, *vide* Magdalinus. *g.* 364.  
 \* Thylacites. *g.* 124.  
 \* Timorus. *g.* 568.  
 \* Tophoderes. *g.* 6.  
 \* Torneates. *g.* 500.  
   Toxephorus. *g.* 392.  
   Toxeres (olim), *vide* Centrinus.  
 \* Toxeutes. *g.* 392.  
 \* Trachelizus. *g.* 68.  
 \* Trachodes. *g.* 444.  
 \* Trachymerus. *g.* 496.  
 \* Trachyphlœus. *g.* 299.  
 \* Tragopus. *g.* 544.  
 \* Tranes. *g.* 60.  
   Traphecorynus. *g.* 560.  
 \* Trigonotarsus. *g.* 605.  
 \* Tropideres. *g.* 26.  
 \* Tropiphorus. *g.* 240.  
 \* Tropirhinus. *g.* 190.  
 \* Trypetes. *g.* 463.  
 \* Trysibius. *g.* 253.  
 \* Tychius. *g.* 413.  
 \* Tyloderes. *g.* 333.  
 \* Tyloides. *g.* 542.  
 \* Tyloinus. *g.* 435.  
 \* Ulocerus. *g.* 99.  
 \* Ulosomus. *g.* 541.  
 \* Urodon. *g.* 4.  
 \* Uterosomus. *g.* 25.  
 \* Xenocerus. *g.* 31.  
 \* Xylinades. *g.* 30.  
 \* Zygons. *g.* 564.



# CORRIGENDA ET ADDITAMENTA

AD

## GENERA ET SPECIES CUREULIONIDUM.

### TOMUS SEPTIMUS. — PARS SECUNDA.

Pag.	lin.		Pag.	lin.	
4,	31,	178. <i>lege</i> 198.	94,	81,	<i>pone</i> lin. 31 <i>adde</i> : —
9,	5,	♂♂ <i>lege</i> ♂♀			<i>Hujus op.</i> III. p.
12,	15,	<i>idem</i> corrig.			211. 62. — <i>P.</i> Bra-
14,	11,	<i>idem</i> corrig.			silia.
16,	11,	Europa <i>lege</i> <i>P.</i> Eu-	97,	29,	194. <i>lege</i> 198.
		ropa	101,		penult. <i>deleatur</i> E
23,	14,	54. <i>lege</i> 55.	110,	<i>pone</i> lin. 24 <i>adde</i> : <i>Huj.</i>	
—	18,	52. <i>lege</i> 58.			<i>op.</i> III. p. 210. 63.
25,	17,	DEPRESSIROSTRIS. <i>lege</i>			— <i>P.</i> Rio-Janeiro.
		DEPRESSIFRONS.	119,	15,	97. <i>lege</i> 47.
33,	15,	<i>pone</i> asteriscum.	—	16-17,	<i>adde</i> : <i>Heilipus con-</i>
42,	27,	BESCHE. <i>lege</i> BESCHE.			<i>finis.</i> <i>DET. Cat.</i> ed. 2.
49,		penult. Brasilia. <i>lege</i> Ca-			p. 274. ed. 3. p. 297.
		yenna.	—	17,	<i>referendi sunt; species, etc.</i>
54,	14,	punctulatum, <i>lege</i>			<i>lege referendæ sunt</i>
		punctatum,			<i>species, etc.</i>
—	29,	163. <i>lege</i> 193.	135,	25-26,	articulis lenticula-
57,	5,	flavescentibus <i>lege</i>			ribus, <i>lege</i> articu-
		fulvescentibus			lis..... lenticula-
60,	17,	dimidio <i>lege</i> medio	136,	9,	<i>adde</i> : Sibiria.
64,	23,	angustatus, <i>lege</i> an-	138,		not. lin. 1, Synonymon <i>lege</i>
		gustatus,			Synonymon
75,	19,	Brasilia. <i>lege</i> Cayenna.	143,	21,	Brasilia. <i>lege</i> Saxonia.
78,	24,	<i>idem</i> corrig.	145,	31,	<i>dele</i> : spec. 28. M.
79,		ult. Extat <i>lege</i> Exstat			MOROSUS. — <i>vide</i> :
89,	22,	<i>dele</i> : H. ROESELII, etc.			gen. 489. MEGOPS
		— <i>Adde</i> : <i>vide</i> <i>Péridi-</i>			MOROSUS. <i>Huj. op.</i>
		<i>netus maculatus.</i> <i>Huj.</i>			VIII. p.
		<i>op.</i> IV. p. 471. 3. et	150,	ult.	<i>adde</i> : <i>Patria</i> : Cayenna.
		VIII. II. p.	154,	13,	f. 5. <i>lege</i> f. 1.
91,	28,	lateribus <i>lege</i> latera-	158,	17,	angustatum, <i>lege</i> an-
		libus			gustum,
			—	33,	ovalis, <i>lege</i> ovali,

- Pag. lin.  
 163, 27, *ante 3. pone* ♂♀  
 — ult. *adde*: Dauria Sibiriae.  
 167, 2, meridionalis. *lege intermedia*.  
 168, 30, Europa. *lege Europa borealis et intermedia*.  
 169, 2, *idem corrig.*  
 — 11, *idem corrig.*  
 171, 11, 73-85. *lege 73-25*.  
 173, 18, *Ins. lege Fauna*.  
 187, 1, 321. *lege 322*.  
 — 23-24, *adde*: Patria: Anglia, Gallia, Germania, Suecia, Lapponia.  
 189, ante-penult., familia *lege familiam*  
 192, 19, 1° longo, . . . : 2°, *lege 2° longo, .. 1°*,  
 195, ante-penult., *pro eadem specie lege eadem species*  
 199, 30, paucissime *lege parcissime*  
 202, 13-14, *adde*: Patria: Brasilia.  
 209, 1, tuberculatus, *lege tubulatus*,  
 210, penult. alio *lege alii*  
 212, 9, *referendi sunt; species lege referendae sunt species*  
 — 12, RACHIODES. *lege RHACHIODES*.  
 217, 29, *pone striolato*, *adde rugoso*  
 — 29-30, *dele striolato*  
 220, 5, facile *lege sub*  
 — 35, 3. *lege III*.  
 221, penult., loc. cit. *lege Lapponia*.  
 223, 36, *ante 22. pone asteriscum*.  
 225, 30, *Nanode lege Nanophye*
- Pag. lin.  
 229, 14, lotiora, *lege latiora*,  
 232, 6, *pone Europa. adde*: Dauria, Caucasus.  
 — 22, occidentales. *lege occidentalis*.  
 237, 17, *mucronato lege macromalo*  
 247, 34-35, *adde*: *Camptocheirus hispoides*. DEJ. *Cat. ed. 3. p. 303*.  
 — penult., America borealis. *lege Brasilia*.  
 252, penult., *On. lege Om*.  
 253, 32, *idem corrig.*  
 260, 4, *H. os. lege H. op*.  
 266, 5, *Y. lege J*.  
 — 7, *Tichii lege Tychii*  
 268, 1, *Y. lege J*.  
 271, 4, nisi *lege non nisi*  
 272, 15, } *Y. lege J*.  
 273, 12, }  
 279, 21, *intermedia. adde et meridionalis*.  
 283, 11, 14. *lege 12*.  
 — 23, 326. *lege 386*.  
 — 14-15, *adde*: *Curculio undulatus*. HERBST. *Col. VI. p. 40. T. 92. f. 8*.  
 288, 33, basin *lege thoracis basin*  
 289, 26, *adde Dauria*.  
 291, 14, flavo, griseo *lege flavo-griseo*  
 298, 18, *post Europa adde*: borealis et intermedia.  
 301, 1, 1-23. *lege 9-23*.  
 303, 18, 76. *lege 56*.  
 309, 42, Hungaria. — *adde?*  
 313, ult. 128. *lege 188*.  
 317, 19, *Sybines lege Sibynes*  
 320, 1, minentia, *lege minentes*,  
 — penult., brunneo-limbo *lege brunneo, limbo*

- | Pag. lin. |  | Pag. lin.   |  |
|-----------|--|---|--|
| 323, 25,  | angustis, lege congestis,  | — 34,   | } <i>arca lege arca</i>                                  |
| 324, 35,  | <i>Sibynia</i> lege <i>Sibinia</i>   | 339, 4,   |  |
| 327, 14,  | DERASOMUS. lege DORASOMUS.   | — 22,   |  |
| 328, 3,   | <i>Sibynia</i> lege <i>Sibinia</i>   | 340, 21,  |  |
| 331, 13,  | extrorsum, lege exsertum,  | 348, 26,  | peristhalio lege peristhalio                             |
| 332, 16,  | (Schh.) lege (Fabr.)   | 351, 23,  | PANSCOPUS. lege MONIUS.                                  |
| — 20-21,  | adde : <i>Rhynchaen.</i> id. FABR. <i>Syst. Eleuth.</i> II. p. 1470. 154. — OLIV. <i>Ent.</i> V. 83. p. 205. 193. T. 14. f. 170. — <i>Curculio</i> id. FABR. <i>Ent. Syst.</i> I. II. p. 430. 152. — <i>Mant.</i> I. p. 106. 111. — <i>Spec. Ins.</i> I. p. 176. 87. — <i>Syst. Ent.</i> p. 138. 62. — HERBST. <i>Col.</i> VI. p. 466. 474. T. 94. f. 12. a. b. — OLIV. <i>Enc. Méth.</i> V. p. 509. 173. — LINN. <i>Syst. Nat.</i> *ed. GMEL. I. IV. p. 1763. 226. — <i>Curculio ovalis.</i> DRURY. <i>Illustr.</i> II p. 60. T. 33. f. 1. 2. | — Not. 1, πάνσχοπος, etc. lege μονός, solitarius. |  |
| 333, 16,  | pallaceo-lege paleaceo-  | 353, 6,   | 246. lege 1.   |
| — 21,     | 461. lege 451.   | 361, 21,  | <i>Cleogomus</i> lege <i>Cleogonus</i>                   |
| 335, 2,   | pallaceo- lege paleaceo-   | 370, 3,   | DUMER. lege CUVIER.                                      |
| — 8,      | vero lege vere   | — 7,  | 28. lege 26.   |
| 337, 24,  | } <i>Phytonomo</i> lege  | — 14,   | 386. lege 356.   |
| — 34,     |  | } <i>Phytonomo</i>                                | 372, 25-26,  |
| 338, 28,  | 296. lege 286.   |   | 374, 4,  |
| — 29,     | ONCHORHINUS. lege ONCORHINUS.  | — 9,  | alata, lege allatam,                                     |
|           | <i>Obs.</i> — Ex. ὄγρος, gravitas, amplitudo.  | — 30,   | indentate lege indentitate                               |
|           |  | 375, 6,   | adde : Dauria.   |
|           |  | 381, 20,  | meridionalis. lege borealis.                             |
|           |  | 383, 20-21,                                       | adde : COHORS II. EXSCUTELLATI. APTERI. (Genus 440-449.) |
|           |  | 389, 5,   | elevationibus lege elevationibus                         |
|           |  | — 17,   | 1 3/4 lege 1 1/4   |
|           |  | 391, ult,   | profundius lege profundius                               |
|           |  | 394, 2,   | rieibus tribus lege rietres                              |
|           |  | — 12,   | 1/4 lege 1 1/4   |
|           |  | 397, 3,   | denudata. lege lateribus denudata.                       |
|           |  | — 16,   | lat. 172 lege lat. 1 172                                 |
|           |  | 398, 27,  | rogosis, lege rugosis,                                   |
|           |  | 399,  | penult. fundo lege fundæ                                 |
|           |  | 400, 13,  | teribus lege teralibus                                   |
|           |  | 407, 9,   | vere lege vero   |
|           |  | 409, 31,  | ferrulatis; lege serrulatis;                             |

Pag. lin.	Pag. col. lin.
413, 25, T. BIGUTTATUS. — Hæc species e serie nominum delenda, et cum <i>Hipporhino pygmeovar.</i> β. I. p. 407. 6. et V. p. 776. 50. conjungenda.	429, 2, 12, DERASOMUS. lege DORASOMUS.
416, 22, T. COSTIROSTRIS. — Genus <i>Hipporhinus</i> , certe.	433, 1, 13, 2. lege 15.
— 29, WALBERG. lege WAHLBERG.	— 1, 26, 341. lege 351.
Pag. col. lin.	— 2, 12, 45, lege 65.
425, 2, 8, <i>Macromatus.</i> lege <i>Macromalus.</i>	437, 2, 6, 87. lege 84.
427, 2, 3-4, adde : CAMPTOCHEIRUS HISPOIDES. g. 396. 9.	440, 1, 25, 91. lege 11.
428, 2, 40-41, adde : ovalis. g. 422. 1.	441, 2, 8, 438. 8. lege 438. 36.
— 1, 25-26, adde : undulatus. g. 408. 20.	— — 9, 438. 36. lege 438. 8.
429, 1, 14-15, adde : sexguttatus. g. 422. 1.	448, 2, penult. RACHIODES. lege RHACHIODES.
	450, 1, 17-18, adde : sexguttatus. g. 422. 1.
	454, 2, 29, dele a.
	458, 1, 21, 22. lege 21.
	— 2, 19, orientalis, lege occidentalis,
	460, 1, 29, 86. lege 386.
	— 2, 12, <i>bimaculus.</i> lege <i>bimaculatus.</i>

## TOMUS OCTAVUS. — PARS PRIMA.

Pag.	lin.	Pag.	lin.
3,	32,	porro	<i>lege</i> poro
4,	20,	antice,	<i>vix lege</i> antice
			<i>vix</i>
—	31,	ex-	<i>lege</i> an-
9,	17,	β.	<i>lege</i> a.
11,	11,	introrsum	<i>lege</i> extror-
			sum
19,	2,	509.	<i>lege</i> 589.
—	3,	580.	<i>lege</i> 583.
20,	34,	bi-si-	<i>lege</i> sub si-
24,	ult.	3.	<i>lege</i> ed. 3.
32,	29,	* 10.	<i>lege</i> 9.
35,	15,	porroque	<i>lege</i> poro-
			que
—	ult.,	23.	<i>lege</i> 83.
40,	36,	ferrugineis;	<i>lege</i> san-
			guineis;
45,	22,	} Y.	<i>lege</i> J.
57,	10,		
66,	11,	fasciæ	mediæ, <i>lege</i>
			fascia media,
73,	6-7,	adde:	<i>Patria</i> : Ame-
			rica borealis.
77,	16,	interiori.	<i>lege</i> inte-
			rior.
86,	15,	breve,	<i>lege</i> læve,
—	30,	ferrugineo;	<i>lege</i> san-
			guineo;
98,	31,	287.	<i>lege</i> 284.
99,	6,	arcuatum,	<i>lege</i> cur-
			vatum,
101,	5,	BARIDIDES.	<i>lege</i> (BA-
			RIDIDES.)
114,	13,	283.	<i>lege</i> 287.
115,	30,	Brasilia.	<i>lege</i> Rio de
			la Plata.
118,	17,	atum,	<i>lege</i> latum,
135,	18,	vix postica	<i>lege</i> postica
			vix
148,	33,	673.	<i>lege</i> 679.
154,	27-28,	adde:	<i>Patria</i> : Pen-
			sylvania.
157,	31,	81.	<i>lege</i> 61.
106,	2,	testaceis;	<i>lege</i> castaneis;
183,	8,	ante 28.	adde p. 145.
212,	22-23,	adde:	<i>Patria</i> : Rio
			Janeiro.
215,	9,	deleatur	parce
219,	penult.	25.	<i>lege</i> 35.
224,	17,	Rhumbicus,	<i>lege</i> Rhom-
			bicus,
227,	12,	fascia	<i>lege</i> supra
231,	2,	squamoso,	<i>lege</i> squa-
			mosus,
239,	6,	II.	<i>lege</i> III.
—	33,	Rhumbicus,	<i>lege</i> Rhom-
			bicus,
253,	27,	} rhumbicus,	<i>lege</i> rhom-
255,	10,		
257,	1,	} Rhumbicus,	<i>lege</i>
262,	3,		
—	14,		
263,	13,		
270,	24,	dimido	<i>lege</i> dimidio
278,	28,	deleatur	ferrugineo,
284,	1,	309.	<i>lege</i> 809.
286,	8,	arcu	<i>lege</i> area
287,	11,	arcu	<i>lege</i> area
291,	10,	} Y.	<i>lege</i> J.
292,	8,		
293,	1,	S. INCALLIDUS.	— Ge-
			nus LOBOTRA -
			CHELUS associend.
—	6,	Y.	<i>lege</i> J.
295,	ult.	arcuato,	<i>lege</i> elevato,
304,	28,	Brasilia.	<i>lege</i> Ameri-
			ca meridionalis.
306,	14-15,	antrorsum	<i>lege</i> in-
			trorsum
307,	13,	rhumbica,	<i>lege</i> rhom-
			bea,
—	18,	ungulo	<i>lege</i> cingulo
325,	1,	23.	<i>lege</i> 83.
334,	21,	auobus,	<i>lege</i> duobus,
339,	ult.	adde:	<i>Patria</i> : Rio
			Janeiro.

Pag.	lin.		Pag.	lin.	
342,	ult.	} loco citato <i>lege</i> loc. cit.	402,	13,	p. 1-5. <i>lege</i> f. 1-5.
345,	1,		405,	6,	<i>pædibus</i> . <i>lege</i> <i>pæditus</i> .
—	5,		412,	35,	<i>variegatis</i> , <i>lege</i> <i>variegati</i> ,
—	11,				413, 22, <i>deleatur</i> <i>fere</i>
—	23,				421, 15, <i>niger</i> , <i>piceus</i> , <i>lege</i> <i>nigro-piceus</i> ,
352,	30,	ALBIFRONS. <i>lege</i> NIVEIFRONS.			429, 33, <i>elevato</i> ; <i>lege</i> <i>clavato</i> ;
357,	3,	<i>rhumbicus</i> , <i>lege</i> <i>rhombicus</i> ,			430, 20, <i>scutellum</i> <i>lege</i> <i>scutello</i>
384,	32,	<i>καίτη</i> , <i>κτήτως</i> , <i>lege</i> <i>καίτη κτήτωρ</i> ,			Pag. col. lin.
396,	23,	<i>Schh.</i> <i>lege</i> <i>Ghl.</i>	439,	2,	12, p. 34. <i>lege</i> p. 311.

## TOMUS OCTAVUS. — PARS SECUNDA.

Pag.	lin.		Pag.	lin.	
4,	10,	<i>regulari</i> <i>lege</i> <i>irregulari</i>	94,	2,	32. <i>lege</i> 392.
9,	19,	Missiouri, <i>lege</i> Missouri,	136,	32,	<i>piliformibus</i> , <i>lege</i> <i>setiformibus</i> ,
15,	25,	<i>nigri</i> , <i>brunnei</i> ; <i>lege</i> <i>nigro-brunnei</i> ;	138,	12,	Tota. Eur. <i>lege</i> Tota Europa.
47,	8,	<i>non-elevatis</i> , <i>lege</i> <i>non elevatis</i> ,	144,	14,	Nastursium. <i>lege</i> Nasturtium.
71,	12,	<i>tamen</i> <i>lege</i> <i>temere</i>	149,	5,	<i>Ins. Spec.</i> <i>lege</i> GERM. <i>Ins. Spec.</i>
74,	14,	<i>pinosis</i> . <i>lege</i> <i>spinosis</i> .	—	14,	UROLEUCUS. <i>lege</i> UROTEUCUS.
—	23,	<i>ovata</i> , <i>lege</i> <i>obovata</i> ,	150,	14,	30. <i>lege</i> 130.
75,	9,	<i>cor?</i> <i>lege</i> <i>an?</i>	153,	25,	<i>impressis</i> , <i>lege</i> <i>imprimis</i> ,
—	14,	Missari, <i>lege</i> Missouri,	—	31,	Sicilia. <i>lege</i> Sicilia forte?
77,	29,	<i>Rhynchaenus</i> <i>lege</i> <i>Rhynchaenus</i>	154,	3,	587. <i>lege</i> 567.
—	35,	PETROSUS. <i>lege</i> PETRO.			
79,	29,	<i>Faun.</i> <i>lege</i> <i>Fenn.</i>			
88,	penult.	<i>quadri-</i> , <i>antica</i> <i>lege</i> <i>quadri antica</i>			