

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
DE FRANCE

Natura maximè miranda in minimis.

Quatrième série.

TOME QUATRIÈME

PARIS

AU BUREAU DU TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ
rue Saint-Placide, 50 (Faub. S^t-Germain).

—
1864

DESCRIPTION

DE

Trois nouvelles espèces de NANOPHYES,

Par M. le docteur CH. AUBÉ.

(Séance du 27 Avril 1864.)

1. NANOPHYES CIRCUMSCRIPTUS.

Ovatus, testaceus; vix pubescens, pectore postice abdomineque nigris. Thorace leviusculo. Elytrorum sutura, margine interstitiisque tertio, quinto et septimo ad basin breviter nigris. Tibiis in medio vage tarsisque infuscatis. Femoribus bidentatis. — Long. 2 1/4 mill.

Ovale, testacé, à peine pubescent, noirâtre. Tête marquée d'une tache plus ou moins apparente de chaque côté, en arrière des yeux; rostre assez long, légèrement arqué, noir, strié et réticulé, avec une carène étroite au milieu; la massue des antennes très longue et noirâtre. Corselet presque lisse, sans ponctuation appréciable. Élytres ayant la suture, toute la bordure et trois petites taches linéaires à la base des troisième, cinquième et septième intervalles noires; elles sont striées-ponctuées, les intervalles assez convexes et granuleux. La partie postérieure de la poitrine et l'abdomen noirs. Les pattes avec un anneau au milieu des tibia et l'extrémité des articles des tarse rembrunies; les cuisses armées de deux petites dents inégales, l'externe plus petite, tuberculiforme.

Il est à peu près de la forme de l'*hemisphericus*, dont il diffère certainement par sa taille un peu plus grande, sa coloration, le défaut de ponctuation sur le corselet et aussi par la longueur plus grande de la massue des antennes.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cet insecte, l'un que j'ai pris moi-même ces jours-ci en fauchant dans un pré aux environs de Crépy-en-Valois ; le second fait partie de la riche collection de M. Reiche.

2. NANOPHYES GENICULATUS.

Ovatus, niger, pallido-pubescens, nitidulus, antennis basi, pedibus geniculis exceptis elytrorumque disco testaceis. Femoribus bispinosis. — Long. 4 à 4 3/4 mill.

Il est ovalaire, un peu raccourci, d'un noir assez brillant et couvert d'une pubescence grisâtre très lâche. Tête couverte de points très fins ; rostre assez long, très légèrement arqué, ayant en dessus deux sillons longitudinaux et une carène étroite au milieu ; les antennes testacées à la base. Corselet couvert de points assez forts et écartés. Élytres striées-punctuées, les intervalles peu relevés, à peine visiblement réticulés, presque lisses ; le disque est testacé dans une étendue plus ou moins grande ; la tache testacée triangulairement échancrée en avant avec quelques petites macules noirâtres disséminées irrégulièrement ; la suture et l'extrémité sont aussi plus ou moins rembrunies. Pattes testacées, avec les genoux noirs et le dernier article des tarsi ainsi que les ongles rembrunis ; les cuisses armées de deux petites dents épineuses inégales, l'externe plus courte.

Il a la plus grande analogie avec certaine variété du *Lythri* dont il diffère cependant par une taille un peu plus petite, une forme plus raccourcie la couleur des pattes qui sont testacées avec les genoux noirs et surtout par les cuisses bidenticulées, tandis que ces organes sont mutiques dans le *Lythri*.

Cet insecte, confondu dans quelques collections avec le *Nanophyes Lythri*, doit être assez répandu. J'ai vu des sujets de Paris, du centre de la France, de Lyon, de Savoie et des Pyrénées. J'en possède moi-même quatre exemplaires.

3. NANOPHYES RUBENS.

Breviter ovatus, rufo-sanguineus, nitidulus, pallido-pubescens. Capite, rostro apice, maculis duabus in thorace, abdomine tarsisque plus minusve nigricantibus. Elytris forte striato-punctatis, vittis duabus vix conspi-

cuis, singulis iufuscato-maculatis. Femoribus bidentatis. — Long. $\frac{3}{4}$ à 1 mill.

Brièvement ovalaire, d'un rouge assez vif et légèrement brillant ; il est couvert d'une pubescence très légère. Tête un peu rembrunie, couverte de points très fins ; le rostre est brunâtre dans sa moitié antérieure, luisant et couvert de très petits points très écartés et à peine visibles. Corselet couvert de points enfoncés assez forts et assez serrés, orné en dessus et de chaque côté d'une petite tache noirâtre arrondie. Élytres ovalaires, assez courtes, convexes et marquées de stries profondes assez fortement ponctuées ; les intervalles assez convexes et réticulés ; elles offrent de chaque côté, au delà du milieu et un peu en dehors, deux taches linéaires un peu plus foncées et très vaguement indiquées ; la suture est également très légèrement rembrunie. La poitrine en arrière et l'abdomen dans toute sa partie antérieure noirs. Pattes testacées, les tarses légèrement rembrunis et les cuisses armées de deux petites dents inégales, l'externe beaucoup plus petite.

Il a la plus grande analogie avec le *tetrastigma* pour la taille, la forme et la ponctuation du rostre et la maculature du corselet, mais il en diffère par sa couleur rouge ferrugineuse assez vive, l'abdomen, à l'exception du dernier segment noir et les cuisses armées de deux petites dents. La maculature des élytres est extrêmement vague et à peine perceptible.

Je possède deux exemplaires de cet insecte et M. Grenier deux autres, tous quatre provenant des environs de Narbonne.

