

ENTOMOLOGISCHE  
B E Y T R Ä G E  
z u  
DES RITTER LINNE'  
ZWÖLFTE AUSGABE  
DES NATURSYSTEMS

v o n

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE

Pastor an der Kirche S. Blasii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede  
der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, und  
der Herzoglichen deutschen Gesellschaft  
in Helmstädt.



ERSTER THEIL.

---

*Leipzig,*

bey Weidmanns Erben und Reich. 1777.

de Geer Inf. Tom. V. p. 281. No. 2. *Bruche rouffe*.\*)  
*(Rufus) rufo-fuscus; clytris pedibusque rufis; corpore griseo-maculato; antennis ferratis.*

*Unäbgebildete.*

1. No. 2. *Theobromae.*
2. No. 3. *Gleditsiae.*
3. No. 4. *Babtris.*
4. No. 5. *Granarius.*
5. No. 6. *Seminarius.*

*Neue Arten dieses Geschlechts.*

1. *Fuscus*, der ganz braune Muffelkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 268. *Mylabris* 2. Le *Mylabre brun.* *Tota fusca.*

2. *Gleichenii*, des Herrn von Gleichen Muffelküferchen im Mays oder türkischen Korn.

*Neuestes im Reich der Pflanzen.* Anh. S. 1. t. 1.

*Elytra rufo-fusca, reticulata; pedes rufi, pilosi; antennae decem articulatae; magnitudo pediculi.*

*Mullers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 207.*

3. *Bipunctatus*, der schweizerische Zweypunkt.

*Füesslins Verz.* S. 9. No. 176.

*Sulzers Gesch.* S. 36. t. 4. f. 2. a.

*Capite deflexo; cinereus, antennis fuscis; thorace griseo tuberculato; elytris striatis poslice truncatis.*

4. *Spi-*

\*.) Recht gewiss ist der Herr von Geer nicht, ob dieses der nämliche Linneische sey, weil bey seinem Exemplar die Fühlhörner nur so lang als der Kopf und der Brustcheld sind.

4. *Spinosus*, der jamaische gedörnte Muffelkäfer.

*Fabric. S. E. p. 64. No. 1. Antennis filiformibus; thorace elytrisque spinosis.*

5. *Scabrosus*, der englische Muffelkäfer mit höckrigen Streifen auf den Flügeldecken.

*Fabric. S. E. p. 64. No. 3. Niger, elytris rufis elevato-striatis scabris, punctis nigris sparsis.*

6. *Cacao*, der gefleckte Kakao-Muffelkäfer.

*Fabric. S. E. p. 64. No. 4. Corpore fusco, griseo, maculato.*

7. *Cisti*, der Heidenyop-Muffelkäfer.

*Fabric. S. E. pag. 65. No. 7. Ater, immaculatus, femoribus muticis.*

8. *Maculatus*, der amerikanische schwarzgefleckte Muffelkäfer.

*Fabric. S. E. p. 65. No. 9. Elytris punctatis, testaceis, nigro-maculatis, podice griseo punctis binis nigris.*

9. *Serricornis*, der orientalische Muffelkäfer mit sägeförmigen Fühlhörnern.

*Fabric. S. E. p. 65. No. 10. Antennis valde serratis, corpore longioribus, corpore griseo, fusco, maculato.*

*Rankrosts* N. G. von Guinea S. 148. der *Palmwurm*.

*Fermus* Beschr. der Kolon. Surinam. i. Th. S. 150. *Wurm des Palmkohls; Kabisch Worm.*

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 517. der *Rüsselkäfer auf den Palmen.*<sup>\*)</sup>

*Bomar.* Dict. XII. p. 100. *Ver du Palmiste.*

*Plin.* hist. nat. lib. 17. c. 24.

*Fabric.* S. E. p. 128. No. 2.

*Stop.* Ann. 5. hist. nat. p. 89. No. 40.

*Maximus, niger, rostro longo; elytris striatis; capitula antennarum magna, compissa, truncata.*

*de Geer* Ins. Tom. V. pag. 269. No. 4. t. 15. f. 26.

*Charanson du Palmier.*

*Cuc. longirostris; antennis fractis clava truncata; femoribus muticis, corpore nigro depresso; thorace ovato planiusculo; elytris abbreviatis striatis.*

2. *Indus*, der *indianische Rüsselkäfer mit zwey Lappen am Rüssel.*

*Müller* l. c. S. 213. t. 4. f. 11. der *Elephantenrüssel.*

*Houltin* hist. nat. de *geplumbe Tor.*

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 515. der *indianisthe Rüsselkäfer.*

*Fabric.* S. E. p. 128. No. 4.

*de Geer* Ins. Tom. V. pag. 265. No. 1. t. 15. f. 22.

*Charanson des Indes.*

*Cuc. longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore nigro depresso; thoracis lateribus tuberculoso villoso; elytris rugoso-sulcatis.*

3. *Hemi-*

<sup>\*)</sup> Hierzu gehört noch des *Gronov.* No. 577. in der *Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 516. der einen *furchicht erhobeten Schnabel besitzende Rüsselkäfer auf den zeylonischen Palmen.*

3. *Hemipterus*, der *indianische Rüsselkäfer*.*Müller* l. c. S. 215. No. 3.*Sulzers* Gesch. S. 39. t. 4. f. 5. der *Kurzflügliche*.*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 515. der *mit halb harten Flügeldecken versehene Rüsselkäfer*.*Fabric.* S. E. p. 128. No. 5.*de Geer* Inf. Tom. V. p. 271. No. 5. t. 15. f. 25. *Charanson roux rayé*.*Curculio (rufo-fasciatus) longirostris, antennis flaccidis; femoribus muticis; corpore oblongo rufo; thorace magno; fasciis longitudinalibus nigris.*4. *Alliariae*, der *Knoblauchrüsselkäfer*.*Müller* l. c. S. 215. No. 4. der *Stengelbohrer*.*Füesslins* Verz. S. 10. No. 178. *Rüsselkäfer des Knoblauchkrauts*.*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 512. der *Rüsselkäfer des Knoblauchkrauts*.*Fabric.* S. E. p. 132. No. 27.*Mulleri* Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 995.*de Geer* Inf. Tom. V. pag. 251. No. 39. *Charanson bleu velus*.*Curc. (coeruleus) longirostris, antennis rectis; corpore obtuso villoso, coeruleo-violaceo nitido.**Frisch* Inf. P. IX. p. 35. t. 18. der *blaue Rüsselkäfer aus der kleinen Art Feldriiben*.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 271. *Rhinomacer 5. Le Bec-nare bleu à poil.*)*Subvillosus coeruleus.*5. *Cya-*

\*) Dieses vom Herrn von Geer bey C. Alliar. angeführte Geoffroische Citatum hat *Fabrizius* S. E. pag. 141. zu *Violaceus* L. No. 63. gesetzt.

5. *Cyanens*, der *Weidenbohrer*.\*)

Müller l. c. S. 215. No. 5.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 760. No. 97. der *lang-schnäbliche schwarze Rüsselkäfer mit blauen Flügeldecken, und dem weißen Schildchen*.

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 514. der *blaue Rüsselkäfer*.

Fabric. S. E. p. 132. No. 128.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 987. Niger, *elytris striatis, coeruleis*.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 252. No. 41. *Charanson noir violet*.

*Longirostris, antennis rectis, corpore oblongo nigro; elytris nigro-coeruleis nitidis.*

6. *Cractae*, der *Wickenrüsselkäfer*.

Müller l. c. S. 215. No. 6.

Fabric. S. E. p. 132. No. 29. *curculio globosus, longirostris, gibbus, supra ater, subtus cinereus*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 253. No. 43. t. 6. f. 31. 32. *Charanson de la Vesse*.

*Curc. (Viciae) longirostris; antennis rectis; corpore oblongo villoso cinereo-nigro; elytris sulcatis.*

7. *Campanulae*, der *Rüsselkäfer auf den Glockenblumen*.\*\*) (

Müller l. c. S. 216. der *Glockenblumenfänger*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1013. *Rhinomacer Campan. niger ovatus; elytris subsulcatis*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 236. No. 23. *Charanson de la Campanule.*

Longi-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Longirostris; antennis fractis fuscis; femoribus muticis; corpore subgloboſo cinereo nigro; elytris lineis griseis.

8. *Badensis*, der schwarze Rüsselkäfer des Badener Gebiets mit roßfarbig schwarzen Füßen.\*)

Müller l. c. S. 216. No. 8.

9. *Aequatus*, der Schrebersche Schwarzzüſel.\*\*)

Müller l. c. S. 216. No. 9. der Schwarzzüſel.

10. *Aterrimus*, der allerschwärzeste Rüsselkäfer.†)

Müller l. c. S. 217. No. 10. der Köhler.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 513. der allerschwärzeste Rüsselkäfer.

Müller Faun. Fridr. p. 10. No. 90.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 991.

Fabric. S. E. p. 141. No. 74.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 299. Curr. 48. Le Charançon noir à corcelet armé.

Niger, thorace vtrinque dentato.

II. *Cerasi*, der Kirschrüsselkäfer.

Müller l. c. S. 217. No. II. Kirschkäfer.

Füesslins Verz. S. 10. No. 179. Kirschrüsselkäfer.

Gleditsch Forstwill. 2. Th. S. 791. No. 25. der schwarze lang schnäbliche Rüsselkäfer mit länglichen dunkeln Flügeldecken.

Frisch Inf. XI. Th. p. 31. t. 23. f. 1. 3 Pl. der Rüsselkäfer in den sauren Kirschen.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 514.* der *Rüsselkäfer der Kirschen.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 91.*

— — *Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 992.*

*Fabric. S. E. p. 141. No. 75.*

12. *Pruni*, der *Pflaumenrüsselkäfer.* \*)

*Müller l. c. S. 217. No. 12.* das *Zwetschenmännchen.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 977.*

*Ater, thorace maculato; tibiis ferrugineis.*

13. *Acridulus*, der *Rüsselkäfer auf den kreuzförmigen Pflanzen.* \*\*)

*Müller l. c. S. 217. No. 13.* der *Laugensfresser.*

*Füesslins Verz. S. 10. No. 180.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 512.* der *scharfe Rüsselkäfer.*

*Fabric. S. E. p. 133. No. 32.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 92.*

— — *Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 993.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 291. No. 32.* Le *Charanson pyriforme.*

*Pyriformis, nigro-coerulescens, abdomine ovato.*

*de Geer Inf. Tom. V. pag. 235. No. 22.* *Charanson acridula.*

*Longirostris arcuatus; antennis fractis fuscis, femoribus muticis; corpore ovato nigro-fusco, tibiis pallidis.*

14. *Purpureus*, der *purpurfarbige Rüsselkäfer.*

*Müller l. c. S. 218. No. 14.* der *Langschnabel.*

*Füesslins Verz. S. 10. No. 181.* der *Purpurfarbige.*

*Poda*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

- : *Poda* Mus. graecens. p. 29.  
*List.* loqu. p. 394. *Scarabaeus ex toto coccineus.*  
*Müller's Faun.* Fridr. p. 11. No. 93.  
— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 986. \*)  
de Geer Ins. Tom. 5. p. 250. No. 38. *Charanson cramoisi.*  
*Rostro longissimo; antennis rectis; corpore villoso subquadrato purpureo-auroto nitidissimo.*  
*Geoffr. Ins. Tom. I. p. 270. Rhinom. 4. Le Bec-mare doré à étuis rouges.\*\*)*  
*Niger; elytris rubris; capite, thoraceque aureis; proboscide longitudine fere corporis,*

15. *Frumentarius*, der rothe Kornwurm.

- Müller* l. c. S. 218. No. 15. *holl. Kalander.*  
*Fließlins Verz.* S. 10. No. 182. *Getraudreuter.*  
*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 515. der *Frucht-Rüsselkäfer.*  
*Catholicon C.* p. 226. †).  
*Fabric.* S. E. p. 133. No. 34.  
*Müller's Faun.* Fridr. p. 10. No. 94.  
— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 101.

Y 3

Rhin-

\*) Der Staatsrath Müller hat aus dem *Skopolischen Curc.* *purpureus* No. 86. den Linné hier bey seinem purp. angeführt hat, l. c. einen neuen gemacht, und mit einem Sternchen bezeichnet: *Purpureus ruber, oculis abdomineque nigris.* *Scop. Ins. 86.*

\*\*) Dieses Citarum hat *Fabric.* p. 130. No. 15. zu *Linn. Bacchus* No. 38. gesetzt.

†) Bey verschiedenen Schriftstellern ist *Calandre* und *Charanson* einerley; andere aber verstecken durch *Calandre* bloß den Curc. *Linn. frument.* und *granar.* durch *Charanson* hingegen den Curc. *L. segetis.* Die beyden ersten Arten heißen *Glander*, Reiter und *Wippele.*

*Rhinomacer sanguineus*, elytris striato-punctatis:  
Kornorm; Snude Bille.

*Alla Nidr.* III. p. 391.

*Journ. des Savans* 1774. Mars p. 194. *Calandre.*

de Geer *Ins. Tom. V.* p. 251. No. 40. *Charanson rouge.* \*)

*Sanguineus*, longirostris, antennis rectis, corpore oblongo sanguineo.

### 16. *Granarius*, der schwarze Kornwurm.

*Mller* I. c. S. 219. No. 16.

*Frisblins Verz.* S. 10. No. 183. der Kornreuter.

*Berlin Samml.* 4. B. S. 342.

*Schröters Abhandl.* 1. B. S. 228. ff.

*Rozier Samml.* brauchbarer Abhandl. 2. B. S. 55. ff.  
t. 2. f. 2. *Calandre*; *Calande*; *Loffon*; *Loffan*; *Gon*  
und *Chatpeleuse*.

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 204. No. 5. t. 16. *Kornkreke*;  
*Klanner*; *Klander*; *Calandre*; *Glander*; *Wip-*  
*pel*; *schwarze Kornwurm*; *Reiter*.

*Altes hamburg. Magaz.* 1. B. S. 301. der schwarz  
Wurm oder *Glander*. 4. B. S. 562. *Kornwurm*.

*Selecta phys. occon.* 2. St. S. 97.

*Schwenkfeld.* Theriotr. Silef. p. 527. *Cis*; *Curcu-*  
*lio*; *Gurgulio*; *Pediculus frumenti*; *Kornwurm*;  
*Kornkäfer*; *Kalander*; *Triticiarius*.

*Loewenhoek Arcan. Nat. detecta.* pag. 252. *Klander*,  
p. 480. f. 1. 2. Segreijn-leer. \*\*)

*Joblot*

\*) Der Herr von Geer hat das vom Linné zu diesem frumentar. gesetzte *Loewenhoeksche* Citatum bey dem folgenden granar. aufgeführt.

\*\*) Dies *Loewenhoeksche* Citatum hat Linné zu *Curcul. frument.* gesetzt.

*Goblot* obs. microscop. 1754. P. I. pag. 15. chap. 4. t. 7. f. 1. La Licorne; Scarabé à tête en forme de trompe.\*)

*Fabric.* S. E. p. 134. No. 39.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 515. der Haberrüsselkäfer.  
*Catholicon C.* p. 226. der Korn- oder Haberrüsselkäfer.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 10. No. 95.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 88. No. 976. Dan. Korn-Krae; Glander.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 285. *Charanson* 18. Le Charanson brun du bled.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 239. No. 25.

*Longirostris, antennis fractis, femoribus muticis;*  
*corpore oblongo fusco-caeruleo; thorace longitudine*  
*elytrorum.*

17. *Dorsalis*, der Rüsselkäfer auf dem Scharbockskraut mit der schwarzen Rückennath.\*\*)

*Müller* l. c. S. 219. No. 17. der Schwarzstriem.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. pag. 514. der Rückenrüsselkäfer.

*Adt. Vpsal.* 1736. p. 16. No. 6.

*Fabric.* S. E. p. 133. No. 35.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 10. No. 96.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 972.

Y 4 18. *Mela-*

\*) *Goblot* sagt daselbst noch: Le Charanson, qui fait tant de tort dans les greniers, où l'on conserve des grains, est une espèce de ce genre.

Von beyden Arten siehe noch *Kolbens* Beschr. des Vorgebirges der guten Hoffn. Ausz. 4. S. 358.

\*\*) Nicht abgebildet.

18. *Melanocardius*, der *Rüsselkäfer mit dem schwarzen Herzflecke*.

*Müller* l. c. S. 219. No. 18. der *Herzfleck*.

*Sulzers Gesch.* S. 40. t. 4. f. II. *Cordiger*, der *Herzfleck*.

*Fießlins Verz.* S. II. No. 218. *Herzfleck*.

*Fabric.* S. E. p. 129. No. 7. *Longirostris*, *cinereus*; *coleoptris macula communis cordata fusca*.

19. *Pini*, der *Fichtenrüsselkäfer*. \*)

*Müller* l. c. S. 220. No. 19. der *Fichtenkäfer*,

*Fießlins Verz.* S. 10. No. 184. *Fichtenrüsselkäfer*.

*Gleditsch Forstwiss.* I. Th. S. 505, No. 12. der *Rüsselkäfer des Nadelholzes; Harzrüsselkäfer*.

*Frisch* Ins. XI. Th. S. 30. No. 29. 3. Pl. t. 23. f. 5. der *Rüsselkäfer der dritten Größe an den schmalen Blättern oder Spitzen der Kienbäume*,

*Schaeff.* Icon. t. 25. f. 7.

*Ononiat.* hist. nat. P. 3. p. 518. der *Rüsselkäfer des Fichtbaums*.

*Fabric.* S. E. p. 129. No. 10,

*Milleri Zool. Dan. Prodr.* p. 89. No. 990.

*Piceus; thorace maculis; elytris fasciis duabus fulvis.*

de *Geer* Ins. Tom. V, p. 222. No. 15. *Charanson du Pin.*

*Longirostris; antennis fractis; femoribus muticis; corpore oblongo testaceo; maculis lineisque transversis flavis; elytris gibbosis.*

20. *La-*

\*) Diesen, und *Akletis* No. 57. hat *Linné* in der Begattung angetroffen; also ist entweder dieser oder jener das zweyte Geschlecht.

20. *Lapadi*, der *Sauerampferrüßelkäfer*.*Müller* l. c. S. 220. No. 20. das *Sauermaul*.*Füesslins* Verz. S. 10. No. 185. *Sauerampferrüßelkäfer*.*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 515. der *Rüsselkäfer des Sauerampfs*.*Fabric.* S. E. p. 138. No. 61.*Longirostris*, *femoribus bidentatis*, albo nigroque varius; *thorace elytrisque muricatis*.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 988. *Niger*, *thorace vtrinque*; *elytris gibbosis vtrinque et postice albis*.de Geer Ins. Tom. V, p. 223. No. 16. t. 7. f. 1. 2.  
*Charanson noir à derrière blanc*.*Curculio (albicaudis) longirostris*; *antennis fractis*; *femoribus muticis*; *corpore ovato nigro*; *fasciulis pilosis*; *elytris postice albis*,21. *Cupreus*, der *kupferfarbige Rüsselkäfer*.\*)*Müller* l. c. S. 220. No. 21. der *Kupferkäfer*.*Onomatol. hist. nat.* P. 3. p. 514. der *kupferfarbene Rüsselkäfer*,*Fabric.* S. E. p. 131. No. 20.22. *Scaber*, der *Rüsselkäfer mit höckrighen Flügeldecken*.\*\*)*Müller* l. c. S. 221. No. 22. der *Puderkäfer*.*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 947. *Fuscus*, *setosus*, *antennis pedibusque rufis*,

Faun. Frider. p. 12. No. 117.

Y 5

23. T- al.

\*) Nicht abgebildet,

\*\*) Nicht abgebildet.

23. *T-album*, der Rüsselkäfer mit dem weissen T.\*)

*Müller* l. c. S. 221. No. 23. das weisse T.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 515. der schwarze und milchfarbne Rüsselkäfer.

24. *Ruficollis*, der Rothhals.\*\*)

*Müller* l. c. S. 221. No. 24.

25. *Quercus*, der Eichenrüsselkäfer.\*\*\*)

*Müller* l. c. S. 222. No. 25.

*Gleditsch* Forstwiss. I. Th. S. 658. No. 49. der kleine blaßgelbe und lang schnäbliche Rüsselkäfer mit schwarzen Augen.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 519. der Rüsselkäfer des Eichbaumes.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 981. *Cinerens*; *elytris pallide flavis; fascia obliqua alba; antennis pedibusque rufis.*

26. *Polygoni*, der Rüsselkäfer auf dem Wegetritt.†)

*Müller* l. c. S. 222. No. 26. der Wegetrittkäfer.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 980. *Gfiseus, thorace terlineato; elytris striis abruptis, nigris.*

27. *Viscariae*, der Mistelrüsselkäfer.††)

*Müller* l. c. S. 222. No. 27. der Mistelkäfer.

28. *2-punctatus*, der zweypunktirte Rüsselkäfer.†††)

*Müller* l. c. S. 222. No. 28. der Schwarzfleck.

*Onomat.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

†††) Nicht abgebildet.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 513. der zweifachgedüppelte Rüsselkäfer.

29. *4-maculatus*, der Rüsselkäfer mit vier weissen Flecken.\*)

Müller l. c. S. 223. No. 29. der Weissfleck.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 518. der vierfachgefleckte Rüsselkäfer.

Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 999. Griseus, *elytris nigris maculis quatuor albis; tibiis rufis.*

Fabric. S. E. p. 133. No. 31.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 287. *Curc. 22.* Le Charanson quadrille à longue trompe.

Cinereus; *elytrorum puncto quadruplici albo; proboscide thorace longiori.*

30. *5-maculatus*, der Fünffleck.\*\*)

Müller l. c. S. 223. No. 30. der Greis.

31. *Pericarpius*, der Rüsselkäfer in den Kernbehältern.†)

Müller l. c. S. 223. No. 31. der Kernwächter.

Füesslins Verz. S. 10. No. 186. der Kernwächter.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 517. der Rüsselkäfer des Feigwarzenkrauts.††)

Fabric. S. E. p. 132. No. 26. Longirostris, subglobosus, nebulosus, *elytrorum futura basi alba.*

Abt. Vpsal. 1736. p. 16. No. 7. *Curculio minimus* cinereus subrotundus obtusus.

Müller i

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

†† ) In der *Onomat.* hist. nat. p. 519. der Rüsselkäfer des Wollkrauts Linn. Syst. N. ed. 10. pag. 380. No. 27. Subglobosus etc. mit diesem einerley.

- Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 98.  
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 994.  
*Gnofr.* Ins. Tom. I. p. 298. *Curc.* 46. *Le Charançon porte-coeur de la Scrofulaire,*
  
- 32. *Sprengleri*, *Sprenglers amerikanischer Rüsselkäfer.* \*)  
*Miller* l. c. S. 223. No. 32. der *Sprenglerkäfer*.  
*Fabric.* S. E. p. 151. No. 125. *Brevirostris*; *elytris flavis, lineis atris, glaberrimis, abbreviatis.*
  
- 33. *Vittatus*, *der amerikanische Streifrückchen.* \*\*)  
*Miller* l. c. S. 224. No. 33.  
*Fabric* S. E. p. 150. No. 124. *Brevirostris*, *ater, elytris striis albis rubrisque abbreviatis.*
  
- 34. *Paraplesticus*, *der Lähmer.*  
*Miller* l. c. S. 224. No. 34. der *Lähmer*; *holl. bonte Olyphantjes.*  
*Börners Samml.* I. Th. 136.  
*Schreibers Samml.* XI, Th. S. 336. t. 4.  
*Pontopp.* N. G. v. D. S. 204. No. 14. t. 16.  
— — *Atlas Dan.* I. t. 1.  
*Lepechins Tageb.* I. Th. S. 207.  
*Berlin. Samml.* 8. B. S. 35.  
· *Fließlins Verz.* S. 10, No. 187. der *Lähmer*.  
· *Sulzers Gesch.* S. 39. t. 4. f. 7. der *Lahmende*.  
*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 517. der *lähmende Rüsselkäfer*,  
*Acta Vpsal.* 1736, p. 16. No. 1. *Curculio acuminatus, longus, fuscus.*  
*Fabric.* S. E. p. 135. No. 44.

Müller

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 10. No. 100.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 971.

*Schaeff.* Inf. t. 44. f. 1.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 279. Curr. 4. Le Charanson à future noire.\*)

Oblongus, *elytris* villoso-cinereis futura nigra,  
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 224. No. 18. t. 7. f. 8.  
*Charanson de la Phelandrie.*

*Curculio (Phelandrii) longirostris, antennis fractis, femoribus muticis; corpore oblongo cylindrica griseo-viridi-flavescens; elytris acuminatis remotis.*

35. *Anguinus*, der *Schlängenkäfer*.\*\*)

*Müller* I. c. S. 224. No. 35.

*Fügßlins* Verz. S. 10. No. 188. die *Schlange*.

36. *Ascanii*, der *Ascanius-Rüsselkäfer*.†)

*Müller* I. c. S. 225. No. 36. der *Ascaniuskäfer*.

*Martini* allgemein. Gesch. der Natur 3. B. 1ste Abth. S. 356.

*Fabric.* S. E. p. 135. No. 47.

37. *Algirus*, der *algierische punktierte Rüsselkäfer*.††)

*Müller* I. c. p. 225. No. 37. der *Algierer*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 512. der Rüsselkäfer von Algier.*

38. *Bacchus*, der *Bacchusrüsselkäfer*.

*Müller* I. c. S. 226. No. 38.

*Fügßlins*

\*) Nach *Fabricio* ist dieser *Geoffroische* der *Paraplecticus*, nach *Mülleri* Zool. Dan. aber *Circ. Similis* p. 89. No. 998. S. unter den neuen der dritten Klasse No. 8.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

- Füeßlins* Verz. S. 10. No. 189. der *Bacchus*.  
*Beckmanns phys. oek. Bibl. 6. B.* S. 249.  
*Sulzers Gesch.* S. 38. t. 4. f. 4. der *Bacchus*.  
*Schaeff. Icon.* t. 37. f. 13.  
*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 513.* der *Weingott*.  
*du Bois Tableau annuel 1772. p. 118-121.* *Charan-*  
*son de la Vigne; le Rouleur*.  
*Schaeff. Icon.* t. 27. f. 3.  
*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 90. No. 42.*  
*Aurato-virens supra, subtus cupreo-auratum.*  
*Fabric. S. E. p. 130. No. 15.\*)*

39. *Betulae*, der Birkenrüsselkäfer.  
*Müller l. c. S. 226. No. 39.* der *Birkenfelder*.  
*Füeßlins Verz. S. 10. No. 39.* der *Birkenfreund*.  
*Sulzers Gesch.* S. 38. t. 4. f. 3. der *Birkenfreund*.  
*Gleditsch Forstwiß. 1. Th. S. 551. No. 12.* der *grün*  
*und goldfarbige lang schnäbliche Rüsselkäfer der Bir-*  
*ken und Erlen*.  
*Frisch Inf. XII. Th. S. 17. t. 8. 2. Platte.* der *purpur-*  
*roth verguldete Rüsselkäfer*.  
*Schaeff. Icon. t. 6. f. 4.*  
*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 513.* der *Rüsselkäfer des*  
*Birkenbaums*.  
*Fabric. S. E. p. 130. No. 16.*  
*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1022.*  
*RHINOM. Alni, supra viridis, subtus aeneus, au-*  
*tannis tarisque nigris.*  
*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 270. Rhinom. 2. Le Bec-*  
*mare vert.*  
*Totus viridi-sericeus.*

de Geer

\* Bey diesem hat *Fabricius* des *Geoffr. Rhinom. 4. p. 270. Tom. I.*  
*angeführt*, so der Herr von *Geer* bey *Lian. Parparr. No. 15.*  
*gesetzt* hat.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 248. No. 5. t. 7. f. 25.  
*Charanson du Bouleau.*

*Longirostris; antennis rectis nigris; corpore subquadrato viridi-aurato nitidissimo, pedibus purpureo-aeneis.*

40. *Populi*, der *Pappelrüsselkäfer*.\*)

Müller l. c. S. 226. No. 40. der *Pappelmäger*.

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 571. No. 10. der *grüne lang schnäbliche Rüsselkäfer mit einem meist stachlichen Bruststück*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 518. der *Rüsselkäfer des Pappelbaums*.

Fabric. S. E. p. 131. No. 17.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1012.

R H I N O M A C E R *Populi*, supra viridis, subtus atrocoeruleescens.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 270. Rhinom. 3. Le *Bec-mare doré*.

Viridi-auratus, subtus nigro-violaceus.

de Geer Inf. Tom. V. p. 249. No. 37. *Charanson du Tremble*.

*Longirostris; antennis rectis nigris; corpore subquadrato supra viridi-aurato, nitido, subtus violaceo, pedibus violaceis.*

II. Springende Langrüsseln mit dicken Hinterschenkeln.

41. *Reccabungae*, der *springende Rüsselkäfer auf den Bachbungen*.

Müller loc. cit. S. 226. No. 41. der *Bachbungen-springer*.

42. *Alni*,

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

42. *Alni*, der Erlen hüpfen.\*)

Müller l. c. S. 227. No. 42.

Fließlins Verz. S. 10. No. 191. der Schwarzpunkt.

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 559. No. 21. der lang-schnäbliche springende grünlich blaue Rüsselkäfer der Eile.

Otomat. hist. nat. P. 3. pag. 520. der Rüsselkäfer der Eile.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 286. *Curc. 20.* Le Charanson sauteur à taches noires.

Rufus, femoribus posticis crassioribus; elytris maculis quatuor nigris.

de Geer Inf. Tom. V. p. 262. No. 49. Charanson sauteur de l'Aune.

Curculio (*saltator alni*) longirostris; corpore ova-to testaceo; elytris maculis binis fuscis; capite nigro.43. *Salicis*, der Springkäfer auf den Sahlweiden.\*\*) )

Müller l. c. S. 227. No. 43. der Weidentänzer.

Fließlins Verz. S. 10. No. 192. Weidenrüsselkäfer.

Gleditsch Forstw. 2. Th. S. 760. No. 96. der schwarze lang-schnäbliche und springende Rüsselkäfer mit zwey schwarzen Binden.

Otomat. hist. nat. P. 3. p. 520. der Rüsselkäfer der Weyde.

Bom. Dicht. I. p. 214.

Fabric. S. E. p. 144. No. 91.

de Geer

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Hietbey hat der Ritter des *Geoffroi Alitica* I. Tom. I. p. 245. angeführt, welches die Chrysomela L. *oleracia* No. 51. ist, wenigstens hat keiner von den übrigen genauen Entomologen bey diesem Curc. *Salicis* des Geoffr. gedacht.

de Geer Inf. Tom. V. p. 264. No. 51. *Charanson sauteur du Saule.*

*Longirostris; corpore subgloboso atro; elytris fasciis duabus transversis albis maculaque fulva.*

44. *Fagi*, der *Springrüsselkäfer auf den Buchen.\**)

Müller l. c. S. 227. No. 44. der *Buchenweider.*

Füesslins Verz. S. 10. No. 193. *Buchrüsselkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 601. No. 6. der *lang-schnäbliche schwarze und springende Rüsselkäfer mit braunen Oberfissen.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 520. der *Rüsselkäfer der Buche.*

Fabric. S. E. p. 145. No. 93.

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 101.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1009.

45. *Segetis*, der *Springrüsselkäfer auf der Kornsaat.\*\**)

Müller l. c. S. 227. No. 45. der *Saatspringer.*

Füesslins Verz. S. 10. No. 194. *Saatrüsselkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 520. der *Rüsselkäfer auf den Ackerfeldern.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 264. No. 50. *Charanson sauteur des bleds.*

*Longirostris; corpore ovato nigro griseo-nebuloso; antennis plantisque pallide fuscis.*

### III. Langrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

46. *Pomorum*, der *Rüsselkäfer in den Äpfeln.*

Müller l. c. S. 228. No. 46. der *Apfelschäler.*

Füesslins

\* ) Nicht abgebildet.

Dieser Wurm, *Larva subcstantea*, ist die Ursache, daß die meisten Blätter an den Buchenbäumen verdorren.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Füeßlini* Verz. S. 10. No. 195. der *Apfelbohrer*.

*Frisch* Inf. I. Th. S. 32. t. 8. von den kleinen Maden, und daraus kommenden Rüsselkäfern in der Baumblüte.

*Glaeser* von schädlichen Raupen S. 45-48.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 792. No. 26. der lang-schnäbliche nebelgraue Rüsselkäfer mit gezackten Hüften.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 525. der aus der Apfelblüte entspringende Käfer.

*Fabric.* S. E. p. 143. No. 84.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. II. No. 103.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1002.

#### 47. *Ovalis*, das *Marmorey*.

*Müller* l. c. S. 228. No. 47.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 525. der eyerförmige Rüsselkäfer.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. II. No. 104.

*Drury* Inf. t. 33. f. 1. 2. *Jamaicensis*.

#### 48. *Carbonarius*, der *Köhler*.\*)

*Müller* l. c. S. 229. No. 48. der *Schwarze*.

*Füeßlini* Verz. S. 10. No. 196. der *Kohler*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 521. der *Kohlenrüsselkäfer*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. II. No. 105.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1004.

*Corpore nigro, oblongo; elytris striatis*.

#### 49. *Mucoreus*, der *indianische Gelbschimmel*.\*\*)

*Müller* l. c. S. 229. No. 49. der *Gelbschimmel*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 524. der *schimmlichte Rüsselkäfer*.

*Fabric.* S. E. p. 136. No. 52.

#### 50. *Pusio*,

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

50. *Pusio*, der *indianische Zwergrüssel*.\*)

Müller I. c. S. 229. No. 50. der *Zwergrüssel*.

Fabric. S. E. p. 136. No. 53.

51. *Vaginalis*, der *amerikanische Scheidenkäfer*.

Müller I. c. S. 229. No. 51. der *Scheidenkäfer*.

Lepechins Tageb. I. Th. S. 302. der *Rüsselkäfer mit der Scheide*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der *indianische mit einem Grubchen versehene Rüsselkäfer*.\*\*) )

Gronov. Gazoph. No. 581. t. 14. f. 6.

de Geer Ins. Tom. V. pag. 266. No. 2. Charanson à Etui. t. 15. f. 23.

Longirostris; antennis fractis, femoribus dentatis; torpore nigro; elytris sulcatis; tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis.

52. *Stigma*, der *indianische Brandfleck*.†)

Müller I. c. S. 230. No. 51.

Fabric. S. E. p. 137. No. 56.

53. *Depressus*, der *amerikanische Platträcken*.

Müller I. c. S. 230. No. 53. der *Platträcken*.

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521. der *unter sich gedrückte Rüsselkäfer*.

Fabric. S. E. p. 143. No. 83.

Seba Mus. IV. t. 95. f. 4.

54. *Annulatus*, der *indianische Ringelträger*.††)

Müller I. c. S. 230. No. 54. der *Ringelträger*.

Z 2

Onomat.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Der *amerikanische Rüsselkäfer* in der Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 522. wobei Gronov. No. 581. angeführt ist, mit *densem einerley*.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

*Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521.* der *ringförmige Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 137. No. 57.*

*Longirostris; pallidus; femoribus dentatis; thorace elytrisque striis nigris.*

55. *Dispar*, der *indianische Bastard*.

*Müller l. c. S. 230. No. 55.* der *Bastard*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521.* der *durchsichtige Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 143. No. 87.*

*Longirostris, femoribus dentatis; elongatus, niger; elytris maculis quatuor rufescentibus.*

*Drury Inf. Tom. I. t. 42. f. 3. 7. Curculio minutus.\*)*

56. *Anchorago*, die *indianische Langbrust*.

*Müller l. c. S. 231. No. 56.* die *Langbrust*.

*Sulzers Gesch. S. 39. t. 4. f. 6.* der *Langbrustkäfer*.

*Onomat. hist. nat. P. 3. p. 523.* der *Rüsselkäfer mit einem sehr langen und dünnen Schnabel und Brustschild*.

*Fabric. S. E. p. 143. No. 86.*

*de Geer Inf. Tom. V. pag. 273. No. 8. t. 15. f. 28.*

*Charanson à long col.\*\*)*

*Curculio (longicollis) longirostris; antennis reclus; femoribus dentatis; corpore longissimo nigro; thorace elongato cylindrico; elytris flavo-striatis.*

57. *Abie-*

\*<sup>)</sup> Nach dem *Fabricius*; nach dem *Geer* aber *Tom. V. pag. 274.*  
No. 8. ist dieser *Drury'sche* des Linn. *Curc. Anchorago No. 56.*

\*\*) Hierbey hat er die vom *Fabric.* bey dem vorigen *Dispar* ci-  
tirten *Drury'schen* Rüsselkäfer *Tom. I. t. 42. f. 3. 7.* angeführt.  
S. die *vorige Anmerkung*.

57. *Abietis*, der Tannenrüsselkäfer.\*)

Müller l. c. S. 231. No. 57. der Tannenkäfer.

Füesslins Verz. S. 10. No. 198. der Tannenrüsselkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 521. der Rüsselkäfer des Tannenbaums.

Schaeff. Icon. t. 25. f. 1.

Fabric. S. E. p. 138. No. 59.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 984. Niger, *elytris* piceis, *punctis* pilosis fulvis subfasciatis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 205. No. 1. t. 6. f. II. *Charanson du Sapin.*

*longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro maculis griseo-flavis.*

58. *Germanus*, der deutsche Gelbpunkt.

Müller l. c. S. 231. No. 58. der Deutsche.

Füesslins Verz. S. 10. No. 199. der Gelbpunktkirte.

Sulzers Gesch. S. 39. t. 4. f. 8. der Deutsche.

Frisch Inf. XIII. S. 28. t. 26. der grosse schwarze Rüsselkäfer.

, Schaeff. Icon. t. 25. f. 2.

Fabric. S. E. p. 139. No. 67. *Longirostris; femoribus* dentatis; ater; *thorace* vtrinque *punctis* duobus testaceis.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 522. der deutsche Rüsselkäfer.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 91. No. 44.

Maximus inter nostros. *Elytra nigra, punctis maculisque testaceis varia.*

Müller Faun. Fridr. p. II. No. 110.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 982.

Ovatus, ater, *punctis testaceis* maculatus.

L 3

59. Nu-

\*.) Mit *Curc. Pini* No. 19. in der Begattung angetroffen, also ein oder das andere Geschlecht.

59. *Nucum*, der Haselnussrüsselkäfer.*Müller* l. c. S. 232. No. 59. der Nusskäfer.*Füesslins Verz.* S. 10. No. 200. der Nussbohrer.*Gleditsch Forstwiss.* 1. Th. S. 567. 571. No. 11. der Haselnusskäfer; der graue langſchnäbliche Rüsselkäfer.

Röſels Inſektenbel. 3. B. S. 385. t. 67. f. 6. 7. der Haselnussnurm, mit ſeinem Rüsselkäfer.

*Onomat.* hiſt. nat. P. 3. p. 524. der aus der Haselnuss entſpringende Rüsselkäfer.*Poda Mus. graecenſ.* p. 29.*Schaeff.* Elem. t. 55. f. 1.

— — Icon. t. 50, f. 4.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 996.*Ovatus gilvus, rostro longifimo.**Fabric.* S. E. p. 141. No. 77.*Raj.* Inf. 3. t. 67. f. 5. 6.*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 295. *Curcul.* 42. La Charanson trampette,Ruso-marmoratus; *scutella* cordato albo; *proboscide* subulata longiflīma,

de Geer Inf. Tom. V. p. 205. No. 2. t. 6. f. 14. 15. 16.

*Charanson des Noisettes,*Longirostris; *antennis* fractis; *femaribus* dentatis rufis, corpore oblongo nigro, *pilis* viridi flavis,60. *Rumicis*, der Sauerampferrüsselkäfer.*Müller* l. c. S. 232. No. 60. der Ampfersauger.*Fabric.* S. E. p. 134. No. 38.*Raj.* Inf. p. 85. No. 36. *Scarabaeus parvus*, corpore sublongo; totus obscure rufus seu fuscus, *punctis* nigricantibus adspersus.*Müller* Faun. Fridr. p. 10. No. 97.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1001.

de Geer

de Geer Inf. Tom. V. p. 231. No. 20. t. 7. f. 10. II.  
*Charanson de la Patience.*

*Longirostris; antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore oblongo griseo-fusco-nebuloso; thorace fa-*  
*sciis binis nigricantibus; pedibus fuscis.*

61. *Scrophulariae*, der *Braunwurzrüsselkäfer*.

Müller l. c. S. 233. No. 61. der *Braunwurzlecker*.

Fürstlins Verz. S. 10. No. 201. der *Braunwurzknäger*.

Fabric. S. E. p. 140. No. 68. *Longirostris; femo-*  
*ribus dentatis; coleoptris maculis duabus dorsilibus*  
*atris.*

Act. Vpsal. 1736. p. 16. No. 5. *Curculio globosus,*  
*proboscide reflexa.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 99.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 997.

*Subglobosus ater; thorace pallido villoso; elytro-*  
*rum lineis elevatis; albo nigroque tessulatis.*

Reaum. Inf. Tom. III. p. 42. t. 2. f. 12. Le *Scarabé à tête allongée en trompe; le Mineur du Bouil-*  
*lon-blanc.* \*)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 296. *Curc. 44.* Le *Charan-*  
*son à lozange de la Scrophulaire.*

*Subglobosus niger; punctis duobus atris suturæ*  
*longitudinalis coleoptrorum; thorace exalbido.*

de Geer Inf. Tom. V. p. 208. No. 3. t. 6. f. 17. 18.  
 19. 20. *Charanson de la Scrophulaire.*

Z 4

Longi-

\*) Dass sich verschiedene *Minirwürmer* in allerley Pflanzenblättern in *Rüsselkäfer* verwandeln, ist eine wichtige Entdeckung, die wir dem grossen Reaumur Inf. Tom. III. Part. I. p. 40. sq. zu danken haben. Die Minirwürmer verwandeln sich in *drey* verschiedene Arten von Insekten: in *Nachtmatten*; in *Fliegen*, und in *Rüsselkäferchen*.

*Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis;  
corpo subgloboso fusco griseo-ve; coleoptris maculis  
duabus rotundis nigris dorsalibus.*

62. *Druparum*, der Kernbohrer.

*Müller* l. c. S. 233. No. 62. der *Rothschnabel*.

*Füesslins Verz.* S. II. No. 203. der *Kernbohrer*.

*Fabric.* S. E. p. 143. No. 82.

*Müller* Faun. Fridr. p. II. No. 106.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1003.

*Schaeff.* Icon. t. I. f. II. a. b.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 296. *Curc.* 43. Le *Charan-*  
*son damier*.

*Flavescens; elytris luteo- et rufo-tessellatis.*

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 214. No. 7. *Charanson des*  
*bayes.*

*Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis;  
corpo oblongo rufo-fusco; elytris obsolete fasciatis.*

63. *Violaceus*, der *violette Fichtenrüttelkäfer*.\*)

*Müller* l. c. S. 233. No. 63. der *Violettrüttel*.

*Füesslins Verz.* S. II. No. 204. der *Kienbohrer*.

*Onomat.* hist. nat. P. 3. pag. 519. der *violette Rüssel-*  
*käfer.*

*Fabric.* S. E. p. 141. No. 76.\*\*) )

*Müller* Faun. Fridr. p. 9. No. 89.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1000. p. 91.

No. 1024. *RHINOM. unispinus*, *violaceus*; thorace  
antrorsum spinofo, *antennis* nigris.

*Scop.* Entom. carn. No. 78.

*Totus ex coeruleo-violaceus; antennis nigris.*

*Poda*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Fabric. hat bey diesem den vom Geer bey Curc. L. Alliar.

No. 4. citirten Geoffr. I. 271. *Rhinom.* 4. angeführt.

*Poda* Mus. graec. p. 28.

de Geer Inf. Tom. V. p. 213. N. 5. *Charanson noir-bleuâtre.*

Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro-coerulecente nitido: elytris striatis.

64. *s-punctatus*, der *Fünfpunkt.*\*)

Müller l. c. S. 233. No. 64. die *Weissnath.*

Fabric. S. E. p. 140. No. 70. Longirostris; femoribus dentatis; elytris futura punctisque duobus albis.

65. *Hispidus*, der *stachlichte Rüsselkäfer.*\*\*)

Müller l. c. S. 234. No. 65. der *Schuppenkäfer.*

Onomat. hist. nat. p. 3. p. 522. der *haarigte Rüsselkäfer.*

66. *Pedicularius*, der *Rüsselkäfer in der Grösse einer Laus.*†)

Müller l. c. S. 234. No. 66. der *Lanfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 525. der *Lausrüsselkäfer.*

67. *Tortrix*, der *Blattroller.*††)

Müller l. c. S. 234. No. 67.

Fabric. S. E. p. 143. No. 85.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 300. Curc. 51. Le *Charanson couleur de rouille.*

Ferrugineus; elytris striatis, oculis nigris.

Z 5 de Geer

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Von der Art ist des Herrn von Geer Curc. Vlmi, Tom. V.

p. 215. 217. No. 8. t. 6. f. 26, 27. der hinten unter den *neuen* vorkommen wird.

††) Nicht abgebildet.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 214. No. 6. *Charanson fauve.*

*Curculio (fulvus) longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo flavo-testaceo; oculis nigris.*

#### IV. Kurzrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

##### 68. *Ligustici*, der Liebstöckelrüsselkäfer.

Müller I. c. S. 234. No. 68. der Liebstöckelkäfer.

Füsslins Verz. S. II, No. 205. der Kleerrüsselkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der Rüsselkäfer des Liebstöckel oder Badkrauts.

Schaeff. Icon. t. 2. f. 12.

Fabric. S. E. p. 155, No. 145.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 962. Niger; thorace murino; elytris maculis pallidis striatis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 218. No. 10. *Charanson du Ligusticum.*

*Apterous, brevirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro-fusco; squamulis griseis nitidis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 292. Cura. 36. Le Charanson gris à étuves reunis et chagrinés.

Cinereus, squamosus, alis carens, elytris rugosis.

##### 69. *Ovatus*, der eyerförmige Rüsselkäfer.\*)

Müller I. c. S. 235. No. 69. der Eyerkäfer.

Fabric. S. E. p. 156. No. 151.

Mülleri Faun. Fridt. p. II. No. 109.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 969.

Scop. Entom. carn. No. 83. Cura. Vrticae; an ovatus Linn.?

de Geer

\*.) Nicht abgebildet.

de Geer Ins. Tom. V. p. 219. No. II. Charanson de l'Eglantier.

Curculio (*Rosae*) *apterus brevirostris*; *pedibus antennisque fractis rufis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro fusco.*

70. *Cervinus*, der Hirschhornrüsselkäfer.\*)

Müller I. c. S. 235. No. 70. der Hirschhornkäfer.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526, der Hirschrüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 149. No. 114.

Milleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 970.

de Geer Ins. Tom. V. p. 220. No. 13. Charanson gris bronze.

Curculio (*griseo-aeneus*) *brevirostris; antennis fractis rufis; femoribus dentatis; corpore oblongo griseo-aeneo nitido.*

71. *Oblongus*, der längliche Rüsselkäfer.\*\*)

Müller I. c. S. 235. No. 71. der Schmalbauch.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der längliche Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 156. No. 150.

Groffr. Ins. Tom. I. p. 294. Curc. 39. Le Charanson à étoiles fauves.

Oblongus, niger; elytris pedibusque testaceis.

72. *Pyri*, der Birnrüsselkäfer.

Müller I. c. S. 235. No. 72. der Birnkäfer.

Füesslins Verz. S. II. No. 206.

Sulzers Kennz. t. 3. f. 23. der erztbraune Rüsselkäfer auf den Birnbäumen.

Gleditsch

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 791. No. 24. der dunkelgrüne Blattkäfer des Birnbaums.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der aus den Blättern des Birnbaums entstehende Rüsselkäfer.

Alta Upsilon. 1736. p. 16. No. 2. *Curculio acuminatus oblongiusculus aeneo-fuscus.*

Lift. loqu. p. 394. No. 31. *Scarabaeus majusculus* e nigro rufescens.

Fabric. S. E. p. 155. No. 147.

Müller's Faun. Fridr. p. II. No. 107.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 965.

Schaeff. Icon. t. 2. f. II.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 282. *Curc. 12. Le Charanson à écailles vertes et pattes fauves.*

Squamoso-viridis; rostro thorace breviore, pedibus rufis.

de Geer Ins. Tom. V. p. 246. No. 34. *Charanson bronzé du Poirier.*

Brevirostris; antennis fractis rufis; femoribus mucicis; corpore oblongo aeneo-nitido; pedibus rufis.

### 73. *Argentatus*, der Silberrüsselkäfer.

Müller I. c. S. 236. No. 73. der Silberkäfer.

Füesslins Verz. S. II. No. 207. *Silberrüsselkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 40. t. 4. f. 9. d. c. \*) *Fühlspitzen-käfer.*

Fabric. S. E. p. 155. No. 148.

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 526. der silberfarbene Rüsselkäfer.

Müller's Faun. Fridr. p. II. No. 108.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 966.

Viride-auratus; antennis pedibusque rufis.

Geoffr.

\*) *Mylabris Schaefferi*. Unter *Scopoli calcaratos*.

Hat die prächtigsten Schuppen auf den Flügeldecken.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 293. Circ. 38. Le Charanson à écailles vertes.*

*Squamosus. viridi-auratus.*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 219. No. 12. Charanson verd-doré de l'Ortie.*

*Curculio (Vrticae) brevirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo viridi-nitido; pedibus viridibus.*

V. Kurzrüssel mit ungesäbelten Schenkeln.

74. *Argyreus*, der *indianische Silberrüssel.*\*)

*Müller* l. c. S. 236. No. 74. der *Silberrüssel.*

*Fabric. S. E. p. 145. No. 94.*

75. *Regalis*, der *peruanische Goldrüssel.*\*\*)

*Müller* l. c. S. 236. No. 75. der *Goldrüssel.*

*Fabric. S. E. p. 145. No. 95.*

76. *Viridis*, der *Grünrüssel.*

*Müller* l. c. S. 236. No. 76.

*Füsslins Verz. S. II. No. 209. der Grünling.*

*Schaeff. Elem. t. 108. Rhinomacer.*

— — *Icon. t. 53. f. 6.*

*Fabric. S. E. p. 146. No. 102. Brevirostris; femoribus muticis; virescens; thorace elytrorumque lateribus flavis.*

*Müller's Faun. Fridr. p. II. No. III.*

— — *Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 958.*

*Corpo viridi, supra obscuro; subtus flavidiore.*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 256. No. 45. Charanson verd à blânde jaune.*

Curcu-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Curculio (flavo-cinctus) brevirostris; antennis rectis; corpore oblongo viridi; fascia laterali flava.*

77. *Speciosus*, der *indianische Rüsselkäfer mit fünf Stacheln auf den Flügeldecken.\*)*

*Müller l. c. S. 237. No. 77. die Stacheldecke.*

78. *Ruficornis*, das *Rothhorn.\*\**)

*Müller l. c. S. 237. No. 78.*

*Fabric. S. E. p. 149. No. 115.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. II. No. 115.*

— — *Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 959.*

*Corpore atro; thorace bituberculato; antennis rubris.*

79. *Albinus*, der *Rüsselkäfer mit der weißen Stirn.*

*Müller l. c. S. 237. No. 79. die Weißstirn.*

*Fabric. S. E. p. 151. No. 127.*

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 973.*

*Niger, tuberculatus; thorace subtus; elytris antice et postice albis.*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 255. No. 44. t. 8. f. 1. Charanson à extremités blanches.*

*Brevirostris; antennis longis rectis; corpore oblongo nigro hispido; capite elytrorumque apice albis; rostro planiusculo lato.*

80. *Lineatus*, der *lineirte Rüsselkäfer.*

*Müller l. c. S. 237. No. 80. der Bruststrich.*

*Füesslins Verz. S. II. No. 210. der Bruststrich.*

*Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 528. der ligienförmige Rüsselkäfer.*

*Fabric.*

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 148. No. 111.

Müller's Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 953. Oblongus aurato-griseus; thorace terlineato; antennis rufescentibus.

Ast. Nidr. IV. p. 14.

Schaeff. Icon. t. 103. f. 8.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 283. Curr. 13. Le Charanson à corcelet rayé.

Rostro thoracis longitudine; thorace tribus striis pallidioribus.

de Geer Inf. Tom. V. p. 247. No. 35. Charanson rayé à courte trompe.

Brevirostris; antennis fractis; femoribus muticis; corpore oblongo griseo; thorace striis tribus pallidioribus.

81. *Incannus*, die Stumpfdecke.\*)

Müller l. c. S. 237. No. 81.

Füeßlins Verz. S. II. No. 211: der Stumpfdeckel.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 528. der schwarzgraulichte Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 147. No. 106. Brevirostris, fuscus, oblongus, thoracis dorso plano.

Lift. loqu. f. Scarab. anglic. 394. No. 30. Scarabaeus fuscus lanugine incannus.

Müller's Faun. Fidr. p. II. No. 112.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 946.

Oblongus, cinereus, hirtus.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 282. Curr. 10. Le Charanson gris, strié et sans ailes.

Cinereus, squamosus, alis carens; elytris striatis.

de Geer Inf. Tom. V. p. 242. No. 28. Charanson gris non\*aillé.

Curcu-

\* ) Nicht abgebildet.

*Curculio (griseo-apterus) brevitostris; antennis  
fractis longissimis rufis; femoribus muticis; corpore  
oblongo nigro-fusco; pilis nitidis griseis.*

82. *Cloropus*, der *Graufuß*.\*)

*Müller* I. c. S. 238. No. 82.

*Fabric.* S. E. p. 149. No. 116.

*Milleri* Faun. Fridr. p. II. No. 113.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 957.

83. *Rufipes*, der *Rothfuß*.\*\*)

*Müller* I. c. S. 238. No. 83.

*Fießlins Verz.* S. II. No. 212. der *Rothfuß*.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 529. der *Rüsselkäfer mit rothen Füssen*.

*Milleri* Faun. Fridr. p. II. No. 114.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 945.

84. *Nebulosus*, der *neblighfarbige Rüsselkäfer*.

*Miller* I. c. S. 238. No. 84. die *Wolkendecke*.

*Fießlins Verz.* S. II. No. 213.

*Gleditsch* Forstwiss. 2. Th. S. 980. No. 31. der *kurz-schnäbliche nebelgraue Rüsselkäfer mit schwarz und schräg gestreiften Flügeldecken*.

*Frisch* Ins. XI. Th. S. 32. t. 23. f. 5.

Ein Käfer mit etwas kurzem Rüssel.

*Schaeff.* Icon. t. 25. f. 3.

*Fabric.* S. E. p. 147. No. 104.

*Onomat. hist. nat.* P. 3. p. 529. der *Rüsselkäfer mit neblicher Farbe*.

\* *Geoffr.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Graeffr. Inf. Tom. I. p. 278. Curt. I. t. 4. f. 8. Le Charanson à trompe filonnée.\*)

de Geer Inf. Tom. V. p. 241. No. 27. Charanson à trompe arrêté.

Curculio (*carinatus*) brevirostris, *antennis fractis*; *femoribus muticis*; *corpo oblongo nigro maculis fasciisque albidiis*; *elytris gibbosis*.

85. *Sulcirostris*, der Rüsselkäfer mit gefurchtem Rüssel.

Müller I. c. S. 238. No. 85. t. 4. f. 14. die Rinnennase.

Füesslins Verz. S. II. No. 214. die Rinnennase.

de Geer Inf. Tom. V. p. 240. No. 26. Charanson à trompe filonnée.

Brevirostris; *antennis fractis*; *femoribus muticis*; *corpo oblongo cinereo*; *elytris maculis fasciisque obliquis nigris*.\*\*)

86. *Ater*, der ganz schwarze Rüsselkäfer.†)

Müller I. c. S. 239. No. 86. der Schwarzrock.

Füesslins Verz. S. II. No. 215.

Müller I. Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 954. Thorax punctato terque lineato; tibiis antennisque rufis.

87. *Emeritus*, der indianische Rüsselkäfer mit hakenförmigen Wärzen.††)

Müller I. c. S. 239. No. 87. der Spinnenkäfer.

Fabric. S. E. p. 152. No. 133.

### 88. Bar.

\*) Nach dem Linné und Fabricius ist hierbey der Geoffroi; von dem Herren von Geer aber bey Linn. Curt. *Sulcirostris* No. 85. angeführt.

\*\*) Hierbey hat der Herr von Geer das vorige Ciatatum des Geoffroi gesetzt.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

88. *Barbarus*, der französische Rüsselkäfer mit ausgehöhltem Brustschild.\*)

Müller l. c. S. 239. No. 88. der Franzose.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 527. der bartige Rüsselkäfer.\*\*)

Fabric. S. E. p. 152. No. 134.

89. *Capensis*, der kapensische Rüsselkäfer.\*\*\*)

Müller l. c. S. 240. No. 89. der Afrikaner.

Fabric. S. E. p. 152. No. 130.

90. *Verrucosus*, der kapensische Wurzenträger.

Müller l. c. S. 240. No. 90. t. 4. f. 15.

Fabric. S. E. p. 152. No. 129.

Drury Ins. Tom. I. t. 32. f. 5.

91. *Cornutus*, der indianische Hornträger.†)

Müller l. c. S. 241. No. 91.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 528. der gehörnte Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 153. No. 137.

92. *16-punctatus*, der indianische Rüsselkäfer mit sechzehn schwarzen Punkten.††)

Müller l. c. S. 241. No. 92. der Furchenkopf.

Fabric. S. E. p. 146. No. 98.

93. Gra-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) In der Onomat. hat man statt Barbarus in der Barbarey, oder in Afrika; *Barbatus* gelesen, woraus die Benennung: der bartige entstanden.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

93. *Granulatus*, die *indianische Körnerdecke*.

Müller l. c. S. 241. t. 4. f. 17. die *Körnerdecke*.

94. *Abbreviatus*, der *martinikische Rüsselkäfer mit abgekürzten Flügeldatken*.\*)

Müller l. c. S. 242. No. 94. der *Kurzmäntel*.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 527. der *abgekürzte Rüsselkäfer*.

95. *Apterus*, der *indianische Ohnflügel*.

Müller l. c. S. 242. No. 95. der *Kahlflügel*.

Fabric. S. E. p. 154. No. 142. *Brevirostris; thorace spinoso; cruce impresso; elytris ferrugineo punctatis*.

de Geer Ins. Tom. V. p. 275. t. 16. f. 1. *Charanson croix de chevalier*.

*Curculio (cruciatus) apterus brevirostris carinatus; antennis rectis; corpore ovato, atro subtus maculis rubris; thorace spinoso crucigero.*

### Unabgebildete Linnéische Rüsselkäfer.

#### I. Der ersten Classe.

- |    |     |     |                   |
|----|-----|-----|-------------------|
| 1. | No. | 5.  | <i>Cyaneus.</i>   |
| 2. | No. | 7.  | <i>Campanulæ.</i> |
| 3. | No. | 8.  | <i>Badensis.</i>  |
| 4. | No. | 9.  | <i>Aequatus.</i>  |
| 5. | No. | 10. | <i>Aterrimus.</i> |
| 6. | No. | 12. | <i>Pruni.</i>     |
| 7. | No. | 17. | <i>Dorsalis.</i>  |
| 8. | No. | 21. | <i>Cupreus.</i>   |
| 9. | No. | 22. | <i>Scaber.</i>    |

Aa 2

10. No.

\*) Nicht abgebildet.

10. No. 23. *T-album.*
11. No. 24. *Ruficollis.*
12. No. 25. *Quercus.*
13. No. 26. *Polygoni.*
14. No. 27. *Viscariae.*
15. No. 28. *2-punctatus.*
16. No. 29. *4-maculatus.*
17. No. 30. *5-maculatus.*
18. No. 31. *Pericarpius.*
19. No. 32. *Sprengleri.*
20. No. 33. *Vittatus.*
21. No. 35. *Anguinus.*
22. No. 36. *Afghanit.*
23. No. 40. *Populi.*

### II. Der zweiten Klasse.

1. No. 41. *Beccabungae.*
2. No. 42. *Alni.*
3. No. 43. *Salicis.*
4. No. 44. *Fagi.*
5. No. 45. *Segetis.*

### III. Der dritten Klasse.

1. No. 48. *Carbonarius.*
2. No. 49. *Mucoreus.*
3. No. 50. *Pufio.*
4. No. 52. *Stigma.*
5. No. 54. *Annulatus.*
6. No. 63. *Violaceus.*
7. No. 64. *5-punctatus.*
8. No. 65. *Hispidus.*
9. No. 67. *Tortrix.*

### IV. Der

## IV. Der vierten Klasse.

1. No. 69. *Ovatus.*
2. No. 70. *Cervinus.*
3. No. 71. *Oblongus.*

## V. Der fünften Klasse.

1. No. 74. *Argyreus.*
2. No. 75. *Regalis.*
3. No. 77. *Speciosus.*
4. No. 78. *Ruficornis.*
5. No. 81. *Incanus.*
6. No. 82. *Cloropus.*
7. No. 83. *Rufipes.*
8. No. 86. *Ater.*
9. No. 87. *Emeritus.*
10. No. 88. *Barbarus.*
11. No. 89. *Capensis.*
12. No. 91. *Cornutus.*
13. No. 92. *16-punctatus.*

## NEUE RÜSSELKÄEFERARTEN.

## I. Langrüssel mit dünnen Schenkeln.

I. *Vlicis*, der englische Rüsselkäfer auf dem Hecksaamen.

*Forsteri* nov. spec. Ins. Cent. I. p. 31. No. 31. Longirostris, femoribus simplicibus; cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus et femoribus primi paris rufi.

2. *Longipes*, der Langfuß von der S. Johannisinsel bey Madagascar.

*Drury* Ins. Tom. II. t. 33. f. 3.

*Longirostris, femoribus simpliçibus, totus rufobruneus-fuscus; pedibus anticis longissimis.*

3. *4-punctatus*, der *russische Vierpunkt*.

*Lepachins* Tageb. 2. Th. S. 204. t. II. f. 23.

*Longirostris; corpore griseo; thorace lineis duabus atque elytrorum punctis 4 albis.*

4. *Variegatus*, der *russische gescheckte Rüsselkäfer*.

*Lepachins* Tageb. 2. Th. S. 204. t. II. f. 33.

*Longirostris; albo nigroque varius, elytris apice acuminatis.*

5. *Gibbus*, der *Buckelrüsselkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1014.

*Longirostris, niger, ovatus, elytris violaceis fulcatis.*

6. *Similis*, der *schwarze Rüsselkäfer mit eyförmigen Flügeldecken*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1015.

*Longirostris, ater; elytris ovatis, punctato-striatis.*

7. *Nemoralis*, der *Waldrüsselkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1016.

*Longirostris niger; elytris striato-punctatis; oculis fuscis.*

8. *Politus*, der *glatte Rüsselkäfer*.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1017.

*Longirostris, niger; elytris cyaneis, striatis, nitidis.*

9. *Flavi-*

9. *Flavipes*, der Rüsselkäfer mit gelben Hüften.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 90. No. 1018.

*Longirostris*, niger, ovatus; *femoribus flavo-rufis*.

*Act. Nidr.* IV. 15.

10. *Griseus*, der aschgraue Rüsselkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 88. No. 974.

*Oblongus*, cinereus, *antennis rufis*.

11. *Nitidulus*, das schwarz violet glänzende Rüsselkäferchen.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 88. No. 975. *Oblongus nigro-violaceus*; *thorace elytrisque nigro virentibus*.

12. *Arvensis*, der Feldrüsselkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 88. No. 978. *Griseus*; *thorace terlineato*, *elytris rufis*, *obscure tessulatis*.

13. *Taberculatus*, der schwarze Rüsselkäfer mit dem Hökerschild.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 88. No. 979.

*Niger*; *thorace rugoso*; *elytris lineis tuberculisque muricatis*.

14. a. *Glaucimus*, der blaugrüne Rüsselkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 88. No. 989.

*Niger*; *thorace vtrinque linea pallida*; *tibiis rufis*.

14. b. *Trifolii*, der Kleekäfer.

*Müllers Suppl.* B. S. 230.

*Supra ater*; *femoribus pallidis*; *ventre niveo*; *elytris stiatis*.

15. *Gigas*, der *große japanische Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 127. No. 1. Longirostris, thorace  
elytrisque scabris; antennis apice albis.*

16. *Cruentatus*, der *Karolinsche Blutpunkt*.

*Fabric. S. E. p. 128. No. 3. Longirostris ater; tha-  
racis lineis, elytrisque punctis duobus sanguineis.*

17. *Paganus*, der *indianische Landmann*.

*Fabric. S. E. p. 128. No. 6. Longirostris, griseus;  
thoracis dorso fusco; arcubus cinereis; rostro bisul-  
cato.*

18. *Cruciatus*, der *neuholländische Rüsselkäfer mit  
einem Kreuz*.

*Fabric. S. E. p. 129. No. 8. Longirostris, subspi-  
nosus, niger, thorace lineis, elytris postice cruce albis.*

19. *Striatulus*, der *gestreifte Rüsselkäfer von der  
Insel Terre neuve in Amerika*.

*Fabric. S. E. p. 129. No. 9. Longirostris, niger;  
elytris holosericeo-striatis.*

20. *Iaceae*, der *Rüsselkäfer der Flockenblume*.

*Fabric. S. E. p. 129. No. 11. Longirostris, niger,  
cinereo-irroratus, elytris punto baseos distincto.*

21. *Biguttatus*, der *amerikanische Zweytropf*.

*Fabric. S. E. p. 130. No. 13. Longirostris, niger;  
elytris punto elevato, abdomine pedibusque posti-  
cis flavis.*

22. *Equi-*

22. *Equiseti*, der Rüsselkäfer auf dem englischen Kannenkraut.

*Fabric.* S. E. p. 130. No. 14. *Longirostris; thorace laevi; elytris muricatis nigris, punctis duobus apice-que albis.*

23. *Bicolor*, der amerikanische zweifarbig Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 131. No. 18. *Longirostris, niger, thorace elytrisque rufis.*

24. *Pubescens*, das deutsche raue Rüsselkäferchen.

*Fabric.* S. E. p. 131. No. 19. *Longirostris, violaceus, hirtus, rostro atro.*

25. *Tragiae*, das brasilianische kupferfarbige Rüsselkäferchen.

*Fabric.* S. E. p. 131. No. 21. *Longirostris, aeneus, rostro pedibusque nigris.*

26. *Aeneus*, das englische kupferfarbige Rüsselkäferchen.

*Fabric.* S. E. p. 131. No. 22. *Longirostris, niger, elytris aeneis.*

27. *Fuscirostris*, der deutsche Braunrüssel.

*Fabric.* S. E. p. 131. No. 23. *Longirostris, griseus, pedibus rufis, rostro feinoribusque basi nigris.*

28. *Nigrirostris*, der englische Schwarzrüssel.

*Fabric.* S. E. p. 132. No. 24. *Longirostris, viridis, rostro atro.*

29. *Rufirostris*, der englische Rothrüssel.

*Fabric. S. E. p. 132. No. 25. Longirostris, niger, rostro dimidiato pedibusque rufis.*

30. *Malvae*, der englische Malven-Rüsselkäfer.

*Fabric. S. E. p. 132. No. 30. Longirostris, griseus, elytris pedibusque testaceis.*

31. *Suturalis*, der deutsche Sahlweiden-Rüsselkäfer, mit der weißen Nath.

*Fabric. S. E. p. 133 No. 36. Longirostris, ovatus, fuscus; linea longitudinali alba.*

32. *Exclamationis*, das neuholländische Exclamationszeichen.

*Fabric. S. E. p. 133. No. 37. Longirostris, ater; elytris puncto lineolaque apicis albis.*

33. *Orizae*, das Reiß-Rüsselkäferchen.

*Fabric. S. E. p. 134. No. 40. Longirostris, piceus; thorace punctato, longitudine elytrorum; elytris punctis duobas rufis.*

*Linn. Amoen. acad. Vol. VI. p. 395. No. 19.*

*Longirostris, oblongus, niger; elytris maculis quatuor ferrugineis; femoribus muticis.*

34. *Barbicornis*, das neuseeländische Barthorn.

*Fabric. S. E. p. 134. No. 41. Longirostris, cylindricus; rostro longissimo, subtus barbato; elytris elongato clavatis.*

35. *Affimilis*, der dem vorigen sehr ähnliche neuseeländische Rüsselkäfer.

*Fabric.*

Fabric. S. E. p. 134. No. 42. Longirostris, cylindricus; rostro apice glabro, atro; elytris ferrugineo subfasciatis. Videtur mas praecedentis.

36. *Semipunctatus*, der neuzeeländische Halbpunktirte.

Fabric. S. E. p. 135. No. 43. Longirostris, cylindricus; thorace lineis, elytris punctis albis.

37. *Barbirostris*, der indianische Bartrüssel.

Fabric. S. E. p. 135. No. 45. Longirostris, niger; rostra barbato; tibiis anticis tridentatis.

38. *Angustatus*, die englische Punktstreife.

Fabric. S. E. p. 135. No. 46. Longirostris, cylindricus, ater; elytris obtusis striato-punctatis.

39. *Lineola*, die neuholändische Linie.

Fabric. S. E. p. 136. No. 48. Longirostris, cylindricus, niger; elytris vitta testacea.

40. *Linearis*, der straßburgische linienförmige Rüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 136. No. 49. Longirostris, elongatus, niger; antennis pedibusque piceis; rostro basi attenuato.

41. *Crassipes*, der straßburgische Dickfuß.

Fabric. S. E. p. 136. No. 50. Longirostris; femoribus anticis subclavatis, corpore atro.

42. *Elongatus*, der Windhund.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 269. Rhinom. I. Le Bec-mare levrette.

Corporē

Corpo angusto longo, niger, thorace fasciis quatuor albicantibus.

43. *Nigro-striatus*, der schwarzgestreifte Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 271. Rhinom. 6. Le Bec-mare noir strié.*

*Nigro-fuscus glaber, punctato-striatus.*

44. *Oblongus*, der längliche gestreifte Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. Rhinom. 7. Le Bec-mare allongé.*

*Nigro-viridesceus, oblongus, striatus.*

45. *Flavipes*, der Gelbfuß.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. Rhin. 8. Le Bec-mare noir à pattes rouges.*

*Subglobosus niger, striatus; femoribus rufis.*

*Fabric. S. E. p. 133. No. 33. Flavipes. Longirostris ater, femoribus luteis.*

46. *Pulex*, das Flohrüsselkäferchen.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. Rhinom. 9. Le Bec-mare-puce.*

*Subglobosus, villosus, niger, pedibus elytrisque rufis.*

47. *Rugosus*, der runzliche Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 278. Curc. 2. Le Charançon ride.*

*Totus fuscus rugosus.*

48. *Sulca-*

48. *Sulcatus*, der gefurchte Brustschild.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 278. *Circ. 3.* Le Charan-  
son à corcelet sillonné.

Fusco-nebulosus; thorace sulcato; elytris striatis.

49. *Nigro-suturatus*, die Schwarznath.\*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 279. *Circ. 4.* Le Charan-  
son à suture noire.

Oblongus; elytris villoso-cinereis, sutura nigra.

50. *Carduelis*, der Distelrüßelkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 281. *Circ. 8.* Le Charan-  
son tacheté des têtes de chardon.

Niger, striatus, maculis villoso-fusco nebulosis.

51. *Pulverulentus*, der bestäubte Rüsselkäfer.

*Scop.* Entom. carn. No. 75. Toton fuscus; thorax  
punctis prothinulisi scaber; elytra transversim rugosa.

52. *Centaureae*, der Skopolische Flockenblumen-  
Rüsselkäfer.

*Scop.* Entom. carn. No. 76.

Fuscus totus ovatus, tenui subrufo villo adspersus;  
rostro deflexo marginato; linea ad apicem elevata media.

53. *Auratus*, der goldne Rüsselkäfer.

*Scop.* Entom. carn. No. 77.

Toton viridi-aureus; antennis rostrique apice di-  
latato nigris.

54. *Ico-*

\*) Nach Fabric. ist es C. L. paraplecticus No. 34. Nach Müller  
Zool. p. 89. No. 998. vermutlich *Similis*, wie das Fragzeichen  
angezeigt. S. No. 8. 3. Kl.

54. *Icosandriae*, der achtgestreifte Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 85. Color atro-coeruleus. Rostrum porrectum. Elytrum octo-striatum.*

55. *Coerulescens*, der himmelblaue Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 87. Color obscure coeruleus; rostrum deflexum; elytrum decem-striatum.*

56. *Oleraceus*, der Kohlrüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 88. Globosus, nigricans, elytris puncto lineaque lunata ad apicem albi coloris.*

57. *Pellucens*, der durchsichtige Rüsselkäfer.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 90. No. 41.*

*Longirostris, muticus, alatus, parvus, flavicans; oculis et rostri apice nigris.*

58. *Piceus*, der pechfarbige Rüsselkäfer.

*de Geer Ins. Tom. V. p. 221. No. 14. Charanson couleur de poix.*

*Longirostris; antennis fractis fuscis; femoribus muticis; corpore oblongo nigro piceo.*

59. *Nigro-gibbosus*, der Schwarzhöker.

*de Geer Ins. Tom. V. p. 224. No. 17. Charanson noir bâsu.*

*Longirostris; antennis fractis, femoribus muticis; corpore ovato nigro; elytris tuberculatis postice cinnereis.*

60. *Castaneus*, der kastanienbraune Rüsselkäfer.

*de Geer Ins. Tom. V. p. 231. No. 19.*

Longi-

Longirostris; *antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore oblongo fusco-castaneo subtus nigro, elytris*  
*striato-punctatis gibbosis.*

61. *Fasciatus*, der graubandirte Rüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 234. No. 21. *Charanson*  
*rayé à longue trompe.*

Longirostris, *antennis fractis, femoribus muticis;*  
*corpore oblongo nigro-fusco; fasciis longitudinalibus*  
*griseis.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 2274.

*Cinereus; fasciis longitudinalibus dilutioribus.*

62. *Plantaginis*, der Wegerichrüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 237. No. 24. t. 7. f. 17. 18.  
*Charanson du Plantain.*

Longirostris; *antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore ovato griseo; thorace fasciis elytris macula*  
*magna punctisque fuscis.*

63. *Rostratus*, der Schnauzenrüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 252. No. 42. t. 7. f. 27. 28.  
*Charanson à museau.*

Longirostris; *antennis rectis; corpore oblonge ru-*  
*fo; capite elytrisque viridi-coeruleis nitidis.*

64. *Melanocephalus*, der surinamische Schuarzkopf.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 272. No. 6. t. 15. f. 27.  
*Charanson à tête et trompe noires.*

Longirostris; *antennis fractis; femoribus muticis;*  
*corpore subgloboso fusco; capite rostroque nigris ely-*  
*tris gibbis.*

65. *Fru-*

65. *Frugilegus*, der *surinamische Kornrüsselkäfer*.

de Geer Ins. Tom. V. p. 273. No. 7. *Charanson des grains*.

*Longirostris; antennis fractis; femoribus muticis; corpore oblongo castaneo; coleoptris maculis quatuor rufis; thorace longitudine elytrorum.*

66. *Nomas*, der *russische Nomas*.

Pallas Reis. I. Anh. No. 31. Ausz. I. S. 11. No. 31.

*Longirostris, oblongus, alatus; femoribus muticis; corpore subtus albo-tomentoso; elytris canescentibus, striis punctato-sulcatis.*

Müllers Suppl. B. S. 230. No. 40.

67. *Piceus*, der *russische pechförmige Rüsselkäfer*.

Pallas Reis. I. Anh. No. 34. Ausz. I. S. 12. No. 34.

*Totus piceus; Cerc. Palmarum egregie similis, sed quadruplo minor; elytris abdomen aequantibus.*

Müllers Suppl. B. S. 232.

68. *Longimanus*, die *kapensische Langhand*.

Fabric. App. S. E. pag. 822. *Longirostris; nigricans, elytris ferrugineis; rostro emarginato; pedibus anticus longioribus. Magnitudo fere 6 palmarum.*

II. *Springende Langrüssel mit dicken Hinterschenkeln.*

1. *Foliorum*, der *Blätterrüsselkäfer*.

Müller's Faun. Fridr. p. 10. No. 102.

*Longirostris, pedibus saltatoriis; corpore femoribusque atris; antennis pedibusque luteis.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1010.

2. *Sub.*

2. *Subater*, das schwärzliche raue Springrüsselkäferchen.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1005.

*Tomentosus*, elytris striatis; antennis tarsisque flavis.

3. *Testaceus*, der muschelbraune Springrüsselkäfer.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1006.

Pallide flavus; elytris striatis; oculis abdomineque nigris.

4. *Rufus*, der fuchsfichte Springrüsselkäfer.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1007.

Elytris striatis; oculis abdomineque nigris.

5. *Setosus*, der borstige Springrüsselkäfer.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1008.

Rufus, oculis, pectore abdomineque basi nigris.

6. *Alni*, das englische Erlen-Springrüsselkäferchen.

*Fabric*. S. E. p. 144. No. 90.

*Pedibus saltatoriis*, niger; *coleoptris testaceis*; *maculis duabus obscuris*.

7. *Viminalis*, das deutsche Bindweiden-Springrüsselkäferchen.

*Fabric*. S. E. p. 145. No. 92.

Longirostris; *pedibus saltatoriis*; *corpore testaceo*.

8. *Vimi*, der Ulme- oder Rüster-Springrüsselkäfer.

*de Geer* Ins. Tom. V. p. 260. No. 48. t. 8. f. 5. *Charanson sauteur de l'Orme*.

*Circ.* (*Saltator Vimi*) longirostris, corpore ovato flavo-testaceo, oculis nigris.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 286. Curr. 19. Le Charan-  
son sauteur brun.*

Rufus, *femoribus posticis crassioribus; elytris rufis.*  
*Reaum. Inf. Tom. 3. p. 31. t. 3. f. 17. 18.*

### III. Langrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

#### 1. *Colon*, der Kolanrüttselkäfer.

*Linn. Mantiss. p. 531.*

*Longirostris canescens; femoribus anticis subdenta-  
tis; thorace vtrinque linea elytrisque puncto albo.*

*Fabric. S. E. p. 130. No. 12.*

*Longirostris, griseus; elytris puncto albo.*

*Scop. Entom. carn. No. 104. Gürçülio pilosus.*

*Proboscis thorace longior; thorax linea laterali  
pallidior — elytra coadunata; cinerascentia, albo  
puncto in medio signata.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 280. Curr. 6. Le Charanson  
à deux points blancs.*

*Oblongus, fuscus; thoracis lateribus albidos; ely-  
tris striatis, puncto albo.*

*Schneff. Icon. t. 155. f. 2.*

*Müllers Suppl. B. S. 229. der Kolanküfer.*

#### 2. *Arator*, der Kornährenrüttselkäfer.

*Linn. Maut. p. 531.*

*Longirostris, subovatus; thorace fusco, lineis tri-  
bus pallidis; elytrorum futura nigro-dentata; pedibus  
fuscis edentulis.*

*Müllers Suppl. B. S. 229. der Pflüger.*

#### 3. *Muricatus*, der amerikanische Warzenrüttsel- käfer.

*Drury Inf. Tom. II. t. 34. f. 4.*

Totus

Totus fuscō-nigricans, *elytris verrucosis striatis; femoribus vnidentatis.*

4. *Longimanus*, die *englische Langhand.*

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 32. No. 32. *Longirostris; femoribus dentatis, manibus longissimis.*

5. *Pollinarius*, der *englische bestäubte Rüsselkäfer.*

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 33. No. 33. *Longirostris; femoribus omnibus dentatis; elytris depressis planis abbreviatis; ventre, elytrorum margine et pedibus polline adspersis.*

6. *Albicans*, der *Russische Weißaftter.*

*Lepechins* Tageb. 2. Th. S. 206. t. 10. f. 6. *Longirostris; tuberculis thoracis 5; elytrorum 6; ano albo; tibiis dentatis.*

7. *Vrticae*, der *Nesselrüsselkäfer.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 983. *Niger planiusculus; thorace vtrinque dentato; elytris striatis, postice bipunctatis.*

8. *Similis*, der *dem Braunwurzrüsselkäfer ähnliche.* \*)

*Müller* Zool. Dan. Prodr. pag. 89. No. 998. *Subglobosus rufus; elytrorum lineis elevatis, albo nigroque tessulatis.*

Bb 2

9. *Bidens,*

\*) Nach dem Müller ist dieses des *Geoffroi* Cuc. 4. T. I. p. 279.

Nach Fabricio aber dieser *Geoffroische* des Linn. Cuc. *paraplecticus* No. 34. S. No. 49. 1. Kl.

9. *Bidens*, der *neuseeländische zweygezähnte Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 136. No. 51. Longirostris; femoribus posticis dentatis niger; elytris vniispinosis.*

10. *Scaber*, der *kayennische höckrige Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. pag. 137. No. 54. Longirostris; femoribus dentatis; elytris sulcatis, tuberculato spinosis.*

11. *Cylindrirostris*, der *neuholländische Walzenrüssel*.

*Fabric. S. E. p. 137. No. 55. Longirostris; femoribus dentatis; thorace scabro; elytris postice bituberculatis.*

12. *Caliginosus*, der *englische schwärzliche Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 137. No. 58. Longirostris; femoribus dentatis, oblongus; elytrorum striis punctatis approximatis.*

13. *Reticulatus*, der *trankebaristhe Rüsselkäfer mit netzförmigen Flügeldecken*.

*Fabric. S. E. p. 138. No. 60. Longirostris; femoribus dentatis; oblongus, piceus; elytris reticulatis; fasciis obliquis pallidis; tibiis anticis spinosis.*

14. *δ-guttatus*, der *amerikanische Sethstropf*.

*Fabric. S. E. p. 138. No. 62. Longirostris; femoribus dentatis, niger; elytris maculis tribus albis.*

15. *Luridus*, der neuholändische dunkelschwarze Rüsselkäfer.

*Fabric. S. E. p. 138. No. 63.* Longirostris; femoribus dentatis, ovatus, obscure niger; elytris punctatostriatis.

16. *Meditabundus*, der neuholändische ernsthafte Rüsselkäfer.

*Fabric. S. E. p. 139. No. 64.* Longirostris; femoribus dentatis; elytris striatis, postice acuminatis.

17. *Stupidus*, der neuholändische unansehnliche Rüsselkäfer.

*Fabric. S. E. p. 139. No. 65.* Longirostris; femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis.

18. *Mangiferae*, der Rüsselkäfer in den Kernen der Mangasfrucht.

*Fabric. S. E. p. 139. No. 66.* Longirostris; femoribus dentatis, griseus, thorace linea, punctisque duobus dorsalibus albis.

19. *Gravis*, der kapensische rostfarbig gescheckte Rüsselkäfer.

*Fabric. S. E. p. 140. No. 69.* Longirostris; femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo variegatis, femoribus canaliculatis.

20. *Haemorrhoidalis*, der neuholändische Rothafteter.

*Fabric. S. E. p. 140. No. 71.* Longirostris; femoribus dentatis; thorace fuscō, lateribus cinerascentibus; elytrorum futura apice ferrugineo.

21. *Trimaculatus*, der *elsässische Dreyfleck*.

Fabric. S. E. p. 141. No. 72. *Longirostris; femoribus dentatis; coleoptris nigris, maculis tribus cinereis, postica communi lunata.*

22. *Litura*, der *europeische Rüsselkäfer mit der schwarzen Rückenlinie*.

Fabric. S. E. p. 141. No. 73. *Longirostris; femoribus dentatis, albo nigroque varius, rostro atro; thoracis linea dorsali nigra.*

23. *Proboscideus*, der *nördlichamerikanische Rüsselkäfer mit außerordentlich langem Rüssel*.

Fabric. S. E. p. 142. No. 78. *Longirostris; femoribus dentatis; griseus, rostro corpore duplo longiore.*

24. *Varius*, die *kayennische Schecke*.

Fabric. S. E. p. 142. No. 79. *Longirostris; femoribus dentatis omnibus, griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis.*

25. *Cerasorum*, der *englische Kirschrüsselkäfer*.

Fabric. S. E. p. 142. No. 80. *Longirostris; femoribus dentatis, fuscus, scutello, elytrorumque fasciis obsoletis, cinereis.*

26. *Amoenus*, der *neuholländische anmutige Rüsselkäfer*.

Fabric. S. E. p. 142. No. 81. *Longirostris; femoribus dentatis, ater, thorace punctis duobus; coleoptris quinque niveis.*

27. *4-pustulatus*, die kapensische Vierblätter.

*Fabric.* S. E. p. 144. No. 88. Longirostris; femoribus dentatis, niger, elytris maculis duabus ferrugineis.

28. *Elongatus*, der jamaische lange Brustschild.

*Fabric.* S. E. p. 144. No. 89. Longirostris; femoribus dentatis; thorace elongato; tibiis anticis bidentatis.

29. *Tuberculatus*, der Rüsselkäfer mit vier Reihen Höckern auf den Decksschilden.

*Scop.* Ent. carn. No. 80. Niger, thorace lateribus albidis; elytro seriebus 4 tuberculorum.

30. *Cariosus*, der Rüsselkäfer in den faulen Birnbaumen.

*Scop.* Entom. carn. No. 81. Oblongus, rostro porrecto; tereti, nitidulo, elytris striatis; femoribus anticis crassioribus et majore dente notatis.

31. *Syngenesiae*, das hirschfarbige raue Rüsselkäferchen.

*Scop.* Entom. carn. No. 82. *Cervinus*, brevissimis villis adspersis, rostro nigro; apice nitido.

32. *Fuscus*, der braune Rüsselkäfer mit weißem Rückenschild.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 300. *Curc. 50.* Le Charançon brun à ecouffon blanc.

*Fuscus*, scutello puncto albo, elytris macula rubescente.

33. *Fraxini*, der Eschenrüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 212. No. 4. *Charanson du Fresne.*

*Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore subglobose griseo; coleopitis macula magna fusca dorsali.*

34. *Vlmi*, der Rüsterknospen-Rüsselkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. p. 215. No. 8. t. 6. f. 26. 27. *Charanson des boutons de l'Orme.*

*Longirostris; antennis fractis, femoribus dentatis; corpore oblongo rufo-fusco; elytris macula nigricante, proboscide nigra.*

35. *Pulverulentus*, der surinamische Puderläufer.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 268. No. 3. t. 15. f. 24. *Charanson poudré.*

*Longirostris; antennis fractis; femoribus dentatis; corpore oblongo nigro; elytris cinereo maculatis.*

36. *Crucifer*, der Kreuzsträger:

Pallas Reis. I. Th. Anh. No. 35. Ausz. S. 12. No. 35. Aequalis Curc. Scrophulariae, subitus flavo-cinereus tomento nitido; supra fuscus; elytris nota ad scutellum cruciformi; femora omnia dentata.

Müllers Suppl. B. S. 231. No. 67.

37. *Iros*, der Iris-Rüsselkäfer.

Pallas Reis. II. Th. Anh. No. 57.

Triplo major Schöphul. corpus totum candidum.

Müllers Suppl. B. S. 230. No. 67. der Schwertelkäfer.

## IV. Kurzrüssel mit gezähnelten Schenkeln.

1. *Gemmatus*, der äugigte Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 90. Apterus, niger; elytris coadunatis scabris maculatis; maculis argenteo-viridibus.*

*Naturforscher 6. St. S. 97. t. 4. f. 6.*

2. *Authracinus*, der kohlschwarze Rüsselkäfer.

*Scop. Ent. carn. No. 92. Totus niger, elytra punctatim striata; femora omnia videntata.*

3. *Trifis*, der Trauerrüsselkäfer.

*Scop. Ent. carn. No. 93. Fuscus, elytra punctis scabra, substriata, villosula, coadunata.*

4. *Infidus*, der Rüsselkäfer von betrügerischer Farbe.

*Scop. Ent. carn. No. 94. Nudis oculis inspectus obsolete cupreus; ad lentem vero coerulestentibus nitidis prostratis villis superne adspersus haeret.*

5. *Pruni*, der die Pflaumenblätter zusammenwickelnde Rüsselkäfer.

Vilosulus niger; antennis elytris pedibusque rufis.

6. *Coelestinus*, der ganz himmelblaue Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 96. Totus coeruleus; antennis pedibusque sanguineis.*

7. *Glaucus*, der blaugrauliche Rüsselkäfer.

*Scop. Entom. carn. No. 97. Fuscus, glaucescens tenui villo adspersus, nullibi scaber; elytris punctatim sparsis.*

8. *Rufipes*, der *Skopolische Rothfuß*.

*Scop. Entom. carn. No. 98. Fuscus, villosulus,  
parumper nitens, antennis pedibusque rufis.*

9. *Roeselii*, das *Röfelsche Nelkenrüsselkäferchen*.

*Röfels Infektenbelust. III. B. S. 391. t. 67. f. A, B,  
C, D.*

*Crassirostris; elytris fusco-fulvis, lineis elevatis  
fulcatis; thorace obscure-viridi, linea longitudinali  
ad finem proboscidis alba.*

10. *Levistici*, der *Müllerische Liebstöckel-Rüssel-  
käfer*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 963. Niger,  
elytris substriatis; oculis rufis.*

11. *Punctatus*, der *Müllerische Blaßpunkt*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 964. Ater,  
elytris subfulcatis, pallide punctatis; oculis rufis.*

12. *Squamifer*, der *Schuppenträger*.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 968. Oblon-  
gus; elytris griseo-nigroque striatis.*

13. *Specabilis*, der *neuholländische schöne Rüssel-  
käfer*.

*Fabric. S. E. p. 155. No. 144. Brevirostris; femo-  
ribus dentatis; corpore viridi nigroque variegato.*

14. *Sulcatus*, der *sächsische gefurchte Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 155. No. 146. Brevirostris; femo-  
ribus dentatis, ater, elytris striatis; ferrugineo-ma-  
culatis.*

15. *Viridarius*, der *tranquebarische Grünling*.

*Fabri*. S. E. p. 155. No. 149. *Brevirostris; femoribus dentatis, viridis; ore antennisque nigris, oculis atris.*

16. *Attelaboides*, der *brasilianische attelabusförmige Rüsselkäfer*.

*Fabri*. S. E. p. 156. No. 152. *Brevirostris; femoribus dentatis; rostro elytrisque vnituberculatis.*

17. *Coronatus*, der *gekrönte Rüsselkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 291. *Curs. 34. Le Charançon à corcelet couronné.*

*Niger, apterus; thorace vtrinque puncto duplici fulvo; basi pilis fulvis coronata.*

18. *Tigris*, der *gefleckte Tiger*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 292. *Curs. 35. Le Charançon tigrée.*

*Niger, maculis villoso-flavis, elytris subrugosis.*

19. *Rugoso-striatus*, der *gestickte Rüsselkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 293. *Curs. 37. Le Charançon cartisanne.*

*Fuscus, apterus, elytris rugoso-striatis.*

20. *Geographicus*, der *geographische Rüsselkäfer*.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 294. *Curs. 40. Le Charançon geographique.*

*Subglobosus, nigro-fuscus, squamosus, lineolis albis variegatus.*

21. *Transverso-vittatus*, die Queerstreife.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 295. Curr. 41. Le Charan-*  
*son brun à bandes transverses de taches blanches.*

*Fuscus; elytris striatis; macularum albarum fascia*  
*triplici transversa.*

22. *Albo-punctatus*, der Weißpunkt.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 299. Curr. 47. Le Charan-*  
*son brun à points blancs.*

*Subglobosus, squamosus, cinereo-fuscus; elytro-*  
*rum maculis tribus et apice albis.*

23. *Sericinus*, der Sammetrißselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 300. Curr. 52. Le Charan-*  
*son velouté.*

*Obscure rufus, villis cinereis adspersus; rostro tho-*  
*race breviore.*

24. *Virgo*, die Jungfrau.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 301. Curr. 53. Le Charan-*  
*son vierge.*

*Oblongus; villis cinereis adspersus, rostro thorace*  
*aequali.*

25. *Griseo-punctatus*, der Graupunkt.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 217. No. 9. Charanson*  
*noir à points gris.*

*Brevirostris; antennis longis fractis; femoribus*  
*dentatis; corpore oblongo nigro; punctis flavescenti-*  
*bus sparsis.*

## V. Kurzrüssel mit ungezähnelten Schenkeln.

1. *Scabriculus*, das gehöckerte Rüsselkäferchen.

*Linn.* Mantiss. p. 531. *Brevirostris, femoribus multicis, cinereus, elytris hispidis.*

*Fabric.* S. E. p. 149. No. 113. *Brevirostris; corpore cinereo hispido.*

*Müllers Suppl. B. S. 233. No. 96. g.* der Stachelkäfer.

2. *Singularis*, der seltsame Rüsselkäfer mit ausgehöhlten Punkten.

*Linn.* Add. p. 1066. No. 3. *Subbrevirostris, cinereus; elytris striis punctatis; punctis excavatis centro eminentibus.*

*Müllers Suppl. B. S. 232. No. 96. e.* der Warzenkäfer.

3. *Carinatus*, der Rüsselkäfer mit eckigen gehöckerten Flügeldecken.

*Linn.* Add. p. 1066. No. 4. *Subbrevirostris, niger; thorace subcarinato, elytris angulatis tuberculatis.*

*Müllers Suppl. B. S. 233. N. 96. f.* der Kielkäfer.

4. *Aurifer*, die jamaische Goldstreife.

*Drury* Ins. Tom. I. t. 32. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 147. No. 103.

*Brevirostris, corpore ferrugineo, aureo-maculato.*

5. *Globosus*, der kapensische hügliche Rüsselkäfer.

*Drury* Ins. Tom. I. t. 32. f. 4.

*Fabric.* S. E. p. 153. No. 135.

*Brevirostris; thorace spinoso, quinque sulcato; elytris laevibus.*

6. *Imperialis*, der *brasiliensis* majestätisch prächtige Rüsselkäfer.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 1.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 34. No. 34. *Brevirostris ater*; *femoribus muticis*; *thoracis linea longitudinali*; *elytrorumque punctis per sticas dispositis viridi-inauratis*.

7. *Rufescens*, der *jamaische Fuchs*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 33. f. 4.

*Cupreo-fuscus totus*, *brevirostris*; *femoribus muticis*; *elytris substriatis*.

8. *Similis*, der *jamaische grauschwarzlich gestreifte dem vorigen sehr ähnliche Rüsselkäfer*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 3.

*Totus griseo-nigro-striatus*; *elytris nigris, virid-aureo-maculatis*.

9. a. *Ornatus*, der *kupffirfarbige große ausländische Prachtrüsselkäfer mit grauen Punktsstreifen*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 3.

*Nigro-cupreo-fuscus*; *thorace linea lata longitudinali nigra griseo-lunulata*, *elytris punctis griseis striatis*; *femoribus rubro-maculatis*.

9. b. *Niger*, der *Schwarze Rüsselkäfer von der S. Johannisiinsel*.

*Drury* Inf. Tom. II. t. 34. f. 2.

*Totus niger*, *capite brevi, rotundatoque*; *brevirostris*, *femoribus muticis*; *elytris striatis*.

10. *Oedematosus*, der amerikanische Oehlbein-Rüsselkäfer.

*Sulzers Gesch.* S. 40. t. 4. f. 10.

Niger, glaber, politus; *elytris* rubreis.

11. *Noveboracensis*, der neuylorfsche graue schwarz und weiß punktirt gestreifte Rüsselkäfer.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 35. No. 35.

*Brevirostris*, muticus, canus; *elytris* subfastigiatis; striis quinque albidis nigro-punctatis, scutello flavicante.

12. *Melanogrammus*, der schwärzlich gezeichnete englische Rüsselkäfer.

*Forsteri* nov. sp. Inf. Cent. I. p. 36. No. 36. *Brevirostris*; *femoribus* muticis; *corpo* cano; *futura elytrorum* antice nigra, nitida, *rostro* brevissimo.

13. *Cypri*, der Hasselquistische Cyprische Rüsselkäfer.

*Hasselqu.* Reis. S. 449. No. 100.

*Mediocris*, *sulcus*, *linea longitudinali* atra in dorso.

14. *Albicans*, der russische graulich weiße Rüsselkäfer.

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 313. t. 17. f. 7.

*Brevirostris*, *apterus*, supra *albicans*; infra dilute *roseus*; thorace bicupidato; *elytris* sulcatis, punctis canis adspersis.

15. *Nassiformis*, der Rüsselkäfer mit der Reuse.

*Lepechins* Tageb. II. Th. S. 203. t. 11. f. 27.

*Brevirostris*; *corpo* cano; *elytris* sulcatis nigro-immaculatis.

16. 2-pun-

16. *2-punctatus*, der *Rüsselkäfer mit zween Punkten*.

*Lepechins* Tageb. II. Th. S. 205. t. II. f. 25.

*Brevirostris; thorace scabro; elytris nebulosis;*  
*punctis 2 prope apicem nigris nitidis.*

17. *Guttatus*, der *tüpfeliche Rüsselkäfer*.

*Lepechins* Tageb. II. Th. S. 205. t. II. f. 30.

*Brevirostris niger, vellere rufescente obsitus pun-*  
*ctulis innumeris nigris in elytris transparentibus.*

18. *Piger*, der *Faulenzer*.

*Scop. Entom. carn. No. 65.*

*Rostrum striis elevatis senis, lateralibus apice con-*  
*junctis; femora antica clavata.*

19. *Resinosus*, der *Harzpfanzenrüsselkäfer*.

*Scop. Ent. carn. No. 67. Niger, scaber; abdomine*  
*subtus; elytrisque apice albidis.*

20. a. *Iners*, der *zehngestreifte punktierte Rüssel-*  
*käfer*.

*Scop. Ent. carn. No. 68. Rostrum linea vnica ele-*  
*vata; elytrum striis 10 punctatis.*

20. b. *Piceus*, der *Pechrüsselkäfer*.

*Scop. Ent. carn. No. 69. Thorax et elytra picea;*  
*abdomen nigrum; subtus albidum; femora clavata.*

21. *Erraticus*, der *Schwärmer*.

*Scop. Entom. carn. No. 70. Rostrum apice concavum;*  
*elytrum villosulum; striatum; stria tertia tu-*  
*berculata.*

22. *Populi,*

22. *Populi*, der *Pappelnrißselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 74. Color, facies, et omnia  
Curc. Limn. Fagi No. 44 sed femora aequalia.

*Füßlins Verz.* S. II. No. 216.

23. *C-album*, das *Skopolische weisse C.*

*Scop.* Ent. carn. No. 99. Cupreo-nigroque varius;  
angulo extero baseos elytri singuli linea arcuata alba,  
itteram C. referente signato.

24. *Sensitivus*, der *empfindliche Rüsselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 100. Niger; femoribus fulvis,  
apice nigris; captus valde se torquens.

25. *Nemoreus*, der *Skopolische Waldrißselkäfer*.

*Scop.* Entom. carn. No. 101. Apterous niger, opa-  
cus; rostro bifido; capite glabro; thorace elytrisque  
scabris acuminatis.

26. *Momus*, der *Skopolische Momus*.

*Scop.* Ent. carn. No. 102. Proboscis superne sulcis  
duobus; abdomen inter pedes posticos fulvo villo to-  
mentosum; femora antica crassiora.

27. *Zoilus*, die *Skopolische Schecke*.

*Scop.* Ent. carn. No. 103. Rostrum deflexum; ely-  
trum striatum; et punctis nigris variegatum, uno ma-  
jore communi ad apicem.

*Füßlins Verz.* S. II. No. 217.

28. *Quercus*, der *Skopolische Eichenrißselkäfer*.

*Scop.* Ent. carn. No. 106. Niger, scutello trilobo;  
lubo antico albo, elytro unipunctato; puncto albo.

29. *Punctatus*, der *Skopolische punktirte Rüsselkäfer*.

*Scop. Ent. carn. No. 107.* Niger, *thorace* albido; *elytro* striis elevatis 5 nigris, albo-punctatis.

30. *Fasciatus*, der *Skopolische bandirte Rüsselkäfer*.

*Scop. Entom. carn. No. 108.* Rufus, *villosum*; *elytro* fasciis duabus obscurioribus, obsoletis.

31. *Praecox*, der *frühzeitige Rüsselkäfer*.

*Scop. Ent. carn. No. 109.* Ferrugineus, *elytra* striata, *villosum*, sub fine *Aprilis*.

32. *Tricolor*, der *dreyfarbige Rüsselkäfer*.

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 91. No. 45.* *Brevirostris*, *inermis*, niger, *thorace* punctis binis albis; *elytra* punctata margine interno albo lineisque binis longitudinalibus flavis.

33. *Candidatus*, der *russische Weißbauch*.

*Pallas Reis. I. Anh. No. 32. Ausz. I. S. II. No. 32.* *Brevirostris*, oblongus, *subitus pedibusque albus*; *femoribus* muticis.

*Müllers Suppl. B. S. 231. No. 96.* der *Candidat*.

34. *Pictus*, der *gemahlte Rüsselkäfer*.

*Pallas l. c. No. 33.* *Alatus*, *minor*, *pulcherrimus*, *albus*; *brevirostris*; *thorax* fasciis tribus longitudinalibus.

*Müllers Suppl. B. S. 232. No. 96.*

35. *Inderiensis*, der *weiße Rüsselkäfer am inderischen See*.

*Pallas*

Pallas l. c. No. 36. *Brevirostris, femoribus muticis, totus albus; thorax scaberrimus, mucroneque vtrinque conico cornutus; elytra striis profunde punctatis.*

Müllers Suppl. B. S. 232. No. 96. d.

36. *Dentirostris*, der Zahnrißsel.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 941. *Ovatus, niger; rostro apice quadridentato.*

37. *Tardus*, der Träge.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 942. *Nigricans; thorace elytrisque vtrinque rufis; macula apicis atra.*

38. *Murinus*, der mausefahle Rüsselkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 943. *Ovatus, nigricans, elytris pallide maculatis.*

— — Faun. Fridr. p. 12. No. 116.

39. *Fasciatus*, der Müller'sche bandirte Rüsselkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 944. *Oblonus ater; thorace vtrinque; elytris fasciis duabus suturaque albis tomentosis.*

40. *Nodosus*, der knotige Rüsselkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 948. *Cane-scens; elytris nodulis minimis striatis.*

Olaff's Reis. durch Isl. I. Th. S. 319. *Silakkepr.*

41. *Longicornis*, das Müller'sche Langhorn.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 949. *Nigricans; thorace hirto; elytris cinereis; maculis flavican-tibus; pedibus antennisque rufis.*

42. *Opacus*, der dunkelgraue Rüsselkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 950. Griseus*  
absque striis et punctis.

43. *Latirostris*, der Müllersche Breittrüffel.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 951. Griseus,*  
antennis pedibusque rufescentibus.

44. *Maculosus*, der gelbgefleckte Rüsselkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 952. Ovatus,*  
obscure flavicans; *elytris luteo-maculatis.*

45. *Carinatus*, der gewölbte Rüsselkäfer.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 955. Cervinus,*  
ovatus; *elytris lineis tribus elevatis; futura po-*  
*stice carinata.*

46. *Striatus*, der dreifach gestreifte Brustschild.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 956. Elonga-*  
*tus, cinereus; thorace terlineato; antennis nigris.*

47. *Mollis*, die weiche Flügeldecke.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 960. Brevi-*  
*rostris, griseo-auratus; nitens, femoribus muticis;*  
*elytris mollibus.*

*Akt. Nidr. IV. p. 12. t. 16. f. 6.*

48. *Fasciatus*, die Rothbinde.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 961. Brevi-*  
*rostris, griseo-nitens; fastiis elytrorum undulatis fer-*  
*rugineis.*

*Akt. Nidr. IV. p. 13.*

49. *Bifpi-*

49. *Bispinus*, der Zweydorn.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1023. *Rhinom.* coeruleus; thorace vtrinque spinoso; antennis nigris.

*Schaeff.* Icon. t. 6. f. 4.

50. *Inermis*, der unbewehrte Rüsselkäfer.

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1025. *Rhinom.* violaceus; thorace mutico; puncto vtrinque impresso; antennis nigris.

*Schaeff.* Icon. t. 56. f. 8.

51. *Marginatus*, der amerikanische Goldrand.

*Fabric.* S. E. p. 145. No. 96.

*Brevirostris*, fuscus; *elytrorum* futura abdominis-que marginibus aureis.

52. *19-punctatus*, der kayennische Neunzehnpunkt.

*Fabric.* S. E. p. 145. No. 97.

*Brevirostris*, canescens; thorace punctis nigris qua-tuor; coleoptris novendecim.

53. *Decorus*, der brasiliische zierliche Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 146. No. 99.

*Brevirostris*, supra fuscus; thorace coleoptrisque vit-tis duabus viridi-aureis.

54. *Nitidulus*, der kayennische Grünglanz.

*Fabric.* S. E. p. 146. No. 100.

*Brevirostris*; femoribus muticis, viridi-tomento-fus; *elytris* punctatis.

55. *Candidus*, der kayennische Weißdorn.

*Fabric.* S. E. p. 146. No. 101.

*Brevirostris*; femoribus muticis; *elytris* spinosis al-bis; macula laterali fusca.

56. *Crenulatus*, der *neuholländische geriebte Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 147. No. 105.*

*Brevirostris, cinereus; elytris tribus lineis elevatis, crenulatis, atris.*

57. *Longimanus*, die *brasiliatische Langhand*.

*Fabric. S. E. p. 147. No. 107.*

*Brevirostris, fuscus; thorace margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis.*

58. *Griseus*, der *englische graue Rüsselkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 148. No. 108.*

*Brevirostris, supra griseo-fuscus, subtus cinereus, rostro canaliculato.*

59. *3-guttatus*, der *englische Dreytropf*.

*Fabric. S. E. p. 148. No. 109.*

*Brevirostris, nigricans, elytris griseis; maculis duabus albis; posteriori majori communi.*

60. *Coryli*, der *englische Haselnusskäfer*.

*Fabric. S. E. p. 148. No. 110.*

*Brevirostris; cinereo-fuscoque varius; elytrorum futura dimidiata, atra.*

61. *Lunatus*, der *englische Schwarzmond*.

*Fabric. S. E. p. 148. No. 112.*

*Brevirostris; coleoptris elevato-striatis, fascia semi-circulari maculaque postica albis; lunula nigra.*

62. *Trifinis*, der *Trauerkäfer*.

*Fabric. S. E. p. 149. No. 117.*

*Brevirostris, niger, elytris striatis cinereis.*

63. *Ad-*

63. *Adspersus*, der neuholändische besprengte Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 149. No. 118.

*Brevirostris*, ater; *elytris* postice albo-maculatis.

64. *Punctatus*, der schwedische Punktrüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 119.

*Brevirostris*, fuscus; *elytris* punctis holosericis elevatis, margineque flavo.

65. *Obscurus*, der schwedische dunkelrostfarbige Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 120.

*Brevirostris*, ovatus, ferrugineo-fuscus.

66. *Niger*, der schwarze deutsche Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 121.

*Brevirostris*, ovatus, *niger*, scaber, pedibus rufis.

67. *Variolosus*, der sächsische Blatterkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 122.

*Brevirostris*, *niger*; thorace carinato varioloso; *elytris* striatis.

68. *Valgus*, der amerikanische sperrbeinige Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 150. No. 123.

*Brevirostris*, ater, nitens; *elytris* punctato-striatis; *femoribus* annulo cinereo.

69. *Rohrii*, der amerikanische Rohrische Rüsselkäfer.

*Fabric.* S. E. p. 151. No. 126.

*Brevirostris*; *elytris* acuminatis griseis; *margine baseos* flavescente.

70. *Latirostris*, der sächsische Breitrißsel.*Fabric. S. E. p. 151. No. 128.*

Brevirostris; rostro latissimo; explanato; *elytris* apice albis, punctis duobus nigris.

71. *Vitulus*, das Feuerländische Kalb.*Fabric. S. E. p. 152. No. 131.*

Brevirostris, niger; fronte bidentata; *elytris* unispinosis.

72. *Acuminatus*, der neuseeländische Spitzflügel.*Fabric. S. E. p. 152. No. 132.*

Brevirostris, cylindricus, fuscus, *elytris* apice acuminatis.

73. *Cultratus*, der neuholändische zweyhöckrige Brustschild.*Fabric. S. E. p. 153. No. 136.*

Brevirostris; thorace tuberculis duobus compressis; *elytris* tuberculatis, postice cinereis.

74. *Tribulus*, der neuholändische Dornträger.*Fabric. S. E. p. 153. No. 138.*

Brevirostris, cinereus; thorace scabro; antice impresso; *elytris* spinosis.

## 75. 4-dens, der neuholändische Vierzahn.

*Fabric. S. E. p. 153. No. 139.*

Brevirostris, cinereus; thorace scabro; *elytris* spinosis; spinis quatuor posticis longioribus.

76. *Clavus*, der neuholändische Keulrißsel.*Fabric. S. E. p. 154. No. 140.*

Brevirostris, albicans; thorace canaliculato; *coeloptris* spinosis; lineolis tribus baseos rubris.

77. *Nodulosus*, der *kapensische knotige Rüsselkäfer*.

*Fabri*. S. E. p. 154. No. 141.

*Brevirostris; thorace lineis sex nodulosis; elytris spinosis.*

78. *Ocellatus*, der *madagaskarische äugigte Rüsselkäfer*.

*Fabri*. S. E. p. 154. No. 143.

*Brevirostris; thorace spinoso, antice excavato; elytris cinereis, punctis atris subspinosis.*

79. *Obesus*, der *kapensische Dickbauch*.

*Fabri*. App. S. E. p. 822.

*Brevirostris, ater; thorace spinoso; inaequali, elytris rubris, punctis nigris confertis.*

80. *Rubifer*, der *kapensische Rothorn*.

*Fabri*. S. E. App. p. 822.

*Brevirostris, cinereus; thorace scabro; elytris spinis elevatis sanguineis.*

81. *Globifer*, der *kapensische Kugelträger*.

*Fabri*. S. E. App. p. 823.

*Brevirostris; thorace scabro; elytris spinosis, postice acuminato.*

82. *Transverso-fasciatus*, die *Queerstreife*.

*Geoffr. Ins. Tom. I. p. 280. Cerc. 7. Le Charançon à deux bandes transverses.*

*Nigro-fuscus; thorace vtrinque fascia longitudinali; elytris dupli transversa cinerea.*

83. *Striato-punctatus*, die Punktstreife.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 281. Curr. 9. Le Charan-  
son brodé.*

Niger; thorace punctato; elytris alternatim striatis  
et punctatis.

84. *Sulcatus*, der *Geoffroische gefurchte Rüssel-  
käfer.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 282. Curr. 11. Le Charan-  
son noir à sillons.*

Oblongus, totus niger; thorace punctato; elytris  
sulcatis.

85. *Cupreo-squamulosus*, die Kupferschuppe.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284, Curr. 14. Le Charan-  
son écailloux à bandes.*

Rostro thorace breviore; squamis nitentibus; tho-  
racis elytrorumque fasciis longitudinalibus.

86. *Griseus*, der *Geoffroische grauliche Rüssel-  
käfer.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. Curr. 15. Le Charan-  
son grisette.*

Rufus, subvillosum; capite nigrante; rostro tho-  
race breviore.

87. *Viridi-sericeus*, der *grünsammetne Rüsselkäfer.*

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. Curr. 16. Le Charan-  
son satin-vert.*

Coeruleo-viridis nitens; thorace punctato; elytris  
striatis.

*Petiv. Gazoph. p. 77. No. 6.*

88. *Dolorosus*, der Trauermantel.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 285. *Circ. 17.* La Pleureuse.  
Oblongus, niger, *abdomine squamoso*, lateribus  
albis.

89. *Quadratus*, der Vierfleck.\*)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 287. *Circ. 21.* Le Charan-  
son quadrille à courte trompe.

*Cinereus, elytrorum puncto quadruplici nigricante;*  
*proboscide thorace breviore.*

90. *Giseo-sericeus*, das graufammetne Rüsselkä-  
ferchen.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 288. *Circ. 23.* Le Charan-  
son satin-gris.

Niger, ovatus, striatus, totus villoso - cinereus;  
thorace inerimi.

91. *Thorace-spinosus*, der Dornshild.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 288. *Circ. 24.* Le Charan-  
son à corcelet épineux.

Ovatus, nigro-cinereus; thorace vtrinque denti-  
culato.

92. *Albo-fasciatus*, der weißgestreifte Rüsselkäfer.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 288. *Circ. 25.* Le Charan-  
son à bandes blanches.

Subrotundus, niger, *squamulosus*, *elytris striatis*;  
thorace vtrinque aculeato, lateribus lineaque media  
albis.

93. *Nigro-*

\*) v. Linn. Circ. 4. macul. No. 29.

93. *Nigro-striatus*, der schwarzgestreifte Rüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. Curr. 26. Le Charançon noir strié.*

Subglobosus, cinereo-ater, striatus; proboscide thoracis longitudine.

94. *Transverse-albo-fasciatus*, die weiße Queerstreife.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. Curr. 27. Le Charançon roux à bande transversale blanche.*

Globosus rufus; elytris striatis; fascia transversa alba.

95. *Niger, transverse-albo-striatus*, der schwarze Rüsselkäfer mit der weißen Queerstreife.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. Curr. 28. Le Charançon noir à bande transversale blanche.*

Globosus niger; elytris striatis, fascia transversa alba.

96. *Muricatus*, das Geoffroische Mause-Rüsselkäferchen.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 290. Curr. 29. Le Charançon souris.*

Subvilloso-murinus; scutello albicante.

97. *Spinosus*, der Geoffroische Dornträger.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 290. Curr. 30. Le Charançon à côtes épineuses.*

Totus fuscus spinosus; elytris striis elevatis villoso-spinosis.

98. *Striato-denticulatus*, der Rüsselkäfer mit gezähnelten Streifen.

*Geoffr.*

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 290. Curr. 31. Le Charan-  
son noir à côtes.

Niger; scutello albicante; elytrorum striis vtrinque  
denticulatis.

99. *Marmoratus*, der marmorirte Rüsselkäfer.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 291. Curr. 33. Le Charan-  
son marbré à bandes.

Lividus; coleoptris fasciis plurimis obscuris.

100. *Atro-apterus*, der schwarze ungeflügelte Rüs-  
selkäfer.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 243. No. 29. t. 7. f. 22.  
*Charanson non-ailé noir.*

Brevirostris; antennis fractis; femoribus muticis;  
corpo oblongo nigro nitido laevi.

101. *Griseo-punctatus*, der Graupunkt.

de Geer Inf. Tom. V. p. 244. No. 30. *Charanson  
brun tacheté de gris.*

Brevirostris; antennis fractis; femoribus muticis;  
corpo subgloboso rufo-fusco, punctis flavo-griseis;  
elytris carinatis.

102. *Flavipes*, der Geerische Gelbfuß.

de Geer Inf. Tom. V. p. 245. No. 31. *Charanson  
vert à pattes jaunes.*

Brevirostris; antennis flavis fractis; femoribus mu-  
ticis; corpos oblongo viridi nitido; pedibus flavis.

103. *Capitatus*, der Breitkopf.

de Geer Inf. Tom. V. p. 245. No. 32. *Charanson  
gris à large tête.*

Brevi-

Brevirostris; *antennis fractis fuscis*; *femoribus muticis*; *capite lato*; *corpore subgloboso griseo-cinereo*; *pedibus fuscis*.

104. *Tereticollis*, der *Rundhals*.

de Geer Inf. Tom. V. p. 246. No. 33. *Charanson gris à tête cylindrique*.

Brevirostris; *antennis fractis*, *pedibusque rufis*; *femoribus muticis*; *capite cylindrico*; *corpore oblongo griseo-cinereo*.

105. *Fasciculatus*, der *surinamische Bürsten-Rüsselkäfer*.

de Geer Inf. Tom. V. pag. 276. No. 10. t. 16. f. 2. *Charanson à brosse*.

Brevirostris; *antennis longis rectis*; *corpore ovato fulvo*; *fasciculis pilosis griseis*.

203. G E S C H L E C H T. *Attelabus*; *Afterrüsselkäfer.\*)*

Müllers Linn. Naturs. 5. B. 1. Th. S. 243. *Bastard-rüsselkäfer*. Holl. Bastard-Olyphantjes.

Börners Samml. 1. Th. S. 470. *Birnenkäfer*.

Eberhards Thiergesch. S. 195. *Schildkrötenkäfer*.

Beckmanns Anfangsgr. der Nat. H. S. 92. *Afterrüsselkäfer*.

Füeßlins Verz. schweiz. Inf. S. 11. *Afterrüsselkäfer*.

Sulzers Kennz. S. 60. *Afterrüsselkäfer*; *Bienengärt.*

— — Gesch. S. 40. *Afterrüsselkäfer*. Le Beouare.

Catholicon A. p. 596. *Afterrüsselkäfer*:

Onomat. hist. nat. P. II. p. 44-48.\*\*)

*Bom.*

\* ) Des Geoffr. *Attelabus* ist Linn. *Hister*, aber des Linn. *Attelabi* sind einige vom *Rhinom.* und *Clerus* des Geoffroi.

\*\*) In diesem Artikel herrsche noch daselbst grosse Verwirrung, die

*Bom.* Dictionnaire des Animaux. X. p. 290.

*Geoffr.* Insectorum Tom. I. p. 273. *Rhinom.* 10. II. p. 303.

*Clerus;* le *Clairon.*

de Geer Insectorum Tom. IV. prélim. P. I. 39. *Colliuris;* *Colliure.* VIII. 50. *L'Attelabe;* *Attelabus.* X. 61. le *Clairon;* Tom. IV. p. 79. des *Colliures.* p. 347. des *Attelabes.* Tom. V. p. 156. des *Clairons.\**)

*Fabric.* S. E. pag. 156. *Attelabus.* pag. 157. *Clerus.* p. 158. *Notoxus.* p. 159. *Spondylis.*

*Stop.* Entomologische Carn. p. 35. *Attelabus.*

*Mulleri* Faun. Fridr. p. 12.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. 95.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 205.

*Gleditsch* Forstwissenschaft. II. Th. pag. 1509. N. 4. *After-*  
*rüsselkäfer.* ~

i. *Coryli,* der *Afterrüsselkäfer auf den Haseln.*

*Müllers* Linn. Naturf. 5. Th. I. B. S. 243. No. I. t. 4.  
f. 18. der *Rollendreher.*

*Fürßlins* Verz. S. II. No. 219. der *Rollenwickler.*

*Sulzers* Kennz. S. 10. t. 4. f. 25. der *Afterrüsselkäfer in den Haselnussblättern.*

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 205. No. I. t. 16.

*Linn.* Reis. durch Oel. Uebers. S. 168.

*Gleditsch* Forstwissenschaft. I. Th. S. 571. No. 12. der *schwarze Afterrüsselkäfer mit rothen Flügeldecken und langem Hinterkopfe.*

*Catho-*

die ich bey den Chrysomelen einigermaßen habe in Ordnung zu bringen gesucht.

Bey den Alten hieß das wahre herumwandelnde Puppchen

der Heuschrecke *Attelabus.* S. *Swammerd.* B. der N. S. 91.

*Jonston* Hist. Nat. Inf. p. 191.

\*) Der Herr von Geer hat einige *Tenebriones* Linn. unter seine *Attelabos* gerechnet.

*Catholicon* A. p. 596. der schwarze Afterrüsselkäfer  
der Haselstaude mit rothen Flügeldecken.

*Müller* Faun. Fridr. p. 12. No. 119.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1019.

*RHINOMACER Coryli*; thorace elytrisque rubris.

*Pon'opp.* Atl. Dan. I. t. 1.

*Schaeff.* Icon. t. 75. f. 8.

*Abta Vpsal.* 1736. p. 19. No. 4. *Nerydalis* rubra;  
*capite minimo nigro.*

*Scop.* Ent. cairn. No. 71. *CVRCVLIO collaris.* \*)

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 273. *Rhinom.* II. La tête  
ecorchee.

Niger; thorace, elytrisque rubris; capite pone  
elongato.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 257. No. 46. t. 8. f. 3. *Charançon tête ecorchée rouge.* \*\*)

*CVRCVLIO* (*excoriato-ruber*) brevirostris; anten-  
nis rectis; corpore brevi subquadiato nigro; elytris  
rubris; capite ovato postice attenuato.

*Fabric.* S. E. p. 156. No. 1. Niger, elytris rufis,  
reticulatis.

## 2. *Avellanae*, der Nussbeisser.

*Müller* l. c. S. 244. No. 2.

*Füesslins* Verz. S. 11. No. 220. der Nussbeisser.

*Catholicon* A. p. 596. der schwarze Afterrüsselkäfer  
der Haselnussstaude mit rothen Flügeldecken, Brust-  
schild und Füssen.

*Fabric.*

\*) Dieses Citatum hat *Fabric.* zu dem folgenden Att. *Avellanae*  
gesetzt, den er für eine bloße Varietät des *Coryli* hält, wie  
auch diesen *Geoffroischen Rhinomacer*.

\*\*) Das Schaeffersche Citatum des *Geers* Icon. t. 56. f. 5. 6. ge-  
hört nach des *Müllers* Zool. No. 1020. zu dem Attel. *Avellanae*.

Fabric. S. E. p. 157. B.\*)

Müller. Zool. Dan. Prodr. p. 91, No. 1020. Niger,  
thorace; elytris femoribusque rubris.

Schaeff. Icon. t. 56. f. 5. 6.

### 3. Curculionoïdes, der kleine Nussbeisser.

Müller l. c. S. 244. No. 3. der Zwergbastard.

Fuesslin's Verz. S. II. No. 221. der Zwergbastard.

Sulzers Gesch. S. 44. t. 4. f. 12. der kleine Nussbeisser.

Catholicon A. p. 596. der dem Rüsselkäfer gleichen-de Afterrüsselkäfer.

Fabric. S. E. p. 157. No. 2. Niger, elytris striatis thoraceque rubris.

Scop. Ent. carn. No. 72. ev r. c. nitens.

Schaeff. Icon. t. 75. f. 8.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 273. Rhinom. 10. Le Bec-mare laque.

Niger, thorace elytrisque rubris proboscide longitudine capitisi.

### 4. Surinamensis, der surinamische Afterrüsselkäfer mit gezähnelten Flügeldecken.

Müller l. c. S. 244. No. 4. der Zahnrüssel.

Catholicon A. p. 596. der surinamische A. R. K. mit braungestreiften zweymal gezackten Flügeldecken.

de Geer Inf. Tom. IV. p. 80. t. 17. f. 16. Colliure de Surinam.\*\*)

COLLIVRIS (Surinamensis) fusca, thorace subulato longissimo arcuato; elytris striatis apice bidentatis; pedibus ferrugineis.

### 5. Pen-

\*) S. die Anmerkungen bey No. 1.

\*\*) Er gleicht der Raphidia vollkommen, nur hat er harte Flügeldecken.

5. *Pensylvanicus*, der *pensylvanische Afterrüsselkäfer mit rothen breit-schwarzgestreiften Flügeldicken*.\*)

*Müller* l. c. S. 245. No. 5. der *Pensylvanier*.

*Catholicon A.* p. 596.

6. *Melanurus*, der *Schwarzschwanz*.\*\*)

*Müller* l. c. S. 245. No. 6.

*Catholicon A.* p. 596. der *schwarzgeschwänzte Afterrüsselkäfer*.

7. *Betulae*, der *Birkenafterrüsselkäfer*.†)

*Müller* l. c. S. 245. No. 7. der *Blattkräusler*.

*Gleditsch Forstw.* I. Th. S. 552. No. 13. der *schwarze springende Afterrüsselkäfer der Birke*.

*Catholicon A.* p. 596. der *Afterrüsselkäfer der Birke mit Springflüssen*.

*Fabrič.* S. E. p. 157; No. 3. *Ater, pedibus saltatoriis*.

*Müller* Faun. Fridr. p. 12. No. 120.

— — Zool. Dan. Prödr. p. 91. N. 1621. *Totus niger*.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 259. No. 47. *Charanson tête ecorchée noir*.

*CVRČYLO* (*excoriato-niger*) *brevirostris; antennis rectis; corpore brevi subquadrato nigro nitido; capite ovato postice attenuata; femoribus posticis maximis*.

8. *Formicarius*, der *ameisenförmige Speckkäfer-Jäger*.

*Müller* l. c. S. 246. No. 8. der *Jäger*.

*Fließins*.

\* ) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

† ) Nicht abgebildet.

Füsslins Verz. S. II. No. 223. der Jäger.

Fonston hist. nat. Inf. t. 15. *Starabaeus minor* 69.  
(ultimo.)

Raj. Inf. p. 103. No. 29. *Cantharis* 29.

Fabric. S. E. p. 157. *Clerus* 2.

*Elytris fascia duplii alba basique rubris.*

Müller Faun. Fridr. p. 12. No. 121.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1077.

Niger; thorace abdome, elytrorumque basi rubra;  
dorso fasciis binis albis.

Schaeff. Icon. t. 186. f. 4. *Cleroïdes*.

Catholicon A. p. 596. der Ameisen-Afterrüsselkäfer.  
de Geer Inf. Tom. V. p. 160. No. 3. t. 5. f. 8. *Clai-  
ron fourmi*.

*CLERVS (formitarius) niger; thorace elytris an-  
tice abdomineque rubris; elytris fasciis binis albis.*

Poda Mus. graec. p. 31.

9. *Sipylus*, der grüne morgenländische Afterrüssel-  
käfer.\*)

Müller I. c. S. 246. No. 9. der Morgenländer.

Catholicon A. p. 596. der ägyptische Afterrüssel-  
käfer.

Fabric. S. E. p. 158. *Clerus* 3.

10. *Apiarius*, der Bienenfeind.

Müller I. c. S. 246. No. 10. t. 4. f. 19. der Bienen-  
fresser.

Füsslins Verz. S. II. No. 224. der Bienenfresser.

Sulzers Kennz. t. 4. f. 25. b. der bläuliche After-  
rüsselkäfer mit rothen Flügeldecken.

— — Gesch. S. 42. t. 4. f. 14. der Bienenfresser.

Dd 2

Taubens

\*) Nicht abgebildet.

*Taubens* Nat. Gesch. von Zelle II. Th. S. 104.

*Pontopp.* N. G. v. D. S. 205. No. 3..

*Grunitz* Bienengesch. S. 303. No. 8. *Bienenwolf;*  
*Rankmade;* der *Rieht-* oder *Rehwurm.*

*Borners* Samml. I. Th. S. 470. *Bienenkäfer.*

*Beckmanns* phys. oek. Bibl. I. Th. S. 133. *Immenwolf.*

*Lepechins* Tageb. I. Th. S. 219. der den *Bienen*  
*feindselige Afterrüsselkäfer;* *Attelabus apiaoster.*

*Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 44. die *kleine Heuschrecke.*

*Schaeff.* Mauerbiene 1764. S. 22. 23. 37. t. 5. f. 19,  
der *Bienenfresser.*

— — Elem. t. 46. *Clerus, Bienenkäfer.*

— — Icon. t. 48. f. 11.

*Catholicon* A. p. 386. *Bienenkäfer.*

— — — p. 596. der *Bienenafterrüsselkäfer.*

*Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1076.

*Fabric.* S. E. p. 158. *Clerus* 4.

*Elytris* rubris; fasciis tribus coeruleofuscantibus.

*Scop.* Entom. carni. No. 35. "

Atro-coeruleus, villosus; *elytris* rubris, apice fa-  
sciisque binis atris.

*Poda* Mus. graec. p. 31.

*Geoffr.* Ins. Tom. I. p. 304. *Clerus* i. t. 5. f. 4. Le  
*Clairon à bandes rouges.*

Nigro-violaceus, hirsutus; *elytris* fascia triplici  
coccinea.

*de Geer* Ins. Tom. V. p. 157. No. 1. t. 5. f. 3. *Clai-  
ron apivore.*

Coeruleo-violaceus; *elytris* rubris, fasciis tribus  
transversis violaceis.

ii. *Mollis*, der *weichschaaliche* Afterrüsselkäfer.

*Müller* l. c. S. 247. No. 11. der *Sammetrock-*

*Catholicon* A. p. 596. der *weiche grauliche* After-  
rüsselkäfer.

*Fabric.*

*Fabri.* S. E. p. 158. *Notoxus* 1.

*Pubescens*; *elytris nigris*, *fasciis tribus pallidis*.

*Mulleri* Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1078. *Flavicans*; *thorace fasciisque elytrorum duabus fuscis*.

*Schaeff.* Icon. t. 60. f. 2.

*Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 305. *Clerus* 3. *Lé Clairon porte-croix*.

*Fuscus*, *vilosus*; *elytris flavis*, *cruce fusca*.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 159. No. 2. t. 5. f. 6. *Clairon à bandes brunes*.

*Clerus (fusco-fasciatus)*; *elytris flavo-griseis*; *fasciis duabus transversis fuscis*, *abdomine rubro*.

12. *Ceramboïdes*, der *holzbockartige Afterrüsselkäfer*.

*Müller* l. c. S. 247. No. 12. der *Schwammkäfer*.

*Catholicon* A. p. 596. der *holzbockartige Afterrüsselkäfer*.

*Fabri.* S. E. p. 159. *Spondylis* 2.

*Atra*; *elytris rugosis*; *thorace latioribus*.

*de Geer* Inf. Tom. V. p. 32. No. 2. t. 2. f. 1. *Tenebrion à équis variolés*.

*TENEBRIO (variolosus)* *alatus ater*; *elytris rugosis*.

13. *Buprestoïdes*, der *stinkkäferartige Afterrüsselkäfer*.

*Müller* l. c. S. 248. t. 4. f. 20. der *Dickhals*.

*Frisch* Inf. 13. Th. S. 23. t. 19. der *dickhalfige Holzkäfer*.

*Catholicon* A. p. 596. der *stinkkäferartige Afterrüsselkäfer*.

*Fabri.* S. E. p. 159. *Spondylis* 1.

*Mulleri* Faun. Fridr. p. 12. No. 122.

*Onomat.* hist. nat. P. 2. pag. 44. der schwarze Stinkkäfer. p. 353. *Buprestis ater.*

*Acta Vpsal.* 1736. p. 19. No. 2.

de Geer Ins. Tom. V. p. 84. No. 21. t. 3. f. 21. *Capricorne à grandes dents.*

*C E R V M B V X (maxillosus)* niger, thorace mutico subgloboso; antennis longitudine thoracis; articulis compressis; dentibus maximis prominentibus.

### *Unabgebildete Attelabi.*

1. No. 5. *Pensylvanicus.*
2. No. 6. *Melanurus.*
3. No. 7. *Betulae.*
4. No. 9. *Sylvae.*

### *Neue Arten dieses Geschlechts.*

#### 1. *Formicarius minor*, der kleine Jäger.\*)

Füesslins Verz. S. 11. No. 222.

Sulzers Gesch. S. 42. t. 4. f. 13. b.

Niger; antennis clavatis; articulis cordiformibus; thorace atro, ab abdomine remoto. *Elytra* striata, apice rubra, *fascia* alba.

#### 2. *Polymorphus*, der in seinen Zeichnungen veränderliche Afterrüsselkäfer an der Wolga.

Pallas Reisen. I. Th. Anh. No. 44. Ausz. I. S. 13. No. 44.

Totus ater, lanugine nigra pubescens; *elytra* subcompressa, rotundata, flexilia.

Müllers Suppl. B. S. 234. No. 15. der *Unbestand.*

#### 3. *Bima-*

\*) S. No. 8. Linn.

3. *Bimaculatus*, der *Zweyfleck*.

*Pallas* Reis. I. Th. Anh. No. 45. Ausz. S. 14. No. 45.

Totus e nigro-cyaneus, nitidissimus, fuscaque lanugine pubescens; in floribus *Euphorbiae*.

*Müllers Suppl.* B. S. 235. No. 16.

4. *Senex*, der *Altvater*.

*Pallas* Reis. II. Th. Anh. No. 48.

Magnitudo infra *Attel. formicar.* totus aterrimus.

*Müllers Supplem.* B. S. 234. No. 14.

5. *Mutillarius*, der *mutillenartige Afterrüsselkäfer* *bey Halle in Sachsen*.

*Fabric.* S. E. p. 157. *Clerus* 1.

Niger; *elytris* fascia triplici alba.

6. *5-punctatus*, der *Skopolische Fünfpunkt*.

*Scop.* Entom. carn. p. 36. No. 114.

Niger; *thorace* fulvo; *elytris* pallidioribus; *punctis* 5, uno communi et majore.

7. *14-punctatus*, der *Skopolische Vierzehnpunkt*.

*Scop.* Entom. carn. p. 37. No. 116.\*)

*Thorax* fulvus, *punctis* tribus nigris; *elytrum* pallidius *punctis* septem, uno in apice sito.

8. *Hungaricus*, der *ungarische Skopolische Afterrüsselkäfer*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 92. No. 46.

Niger, *thorace* hirsuto; *elytro* singulo fasciis duabus flavis, *punctisque* totidem flavis, uno ad basin, uno ad apicem.

Dd 4

9. *Niger*,

\**) Skopoli* hat verschiedene *Linnéische Chrysomelen* unter seine *Attelabos* gerechnet.

9. *Niger*, der ganz schwarze sammetartige Afterrüsselkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 305. Clerus 4. Le Clairon satiné.*

*Clerus niger subovatus, villis cinereis.*

*de Geer Inf. Tom. V. p. 164. No. 5. Clairon noir.*

*CLERVS (niger) oblongus.*

10. *Gaber*, der Geerische glatte Afterrüsselkäfer.

*de Geer Inf. Tom. IV. pag. 351. No. 2. t. 19. f. 14.*

*Attelabe lisse.*

*Fusco-castaneus, nitidissimus, elytris glabris; maxillis magnis arcuatis.*

11. *Rufipes*, der surinamische Rothfuss.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 165. No. 1. t. 15. f. 4. Clairon à pattes rouges.*

*Oblongus, nigro-coeruleus nitidus; antennarum basi, pedibusque flavo-rufis.*

12. *Formicaroides*, der rothleibige Afterrüsselkäfer.

*P. Schrank Beytr. zur N. G. S. 65. §. 8.*

*Thorace elytrisque nigris; elytris fascia rubra albaque.*

204. G E S C H L E C H T. *Cerambyx; Bockkäfer; Holzbock; holl. Bock-Torren.\*)*

*Müller's*

\*.) Ob die Larve der wahre Cossus der Alten, ist wohl nicht auszumachen, da von andern die Holzraupe, der Weidenbohrer, (Phalaena Cossus); von andern die Larve des Lucan. *Cervus* u. s. w. dafür gehalten wird. S. Swammerdams B. der N. S. 132. Den Larven der Holzwürmer schreibt Rosel aus Erfahrung das unähnliche Picken in den Wänden zu. S. 2. B. Erdk. 2. Kl. S. 9. 10.

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 249. *Bockkäfer*.

Fießlins Verz. schweiz. Inf. S. 12. *Bockkäfer*.

Sulzers Kennz. der Inf. S. 61. *Holzkäfer; Steinbock; Hirsch; Bisamkäfer*.

— — Gesch. der Inf. S. 42. der *Bockkäfer*.

Hanous Seltenheiten der Natur I. B. S. 339. *langhörnige Maykäfer*.

Pontopp. N. G. v. D. S. 205. *Holzbock*. dän. *Tømmermand (Zimmermann)*.

Gleditsch Einl. in die Forstwiss. II. Th. S. 1509. der *Holzkäfer*, oder der eigentliche *Holzwurm*.

Röfels Infektenbel. 2. B. Erdk. 2. Kl. Vorb. pag. 3. *Holzböcke*, oder *Holzkafer*.

Börners Samml. I. Th. S. 470. *Holzbock*.

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 96. der *Holzbock* oder *Bisamkäfer*.

Eberhards Thiergesch. S. 198. der *Holzkäfer*.

Lessers Theologie der Infekten S. 308. der *Geiger*; Lierdräner; Scar. *Lyricen*.

Swammerd. B. der N. S. 119. *fliegende Böcke und Ziegen*.

Frisch Inf. V. Th. S. 5. *Holzkäfer; Geiger*.

Neuer Schauplatz der Natur. S. 883. *Bockkäfer*.

Onomat. hist. nat. P. II. p. 604. *Capricornus*; p. 754. *Cerambyx*; der *Holzbock*; der *Holzkäfer*.

Catholicon C. p. 83. *Steinbockkäfer; Holzbock; Bisamkäfer; Fliegenkäfer*.

Commentar. Lips. Dec. I. Vol. III. pag. 69. Vol. V. p. 534. 606.

Bomar. Dict. des Anim. II. 364.

Imperat. hist. nat. p. 922. 923. Scar. *Taurus*.

Fonston hist. nat. Inf. p. 91. t. 15. *Capricornus; Agoterus; Cerambylus; Quicius*.

Scop. Entom. carn. p. 50.