

L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (C. I. P., O. S.), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodius paléarctiques*, *Hispidius* français.

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides*, *Nitidulides*, *Cucujides*, *Erotylides*, *Phalacridés*, *Lathridiides*.

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe*, *Melyridæ*, *Pilinidæ*, *Nanophyes*, *Anthicidæ*, *Pedilidæ*, *Crioceridæ*, etc du globe. — *Cerambycidés* de la Chine, du Japon, etc. *Cryptocéphalides paléarctiques*. *Malacodermes* du globe.

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15^e). *Coléoptères* de France (*Curculionides* exceptés.)

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à Digoïn

(20 Novembre 1925)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (*suite*).

Hyménoptères nouveaux, par M. Pic (*suite*).

Malacodermes exotiques, par M. Pic (*suite du hors-texte*).

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (*suite*).

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France: 5 francs. | Étranger: 6 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHIEN, 15

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Eurynebria complanata L. Variétés nouvelles de ma collection : **multijuncta**, d'Algérie, à fascies noires jointes entre elles sur plusieurs points, d'où dessins noirs encerclant des lineoles claires ; v. **obliterata**, d'Arcachon, à fascies plus ou moins oblitérées et réduites à des linéoles brunes.

Ptinomorphus imperialis v. nov. **luteosuturalis**. Elytris nigris, ad humeros rufis, signaturis albis bene distinctis, ad suturam luteo pubescentibus. Les Guerreaux (Pic). — Jolie variété, voisine de la var. **interrupta** Pic, avec le revêtement différent.

Zonabris floralis Pallas ou **Fuesslini** Panz. Varie, soit par la 2^e fascie jaune interrompue (v. nov. **Mulsanti**), ou avec la 2^e fascie aussi interrompue (v. nov. **alpestris**), soit par la bande antérieure noire interrompue (v. nov. **baregesius**), ou la postérieure, ainsi que l'antérieure, interrompue (v. nov. **Pelissieri**). Parfois la bande postérieure jaune est étroitement réunie à la macule apicale (v. nov. **monetierensis**) ou largement réunie avec la fascie postérieure (v. nov. **Viturati**). Toutes ces variétés font partie de ma collection et sont françaises.

Hylophilus pruinosis v. nov. **uniformis**. Concolor, rufus, femoribus posticis nigris exceptis. Caucase (coll. Pic) ; v. nov. **Montandoni**, nigro-piceus, elytris rufis, latera-liter paulo brunneo notatis. Roumanie (coll. Pic) ; v. nov. **moreanus**, elytris late nigris, ad humeros et postice rufo maculatis. Morée (coll. Pic).

Tetropium Gabrieli v. nov. **bicolor**. Elytris rufis. Hautes-Alpes (Pic).

Nanophyes (Corimalia) convexipennis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, squamulis piliformibus albis parum dense vestitus, rufus ; rostro subarcuato ; oculis nigris, approximatis ; thorace parum breve, antice attenuato ; elytris thorace paulo latioribus, postice attenuatis, brevibus, ad medium supra valde convexis, striatis, interstitiis elevatis ; femoribus inspinosis. Long. 1 mill. Mésopotamie (coll. Pic). — Cette petite espèce, par son revêtement squamuleux piliforme se rapproche de **inconspicuis** Bris. et s'en distingue par le prothorax moins court, les élytres très bombées sur leur milieu, les cuisses inermes.

Nanophyes brunneonotatus v. nov. **alepensis**. Diffère des types par la forme moins trapue, la pubescence grise moins dense sur la base des élytres. Syrie : Alep (coll. Pic).

Nanophyes latifrons v. nov. **atritarsis**. Testaceus, infra corpore pro parte tarsisque nigris. Egypte (coll. Pic).

Nanophyes 4-virgatus v. nov. **larnacanus**. Oblongo-ovatus, testaceus, infra corpore pro parte capiteque nigris, thorace nigro bimaculato, elytris ad basin, in disco

et lateraliter nigro signatis. Chypre (coll. Pic). Variété caractérisée par sa forme et ses nombreuses macules foncées aux élytres.

Le Dr Normand a nommé *in litteris*, depuis longtemps déjà, diverses variétés de *Nanophyes* Sch., de Tunisie; j'estime qu'il n'y a pas lieu d'en retarder plus longtemps la publication. Voici donc le signalement de celles que je possède également. **N. posticus v. obliteratus**. Coloration générale roussâtre avec une macule suturale rousse allongée. — **N. biskrensis v. separatus**, à élytres ornées de macules rousses et v. **thoracicus** à prothorax maculé de noir. — **N. minutissimus v. scapularis**. Elytres flaves, ornées d'une macule humérale noire.

Pachytychius Rotroui n. sp. Satis elongatus, subopacus, fulvo squamulatus, niger, antennis tarsisque rufescentibus; capite sparse punctato, glabro, inter oculos impresso; rostro sat robusto, elongato, parum arcuato, nitido, medio-supra læve, ad basin sparse punctato; antennis elongatis, articulis ultimis brevibus, clava oblongo-ovata; thorace subquadrato, fortiter et dense punctato-foveolato, squamulato, antice medio læve; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, minute striatis, striis fortiter et sparse punctatis, punctis apice minutis, intervallis sat dense squamulatis; pedibus validis, femoribus inermibus, tibiis latis, intus sinuatis et longe ciliatis. Long. 8 mill. Algérie: Bonnier (coll. Rotrou). — Voisin de *strumarius* Gylh., très distinct par la forme plus allongée, le prothorax à peine arqué sur les côtés, les épaules plus avancées en avant, les élytres à rangées de gros points.

Rhytirhinus semituberculatus n. sp. Elongatus, depressus, niger, dense albo aut luteo squamulatus, setis crassis sparse ornatus; rostro robusto, parum brève, sulcato, supra oculos tuberculato; thorace satis brève, non transverso, postice valde attenuato, medio sulcato, lateraliter antice valde et postice minute impresso, sparse punctato; elytris ad basin et apice attenuatis, ad basin plicato-tuberculatis, tricarinatis, carinis postice multi tuberculatis, intervallis bilineato punctatis; pedibus parum elongatis, depressis, tibiis anticis apice externe non dilatatis, intus mucronatis. Long. 6 mill. Algérie: Colomb Bechar (coll. Rotrou). — Espèce voisine de *Sarcofi* Peyr., s'en distinguant, à première vue, par les élytres postérieurement munies de nombreux tubercules très distincts, quoique peu élevés, et le prothorax à sillon médian non interrompu au milieu.

Gnorimus bahorensis Bedel. Varie par les élytres n'ayant pas de macule blanche médiane (**var. nov. diversus**), ou dépourvues de macules externes (**var. nov. interne-notatus**). Algérie: Mont Babor (coll. Pic). ex Dayrem.

(A suivre.)

M. Pic.

Hyménoptères nouveaux

(Suite.)

Allantus Koehleri Kl. Var. nouvelles: v. *biinterruptus* ♂, toutes les bandes de l'abdomen interrompues au milieu, ou celle du 4^e segment seule interrompue (v. *uni-interruptus*), ou bandes des 4^e et 6^e segments interrompues (v. ♀ *multiinterruptus*); parfois antennes marquées de jaune à la base (v. ♀ *notaticornis*). Royat.