

Description de Coléoptères nouveaux, d'Europe et Circé

Par M. Pic Maurice,

Nemognatha akbestiana. — Jaune rougeâtre, un peu brillant, élytres d'un testacé pâle avec les yeux, les palpes, les antennes à partir du 2^e article, les tarse, la poitrine et l'abdomen noirs. Tête assez longue, impressionnée sur le front, à ponctuation forte et rapprochée; antennes assez fortes, à 2^e article un peu plus large que long, 3^e long et épais, le 4^e un peu moins long. Prothorax à peu près aussi long que large, un peu dilaté-arrondi par côté, légèrement déprimé sur le disque, à ponctuation forte, irrégulière, très écartée; un petit point brun sur le milieu. Ecusson testacé. Elytres un peu brillants, relativement étroits, peu étranglés après le milieu, très atténués en arrière, courtement déhiscent à l'extrémité, à ponctuation ruguleuse, assez forte et espacée; ils sont ornés d'une large bande spéciale et d'une petite tache médiane arrondie, noires. Pattes testacées, moins les tarse, avec les tibias postérieurs largement et les intermédiaires un peu obscurcis à l'extrémité. Poitrine et abdomen noirs. Long. 9 mill.

Haute Syrie : Akbès (coll. Pic).

Diffère de *flavicornis* Stierl. par la coloration des antennes et de l'abdomen, de *nigritarsis* Stierl., par les taches des élytres, de *chrysomelina* F., par sa forme élytrale, l'aspect plus brillant. Paraît caractérisé surtout par ses élytres ayant une terminaison particulière, copiant légèrement de forme celles de *Stenaria apicalis* Latr., avec une déhiscence moins prononcée, plus postérieure.

Rhinosimus (Cariderus) angustirostris. — Noir bronzé, tout ou partie du rostre, les antennes et les

pattes roussâtres. Tête modérément large, à ponctuation très forte et écartée, un peu déprimée en avant. Rostre relativement étroit et tout à fait long, à peu près deux fois aussi long que la tête, nettement élargi à l'extrémité, à ponctuation forte, en lignes. Antennes roussâtres, atteignant presque la base du prothorax, ayant leurs six dernier articles plus gros, les premiers articles minces avec le troisième très long; elles sont insérées plus près de l'extrémité du rostre que de la tête. Prothorax plus long que large, modérément dilaté en avant, marqué d'une dépression basale allongée et oblique, de chaque côté de sa base, et parfois d'une dépression antérieure latérale, à ponctuation forte et écartée. Elytres allongés, subparallèles à dépression post-scutellaire nette et dépression post-humérale moins accentuée, avec des stries régulières, en arrière, formées de gros points enfoncés: ces points, irrégulièrement disposés à la base; un enfoncement pré sutural à l'extrémité. Dessous du corps foncé, à ponctuation un peu moins forte sur l'abdomen. Pattes grêles, roussâtres. Long. 4 à 4,5 mill. (avec le rostre).

Forêt de Yakcuren, en Kabylie, sur chêne (Pic I)

A placer entre *Rh. tapirus* Ab. et *Rh. aeneus* Ol. Espèce nettement séparable de toutes celles du genre décrites de nos pays par sa taille avantageuse jointe à la grande longueur et l'étroitesse relative de son rostre.

Nanophyes (*s.str.*) **caucasicus** (Reitt). — Petit et court, globuleux-ovale, peu brillant, testacé, orné, sur les élytres, de macules pileuses blanchâtres, allongées, variables, et de taches en partie dénudées, rembrunies, également variables; tête parfois, et dessous du corps obscurcis. Tête un peu pubescente, testacée, roussâtre ou obscurcie, avec les yeux grands, noirs, bien rapprochés. Rostre assez long, courbé, peu épais, caréné, ordinairement rembruni à l'extrémité. Antennes testacées, peu

fortes, à premier article du funicule long, les suivants plus courts, subglobuleux, avec la massue tri-articulée, modérément forte. Prothorax court, très rétréci en avant, testacé, de nuance variable, parfois un peu rougeâtre sur le disque, à ponctuation peu marquée et à longue pubescence d'un gris blanchâtre peu serrée et plus fournie sur les côtés. Elytres courts et très larges aux épaules, légèrement et progressivement atténués ensuite et obliquement arrondis à l'extrémité, nettement striés, testacés, avec une pubescence d'un gris blanchâtre, longue, plus ou moins condensée en macules pileuses allongées et variablement disposées, parfois en lignes, et ça et là quelques taches brunâtres ou roussâtres, produites en partie par l'épilation et plus ou moins obliquement rangées ; quelquefois, sur chaque élytre, une tache humérale et deux petits traits, disposés dans le sens longitudinal et près de la suture, plus foncés. Pattes grêles, longues, pâles avec les fémurs munis de deux ou trois dents très petites et fines. Dessous du corps obscurci, garni d'une longue pubescence blanchâtre. Long. 1,3 à 1,7 mill.

Caucase, (Leder in coll. Reitter, actuellement coll. Pic).

Var. A. Elytres à pubescence grisâtre plus étendue et macules brunâtres plus ou moins oblitérées.

Par sa forme générale, doit se placer près de *Sahlbergi*, Sahlb., mais facilement séparable, à première vue, de cette espèce, par ses dessins pileux. Rappelle un peu, par sa coloration, certaines variétés claires de *Lythri*, mais bien différent de cette espèce par ses pattes, la forme plus courte, etc.

J'ai trouvé, sous le nom de *caucasicus*, dans la collection Reitter, deux espèces différentes, l'une, nouvelle et que j'ai signalée ici, l'autre que je crois devoir rapporter à *syriacus* Bris. Cette dernière présente, comparée à celle que je viens de décrire, une forme plus élargie, les fémurs inermes et des bandes obliques pileuses.

Asclera Deyrollei var. **Milleri**.— Noir, avec le prothorax flave, très brillant, les élytres mats, un peu bleuâtres. Tête noire avec les yeux gris. Antennes foncées, ayant les premiers articles parfois un peu roussâtres. Prothorax flave, à ponctuation écartée, fine et irrégulière, un peu sinué sur le bord antérieur, celui-ci simple; disque offrant, de chaque côté, une dépression parfois prolongée sur le bord latéral, deux autres dépressions, l'une en avant, l'autre en arrière. Ecusson foncé, tronqué au sommet. Elytres à côtes peu saillantes, l'interne plus ou moins effacée, au moins au sommet, assez fortement granuleux, d'un bleu noir, parfois un peu roussâtre par transparence, ornés d'une fine pubescence grisâtre. Pattes foncées ainsi que le dessous du corps. Long. 10-11 mill.

Syrie (Miller in coll. Tournier = coll. Pic).

Diffère de *Deyrollei* Pic par les élytres plus granuleux, à coloration différente, avec le prothorax différemment sculpté en dessus; de *sanguinicollis* F. par les côtes moins saillantes, l'interne plus ou moins oblitérée, le prothorax non muni d'impressions profondes.

M. PIC.
