

# L'ÉCHANGE

# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (O. I. P., ♂), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodiens paléarctiques, Histiérides français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacrides, Lathridiides.*

J. Sainte-Claire-Deville, à PARIS. — *Hydrophilides de France. — Staphylinides du bassin de la Seine. — Coléoptères de Corse.*

⊕ Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridae, Pitinidae, Nanophyes, Anthicidae, Pedilidae, etc. du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

A. Hustache, à LAGNY (Seine-et-Marne) : *Apion et Ceuthorrhynchus de France.*

A. Méquignon, 68, rue Bannier, à Orléans. *Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

ADRESSER TOUTES COMMUNICATIONS CONCERNANT LA RÉDACTION ET LES ÉCHANGES

A. M. M. PIC, à Digoïn

Celles concernant les Abonnements et les Annonces, à l'Imprimerie E. REVÉRET, à Moulins

(2 Juin 1919)

## SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (*suite*).Étude détaillée de divers insectes, par M. Pic (hors texte), (*suite*).

Question posée aux Lépidoptéristes, par P. NICOD.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (*suite*).PRIX D'ABONNEMENT : UN AN, À PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France : 5 francs. | Étranger : 6 francs.

MOULINS  
IMPRIMERIE ETIENNE AUCLAIRE  
E. REVÉRET, SUCCESSEUR

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

**Troglops angustatus** v. nov., **Normandi** ♂. Niger, capite lato, testaceo, vertice nigro notato, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis. Tunisie (D<sup>r</sup> Normand).

Je n'ai vu qu'un exemplaire communiqué par le D<sup>r</sup> Normand, et provenant de ses chasses au Kef, qui diffère de la forme typique par la coloration entièrement foncée de son prothorax.

**Malthodes luteostylus** n. sp. Nitidus, niger, antennis ad basin, mandibulis, thorace abdomineque pro parte testaceis aut luteis, élytris griseis, ad scutellum nigris et apice sulphureis, pedibus pro parte piceis. Long. 3,5 mill. Tunisie (Bir Bou Rekba (Pic).

Tête noire avec les mandibules testacées, à peu près de la largeur du prothorax ; antennes assez longues, foncées à base testacée ; prothorax court, élargi en avant, testacé, largement noir de chaque côté ; élytres à peu près de la largeur du prothorax, gris, foncés près de l'écusson et parfois près de la macule apicale qui est jaune ; abdomen jaune, maculé de noir, derniers segments dorsaux de l'abdomen ♂ foncés, allongés avec le terminal terminé par deux branches grêles et assez longues, dernier segment abdominal assez long, style jaune, un peu arqué, fourchu au sommet.

Se rapproche de *M. pallidipennis* Pic par sa structure abdominale, mais dernier segment dorsal différent ; le prothorax est moins robuste, la tête plus foncée.

**Malthodes furcatistylus** n. sp. Parum nitidus, niger, antennis ad basin, mandibulis, thorace abdomineque pro parte testaceis aut luteis, élytris nigris, lateraliter et ad humeros testaceo notatis, apice sulphureis, pedibus pro parte rufescentibus. Long. 4 mill. Kroumirie (D<sup>r</sup> Normand, in coll. Normand).

Tête noire avec les mandibules testacées, peu plus large que le prothorax, celui-ci pas très robuste, un peu élargi en avant, antennes longues, foncées, à base testacée ; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs ; derniers segments dorsaux de l'abdomen ♂ un peu allongés, terminal long et assez étroit, modérément fourchu au sommet, les branches étant courtes et divergentes, teinté en partie de brun, avant-dernier segment dorsal long et assez étroit, dernier testacé, en forme de style un peu courbé et longuement fourchu au sommet. — Coloration du précédent, moins brillant, avec la structure abdominale tout autre.

**Malthodes gracilipygus** n. sp. Nitidus, niger, membris pro parte rufis, élytris apice luteo-maculatis, abdomine luteo marginato. Long. 3,5 mill. Algérie : Philippeville (coll. Pic).

Tête grosse, de la largeur du prothorax, celui-ci inégal, un peu élargi en avant, presque tout noir ; antennes longues ; élytres longs ; derniers segments dorsaux de

l'abdomen ♂ foncés, grêles, le terminal profondément échancré, d'où longuement fourchu au sommet, dernier segment ventral assez court, style testacé subsinué, très fourchu au sommet. — Espèce très distincte par la forme grêle de l'extrémité dorsale de l'abdomen. Peut se placer près de *M. inapicalis* Pic.

**Tomoderus syriacus**, v. nov. **innototatipennis**. Elytris pallido-testaceis, immaculatis. Turquie d'Asie : Tarsous (coll. Pic).

**Leptaleus Rodriguesi** v. nov. **postreductus**. Elytris nigris, antice luteo fasciatis et postice ad suturam breve luteo maculatis. Sicile : Palerme (coll. Pic).

**Anthicus dagestanicus** n. sp. Parum elongatus, nitidus, testaceus, oculis nigris, elytris in disco et postice piceo lineatis.

Peu allongé, brillant, modérément pubescent de gris, entièrement testacé moins les yeux noirs et une ligne brune discale et un peu externe, partant d'avant le milieu pour atteindre presque le sommet des élytres. Tête rétrécie en arrière et un peu conique, fortement ponctuée ; prothorax pas très long, fortement dilaté-arrondi en avant, à base droite sur les côtés, à peine tuberculé, à ponctuation assez forte, peu dense ; élytres pas très longs, faiblement élargis vers le milieu, subarrondis au sommet, médiocrement ponctués ; pattes assez grêles. Long. 3,5 mill. Dagestan (coll. Pic). — Peut se placer près de *A. humilis* Gem., distinct, à première vue, par sa particulière coloration.

**Anthicus Nicolasi** n. sp. Satis robustus, parum nitidus, nigro-piceus, antennis pro majore parte, thorace pedibusque testaceis, elytris latis, humeris prominulis.

Assez robuste, peu brillant et pubescent de gris, noir de poix avec les antennes, celles-ci à sommet rembruni, les pattes et le prothorax testacés ; tête large et courte, subarquée postérieurement ; prothorax court, dilaté-arrondi en avant, peu ponctué ; élytres courts et larges, à épaules marquées, un peu déprimés en avant et sur la suture, subtronqués au sommet, finement ponctués ; cuisses un peu robustes. Long. 3 mill. Transcaspienne (coll. Pic). — Voisin de *A. caspius* Desbr., tête plus robuste et coloration différente.

**Anthicus longipygus** n. sp. Satis elongatus, nitidus, rufo-testaceus, capite, antennis apice femoribusque brunnescentibus, elytris subovatis, humeris nullis.

Assez allongé, brillant, roux-testacé avec la tête, les antennes moins la base, et le milieu des cuisses rembrunis ; tête assez grosse et pas très longue, subarquée postérieurement ; prothorax plus long que large, modérément élargi en avant, à base presque droite, modérément ponctué ; élytres en ovale un peu allongé avec les épaules tout à fait effacées, subtronqués au sommet, assez fortement ponctués ; pygidium un peu saillant ; pattes courtes. Long. 3 mill. Syrie (coll. Pic). — Voisin de *A. globipennis* Pic par ses épaules nulles, mais prothorax plus étroit, élytres de forme plus allongée, etc.

**Anthicus corsicus** v. nov. **valdoniellensis**. Thorace testaceo, antice late nigro, elytris nigris, antice rufo maculatis, et postice rufo fasciatis, apice breve rufo-marginatis. Corse : Valdoniello (coll. Pic.) — Coloration noire plus étendue que chez v. *corsicus* Laf. avec le prothorax bicolore.

**Anthicus binotaticollis** n. sp. ♂. Satis elongatus, parum nitidus, niger, thorace rufo, antice nigro bimaculato, elytris nigris, postice testaceo fasciatis, pedibus testaceis, femoribus pro parte nigris. Long. 4 mill. Corse (coll. Pic). — Jolie espèce voisine

de *A. hispanicus* Pic par sa coloration, et distincte, à première vue, par son prothorax bimaculé de noir antérieurement, les antennes plus grêles et la fascie postérieure claire des élytres plus droite.

***Anthicus fasciatus* v. nov. Codinai.** Robustus, niger, antennis ad basin pedibusque pro majore parte testaceis, thorace postice et infra testaceo notato, elytris nigris, antice distincte argenteo pubescentibus, postice testaceo fasciatis ♂, ♀ ad humeros breve rufe notatis. Espagne : Barcelone (Codina, in coll. Pic).

***Eudomia unifasciata* v. nov. maculata.** Elytris postice non fasciatis sed nigro maculatis. France : Cannes et Lyon (coll. Pic).

***Nanophyes luteonotatus* n. sp.** Oblongo-ovatus, rufescens, elytris brunnescentibus, antice oblique luteo fasciatis et postice luteo maculatis, infra corpore nigro.

Oblong-ovalaire, roussâtre avec les élytres rembrunis, à dessins jaunes, dessous noir. Rostre robuste, arqué, yeux assez rapprochés ; antennes à massue triarticulée avec le dernier article long, sommet du scape plus clair que le reste de ces organes, prothorax court, très rétréci en avant ; élytres peu plus larges que le prothorax, assez longs, fortement striés, brunâtres, ornés d'une fascie oblique antérieure jaune et de macules postérieures jaunes allongées et en partie pubescentes de gris ; cuisses robustes, les antérieures nettement biépineuses. Long. 2.5 mill. Caucase (coll. Pic). — Ressemble à *N. Durieui* Luc. ; un peu moins robuste, élytres dépourvus de macules noires, etc.

***Nanophyes centromaculatus* v. nov. uninotatus.** Elytris pallidis, ad suturam in medio minute nigro maculatis. Algérie : Bône (coll. Pic).

***Nanophyes setulosus* v. nov. junctus.** Lineolis nigris elytrorum in singulo junctis. Egypte (coll. Pic.)

***Nanophyes 4-virgatus* v. nov. 7-maculatus.** Thorace piceo trinotato, elytris in singulo piceo et oblique maculatis. Bône (coll. Pic).

***Nanophyes 4-virgatus* v. nov. innotatithorax.** Thorace elytris que testaceis, immaculatis. Caucase (coll. Pic).

***Nanophyes 4-virgatus* v. semiobliteratus.** Thorace elytris que pallidis, his brunneo maculatis. Algérie : Ouarsenis (coll. Pic). — Les élytres ont seulement chacun une macule brunâtre, placée en dessous du milieu du 5<sup>e</sup> intervalle.

***Nanophyes (Corimalia) Letourneuxi* n. sp.** Minutus, oblongus, testaceus, capite et infra corpore nigris, pro parte albo squamulatus, pro parte albo pilosus.

Petit, oblong, testacé avec la tête et le dessous noirs, revêtu sur le prothorax de squamules blanches peu serrées et sur les élytres de poils subsquamuleux blancs. Rostre assez long, un peu courbé à la base, yeux un peu éloignés, parallèles ; prothorax court, nettement rétréci en avant ; élytres un peu plus larges que le prothorax, à épaules marquées, courts, striés ; fémurs inermes. Long. 1,5. Egypte (Letourneux, in coll. Pic). — Diffère de *N. inconspicuus* Bris. par ses épaules plus marquées et son revêtement un peu différent.

(A suivre.)

M. Pic.